



CAROLI LINNÆI

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. A
PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIA
BERNENS. LONDIN. ANGLIC. EDENBURG. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. SOC.

SPECIE PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS

AD

GENERA RELATAS

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIB
TRIVIALIBUS, SYNONYMIS SELECTIS
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Editio Tertia.

VINDOBONAE,

TYPIS JOANNIS THOMAE DE TRATTN
CAES. REG. *AVLAE TYPOGRAPHI* ET BIBLIOP.

MDCCLXIV.

Classis XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

AJUGA.

AJUGA floribus resupinatis. orientalis.
Teucrium staminibus tubo corollæ brevioribus. *Roy. lugdb.* 306.
Bugula orientalis villosa, flore inverso candido cum oris purpureis. *Tournef. cor.* 14.
Bugula orientalis villosa, flore inverso cæruleo: alba macula notato. *Tournef. cor.* 14. *Dill. elth.* 60. *t.* 53. *f.* 61.
Habitat in Oriente.

AJUGA tetragono-pyramidalis. *Fl. svec.* 475; 512. * pyramidal
Mat. med. 306. *Dalib. parif.* 167.
Consolida media pratensis cærulea. *Bauh. pin.* 260. *non synon.*
Consolida media genevensis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 432.
Bugula foliis angulose dentatis, caule simplici. *Hal. helv.* 635.
Phyllochnois. *Reneal. spec.* 125. *
Habitat in Suecia, Helvetia, Germania. ♂

AJUGA foliis tomentosis, calycibus hirsutis. genevensis
Bugula carneo flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 43.
Habitat in Europa *australiori.*

AJUGA stolonibus reptantibus. reptans.
Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Gort. gelr.* 330.
Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. parif.* 170.
[C]onsolida media pratensis cærulea. *Bauh. pin.* 260.
[B]ugula. *Dod. pempt.* 135.
[H]abitat *in* Europa *australiori.* ♃

TEUCRIUM.

ampanulatum. 1. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus oppositis.

Teucrium foliis cuneiformibus trifidis: laciniis divisis, floribus solitariis. *Roy. lugdb.* 306.

Teucrium, calyce campanulato, laciniatum, flore parvo subcæruleo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 181.

β. Teucrium supinum perenne palustre apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo. *Till. pis.* 163. *t.* 49. *f.* 1. *Allion. taur.* 53.

Habitat in Orientis, Apuliæ *humentibus.* ♃.

Simillimum T. Botryi, sed planta glabra. Radix *perennis.* Flores *solitarii, Pedunculis flore brevioribus; Calyces campanulati, nec basi gibbi; Corollæ albo-margaritaceæ, folio incumbentes.* Caules *seniores prostrati.* Folia *bis trifida.* Semina *scabra.*

rientale. 2. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus racemosis.

Teucrium foliis pinnatifidis: laciniis linearibus: infimis divisis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 307.

Teucrium orientale angustifolium laciniatum; flore magno subcæruleo. *Tournef. cor.* 14. *Comm. rar.* 25. *t.* 25.

Habitat in Oriente.

otrys. 3. TEUCRIUM foliis multifidis, pedunculis axillaribus ternis.

Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. paris.* 171. *Sauv. monsp.* 248.

Botrys chamædryoides. *Bauh. pin.* 138.

Chamæpitys altera. *Dod. pempt.* 46.

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Helvetiæ, Italiæ *apricis cultis.* ☉

aissolianum. 4. TEUCRIUM foliis trifidis quinquefidisque filiformibus, floribus pedunculatis solitariis oppositis, caule decumbente.

Teucrium supinum annuum lusitanicum, foliis laciniatis. *Tournef. inst.* 208.

Chamædrys annua multiflora tenuifolia hispanica tournefortii. *Moris. hist.* 3. *p.* 423. *s.* 11. *t.* 22. *f.* 19.

Habitat in Hispania, Lusitania. ☉

5. TEU-

5. TEUCRIUM foliis tripartitis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis solitariis oppositis, caule patulo. Pseudochamæpitys.
Chamæpitys spuria, multifido folio, lamii flore. *Bauh. pin.* 250.
Pseudochamæpitys. *Clus. hist.* 2. *p.* 185.
Chamæpitys alia. *Cam. epit.* 680.
Habitat in Hispania. ♃

6. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Hort. upf.* 160. *Mat. med.* 287. Chamæpitys.
Teucrium foliis simpliciter trifidis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Guett. stamp.* 2. *p.* 248. *Gron. virg.* 64. *Dalib. paris.* 173. *Sauv. monsp.* 175.
Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. *Bauh. pin.* 249.
Chamæpitys prima. *Dod. pempt.* 46.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Hungariæ, Helvetiæ *arvis.* ☉

7. TEUCRIUM foliis subtricuspidatis linearibus, floribus sessilibus. Iva.
Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb.* 306. *Sauv. monsp.* 141.
Chamæpitys moschata, foliis serratis. *Bauh. pin.* 249.
Chamæpitys spuria prior. *Dod. pempt.* 47.
Anthyllis altera. *Clus. hist.* 2. *p.* 186.
Habitat in Lusitania, G. Narbonensi, Monspelii.

8. TEUCRIUM foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis. Mauritanum.
Teucrium, delphinii folio, non ramosum. *Shaw. afr.* 575. *t.* 57.
Habitat in Mauritania.

9. TEUCRIUM foliis integerrimis oblongo-ovatis petiolatis: supra glabris, subtus tomentosis, pedunculis unifloris. fruticans.
Teucrium foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305.
Teucrium peregrinum, folio sinuoso. *Bauh. pin.* 247.

Teucrium fruticans boeticum. *Cluf. hift.* 1. *p*. 348.
Habitat in Bæticæ, Siciliæ *maritimis.* ♄

0. TEUCRIUM foliis integerrimis rhombeis acu villofis: fubtus tomentofis. *Hort. upf.* 159. *
Teucrium fruticans bæticum, ampliore folio. *D eltb.* 379. *t.* 284. *f.* 367.
Teucrium bæticum humilius & ramofius, folio fubr tundo. *Hort. angl. t.* 3 *
Habitat in regione Bætica. ♄

12. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integ rimis, racemo fubfpicato: floribus ternis.
Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis fl feffilibus, floribus folitariis pedunculatis. *Hort. cl* 303 *Hort. upf.* 159. *Mat. med.* 286. *Roy. lugdb.* 3
Polium anguftifolium creticum. *Bauh. pin.* 221.
Rofmarinum ftœchados facie. *Alp. exot.* 103. *t.* 10
Habitat in Creta, Ægypto. ♄

12. TEUCRIUM foliis integerrimis ovatis fubtus t mentofis utrinque acutis, racemis fecundis, cal cibus villofis.
Teucrium foliis ovatis utrinque acutis integerrim floribus folitariis utrinque digeftis. *Hort. cliff.* 30 *Hort. upf.* 159. *Mat. med.* 285. *Roy. lugdb.* 305.
Marum cortufi. *Bauh. hift.* 3. *p.* 242.
Habitat in regno Valentino. ♄

13. TEUCRIUM foliis ovatis utrinque acutis: fup ne ferrato-dentatis, floribus racemofis. *Roy. lugdb.* 3
Teucrium foliis ovatis utrinque acutis utrinque dentatis, verticillis laxis. *Hort. cliff.* 303.
Chamædrys multiflora tenuifolia hifpanica. *Tourn inft.* 205. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 182.
Habitat in Hifpania.

14. TEUCRIUM foliis ovatis ferratis, pedunculis litariis trifloris, bracteis lineari-lanceolatis.
Teucrium chamædryos folio, flore parvo purpure *Gmel. mff.*
Habitat in Sibiria. ♃
Pedunculi *folitarii, triflori: flore intermedio feffili.* B cteæ *fub bifurcatura,* 2, *lanceolatæ, mucronatæ, in gerrimæ, longitudine calycis, ut in Satureja montana*

15. TEU-

15. TEUCRIUM foliis ovato-lanceolatis ferratis, caule erecto, racemo terminali, verticillis hexaphyllis. canadense.
Teucrium foliis lanceolatis ferratis petiolatis, floribus solitariis. *Gron. virg.* 64?
Chamædrys canadensis, urticæ folio fubtus incano. *Tournef. inst.* 205.
Habitat in Canada. ♃
Planta e Canada *Foliis gaudet angustioribus, æqualiter ferratis, fubtus tomentosis, planis; Spica ex verticillis aut sparsis floribus bractea minima singulis fubjecta; at* Hortensis *Foliis majoribus rugosis, inæqualiter ferratis, vix fubtus pubescentibus &* Floribus *in* Racemum *fubspicatum ex verticillis sexfloris, hexaphyllis: bracteis ferratis.*

16. TEUCRIUM foliis cordato-oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis terminalibus sessilibus spiralibus. hircanicum
Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis oblongis densissimis. *Hall. gœtt.* 315. *Arduin. spec.* 13. *t.* 4.
Habitat in Hircania. ♃
Folia *Betonicæ officinalis.* Spicæ *longissimæ, floribus undique spiraliter dense congestis, ex dichotomiis ultimis caulis.*

17. TEUCRIUM foliis ovatis inæqualiter ferratis, racemis terminalibus. *Gron. virg.* 64. virginicum
Habitat in Virginia.

18. TEUCRIUM foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus fecundis, caule erecto. Scorodonia
Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis fecundis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. parif.* 171. *Gort. gelr.* 331.
Scorodonia. *Riv. mon. t.* 12.
Scordium alterum f. Salvia fylvestris. *Bauh. pin.* 247.
Habitat in arenosis editis Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ, Angliæ, Belgii: *in duris prædii Hartecampi, beati quondam mihi Paradisi.* ♃

TEUCRIUM foliis ovatis rugosis inciso-crenatis incanis, caulibus erectis, racemis rectis. massiliense
Teucrium creticum. *Clus. hist.* 1. *p.* 348.

Teucrium fruticosum incanum creticum, flore purpureo. *Barr. ic.* 806.

Chamædrys fruticosa cretica, purpureo flore. *Tou inst.* 405.

Habitat in Creta, Gallia *australi: villa Franca.* ♄

Caules *suffruticosi, vix pedales.* Folia *ovata s. dato ovata, rugosa, inæqualiter serrata, obtusi la, parva, margine reflexa, subtus venosa.* Rac *terminales, secundi.* Flores *oppositi, peduncu* Calyces *fere Scutellariæ ut in T. hircanico: La superiore subcordato, patente, acuto.* Corolla *purascens Labio inferiore valde concavo.* Odor *petæ.*

20. TEUCRIUM foliis oblongis sessilibus dentato-ratis, floribus geminis lateralibus pedunculat caule diffuso.

Teucrium foliis ovato-lanceolatis serrulatis sess bus, floribus sæpius binatis. *Hort. cliff.* 302. *svec* 476; 513. *Mat. med.* 289. *Roy. lugdb.* 3 *Dalib. paris.* 171.

Scordium. *Bauh. pin.* 247. *Cam. epit.* 588. *L pempt.* 126.

Habitat in Europæ *paludosis.* ♃

Conf. Scordium lanuginosum C. B. 247. *Vari hirsutior, ramosior, foliis minoribus.*

21. TEUCRIUM foliis ovatis acute inciso-serratis bris, floribus axillaribus geminis, caule erecto.

Chamædrys alpina frutescens, folio splendente. *M hort.* 52. *t.* 52.

Habitat in alpinis vallis Barsilionensis Sabaudiæ; *in te Lachin* Galloprovinciæ. *Gerard.* ♃

Radix *perennis, stolones exserens, e quibus* Caules *sti, glabri, nigricantes.* Folia *petiolata, oblon acute crenata, nervosa, glabra, internodiis brevi* Flores *axillares, utrinque gemini, purpurei: Caly fusci.*

22. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis incisis c natis petiolatis, floribus subverticillatis ternis tiolatis. *Hort. cliff.* 302. *Mat. med.* 288. *Roy. lu* 307. *Dalib. paris.* 170. *Sauv. monsp.* 145.

Chamædrys major repens. *Bauh. pin.* 248.

Cha

Chamædrys. *Riv. mon.* 10.
β. Chamædrys minor repens. *Bauh. pin.* 248.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. ♃
Bracteæ serratæ. Corolla purpurea labio plano obsolete trifido.

3. TEUCRIUM foliis cordatis obtuse serratis: floralibus integerrimis concavis, caule fruticoso, floribus ternis. flavum
Teucrium foliis subovatis crenatis, floribus laxe spicatis pedunculatis, caule frutescente. *Hort. cliff.* 302. *Hort. upf.* 160. *Roy. lugdb.* 307. *Sauv. monsp.* 145.
Teucrium. *Bauh. pin.* 247.
Chamædrys fruticosior, flore ochroleuco. *Moris. hist.* 3. *p.* 421. *s.* 11. *t.* 22. *f.* 1.
Teucrium vulgare fruticans 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 348.
β. Teucrium lucidum, parvo folio, flore venuste purpureo. *Pluk. alm.* 367. *t.* 65. *f.* 2.
Habitat in Italia, Sicilia, Melita, Hispania, Monspelii. ♄
Flores racemosi, utrinque terni, pedunculati. Corolla albida labio integro concavo.

4. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. montanum
Teucrium foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, spicis laxis subrotundis. *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305. *Dalib. paris.* 172. *Sauv. monsp.* 141.
Polium, lavendulæ folio. *Bauh. pin.* 220.
Polium majus. *Cord. hist.* 124. *b.*
Ajuga folio integro. *Riv. mon.* 15.
Habitat in siccis Germaniæ, Monspelii, Genevæ, Helvetiæ, Parisiis. ♃

5. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis linearibus margine revolutis. supinum.
Polium montanum repens. *Bauh. pin.* 220.
Polium montanum supinum minimum. *Lob. ic.* 488.
Habitat in agro Viennensi.
Præcedenti maxime affinis est.

TEUCRIUM corymbo *terminali*, *foliis* cuneiformi-*rotundatis crenatis.* pyrenaicu

Teucrium foliis cuneiformibus crenatis, corymb terminali, foliolis floralibus linearibus. *Vir. cli* 55. *Roy. lugdb.* 305.

Teucrium foliis suborbiculatis crenatis, spica la orbiculata depressa. *Hort. cliff.* 301.

Polium pyrenaicum supinum, hederæ terrestris foli *Tournef. inst.* 206.

Polium saxatile purpureum chamædryoides, amp coma. *Bocc. mus.* 2. *t.* 61. *Barr. rar.* 315. *t.* 108 *folia male.*

Habitat in Pyrenæis. ♃

27. TEUCRIUM capitulis subrotundis, foliis oblo gis obtusis crenatis tomentosis sessilibus, caule pr strato. *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305. *Sau monsp.* 141. *Gron. orient.* 71.

α. Polium montanum luteum. *Bauh. pin.* 220.

β. Polium montanum album. *Bauh. pin.* 221.

γ. Polium montanum supinum alterum. *Bauh. pin.* 221.

δ. Polium maritimum supinum venetum. *Bauh. pin.* 221

Polium montanum 5. *Clus. hist.* 1. *p.* 362.

Hyssopium dioscoridis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 59. *t.* 67.

Habitat in Italia, Hispania, Lusitania, Narbona, Li bano. ♃

Species Polii, *a varietatibus distinctas, hodie confusas inquirant solidi Botanici, in solo natali.*

28. TEUCRIUM capitulis sessilibus terminalibus, fo liis linearibus planis quadrifariis confertis, caul procumbente tomentoso. *Amœn. acad.* 4. *p.* 276. *

Polium hispanicum montanum pumilum, rosmarin folio, flore rubro. *Tournef. inst.* 207.

Polium montanum pumilum rubrum, viridi stœcha dis folio, caule tomentoso. *Barr. ic.* 192.

Habitat in Hispania. *Læfl.*

29. TEUCRIUM capitulis pedunculatis, foliis lanceo latis crenatis tomentosis, caule erecto.

Polium montanum album serratum latifolium. *Barr. rar.* 325. *t.* 1079. 1078.

β. Polium maritimum erectum monspeliacum. *Bauh. pin.* 221.

Polium monspelianum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 699.

Habitat in Hispania.

Ha-

Habitus Origani majoranæ, sed tomentosum & angustifolium.

TEUCRIUM spinosum, calycibus labio superiore ovato, corollis resupinatis, pedunculis geminis. *Loefl. it.* 147. — spinosum.

Chamædrys multifida spinosa odorata. *Grisl. lusit.* 20.
Chamædrys spinosa. *Bauh. pin.* 248. *prodr.* 117. *f.* 117. *Morif. hist.* 3. *p.* 423. *f.* 11. *t.* 22. *f.* 17.
Habitat in Lusitaniæ *collibus, arvis.* ☉
Flores 2, axillares, pedunculati, sc. unus a singulo latere spinæ.

TEUCRIUM foliis serratis, spinis terminalibus, corollis rectis. — mucronatum.

Scordium spinosum odoratum. *Corn. can.* 123. *Barr. rar.* 319. *t.* 202.
Habitat - - - - - †

SATUREJA.

SATUREJA capitulis terminalibus, foliis lanceolatis. — virginiana.

Satureja virginiana. *Herm. par.* 218. *t.* 218.
Pulegium erectum virginianum angustifolium, floribus in cymis dispositis. *Morif. hist.* 3. *p.* 371. *f.* 11. *t.* 7. *f.* 8.
Clinopodium foliis lanceolatis acuminatis, capitulis terminalibus. *Hort. cliff.* 304. *Gron. virg.* 65. *Roy. lugdb.* 314.
Clinopodium, pulegii angusto rigidoque folio, virginianum, flosculis in cymis dispositis. *Pluk. alm.* 110. *t.* 54. *f.* 2.
Serpentaria virginiana. *Bocc. muf.* 2. *p.* 161. *t.* 115.
Habitat in Virginia. ♃
Stamina *in fundo corollæ latent Antheris minimis effœtis, ut fere posset genere proprio tradi.*

SATUREJA verticillis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis. — juliana.

Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis glabris. *Roy. lugdb.* 324.
Satureja spicata. *Bauh. pin.* 218.
Satureja perennis, verticillis spicatim & densius dispositis. *Morif. hist.* 3. *p.* 412. *f.* 11. *t.* 17. *f.* 4.

 Ha-

Habitat in Hetruria, *in Thyrrheni maris asperis*, rentiæ. ♃

3. SATUREJA verticillis subrotundis hispidis, oblongis acutis. *Roy. lugdb.* 324.
Satureja cretica. *Bauh. pin.* 218.
Thymus frutescens, verticillis fere nudis glo foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 306.
Thymbra legitima. *Clus. hist.* 1. *p.* 358.
Thymum creticum pone verticillatum. *Barr.* 279. *t.* 898.
Habitat in Creta, Tripoli.
Verticilli in hac 4. *s.* 5, *in præcedenti* 9. *s.* 10.

4. SATUREJA pedunculis subtrifloris lateralibus volucellis calyce brevioribus.
Satureja annua orientalis tenuior, ad singulos n florifera. *Moris. hist.* 3. *p.* 411. *s.* 11. *t.* 17. *f.* 9
Clinopodium minus exoticum, thymi folio ma inodorum. *Pluk. alm.* 110. *t.* 84. *f.* 8.
Clinopodium creticum. *Alp. exot.* 265. *t.* 264.
Habitat ad Archipelagum. ♃
Facie convenit cum S. montana, a qua differt folii nus mucronatis; sed præcipue corymbis florum, utrinque non soli, sed bini; accedit quod bracte involucrum in hac minimum est, in montana longitudine corymbi. Folia *inferiora ovata Th subtus purpurascentia, reliqua magis linearia: i perna foliorum pagina sunt quasi micæ s. atomi dentes, qui relucent a pilis nonnullis brevibus sp* Corollæ *extus purpurascentes, intus albido-pur scentes maculis* 3. *purpureis ad corollæ basin, qu intermedia major.*

5. SATUREJA pedunculis dichotomis lateralibus litariis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis.
Satureja pedunculis dichotomis, verticillis conc natis. *Vir. cliff.* 57. *Hort. upf.* 161. *Roy. lu* 324. *Sauv. monsp.* 142.
Satureja montana. *Baub. pin.* 218.
Satureja perennis. *Riv. mon.* 41.
Melissa foliis linearibus integerrimis. *Hort. cliff.*
Habitat in Hetruria, Narbona. ♃

6. SA

1. SATUREJA pedunculis bifloris. *Vir. cliff.* 87. *Hort. upf.* 161. *Mat. med.* 284. *Roy. lugdb.* 324. *Sauv. monfp.* 142. — hortenfis

Satureja hortenfis. *Bauh. pin.* 218.

Satureja altera. *Cam. epit.* 487.

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 306

Habitat in G. Narbonenfi & Italia. ⊙

2. SATUREJA floribus fpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Mat. med.* 283. *Gron. orient.* 71. — capitata.

Thymus capitatus qui diofcoridis. *Bauh. pin.* 219.

Thymum legitimum. *Cluf. hift.* 1. *p.* 357.

Thymum creticum incanum capitatum. *Barr. ic.* 897.

Habitat in Creta, Bætica, Hifpali, Græcia, Palæftina. ♃

3. SATUREJA ramis fpinofis, foliis hifpidis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 317. * — fpinofa.

Satureja cretica frutefcens fpinofa. *Tournef. cor.* 13.

Satureja cretica fpinofa. *Pon. ital.* 21.

Habitat in Creta. ♄

4. SATUREJA pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 399. * — viminea.

Mentha viminea, foliis minoribus obovatis, pedunculis trifloris alaribus. *Brown. jam.* 258.

Habitat in Jamaica.

Facies Cunilæ, fed ftamina 4.

THYMBRA.

1. THYMBRA floribus fpicatis. — fpicata.

Thymbra fpicata verior hifpanica. *Barr. rar.* 281. *t.* 1230.

Thymum majus longifolium, ftoechadis foliaceo capite purpurafcente, pilofum. *Pluk. alm.* 368. *t.* 116. *f.* 5.

Hyffopus capitata africana, faturejæ rigido hirfuto folio. *Morif. hift.* 3. *p.* 361.

Satureja hirfuta purpurea olibani. *Dodart. mem.*

Habitat in Macedonia, Libano. ♄

2. THYM-

2. THYMBRA floribus verticillatis.
Hyssopus angustifolia montana aspera. *Bauh. pin.*
Hyssopus montana. *Daleck. hist.* 394.
Habitat in Europa *australi.* ♄
Caules *vix pedales.* Folia *opposita, lineari-lanceol integra, punctata:* Floralia *paulo latiora, acuti sed ciliata. Hæc omnino verticillata, floribus se bus;* Præcedens *obsolete spicata, spica oblonga cteis s. foliis ciliatis imbricata. Forte prioris varietas.*

HYSSOPUS.

1. HYSSOPUS spicis secundis. *Hort. cliff.* 304. *H upsf.* 152. *Mat. med.* 290. *Roy. lugdb.* 323. *G gelr.* 336.
Hyssopus officinarum cærulea s. spicata. *Bauh. pin.*
Hyssopus vulgaris. *Dod pempt.* 287.
β. Hyssopus rubro flore. *Bauh. pin.* 217.
Habitat in Valle angusta. ♃

2. HYSSOPUS corollis subresupinatis, staminibus ferioribus corolla brevioribus. *Hort. upsf.* 162.
Cataria floribus inversis. *Hall. gætt.* 344.
Habitat in China *septentrionali.* ♃

3. HYSSOPUS caule acuto quadrangulo. *Hort.* 163. *
Nepeta caule acute quadrangulo glabro. *Vir. cliff.* *Roy. lugdb.* 316. *Gron. virg.* 66.
Brunella bracteis lanceolatis. *Hort. cliff.* 316.
Betonica virginiana elatior, foliis scrophulariæ g bris, flore ochroleuco. *Pluk. alm.* 67. *t.* 150. *f. Morisf. hist.* 3. *p.* 365. *s.* 11. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in Virginia, Canada. ♂
Hanc cum præcedente ad Hyssopum ex lege tantum tis retuli, ut character generis obtineatur.

NEPETA.

1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedic latis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis.
Nepeta floribus interrupte spicatis pedunculat *Hort. cliff.* 310. *Hort. upsf.* 163. *Fl. svec.* 48 514. *Mat. med.* 291. *Roy. lugdb.* 316. *Gron. vi.* 65. *Dalib. parisf.* 116.

Men-

Mentha cataria vulgaris & major. *Bauh. pin.* 228.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Mentha Cataria minor. *Bauh. pin.* 228.
Habitat in Europa. ♃
Varietas β. dimidio minor est.

NEPETA floribus paniculatis, foliis cordatis petiolatis obsolete crenatis. pannonica.
Nepeta caule paniculato, pedunculis partialibus ramosis multifloris. *Roy. lugdb.* 316.
Nepeta pannonica major & elatior. *Moris. hist.* 3. *p.* 415. *s.* 11. *t.* 6. *f.* 6.
Mentha montana verticillata. *Bauh. pin.* 227.
Habitat in Pannonia. ♃

NEPETA verticillis pedunculatis corymbosis, foliis petiolatis cordato-oblongis dentatis. violacea.
Nepeta foliis ovatis petiolatis glabris, verticillis dissite spicatis glabris. *Sauv. monsp.* 151.
Nepeta montana purpurea major, sparsa spica. *Barr. ic.* 601. *Bocc. mus.* 2. *p.* 46. *t.* 36.
Cataria hispanica, betonicæ folio angustiore, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 202.
Habitat in Hispania. ♃

NEPETA foliis cordato-lanceolatis dentatis tomentosis, floribus racemosis: racemulis quinquefloris. Nepetella.
Habitat in Europa *australi.*
Planta *triplo minor Cataria.* Folia *angustissima, acute sinuato-dentata.* Flores *laxe racemosi: racemulis sub-quinquefloris, nec ut in N. violacea floribus* 30. Calyces *nudi.* Corollæ *recentes rubræ, nec albidæ aut cæruleæ.* Antheræ *cæruleæ.* Bracteæ *angustissimæ, patentes.*

NEPETA floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus nudis. ucranica.
Cataria betonicæ folio angustiore, flore cærulescente. *Gerb. tan.* 87.
Habitat in Ucrania.

NEPETA foliis cordato-oblongis subsessilibus serratis, racemis verticillis nudis. nuda.

Ne-

Nepeta foliis sessilibus nudis, calycibus fructus o
tis æqualibus. *Hort. upf.* 164. *
Mentha cataria hispanica, olim Sideritis altissim
flore albo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 226.
Habitat in Hispania. ♃

7. NEPETA floribus sessilibus verticillato - spicat
verticillis tomento obvolutis. *Hort. cliff.* 311. *R*
lugdb. 316.
Horminum spicatum, lavendulæ flore & odore. *Bo*
sicc. 48. *t.* 25. *f.* 2.
Habitat in Sicilia.

8. NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, b
cteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiola
Mentha Cataria minor alpina. *Bauh. pin.* 228. *prodr.* 1
Habitat in Italia. *D. Rathgeb.* ♃
Radix *perennis.* Caulis *pedalis.* Folia *cordata, ob*
sa, crenata, petiolata. Spicæ *terminales, vertic*
latæ: verticilli remoti, sessiles, obvallati Bracteis la
ceolatis, viridibus, lateribus albidioribus, longitu
ne calycum, acuminatis. Calyces *erecti, æquale*
Corollæ *albæ.*

9. NEPETA spicis sessilibus terminalibus: bract
subcordatis villosis, foliis cordatis obtusis. *Ama*
acad. 4. *p.* 317. *
Scordium alterum lanuginosius verticillatum. *Bau*
pin. 248.
Scordotis. *Alp. exot.* 284. *t.* 283. *Clus. hist.* 2. *p.* 3
Habitat in Creta. ♃

10. NEPETA spicis terminalibus, sessilibus, bracteis
vatis coloratis, foliis summis sessilibus. *Hort. cli*
311. *Roy. lugdb.* 316.
Mentha tuberosa radice. *Bauh. pin.* 227.
β. Nepeta tuberosa spicata hispanica. *Bocc. muf.* 2.
44. *t.* 36. *Barr. ic.* 1131.
Habitat in Hispania, Lusitania. ♃
Caules *simplices.* Folia *cordato-oblonga, rugosa, o*
tusiuscula, grosse serrata, pubescentia. Spica *term*
nalis, longa, subinterrupta: Bracteis *numerosis, er*
ctis, ovatis, acutis, nervosis, rubro coloratis, ma
gine pubescentibus, calyces obtegentibus, Flores *viol*
cei β. procumbens est.

11. NE-

NEPETA foliis lanceolatis, capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus. virginica.

[Cl]inopodium foliis lanceolatis, capitulis terminalibus. *Hort. cliff.* 305. *Gron. virg.* 65.

[Cl]inopodium, amaraci folio, floribus albis. *Pluk. alm.* 110. *t.* 85. *f.* 2.

[Cl]inopodium, flore albo, ramosius, angustioribus foliis glabris, virginianum. *Moris. hist.* 3. *p.* 374. *s.* 11. *t.* 8. *f. ult.*

Habitat in Virginia. ♃

Labium inferius corollæ serratum, at non concavum.

NEPETA corollarum labio superiore integerrimo brevissimo. indica.

[L]eucas foliis subrotundis serratis, flore albo. *Burm. zeyl.* 140. *t.* 63. *an?*

[N]epeta indica, rotundiore folio. *Moris. hist.* 3. *p.* 415. *s.* 11. *t.* 6. *f.* 7.

[T]tu-kurka. *Rheed. mal.* 10. *p.* *t.* 90.

[Ha]bitat in India.

[La]bium corollæ superius brevissimum omnium, integrum, [s]tamina autem longitudine labii inferioris. Flores *verticillati.*

NEPETA floribus spicatis, foliis pinnatifidis integerrimis. multifida.

[L]avendula montana, folio valerianellæ varie secto, cærulea. *Amm. ruth.* 69.

[Be]tonica sibiriensis. *Walth. hort.* 122. *t.* 20.

[Hab]itat in Dauria.

[Ca]ulis *erectus absque ramis;* Folia *inferiora petiolata; superiora sessilia, non crenata, oblonga, triloba, quadriloba, quinqueloba: lobis alternis, oblongis.* Flores *valde parvi;* Antheræ *bipartitæ.*

NEPETA spicis secundis, foliis cordatis nudis, caule frutescente, corollis minutis. pectinata.

[Ga]leopsis procerior, foliis ovato-acuminatis serratis, spicis majoribus compositis, spicillis geminatis secundis. *Brown. jam.* 259.

[Hab]itat in Jamaica. ♄

[Cau]lis *orgialis, tetragonus, lævis, brachiatus, vix fra[gr]ans.* Folia *petiolata, cordata, venosa, nuda, serra[ta].* Spicæ *terminales, secundæ, interruptæ, vix foliatæ: [ve]rticillis pedunculatis, fastigiatis, secundis:* Bracteis *seta-*

setaceis, plurimis, longitudine florum. Calyx 5-parti *setaceus.* Corolla *lutea, vix calyce major: Limbi fido: laciniis quatuor, æqualibus, acutis, patenti quinta s. labium purpurascens subrotundum.* Stam 4, *longitudine corollæ distantia.* Stylus *purpurasc* Stigmata *simplicia.* Floret *hyeme.*

L A V A N D U L A.

1. LAVANDULA foliis lanceolatis integerrimis, cis nudis. *Hort. cliff.* 303. *Hort. upf.* 162. *M med.* 296. *Roy. lugdb.* 322. *Sauv. monsp.* 143.
   α. Lavandula angustifolia. *Bauh. pin.* 216.
   Lavendula altera. *Dod. pempt.* 273.
   β. Lavandula latifolia. *Bauh. pin.* 216.
   Habitat in Europa *australi.* ♄
   Varietas *α. Fruticans foliis linearibus. β. Annua fi lanceolatis.*

2. LAVANDULA foliis duplicato-pinnatifidis. *cliff.* 56. *Hort. cliff.* 303. *Roy. lugdb.* 322. *H upf.* 162.
   Lavandula folio dissecto. *Bauh. pin.* 216.
   Lavendula multifido folio. *Clus. hist.* 1. *p.* 345.
   β. Lavendula folio longiore tenuius & elegantius fecto. *T. Comm. rar.* 27. *t.* 27.
   γ. Lavandula canariensis maritima, spica multip cærulea. *Pluk. alm.* 209. *t.* 303. *f.* 5.
   Habitat in regione Bætica ♂

3. LAVANDULA foliis pinnato-dentatis. *Hort. cl* 303. *Roy. lugdb.* 323.
   Stœchas folio serrato. *Bauh. pin.* 216.
   Stœchas crispo folio. *Clus. hist.* 1. *p.* 346.
   Habitat in Hispaniæ *Calape,* Oriente. ♄

4. LAVANDULA foliis lanceolato-linearibus, sp comosa. *Hort. cliff.* 303. *Hort. upf.* 162. *Mat. m* 297. *Roy. lugdb.* 323. *Sauv. monsp.* 143.
   Stœchas purpurea. *Bauh. pin.* 216.
   Stœchas brevioribus ligulis. *Clus. hist.* 1. *p.* 344.
   β. Stœchas cauliculis non foliatis. *Bauh. pin.* 216.
   Stœchas longioribus ligulis. *Clus. hist.* 1. *p.* 344.
   Habitat in Europa *australi.* ♄

SIDERITIS.

* *Ebracteatæ.*

SIDERITIS fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis acutis petiolatis, spicis verticillatis. canariensis.
Stachys fruticosa, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Hort. cliff.* 310.
Stachys amplissimis verbasci foliis, floribus albis parvis non galeatis, spica betonicæ. *Pluk. alm.* 356. *t.* 322. *f.* 4.
Habitat in Canariis. ♄
Frutex Foliis *cordatis, acuminatis, crenatis, utrinque viridibus.* Spicæ *pedunculatæ, longæ, nutantes: verticillis remotis; Floribus numerosis; Calycibus hirtis, mucronatis.*

SIDERITIS fruticosa tomentosa, foliis cordatis obtusis petiolatis, ramis divaricatis, spicis verticillatis. cretica.
Stachys canariensis frutescens, verbasci folio. *Comm. hort.* 2. *p.* 197. *t.* 99. *fol. subtus alba.*
Stachys cretica latifolia. *Tournef. inst.* 186?
Habitat in Creta. ♄
Frutex *ramis divaricatis, densissime tomentosis, niveis.* Folia *cordata, crenata, utrinque tomentosa, obtusa, subtus densissime tomentosa & nivea, supra viridia.* Spica *e dichotomia ramorum, pedunculata, pendula, tomentosa, nivea una cum calycibus obtusis.* Floribus *circiter octo in singulo verticillo.*

SIDERITIS suffruticosa tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. syriaca.
Cunila calycibus inermibus lanigeris. *Hort. cliff.* 313.
Sideritis cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tournef. cor.* 12.
Stachys fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus. *Hort. cliff.* 310.
Stachys minor italica. *Bauh. pin.* 236.
Stachys lychnoides incana angustifolia, flore aureo. *Barr. ic.* 1187.
Pilosella syriaca. *Bauh. pin.* 262.
Habitat in Creta. ♄
Fruticulus *facie Salviæ, sed longior.* Folia *Salviæ, tomentosa, lanata, alba: inferiora petiolata; superiora sessilia.* Flores *ex albo flavescentes.*

perfoliata. 4. SIDERITIS herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus.

Sideritis orientalis, phlomidis folio. *Tournef. cor.* 12.

Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus serratis, floralibus cordatis acutis integerrimis. *Roy. lugdb.* 318.

Habitat in Oriente?

Caulis *erectus, herbaceus.* Folia *inferiora caulis petiolata; superiora sessilia, opposita, amplexicaulia: Floralia cordata, integerrima, acuminata.* Corollæ *albi venis aliquot rufis.*

montana. 5. SIDERITIS herbacea decumbens ebracteata, calycibus corolla majoribus spinosis: labio superiore trifido.

Cunila calycum labio spinoso: superiore trifido, inferiore bipartito. *Hort. cliff.* 313. *Hort. upsf.* 169 *Roy. lugdb.* 329.

Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin* 233.

Sideritis montana, parvo flore nigro purpureo, capite medio croceo. *Col. ecphr.* 1. *p.* 198. *t.* 196.

Habitat in Italia. ☉

Corollæ flavæ margine ferrugineo, calyce minores. Verticillis sexflori absque bracteis.

romana. 6. SIDERITIS herbacea ebracteata, calycibus spinosis lacinia superiore majore ovata.

Cunila calycum lacinia superiore latiori ovata trinervi. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 321.

Sideritis genus verticillis spinosis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 428.

Sideritis, verticillis spinosis, minor procumbens. *Moris. hist.* 3. *p.* 388. *s.* 11. *t.* 12. *f.* 5.

Habitat in agris Europæ *australis.* ♂

Calycis *lobus* 5:*tus s. superior ovatus reliquis duplo latior.* Corollæ *albæ Marrubii, Labio superiore tantum emarginato.* Verticilli *sexflori absque bracteis.*

* * *Bracteatæ: bracteis dentatis.*

incana. 7. SIDERITIS suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus bracteisque dentatis.

Sideritis hispanica erecta, folio angustiore. *Tournef inst.* 191.

Hys-

Hyssopus montana verticillata major. *Barr. ic.* 239. *Bocc. musf.* 2. *p.* 77. *t.* 67. *f.* 2.
Habitat in Hispania. *Læfling*, *Alstræmer.* ♄
Habitus *Lavandulæ*, *sed tomentoso-incanus.* Truncus *suffruticosus*, *basi plerumque decumbens*, *e quo* Caules *s. rami multi*, *tenuissime tomentosi*, *albi*, *erecti*, *elongati*, *pedales*, *tetragoni.* Folia *minus explicata*, *integerrima*, *lineata*, *tomentosa*, *alba*: *inferiora lineari-lanceolata*, *supra nuda*; *superiora linearia*, *remotiora*; *summa versus verticillos interdum dentata.* Bracteæ *cordatæ*, *dentatæ*, *subspinosæ.* Verticilli *sexflori.* Calyces *quinquedentati*, *incani.* Corollæ *flavæ*: *labio superiore erecto*, *lineari*, *sæpe bifido*; *inferiore trifido*: *intermedia quadruplo latiore.*

SIDERITIS foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. hyssopifolia.
Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 322.
Sideritis alpina hyssopifolia. *Bauh. pin.* 233.
Sideritis VII. *Clus. hist.* 2. *p.* 41.
Habitat in Hetruria, Pyrenæis, Thuiri. ♃

SIDERITIS foliis lanceolatis acutis dentatis, bracteis ovatis dentato spinosis, calycibus æqualibus, spicis ovatis. Scordioides
Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis. *Bauh. pin.* 233.
Sideritis f. ferruminatrix heraclea. *Lob. ic.* 528.
Habitat Monspelii. *D. Sauvages.* ♃
Caules supra terram parum perennantes, *adscendentes*, *simplices.* Differt a *f. hirsuta Caulibus erectioribus*; *Foliis supra sæpe glabris*; *Corollis etiam labio superiore luteis*; Spicis *ovatis*, *non interruptis*; Bracteis *ovatis*, *dentato-ciliatis.*

SIDERITIS foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato spinosis, caule hirto, spicis interruptis elongatis. hirsuta.
Sideritis hirsuta procumbens. *Bauh. pin.* 232.
Sideritis III. *Clus. hist.* 2. *p.* 40.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia.
Caulis *rigidus*, *pilosus.* Folia *lanceolata*, *obtusiuscula*, *rugoso-plicata*, *serraturis* 3. *f.* 4. *subacutis.* Bracteæ

 cor-

cordatæ, serrato-spinosæ. Verticilli *remotissimi siles, sexflori, caule inter verticillos hirsutiore.* rollæ *flavæ, tubo incurvo; Labio superiore l ri, semibifido, reflexo, erecto, niveo; L. infer minimo.* Calyces *hirti, spinis* 5 *æqualibus.* St na *intra tulum.*

11. SIDERITIS foliis cordatis obtusis villosis, c cibus muticis lanatis, spica longa, caule erect
Habitat in Ægypto, Palæstina. ☉
Planta *spithamæa, erecta, tota lanata.* Caulis *si cissimus.* Folia *cordata, subsessilia, obsolete cren obtusa.* Spica *longior ipso caule, sessilis, ter lis e Verticillis sexfloris, remotis, valde lanatis.* rollæ *atro-violaceæ, longitudine calycis.* Bracteæ *tæ, obsolete serratæ, lanatæ.*

MENTHA.

* *spicatæ.*

1. MENTHA spicis oblongis, foliis oblongis tom tosis serratis sessilibus, staminibus corolla longiori
Hort. cliff. 306. *Hort. upf.* 168. *Mat. med.* 279. *lib. parif.* 177. *Gort. gelr.* 341. *Hudf. angl.* 221.
Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.
Menthastrum spicatum, folio longiore candica *Bauh. hist.* 3. *p.* 321.
Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia. ♃
Folia albida.

2. MENTHA spicis oblongis, foliis lanceolatis n serratis sessilibus, staminibus corolla longioribu
Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceol serratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* *Hudf. angl.* 221.
Mentha angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 227.
Mentha. *Cam. epit.* 477.
Mentha. III, IV. *Dod. pempt.* 95.
Mentha aquatica spicata, foliis oblongis viridibus ratis acuminatis. *Gron. virg.* 167.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia. ♃
Affinis nimium M. sylvestri, sed minor & glabra.

MENTHA spicis oblongis, foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus. *Hudf. angl.* 221. — rotundifol

Mentha sylvestris, rotundiore folio. *Bauh. pin.* 227.

Menthastrum, folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato odore gravi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 219.

Habitat in Angliæ *aquosis.* ♃

* * *capitatæ.*

MENTHA spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *Hort. upf.* 168. *Mat. med.* 278. — crispa.

Mentha crispa danica s. germanica speciosa. *Moris. hist.* 3. *p.* 367. *f.* 11. *t.* 6. *f.* 5.

Mentha crispa. *Riv. mon.* 47.

Habitat in Sibiria. ♃

MENTHA spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Fl. svec.* 482; 517. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. paris.* 177. — aquatica.

Mentha rotundifolia palustris s. aquatica major. *Bauh. pin.* 227.

Sisymbrium sylvestre. *Dalech. hist.* 677.

Habitat in Europa *ad aquas.* ♃

Planta *non hirta.* Verticilli *terminales in capitulum s. spicam obtusam conferti; Stamina corolla longiora.*

MENTHA spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. — piperita.

Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

Habitat in Anglia. ♃

* * * *verticillatæ.*

MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutiusculis serratis, staminibus corolla longioribus. — sativa.

Mentha crispa verticillata. *Bauh. pin.* 227.

Mentha crispa verticillata, folio rotundiore. *Bauh. hist.* 3. *p.* 215.

Habitat in Europa *australi.* ♃

MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corolla brevioribus. — gentilis.

Mentha hortensis verticillata, ocymi odore. *Bauh. pin.* 227.

Mentha verticillata minor acuta non crispa, odore ocymi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 216.

Mentha quarta. *Fuchs. hist.* 291.

Habitat in Europa *australiore.* ♃

Simillima M. arvensi, at minus hirta, Caulibus rubris; Stamina Tubo corollæ non longiora: Verticilli laterales. Corollæ infima lacinia acuta. Calyces adspersi punctis resinosis.

arvensis. 9. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 307. *Fl. svec.* 481; 516. *Roy. lugdb.* 326. *Hall. helv.* 658. *Dalib. paris.* 178.

Mentha arvensis verticillata procumbens. *Moris. hist.* 3. *p.* 369. *s.* 11. *t.* 7. *f.* 5.

Calamintha arvensis verticillata. *Bauh. pin.* 229.

Habitat in Europæ *agris, frequens post messem.* ♃

Caules diffusi; Verticilli laterales; Planta tota hirta; Stamina corollæ limbo longitudine æqualia. Corollæ lacinia infima obtusa. Calyces canescentes.

exigua. 10. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 318.

Mentha aquatica exigua. *Raj. angl.* 3. *p.* 232.

Mentha hortensis 4. *Fuchs. hist.* 291.

Calamintha aquatica belgarum & matthioli. *Lob. ic.* 505.

Habitat in Anglia. *Miller.* ♃

canadensis. 11. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolatis serratis petiolatis pilosis, staminibus corollam æquantibus.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Differt a præcedenti Caule *altiore, non ramoso, multum piloso.* Foliis *dimidio angustioribus, acutioribus, profundius serratis, obscurioribus, pilis vagis adspersis, uti etiam calyces.* Calyces *quinquedentati, subæquales.* Corolla 4*fida: lobo superiore oblongo, longiore, integro; reliquis æqualibus.* Stamina 4, *intra tubum corollæ.* Stylus *corolla longior, apice bifidus.*

12. MEN-

12. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 326. *Dalib. parif.* 178. *Mat. med.* 280. *Gort. gelr.* 344 — Pulegium

Pulegium latifolium. *Bauh. pin.* 222.

Pulegium. *Fuchs. hist.* 199.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ, *inundatis.* ♃

13. MENTHA floribus verticillatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 307. *Hort. upf.* 168. *Sauv. monsp.* 143. — cervina.

Pulegium angustifolium. *Bauh. pin.* 222. *Moris. hist.* 3. *p.* 371. *f.* 11. *t.* 7. *f.* 7 *Riv. mon.* 22.

Habitat Monspelii & *ad* Rhodanum. ♃

14. MENTHA floribus capitatis axillaribus dichotomis, staminibus corolla brevioribus, foliis ovatis crenatis, caule arborescente. *Hort. cliff.* 307. — canariensis

Mentha canariensis frutescens, foliis subtus lanugine candidissima villosis, floribus glomeratis e sinu foliorum longioribus pediculis insidentibus. *Pluk. alm.* 248 *t.* 307. *f.* 2.

Heliotropium foliis ovatis crenatis oppositis, floribus capitatis alaribus dichotomis, caule arborescente. *Mill. d ft. n.* 5.

Heliotropium canariense arborescens, scorodoniæ folio. *Comm. hort.* 2. *p.* 129. *t.* 65.

Habitat in Canariis. ♄

Confer tur Melissa altissima globularia. *Plum. spec.* 6. *ic.* 163. *f.* 2. *quæ vel eadem, vel proxima.*

GLECOMA.

1. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Hort. cliff.* 307. *Fl. svec.* 483; 518. *Roy. lugdb.* 320. *Mat. med.* 303. — hederacea

Hedera terrestris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.

ChamæCissus. *Fuchs. hist.* 876.

Habitat in Europæ *septentrionalioris sepibus.* ♃

ORVALA.

ORVALA † — garganica

Papia garganica, foliis urticæ alternis & eleganter incisis, flore purpureo. *Mich. gen.* 20. *t.* 17.

Habitat in valle Garganica *montis* Apuliæ.

Plantam *non vidi, sed a Michelio mutuatam propono, quam sedulo inquirant Itali: vereor esse varietatem Lamii Orvalæ.*

LAMIUM.

ala. 1. LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque serratis, corollis fauce inflata, calyce colorato.

Lamium maximum sylvaticum alterum. *Bauh. pin.* 231.

Lamium montanum saxatile ferme glabrum, flore amplo purpureo: labio inferiore crenulato. *Till. pis.* 92. *t.* 34. *f.* 1?

Galeopsis maxima pannonica. *Clus. hist.* 2. *p.* 35.

Habitat in Pannonia, Italia. *Miller, D. Royen.* ♃

ganicum. 2. LAMIUM foliis cordatis pubescentibus, corollis fauce inflata, tubo recto, dente utrinque gemino.

Lamium garganicum subincanum, flore purpurascente: labio superiore crenulato. *Till. pis.* 93. *t.* 34. *f.* 2.

Lamium catariæ folio, flore purpureo. *Act. paris.* 1717. *p.* 351.

Habitat in Gargano *monte ad castrum angeli.* ♃

Caules *pubescentes.* Folia *obtusiuscula, sublobato-serrata, pubescentia, non vero scabra.* Verticilli *multiflori.* Corollæ *tubi recti, nec ad basin ut in reliquis curvati. Limbi faux inferne albida striis purpureis, utrinque duobus dentibus, qui huic proprii.*

igatum. 3. LAMIUM foliis cordatis rugosis, caule lævi, calycibus glabris longitudine corollæ.

Lamium purpureum fœtidum, folio parvo acuminato, flore majore. *Pluk. phyt.* 198. *f.* 1.

Lamium purpureum non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

Lamium subrotundo rugoso folio, flore rubro. *Bocc. mus.* 2. *t.* 23.

Galeopsis flore purpurascente majore, folio non maculato. *Bauh. hist.* 3. *p.* 321. *Raj. hist.* 559.

Habitat in Italia, Sibiria. ♃

Caules *purpurascentes.* Folia *serrata, vix pubescentia.* Verticilli *utrinque subquinqueflori.* Calycum *dentes ventre suo duplo longiores, absque maculis fuscis ad basin.* Corollæ *dentes laterales latiores, lanceolati*

nec

nec setacei, antrorsum porrecti; Labio inferiore patente, nec lobis reflexis parallelis.

LAMIUM foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. maculatum.
Lamium alba linea notatum. *Bauh. pin.* 231.
Lamium plinii montanum campoclarensium. *Col. ecphr.* 1. *p.* 192. *t.* 90.
Lamium maculatum. *Bauh. pin.* 231.
Habitat in Italia. ♃. ♂
Affine nimium L. albo, diversum Corollis purpureis; Foliis area longitudinali alba; Petiolis non dilatatis; Floribus utrinque 5, *nec* 10; *Galea carinis duabus ad occiput concurrentibus.*

LAMIUM foliis cordatis acuminatis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Hort. cliff.* 314. *Fl. svec.* 493; 520. *Mat. med.* 307. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 178. album.
Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.
Galeopsis. *Cam. epit.* 865.
Habitat in Europæ *cultis.* ♃
Calyces *macula fusca notati sunt.*

LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Hort. cliff.* 314. *Fl. svec.* 494.; 521. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 179. purpureum.
Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 230.
Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.
Habitat in Europæ *cultis.* ☉

LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Hort. cliff.* 314. *Fl. svec.* 495.; 522. *Roy. lugdb.* 319. *Gron. virg.* 66. *Dalib. paris.* 179. amplexicaule.
Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Bauh. pin.* 231.
Morsus gallinæ, folio hederulæ, alterum. *Lob. ic.* 463.
Lamium, folio caulem ambiente, majus. *Bauh. pin.* 231.
Habitat in Europæ *cultis.* ☉

LAMIUM foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 315. multifidum.

Lamium orientale, foliis eleganter laciniatis. *Tourn cor.* 11. *Comm. rar.* 26. *t.* 26.
Habitat in Oriente.

GALEOPSIS.

Ladanum. 1. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis.
Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Hort. cliff.* 3
Fl. svec. 492, 524. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 1
Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.
Ladanum segetum folio latiore. *Riv. mon.* 24.
Habitat in Europæ *arvis & campis sabulosis.* ⊙

Tetrahit. 2. GALEOPSIS internodiis caulinis superne incrassati verticillis summis subcontiguis.
Galeopsis ramis summis strigosis. *Hort. cliff.* 314.
svec. 491, 523. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 1
Galeopsis corolla rubra aut alba. *Fl. lapp.* 237.
Urtica aculeata, foliis serratis. *Bauh. pin.* 232.
Cannabis spuria. *Riv. mon.* 44.
β. Galeopsis corolla flava: labio inferiore maculato.
lapp. 192.
Lamium cannabinum aculeatum, flore specioso lute labiis purpureis. *Pluk. alm.* 204. *t.* 41. *f.* 4.
Cannabis spuria, flore majore. *Riv. mon.* 45.
Habitat inter Europæ *segetes & olera.* ⊙

Galeobdolon. 3. GALEOPSIS verticillis sexfloris: involucro tet phyllo.
Leonurus foliis ovatis serratis acutis. *Hort. cliff.* 31
Roy. lugdb. 310. *Fl. svec.* 497, 525. *Dalib. paris.* 1
It. scan. 64.
Lamium folio oblongo luteum. *Bauh. pin.* 231.
Urtica iners tertia s. Lamium flore luteo. *D pempt.* 153.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃
Fructificatio *parum recedit a congeneribus, vix men distincto genere nominari meretur.*

BETONICA.

officinalis. 1. BETONICA spica interrupta, corollarum lacinia bii intermedia emarginata. *Roy. lugdb.* 316. *Fl. s* 487.; 515. *Hort. ups.* 164. *Gort. ingr.* 91.

Be-

Betonica. *Dod. pempt.* 40. *Hort. cliff.* 310.
Betonica purpurea. *Baun. pin.* 235.
Betonica alba. *Bauh. pin.* 235.
Habitat in Europa. ♃

BETONICA spica integra, corollarum lacinia labii intermedia integerrima. *Roy. lugdb.* 316. — orientalis.
Betonica orientalis, angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. *Tournef. cor.* 13.
Habitat in Oriente. ♃

BETONICA spica basi foliosa, corollis galea bifida. *Jacq. vind.* 251. — alopecurus.
Horminum minus album, betonicæ facie. *Bauh. pin.* 239 *prodr.* 114. *Burf.* XIII. 119.
Betonica montana lutea. *Barr. icon.* 339? *Bocc. muf.* 2. *p.* 82 *t.* 7.?
Betonicæ folio, capitulo alopecuri. *Bauh. pin.* 235.
Betonicæ folio, Alopecuros quorundam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 303.
Alopecuros alpina, betonicæ folio, capitulo alopecuri. *Pont. anth.* 253. *Segu. ver.* 318.
Horminum alpinum luteum, betonicæ spica. *Raj. hist.* 547.
Habitat in montibus Sabaudicis, Austriæ *superioris*, Lessanensibus, Italicis, Galloprovinciæ. ♃

STACHYS.

STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Fl. svec.* 489, 526. *Dalib. parif.* 180. — sylvatica.
Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Hall. helv.* 642.
Lamium maximum sylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.
Galeopsis legitima. *Clus. hist.* 2. *p.* 35.
Habitat in Europæ *nemoribus umbrosis.* ☉

STACHYS verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semi-amplexicaulibus. *Fl. svec.* 490; 528. *Dalib. parif.* 180. — palustris.
Stachys foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.
Stachys palustris fœtida. *Bauh. pin.* 236.
Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.

Ver-

Verticilli 6. *ad* 10. *floribus.*
Habitat in Europa *ad ripas*, *inque cultis humidi*-*lis.* ♃

alpina. 3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serra- apice cartilagineis, corollis labio plano. *Fl. sv. n.* 527.
Stachys verticillis duodecimfloris, caule villoso. *H. upf.* 170.*
Stachys foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis, ver-ticillis tomentosis. *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb. Dalib. parif.* 180.
Stachys latifolia major, foliis obscure virentibus, flo-re galeato ferrugineo. *Pluk. alm.* 356. *t.* 317. *f.* 4.
Pseudo-stachys alpina. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.
Habitat in Germania, Helvetia. ♃
Plantæ *color obscurus.* Folia *flavo-virescentia* *s-turis apice cartilagineo fusco : Floralia superiora vata : margine plano integerrimo.* Verticilli *lucrati, ut in* 4, 5; Corollæ *triste purpureæ horizontali, nec erecta ut* 4, 5; *Labio non ad-ra reflexo.*

germanica. 4. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serrat- imbricatis, caule lanato.
Stachys verticillis quadragintafloris, caule lan- *Hort. upf.* 170.*
Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticill- *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Dalib. parif.* 179.
Stachys major germanica. *Bauh. pin.* 236.
Stachys. *Fuchs. hist.* 766.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia. ♃
Caulis *lana alba vestitus, ut tota planta albus.* F- *serraturis subimbricatis : floralia lanceolata, refl-* Antheræ *albo-flavescentes.*

cretica. 5. STACHYS verticillis multifloris, calycibus pung-tibus, caule hirto. *Hort. upf.* 170.*
Stachys folio obscure virente, flore purpurascen- *Walth. hort.* 108. *t.* 19.
Stachys cretica. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.
Habitat in Creta. ♃
Similis S. germanicæ, *sed planta lurida, hirta abs- lana alba.* Folia *floralia lanceolata, serrato-un- lata, non vero reflexa s. fornicata, uti* 4.

6. STA

STACHYS ramis ramosissimis, foliis lanceolatis glabris. *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 318. — glutinosa.
Sideritis glutinosa bitumen redolens. *Moris. hist.* 3. p. 389.
Sideritis viscosa cretica bitumen redolens. *Zan. hist.* 136.
Habitat in Creta.

STACHYS ramulis spina terminatis. *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 318. — spinosa.
Stachys spinosa cretica. *Bauh. pin.* 236. *Moris. hist.* 3. p. 283. *s.* 11. *t.* 10. *f.* 9.
Saidarothymo. *Clus. hist.* 2. *p.* 311.
Habitat in occidentali Cretæ.

STACHYS foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillo brevioribus. *Roy. lugdb.* 318. — orientalis.
Stachys orientalis altissima fœtidissima. *Tournef. cor.* 12. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 154.
Habitat in Oriente.

STACHYS verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis lævibus petiolatis. — annua.
Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. *Hort. cliff.* 310. *Gron. virg.* 66. *β. Dalib. paris.* 180.
Betonica verticillata, calycibus spinosis. *Hort. ups.* 165. *Sp. pl.* 1. *p.* 573.
Betonica foliis inter dissitos verticillos longioribus ellipticis serratis. *Hall. helv.* 645.
Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bauh. pin.* 233.
Alyssum majus. *Tabern. hist.* 929.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, *ad agrorum margines.* ⊙
Stamina *ad latera reflexa genus indicant.* Folia *inferiora ovata, rugosa, obtusissima: Media oblonga, petiolata; Suprema sessilia, lanceolata, trinervia.* Corollarum *labium superius album; inferius flavum.* Calyces *mucronati, non tamen spinosi.*

STACHYS verticillis sexfloris, caulibus prostratis, corollis labio superiore bifido divaricato reflexo. — hirta.
Leopsis caule piloso, calycibus labio corollæ superiore longioribus. *Sp. pl.* 1. *p.* 580. *Allion. nicæens.* 44.
Marrubium nigrum rotundifolium. *Bauh. pin.* 230.
Thymum valentinum. *Clus. hist.* 2. *p.* 42.

Ha-

Habitat in Orientis, Hispaniæ, Italiæ *collibus.* ♃.

Caules *prostrati, tetragoni, fistulosi, fragiles, pili rioribus adspersi.* Folia *petiolata, cordata, utri pilosa, venosa: inferiora obtuse serrata, obtusa, gius petiolata; Superiora acuta, acute serrata.* res *verticillati, utrinque 3, absque involucro.* lyx *aristatus.* Corollæ *tubus calyce brevior, i vatus. Labium superius fornicatum, semibifid lobis divaricatis obtusis; Lab. inferius obtusissim planum, obsolete trilobum, ad basin utrinque lac la acuta vix manifesta. Puncta purpurascentia margines baseos labii superioris & in disco baseos bii inferioris.*

arvensis. 11. STACHYS verticillis sexfloris, caule debili, fo obtusis nudiusculis, corollis calyce vix longiori

Glecoma foliis cordato-oblongis crenatis. *Hort.* c 307.

Sideritis calycibus subinermibus hispidis. *Fl. svec.* 4 519.

Sideritis alsines trixaginis folio. *Bauh. pin.* 233. *prodr.* 1

Sideritis humilis, lato obtuso folio. *Raj. hist.* 565.

Marrubiastrum vulgare. *Tournef. inst.* 190.

β. Lamium paludosum belgicum. *Herm. lugdb.* 351 353.

Habitat in Europæ *arvis.*

Caulis *tetragonus, obtusus, brachiatus, hirtus uti tioli & Calyces.* Folia *cordata, obtusa, obtuse s rata, minus hirta.* Calyces *sessiles, semiquinqu di, æquales, mucronati.* Corolla *albida, calyce f minor: galea integerrima. Labio 3fido: interme latiore purpurascente punctato.*

BALLOTA.

nigra. 1. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis, caly bus acuminatis. *Fl. svec.* 484; 529

Ballota. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 315.

Ballote. *Fuchs. hist.* 154. *Cæsalp. plant.* 445.

Marrubium nigrum fœtidum. *Bauh. pin.* 230.

Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

alba. 2. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis, caly bus subtruncatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 530. *

Ballote flore albo. *Tournef. inst.* 185. *Vaill. paris.* 1

Bal-

lote. *Cam. epit.* 572.
at in Europa. ♃
nimium B. nigræ, sed videtur satis distincta.

LLOTA foliis palmatis dentatis, caule lanato. lanata.
ote foliis geranii batrachioides. *Amm. ruth.* 47.
at in Sibiria.
s lana alba induti. Verticilli *hirsutissimi.* Folia
ularia, semi3fida s. semi5fida, lobis obtusis tri-
atis, supra glabra, subtus hirsuta. Calyces
ntati denticulis setaceis. Corollæ *albæ, ven-*
osæ, magnæ in hac gente.

LLOTA foliis cordatis, spicis foliosis, calycibus suaveolens.
ncatis aristis linearibus.
sphærum hirsutum, foliis cordatis serrato-sinuatis,
ribus verticillariter spicatis. *Brown. jam.* 257. *t.*
f. 3.
ssa spicata, lavandulam spirans, major. *Plum. spec.*
ic. 163 *f.* 1.
rubiastrum maximum, flore cæruleo, nardi odore.
an. jam. 64. *hist.* 1. *p.* 171. *t.* 102. *f.* 2.
tat in America *meridionali.*

MARRUBIUM.

* *Calycibus 5dentatis.*

ARRUBIUM foliis cuneiformibus quinquedenta- Alysson.
plicatis, verticillis involucro destitutis. *Hort.*
. 311 * *Roy. lugdb.* 314. *Sauv. monsp.* 151.
ubium album, foliis profunde incisis, flore cæ-
eo. *Moris. hist.* 3. *p.* 377 *s.* 11. *t.* 10 *f.* 12.
on verticillatum, foliis profunde incisis. *Bauh.*
. 232.
on galeni. *Clus. hist.* 2. *p.* 35.
tat in Hispania. ♃
es utrinque 3, *purpurei, parvi.* *Calyces acuti*
ntibus patentibus.

ARRUBIUM foliis ovato-lanceolatis serratis, ca- peregrinum.
cum denticulis setaceis. *Hort. cliff.* 311. *n.* 3. *Roy.*
b. 314. *Gron. orient.* 73.
ibium album latifolium peregrinum. *Bauh. pin.*
Moris. hist. 3. *p.* 577. *s.* 11. *t.* 9. *f.* 8.
ibium alterum pannonicum. *Clus. hist.* 2. *p.* 34.

β. Mar-

β. Marrubium album angustifolium peregrinum. *pin.* 230.
Marrubium creticum. *Dalech. hist.* 962.
Habitat in Siciliæ, Cretæ, Austriæ *siccis.* β *in* no. ♃

candidissimum. 3. MARRUBIUM foliis subovatis lanatis super marginato-crenatis, denticulis calycinis subul *Hort. cliff.* 312. *n.* 4.
Marrubium album candidissimum & villosum. *Tou cor.* 12.
Habitat in Creta?

supinum. 4. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis r villosis. *Hort. cliff.* 312. *Roy. lugdb.* 315. *S monsp.* 151.
Marrubium album, sericeo parvo & rotundo f *Barr. ic.* 685. *Bocc. mus.* 2. *p.* 78. *t.* 69.
Marrubium album hispanicum majus. *Barr. ic.* 686.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♃

* * *Calycibus 10-dentatis.*

vulgare. 5. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis unc tis. *Hort. cliff.* 342. *Fl. svec.* 485; 531. *Mat.* 305. *Roy. lugdb.* 315. *Hall. helv.* 648. *Dalib. paris.*
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.
Marrubium vulgare. *Clus. hist.* 2. *p.* 34.
β. Marrubium album villosum. *Bauh. pin.* 230. *pr* 110. *Burser.*
Habitat in Europæ *borealioris ruderatis.* ♃

africanum. 6. MARRUBIUM foliis cordatis subrotundis ema nato-crenatis. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 314.
Pseudo-Dictamnus africanus, foliis subrotundis sub incanis. *Comm. hort.* 2. *p.* 179. *t.* 90.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

hispanicum. 7. MARRUBIUM calycum limbis patentibus, de culis acutis. *Hort. cliff.* 312. *Hort. upf.* 169. * *R lugdb.* 315.
Marrubium album rotundifolium hispanicum. *H par.* 201. *t.* 201.
Marrubium subrotundo folio. *Barr. ic.* 797. *B mus.* 2. *p.* 167. *t.* 122.
Habitat in Hispania. ♃

H

Habitat in Hispania. ♃

Folia subrotunda, plana, crenata. Calyces limbo plano, glabro: angulis 10 acutis. Sauvages.

MARRUBIUM calycum limbis planis villosis, foliis cordatis concavis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 312. * *Hort. upf.* 169. *Roy. lugdb.* 315. — Pseudo-Dictamnus.

Pseudo Dictamnus verticillatus inodorus. *Bauh. pin.* 222.

Pseudo-Dictamnum. *Dod. pempt.* 281.

Habitat in Creta. ♄

MARRUBIUM calycum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. — acetabulosum.

Pseudo-Dictamnus acetabulis moluccæ. *Bauh. pin.* 222.

Dictamnus falsus verticillatus, pericarpio conoide, bæticus. *Barr. ic.* 129. *

Habitat in Creta. ♃

Limbus *calycis absoluta florescentia excrescit, fit tubo duplo longior, nudus & membranaceus, nec villosus ut in præcedentibus; limbi margo 20 angulis: minoribus scilicet acutis, latioribus obtusissimis rotundatis.*

LEONURUS.

LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Hort. cliff.* 313. *Fl. svec.* 496; 532. *Mat. med.* 308. *It. scan.* 231. *Roy. lugdb.* 312. *Dalib. parif.* 182. — Cardiaca.

Marrubium cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.

Cardiaca. *Fuchs. hist.* 395.

Cardiaca crispa. *Raj. hist.* 572.

Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

LEONURUS foliis lanceolatis subserratis, calycibus septemdentatis. — Indicus.

Habitat in India. *Burmannus.*

Statura & Facies L. Marrubiastri. Corollæ priori similes galea hirsuta, sed calycis dentes minimi septemdentati.

LEONURUS foliis ovatis lanceolatisque serratis, calycibus sessilibus spinosis — Marrubiastrum.

[M]arrubiastrum] ...eritis foliis ovatis & lanceolatis inciso-serratis. *Hort. cliff.* 313. *Sauv. monsp.* 279.

...rrubiastrum foliis cardiacæ. *Bocc. muf.* 2. p. 12 t. 98.

...*bitat in* Bohemia, Ucrania.

tataricus. 4. LEONURUS foliis tripartitis laciniatis, calyci villosis. *Hort. upf.* 171. *
Sideritis foliis tripartito-multifidis. *Hort. cliff.*
Hort. upf. 169.
Cardiaca, foliis tenuius & profundius incisis, gla f. villosa. *Amm. ruth.* 49. 50. *Mill. ic.* 80.
Habitat in Tataria. ♂

sibiricus. 5. LEONURUS foliis tripartitis multifidis lineari obtusiusculis. *Hort. upf.* 170. *
Ballote inodora, foliis coronopi. *Amm. ruth.* 48. *t.*
Habitat in Sibiria, China. ♂

PHLOMIS.

fruticosa. 1. PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, volucris lanceolatis, caule fruticoso.
Phlomis involucris tomentosis lanceolatis, foliis c datis villosis, caule fruticoso. *Hort. upf.* 171.
Phlomis involucri radiis lanceolatis villosis. *Hort. c* 315.
Verbascum latis salviæ foliis. *Bauh. pin.* 240.
Verbascum sylvestre alterum. *Dod. pempt.* 146.
β. Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore teo. *Tournef. cor.* 10.
Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora. *Dill. e* 316. *t.* 237. *f.* 306.
Habitat in Sicilia, Hispania. ♃

purpurea. 2. PHLOMIS involucris linearibus obtusis calyce b vioribus, foliis cordatis oblongis tomentosis, ca suffruticoso. *Mill. dict. t.* 202.
Verbascum subrotundo salviæ folio. *Bauh. pin.* 240.
Salvia fruticosa, cisti folio haud incano, floribus p pureis. *Pluk. alm.* 329. *t.* 57. *f.* 6.
Phlomis fruticosa lusitanica, flore purpurascente, fo acutioribus. *Tournef. inst.* 178.
Habitat in Lusitania, Italia.
Caulis *fere suffruticosus, tomentosus; plerumque de lis.* Folia *cordata, oblonga, utrinque tomentosa, bida.* Petioli *inferiores folio longiores.* Vertic *floribus sex.* Involucra *calyce dimidio breviora, nearia, obtusa, tomentosa.* Corolla *labio inferi supra purpurascente.*

3. PHLO-

PHLOMIS foliis radicalibus cordato-sagittatis utrinque tomentosis villosis. *Mill. dict. t.* 204. — Nissolii.
Phlomis orientalis, foliis auriculatis incanis, flore luteo. *Nissol.*
Habitat in Oriente.
Folia *radicalia profunde cordata, oblonga, obtusiuscula; Floralia ovata.* Calyces *hirsuti.*

PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Mill. dict. t.* 203. — lychnitis.
Phlomis foliis ligulatis utrinque tomentosis, radiis involucri setaceis villosis. *Sauv. monsp.* 143.
Verbascum angustis salviæ foliis. *Bauh. pin.* 240.
Verbascum sylvestre, foliis salviæ tenuifoliæ. *Lob. ic.* 558.
Habitat in Europa *australi. D. Sauvages.*
Habitus *speciei* 1, *sed* Folia *angustiora.* Corollæ *vix calyce majores.* Involucra *linearia, pilis longis crinita.*

PHLOMIS foliis alternatim pinnatis: foliolis laciniatis, calycibus lanatis. — laciniata.
Phlomis orientalis, foliis laciniatis. *Tournef. cor.* 10.
Habitat in Oriente.

PHLOMIS foliis ovatis subtus tomentosis, involucris subulatis strictis tripartitis. — samia.
Phlomis radiis involucri setaceis trifidis, foliis cordatis. *Sauv. meth.* 152.
Phlomis involucri radiis subulatis strictis. *Hort. cliff.* 315. *
Phlomis samia herbacea, folio lunariæ. *Tournef. cor.* 10.
Habitat in Samo.

PHLOMIS involucris setaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo. *Hort. ups.* 171 * *Sauv. monsp.* 152. — herba venti.
Phlomis involucri radiis setaceis hispidis. *Hort. cliff.* 315.
Marrubium nigrum longifolium. *Bauh. pin.* 230.
Habitat in Persia, Tataria, Narbona *ad aggeres.* ♃

PHLOMIS involucris hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo. *Hort. upsf.* 171. — tuberosa.

Phlomis foliis cordiformibus, galea lacera. *Act. goett.* 211. *t.* 12.
Phlomis, urticae foliis, glabra. *Amm. ruth.* 40. 39.
Galeopsis maxima, foliis hormini. *Buxb. cent.* 1. *p.* 4 *t.* 6.
Habitat in Sibiriae *campestribus.* ♃
Involucra *subulata & Calycis dentes patentes, hispidi.* Corollae *galea dentata.* Radix *tuberosa.*

zeylanica. 9. PHLOMIS foliis lanceolatis subserratis, capitulis terminalibus, calycibus octodentatis.
Leonurus foliis lanceolatis subserratis obtusiusculis, calycibus octodentatis. *Fl. zeyl.* 227. *
Cardiaca s. Leonurus, hyssopi hirsutis foliis, maderaspatana, floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum cymis. *Pluk. alm.* 81. *t.* 118 *f.* 4.
Habitat in India.

indica. 10. PHLOMIS involucris linearibus, calycibus unilabiatis obliquis, foliis lanceolato-ovatis pilosis.
Habitat in India.
Folia *ovata, serrata, basi attenuata, petiolata, pilis mollibus vestita, viridia.* Verticilli *versus apicem duo vel tres, crassi, cincti* Involucris *erectis, linearibus, carinatis, villosis.* Calyces *tubulosi, oblongi decagoni, exteriori margine oris producti in labium 3-dentatum; a tergo, ubi margo brevissimus, dentes duo minutissimi.* Corolla *Leonuri Cardiacae: galea hirsutissima pilis albis, longior, incana.* Labium *inferius parvum.*

nepetaefolia. 11. PHLOMIS foliis ovatis, calycibus decagonis septemdentatis inaequalibus. *Hort. cliff.* 312. *sub Leonuro.*
Cardiaca americana annua, nepetae folio, floribus brevibus phoeniceis villosis. *Herm. lugdb.* 115. *t.* 11.
Habitat Surinami? ♃

Leonurus. 12. PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, involucris linearibus nudis, calycibus decagonis decemdentatis.
Leonurus foliis lanceolatis obtuse serratis. *Hort. cliff.* 312.
Leonurus capitis bonae spei. *Breyn. cent.* 171. *t.* 8
Seb. mus. 1. *p.* 22. *t.* 14. *f.* 1.

Sta-

Stachys africana frutescens angustifolia, flore longissimo phœniceo, Leonurus dicta. *Moris. hist.* 3. *p.* 383. *s.* 11. *t.* 19. *f.* 17.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

MOLUCCELLA.

MOLUCCELLA calycibus campaniformibus subquinquedentatis: denticulis æqualibus. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. ups.* 172. *Gron. orient.* 75. **lævis.**
Molucca lævis. *Dod. pempt.* 92.
Melissa moluccana odorata. *Bauh. pin.* 229.
Habitat in Syria. ☉

MOLUCCELLA calycibus ringentibus octodentatis. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. upf.* 172. **spinosa.**
Molucca spinosa. *Dod. pempt.* 92.
Melissa moluccana fœtida. *Bauh. pin.* 229.
Habitat in Moluccis. ☉
Verticilli *sexflori*, *sessiles*. Involucrum *Spinis* 4, *ternatis*, *linearibus*, *patentibus*, *spinosis*. Calycis *Lab. superius majus*, *acuminato-spinosum*; *L. inferius rotundatum*, *integrum*, *spinis septem*.

MOLUCCELLA calycibus infundibuliformibus quinquefidis, corollis calyce longioribus. *Allion. nicæens.* 51. * **frutescens.**
Scordium spinosum, floris labio superiore s. galea lanuginosa s. villosa. *Raj. suppl.* 311.
Habitat in Pedemontio *inter* Tendo & Preglio *a Saurgio ad Bretiam. Sauvages.* ♄
Fruticulus *Ramulis dichotomis*. Folia *ovata*, *pollicaria*, *pilis raris pubescentia*, *utrinque* 2. *s.* 3. *profundis serraturis notata*, *petiolata*. Spinæ *axillares*, *utrinque solitariæ*, *ternatæ ut in Berberide*, *sed tantum ad florum verticillos*. Calyces *infundibuliformes*, *parvi*, *decagoni*, *regulares limbo quinquefido*, *spinis terminalibus* 10. Corolla *Cardiacæ*, *galea lanata*. Media *inter Ballotam Leonurum* & *Moluccellam*.

CLINOPODIUM.

CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. **vulgare.**

Clinopodium foliis ovatis, capitulis verticillatis. *H cliff* 305. *Fl. svec.* 479; 533. *Roy. lugdb.* 313.
Clinopodium origano simile. *Bauh. pin.* 224.
Clinopodium. *Cam. epit.* 563.
β. Clinopodium foliis ovatis rugosis verticillis omni distantibus. *Mill. ic.* 63. *t.* 95.
Habitat in rupestribus Europae, Canadae, Ægypti.
Canadense *ex seminibus duplo minores gerit corolla caeterum idem.*
Ægyptiacum β. *corollis incarnatis, nec purpureis est.*

incanum. 2. CLINOPODIUM foliis subtus tomentosis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis.
Clinopodium foliis lanceolatis serratis, verticillis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 313.
Clinopodium, menthae folio, incanum & odoratum. *Dill. elth.* 87. *t.* 74. *f.* 85.
Clinopodium majus virginianum non ramosum, verticillis majoribus, floribus brevioribus carneis. *Mor. hist.* 3. *p.* 374. *s.* 11. *t.* 8. *f.* 4.
Clinopodium Serpentaria dictum, latiori folio, capitulis grandioribus. *Pluk. mant.* 51. *t.* 344. *f.* 7. *R. suppl.* 298.
Origanum foliis ad summitatem caulium canis. *R. hist.* 1229.
Habitat in America *boreali.* ♃

rugosum. 3. CLINOPODIUM foliis rugosis, capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis.
Clinopodium rugosum, capitulis scabiosae. *Dill. elth.* 88. *t.* 75. *f.* 86.
Scabiosae affinis, chrysanthemi facie, lamii foliis, americana. *Pluk. alm.* 335. *t.* 222. *f.* 1.
Sideritis spicata, scrophulariae folio, flore albo, spicis brevibus habitioribus rotundis pediculis insidentibus. *Sloan. jam.* 65. *hist.* 1. *p.* 174. *t.* 109. *f.* 2.
Mentha americana inodora, foliis subincanis. *R. suppl.* 284.
Mentha melissoides americana. *Pluk. mant.* 129.
Melissa altissima globularia. *Plum. spec.* 6.
Habitat in Carolina, Jamaica, Gallia *aequinoctiali.* ♃

ORIGANUM.

ægyptiacum. 1. ORIGANUM foliis carnosis tomentosis, spicis nudis. *Hasselq. it.* 479.

Ma-

Majorana rotundifolia scutellata exotica. *Tournef. inst.* 199.
Origano cognata Zatarhendi. *Bauh. pin.* 223. *Moris. hist.* 3. *p.* 360. *s.* 11. *t.* 3. *f. ult.*
Zatarhendi. *Alp. ægypt.* 94. *t.* 95.
Habitat in Ægypto. ♃

ORIGANUM foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 304. *Mat. med.* 301. *Roy. lugdb.* 323. — Dictamnus
Dictamnus creticus. *Bauh. pin.* 222.
Dictamnum cretense. *Cam. epit.* 472.
Dictamnum. *Lob. ic.* 502.
Habitat in Cretæ *monte* Ida. ♄

ORIGANUM foliis omnibus glabris, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 323. — sipyleum.
Origanum montis sipyli. *Herm. lugdb.* 462. *t.* 463.
Dictamnus sipyleus, majoranæ foliis. *Moris. hist.* 3. *p.* 457. *s.* 11. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat in Phrygiæ *monte* Sipylo.

ORIGANUM spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. — creticum.
Origanum foliis ovatis acutis glabris; venis scabris, spicis tetragonis. *Mat. med.* 300. *Gron. orient.* 75.
Origanum foliis ovatis obtusis scabris integerrimis, spicis confertis compactis glabris. *Amœn. acad.* 1. *p.* 160.
Origanum creticum. *Bauh. pin.* 223.
Origanum folio subrotundo. *Bauh. pin.* 223.
Origanum monspeliense pulchrum. *Cam. epit.* 468.
Habitat in Europa *australi*, Palæstina. ♃

ORIGANUM foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis. *Hort. cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 324. — smyrnæum
Origanum smyrnæum. *Wheel. itin.* - - *Raj. hist.* 450.
Majorana cretica, origani foliis, villosa, saturejæ odore, corymbis majoribus albis. *Tournef. cor.* 13.
Habitat in Creta & Smyrnæ *in monte cui arx inædificata.*

ORIGANUM spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycum. — heracleoticum.

Origanum heracleoticum, Cunila gallinacea pl. *Bauh. pin* 223.

Orega, Origanum heracleoticum, Cunila. *Lob.* 492.

Habitat in Europa *australi*, Græcia. ♃

Habitus *O. sylvestris, sed* spicæ *digitales, laxe im-catæ; at differt ab O. cretico, quod* bracteæ *calycibus longiores & demum quod* spicæ *pedu-latæ.*

ulgare. 7. ORIGANUM spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.

Origanum foliis ovatis, spicis laxis, erectis confertis paniculatis. *Hort. cliff.* 305. *Fl. suec.* 480, 534. *M. med.* 299. *Roy. lugdb.* 323. *Gron. virg.* 65.

Origanum sylvestre. *Bauh. pin.* 223.

Origanum sylvestre s. vulgare. *Fuchs. hist.* 522.

Habitat in Europæ, Canadæ *rupestribus.*

Americanum *bracteis coloratissimis gaudet.*

nites. 8. ORIGANUM spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis. *Hudf. angl.* 229.

Origanum lignosum syracusanum perenne, umbella amplissima brevi, lato & nervoso folio. *Bocc. m.* 2. *p.* 45. *t.* 38.

Origanum onites. *Bauh. pin.* 222. *an?*

Habitat Syracusæ. ♄

Habitus *Majoranæ, sed lignosus.* Caules *pilis lon-patulis.* Folia *parva, cordata, subsessilia, acu-rarius serrata, utrinque tomentosa; ex alis ram-rum rudimenta.* Spicæ *congestæ, ut in Majora-sed oblongæ, in singulo pedunculo ternæ intermed-sessili, villosæ;* Flores *albi.*

yriacum. 9. ORIGANUM spicis longis ternatis pedunculatis villosis, foliis ovatis villosis.

Majorana syriaca vel cretica. *Bauh. pin.* 224.

Marum syriacum. *Lob. ic.* 499. *

Habitat - - - -

Habitus *Majoranæ.* Folia *subrotundo-ovata, acu-pilis vagis adspersa.* Rami *ex axillis.* Corymb- *terminalis, ex ramis longioribus brachiatus.* Spi- *sæpius ubique* 3, *terminales, longæ, erectæ, tetr-gonæ, villosæ.*

ORIGANUM spicis hirsutis, foliis ovatis tomentosis sessilibus. **Maru.**
Majorana cretica, origani folio, villosa saturejæ odore, flore purpurascente. *Tournef. cor.* 13.
Maru creticum. *Alp. exot.* 289. *t.* 288.
Habitat in Creta. ♃
Species O. Majoranæ, sed rigidior. Folia *absque manifestis petiolis, valde crassa, tomentosa, ovata, nec obovata, albida.* Caulis *purpurascens, adspersus villis raris.* Capitula *valde hirsuta, triternata; ultima sessilia, caulem ramosque terminantia.*

ORIGANUM foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304. *Hort. ups.* 161. *Mat. med.* 298. *Roy. lugdb.* 324. **Majorana.**
Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.
Amaracus vulgatior. *Lob. ic.* 498.
Majorana tenuifolia. *Bauh. pin.* 224.
Majorana hortensis odorata perennis. *Morif. hist.* 3. *p.* 359.
Habitat - - - - ⊙

THYMUS.

THYMUS floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. svec.* 477; 535. *Mat. med.* 282. Serpyllum.
Thymus repens, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220.
Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277.
Serpyllum vulgare majus. *Bauh. pin.* 220.
Serpyllum vulgare minus, capitulis lanuginosis. *Tournef. inst.* 197. *It. gotl* 219.
Serpyllum angustifolium hirsutum. *Bauh. pin.* 220.
Serpyllum foliis citri odore. *Bauh. pin.* 220.
Habitat in Europæ *aridis apricis.* ♄
Folia *basi ciliata.* Stamina *longitudine corollæ.*

THYMUS erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 305. *Hort. ups.* 16?. *Mat. med.* 281. *Roy. lugdb.* 325. *Sauv. monsp.* 148. vulgaris.
Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 219.
Thymus vulgaris, folio latiore. *Bauh. pin.* 219.
Thymum durius. *Dod. pempt.* 276.

Habitat in Hispaniæ *montosis saxosis, in* Gallia N bonensi *nulla alia planta frequentior.* ♄. ♃

Zygis. 3. THYMUS floribus verticillato spicatis, caule suff ticoso erecto foliis linearibus basi ciliatis. *Loefl.*

Thymo vulgatiori rigidiori simile. *Bauh. hist.* 2. 371.

Thymum angusto longioreque folio. *Barr. ic.* 77

Serpyllum sylvestre Zygis dioscoridis. *Clus. hist.* 1. 358.

Serpyllum folio thymi. *Bauh. pin.* 220?

Habitat in Hispania. ♄

Facies T. vulgaris, at Folia basi ciliata.

Acinos. 4. THYMUS verticillis sexfloris, caulibus erectis s ramosis, foliis acutis serratis. *Fl. svec.* 478.

Thymus caulibus vix ramosis, foliis ovatis acutis, dunculis plurimis unifloris. *Hort. cliff.* 306. *R lugdb.* 325.

Clinopodium arvense, ocymi facie. *Bauh. pin.* 225

Clinopodium vulgare. *Lob. ic.* 506.

Habitat in Europæ *glareosis, cretaceis, siccis.* ☉

Alpinus. 5. THYMUS verticillis sexfloris, foliis obtusiusc concavis subserratis.

Clinopodium verticillis paucifloris in spicam conge *Hall. helv.* 653.

Clinopodium montanum. *Bauh. pin.* 225. *Bocc. n* 2. *p.* 50. *t.* 45.

Acini pulchra species. *Bauh. hist.* 3. *p.* 620.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Monspe *D. Rathgeb.* ☉

Affinis nimium antecedenti, sed major & Flores plo majores, pedunculati, utrinque quaterni.

Cephalotos. 6. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis o tis, foliis lanceolatis.

Thymus lusitanicus cephalotos, squamis capitulor amplioribus. *Tournef. inst.* 196.

Tragoriganum, dictamni capite, hispanicum. *Barr.* 787. *Bocc. muf.* 2. *p.* 50. *t.* 43.

β. Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo majori.

γ. Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo minori.

Habitat in Hispania, Lusitania. ♄

7. THY

THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis setaceis pilosis. villosus.
Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente oblongo. *Tournef. inst.* 196.
Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente rotundo. *Tournef. inst.* 190.
Habitat in Lusitania. ♄

THYMUS verticillis lanuginosis: dentibus calycinis setaceis pilosis. *Hort. cliff.* 306. *Hort. upf.* 160. *Gron. orient.* 73. Mastichina
...mpsucus s. Marum mastichen redolens. *Bauh. pin.* 224.
...rum vulgare s. Clinopodium. *Dod. pempt.* 271.
...itat in Hispaniæ *petrosis.* ♄
...biget media inter Saturejam & Thymum, sed cum stamina delitescant in fundo corollæ, & stylus corolla longior ad Thymum refero.

MELISSA.

MELISSA racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus. officinalis.
...elissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 307. *Hort. upf.* 163. *Mat. med.* 294. *Roy. lugdb.* 320. *Sauv. monsp.* 149.
...elissa hortensis. *Bauh. pin.* 229.
...iastrum s. Melissophyllum. *Lob. ic.* 227.
...itat in montibus Genevensibus, Allobrogicis, Italicis. ♃

MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. grandiflora
...amintha magno flore. *Bauh. pin.* 229. *Riv. mon.* 43.
...amintha montana præstantior. *Besl. eyst. æst.* 7. *t.* 7. *f.* 1.
...itat in Hetruriæ *montosis.* ♃

MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. Calamintha
...elissa floribus ex alis superioribus, pedunculo communi confertis. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320. *...t. med.* 295. *Sauv. monsp.* 149.
...amintha vulgaris & *officinarum germaniæ. Bauh. pin.* 228.

Ca-

Calamintha montana. *Dod. pempt.* 98.
Habitat in Italiæ, Hispaniæ, Galliæ *clivis saxosis.*

[N]epeta. 4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis f[oliis] longioribus, caule decumbente.
Melissa floribus ex alis superioribus, pedunculo [di]chotomo, caule procumbente. *Hort. cliff.* 308. *G[ron.] virg.* 65. *Roy. lugdb.* 321. *Sauv. monsp.* 149. *G[ort.] gelr.* 337.
Calamintha pulegii odore s. Nepeta. *Bauh. pin.* [...]
β. Calamintha montana præalta, pulegii odore. *B[occ.] mus.* 2. *p.* 45. *t.* 40. & 38.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Helvetiæ *ag[geri]bus glareosis.*

[C]retica. 5. MELISSA racemis terminalibus, pedunculis so[lita]riis brevissimis.
Calamintha incana, ocymi foliis. *Bauh. pin.* 228
Calamintha, pulegii odore minor. *Barr. ic.* 1166.
Calamintha clinopodii austriaci foliis, odore pul[egii]. *Pluk. alm.* 75. *t.* 163. *f.* 4?
Habitat Monspelii, *in* Hispania.

[f]ruticosa. 6. MELISSA ramis attenuatis virgatis, foliis subtus [to]mentosis, caule fruticoso.
Melissa caule fruticoso, racemis verticillatis. *[Roy.] lugdb.* 321.
Calamintha hispanica frutescens, mari folio. *Tou[rnef.] inst.* 194.
Habitat in Hispania. ♂

DRACOCEPHALUM.

* *Spicata.*

[V]irginianum. 1. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis [lan]ceolatis serratis.
Dracocephalum foliis simplicibus, floribus spi[catis]. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 311.
Dracocephalum. *Breyn. ic.* 33. *t.* 27. *Hir. act.* [...] *p.* 276. *t.* 11.
Dracocephalus angustifolius; folio glabro ser[rato]. *Moris. hist.* 3. *p.* 407. *s.* 11. *t.* 4. *f.* 1.
Pseudodigitalis persicæ foliis. *Bocc. sic.* 12. *t.* 6.
Digitalis americana purpurea, foliis serratis. *D[od.] mem.* 272.

I

Lysimachia galericulata spicata purpurea canadensis. Barr. ic. 1152.
Habitat in America septentrionali. ♃

DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis compositis. Hort. cliff. 308. Mat. med. 293. — canariense.
Dracocephalo affinis americana trifoliata, terebinthinæ odore. Volk. norib. 145. t. 145.
Camphorosma. Moris. hist. 3. p. 366. s. 11. t. 11. f. ult.
Melissa forte canariana triphyllos, odorem camphoræ spirans penetrantissimum. Pluk. alm. 401. t. 325. f. 5.
Citronella canariensis viscosa, foliis plerumque ex eodem pedicello ternis. Comm. hort. 2. p. 81. t. 41.
Habitat in Canariis? America. ♄

DRACOCEPHALUM floribus spicatis foliis cordatis pinnato-sinuatis. — pinnatum.
Dracocephalum foliis pinnato-sinuatis obtusis, floralibus spicatis villosis coloratis. Hort. upf. 165. *
Habitat. ad Jerkatsch. Steller, D. Gmelin.
Caules fruticosi, decumbentes. Folia cordata, transversim pinnatifida, obtusa lobis remotis, longe petiolata. Spica Melampyri arvensis: bracteis lanceolatis, dentato-setaceis, rubris sæpe. Corollæ parvæ; Styli floribus duplo longiores.

DRACOCEPHALUM floribus subspicatis, foliis caulinis ovato-oblongis incisis; racemis lineari-lanceolatis denticulato-spinosis. — peregrinum.
Dracocephalum floribus oppositis, bracteis lanceolatis integerrimis, foliis lanceolatis mucronatis dentatis. Amœn. acad. 4. p. 318. *
Dracocephalum foliis ex lanceolato linearibus rarius dentatis. Act. gœtt. 3. p. 436.
Habitat in Sibiria. ♃

DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bracteisque linearibus partitis spinosis. — austriacum.
Hyssopus spicis interruptis. Hort. cliff. 364
Hyssopus austriacus, magno flore, folio chamæpithyos, Herm. lugdb. 330.
Ruyschiana hirsuta, foliis laciniatis. Amm. ruth. 50.
Chamæpithys cærulea austriaca Bauh. pin. 250.
Chamæpithys austriaca. Clus. hist. 2. p. 185.
Habitat in Austria. ♃

6. DRA-

Ruyschiana. 6. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Fl. svec.* 537.
Dracocephalum foliis linearibus indivisis integerrimis floribus spicatis. *Hort. upf.* 165. *
Ruyschiana glabra, foliis integris. *Amm. ruth.* 9
Ruyschiana flore caeruleo magno. *Boerh. lugdb.* 1. 172.
Pseudo-Chamaepithys austriaca. *Riv. mon.* 106.
Prunella hyssopi folio viridi, amplo flore caeruleo. *Moris. hist.* 3. *p.* 364. *f.* 11. *t.* 5. *f.* 9.
Habitat in Sibiria, Svecia. ♃

* * *Verticillata.*

Sibiricum. 7. DRACOCEPHALUM floribus subverticillatis, pedunculis bifidis secundis, foliis cordato-oblongis acuminatis nudis.
Nepeta corymbis geminis pedunculatis axillaribus, foliis cordato-oblongis acuminatis serratis. *Hort.* 164.
Cataria montana, foliis veronicae pratensis. *Buxb. c.* 3. *p.* 27. *t.* 50. *f.* 1.
Habitat in Sibiria. ♃
Corollae faux lata & fere inflata: Labio superiore compresso, bifido; L. inferiore denticulato, antice villoso. Stamina duo superiora basi hirsuta.

grandiflorum. 8. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, foliis ovatis inciso-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis.
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis oblongis obtusis sinuato-crenatis, bracteis oblongis. *Gmel.* 1
Habitat in Sibiria. ⊙
Folia *ovata s. ovalia, profunde & obtuse serrata, ... da: caulina trinervia; floralia integerrima.* Bracteae *lanceolatae, integerrimae, parvae, pilis adspersae.* Corolla *maxima, caerulea.*

Moldavica. 9. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: serraturis capillaceis. *Hort.* 166. * *Mat. med.* 292.
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 312.
Melissa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.

Me-

Melissa moldavica. *Cam. epit.* 576.
Habitat in Moldavia. ☉

DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis: serraturis spinosis, foliis subtomentosis. *Hort. ups.* 66. * *Mill. dict. t.* 129. — canescens.
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis lanceolatis, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 312.
Moldavica orientalis, betonicæ folio, flore magno violaceo. *Tournef. cor.* 11. *Comm. rar.* 28. *t.* 28.
Sideritis incana, oleæ folio, flosculis ex incarnato candicantibus, montis libani. *Volk. norib.* 353. *t.* 353.
Sideritis annua, flore luteo, utriculis & foliis longioribus. *Moris. hist.* 3. *p.* 389. *f.* 11. *t.* 8. *f.* 18.
Habitat in Oriente. ☉

DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis orbiculatis serrato-ciliatis. *Hort. upf.* 166. * — peltatum.
Dracocephalum Floribus verticillatis, foliis floralibus orbiculatis. *Hort. cliff.* 309. * *Roy. lugdb.* 312.
Moldavica orientalis, salicis folio, parvo flore cæruleo. *Tournef. cor.* 11.
Habitat in Oriente. ☉

DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nutantibus. *Hort. upf.* 167. *n.* 6. * — nutans.
Moldavica betonicæ folio, floribus minoribus cæruleis pendulis. *Amm. ruth.* 44.
Habitat in Sibiria.

DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Hort. upf.* 167. * — thymiflorum.
Cedronella tatarica perennis, urticæ foliis, flosculis minoribus ex cæruleo rubentibus. *Roy. lugdb.* 537.
Moldavica orientalis minima, ocymi folio. *Comm. rar.* 29. *t.* 29?
Moldavica betonicæ folio, floribus minimis pallide cæruleis. *Amm. ruth.* 46.
Habitat in Sibiria. ☉

HORMINUM.

HORMINUM foliis cordatis obtusis, caule nudo. — pyrenaicum
Horminum. *Hort. cliff.* 309.

Cal-

Callitrichum folio rotundo, flore magno viola *Bauh. hist.* 3. *p.* 313. *Moris. hist.* 3. *p.* 395. *Raj.* 546.

Melissa pyrenaica, caule brevi, plantaginis folio *Magn. hort.* 133. *t.* 133.

Habitat in altis montium Tyrolensium, Pyrenæ rum. ♃

virginicum. 2. HORMINUM foliis cuneiformi-oblongis, caule folio.

Melissa atrorubens, bugulæ folio. *Dill. elth.* 215 175. *f.* 216.

Sideritis, bugulæ folio, mariana, floribus purpu longo tubulo donatis. *Pluk. mant.* 171.

Habitat in Virginia, Carolina.

MELITTIS.

melissophyllum. 1. MELITTIS. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 309. *Sa monsp.* 150.

Melissa fuchsii. *Cam. epit.* 99. 30.

Lamium montanum, melissæ folio. *Bauh. pin.* 231

Habitat in subalpinis Germaniæ, Helvetiæ, Angli Monspelii. ♃

OCIMUM.

frutescens. 1. OCIMUM racemis secundis lateralibus, caule recto.

Ocymum foliis lanceolato-ovatis, radice peren *Hort. cliff.* 315. *Fl. zeyl.* 228. * *Roy. lugdb.* 222.

Cottam. *Rh. ed. mal.* 10. *p.* 153. *t.* 77.

Habitat in India. ⊙

Habet & hoc Stamina propria generi.

gratissimum. 2. OCIMUM racemis terminalibus: bracteis caduc foliis lanceolato-ovatis, caule suffruticoso.

Ocymum zeylanicum perenne odoratissimum latifo um. *Burm zeyl* 174. *t.* 80. *f.* 1.

Majorana rubra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 291. *t.* 201.

Habitat in Asia. ♄

Caules *tripedales, lignosi, simplices, subtetragoni, strig* Folia *lanceolato-ovata, serrata, subtus scabra una c petiolis, folio dimidio brevioribus.* Racemi *aliqu terminales, pedunculati, teretes, e verticillis sexf ris albis: bracteis caducis. Odor gratus.*

3 OCI-

OCIMUM foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *Hort. upf.* 168. *Roy. lugdb.* 322. — Basilicum.
Ocimum caryophyllatum majus. *Bauh. pin.* 226.
Ocymum. *Cam. epit.* 308.
Ocimum caryophyllatum maximum. *Bauh. pin.* 226.
Ocimum latifolium maculatum f. crifpum. *Bauh. pin.* 226.
Ocimum viride, foliis bullatis. *Bauh. pin.* 225.
Habitat in India, Perfia. ☉

OCIMUM foliis ovatis integerrimis. *Hort. upf.* 169. — minimum.
Ocymum foliis ovatis incanis. *Hort. cliff.* 315. *Roy. lugdb.* 322.
Ocimum minimum. *Bauh. pin.* 226. *Morif. hift.* 3. *p.* 407. *f.* 11. *t.* 10 *f.* 17.
Habitat in Zeylona. ☉

OCIMUM foliis fublanceolatis acuminatis fubferratis, racemis terminalibus, caule herbaceo. *Amœn. acad.* 4. *p.* 276. * — americanum.
Habitat in America. ☉

OCIMUM foliis ovato-oblongis ferratis, bracteis cordatis reflexis concavis, fpicis filiformibus. — tenuiflorum.
Ocymum maderafpatanum frutefcens, gratiffimi odoris, flore parvo, caulibus villofis. *Pluk. alm.* 268. *t.* 208. *f.* 4.
Bafilicum agrefte. *Rumph. amb.* 5. *t.* 92. *f.* 2.
Mentha zeylanica fpicata pufilla, anguftiffimo folio dentato. *Burm. zeyl.* 158. *t.* 70. *f.* 2.
Habitat in Malabaria. ☉. ♄

Caulis pedalis f. bipedalis, teretiufculus, purpurafcens, brachiatus, pilis adfperfus patulis; Rami breviores. Folia *ovato-oblonga, obtufe ferrata, mollia, longe petiolata.* Spicæ *terminales, ternæ, longæ, anguftæ, pedunculatæ:* *Bracteis oppofitis, glabris, cordatis, concavis, arcte reflexis.* Flores *tres ex fingula bractea, fubfeffiles.* Calyces *glabri, 5fidi: labio fuperiore plano, majore, reniformi, acuto.* Corolla *parva, purpurafcens: Labio fuperiore 4fido; Labio inferiore fimplici.* Stamina 4, *quorum 2 bafi appendiculata* Stylus *flore longior bifidus.* Flores *tam parvi, ut vix nudis oculis confpiciantur, incipiunt florere ab apice fpicarum.*

nenthoides. 7. OCIMUM foliis lineari-lanceolatis serratis. *Fl.* 229.
Mentha zeylanica, angustissimo folio dentato *suppl.* 284.
Habitat in Zeylona.

cutellarioides. 8. OCIMUM foliis lanceolato-ovatis serratis, ra verticillatis.
Majorana rubra. *Rumph. amb.* 5. *t.* 101.
Habitat in Amboina.
Statura *Ocimi*, *sed Calyx Scutellariæ*, *inter quas a Staminibus determinanda*, *quæ non examinavi* cemus *terminalis*: Bracteis *ovatis*, *oppositis*, *de* Flores *sæpius quini ex singula bractea*, *resupinati* *dicellati.* Calyx *quinquefidus.*

TRICHOSTEMA.

dichotomum. 1. TRICHOSTEMA staminibus longissimis exsert
Trichostema. *Hort. cliff.* 493. *Gron. virg.* 90. *lugdb.* 310.
Scutellaria cærulea, majoranæ folio, americana *suppl.* 311.
Cassida mariana, majoranæ folio. *Pet. sicc.* 243.
Habitat in Virginia, Pensylvania. ☉

brachiatum. 2. TRICHOSTEMA staminibus brevibus inclusis.
Teucrium virginianum, origani folio. *Dill. elth.* *t.* 285. *f.* 369.
Habitat in America *septentrionali.*

SCUTELLARIA.

orientalis. 1. SCUTELLARIA foliis incisis subtus toment spicis rotundato-tetragonis. *Hort. upf.* 173.
Scutellaria foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 316.* *Roy.* 310.
Cassida orientalis, folio chamædryos, flore luteo. *T nef. cor.* 11. *itin.* 3. *p.* 306. *t.* 306. *Comm. rar.* *t.* 30. *Mart. cent.* 18. *t.* 18.
β. Scutellaria orientalis incana, foliis laciniatis, flore l *Tournef. cor.* 11.
Habitat in America *circa Tephlin*; Mauritania. ♃

alpina. 2. SCUTELLARIA foliis cordatis inciso-serratis c tis, spicis imbricatis rotundato-tetragonis.
Scutellaria foliis ovatis, spicis imbricatis. *Hort* 317. *Hort. upf.* 173. *Roy. lugdl.* 311.

T

Teucrium alpinum inodorum, magno flore. *Bauh. pin.* 247. *prodr.* 116. *Burs.* XV. 35.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Vallis angustæ. ♄

Simillima S. supinæ *sed* Corollæ *violaceæ labio albido nec flavæ; Bracteæ ovatæ, acutæ, nec acuminatæ, turbo corollis breviores, nec æquales;* Folia *minus oblonga.*

SCUTELLARIA foliis cordatis inciso-serratis acutis glabris, spicis imbricatis rotundato-tetragonis. *Hort. upf.* 173.* — supulina.

Cassida alpina supina, magno flore albido. *Tournef. inst.* 182.

Habitat in Sibiria, Tataria. ♃

SCUTELLARIA foliis lævibus carina scabris, racemis lateralibus foliosis. — lateriflora.

Scutellaria foliis cordato-lanceolatis serratis, pedunculis multifloris. *Roy. lugdb.* 311.

Scutellaria foliis ovato-lanceolatis petiolatis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 91.

Scutellaria palustris repens virginiana major, flore minore. *Moris. hist.* 3. *p.* 416.

Habitat in Canada, Virginia. ♃

Racemi *laterales; Foliis minoribus, lanceolatis, serratis; insuper singuli pedicelli seta utrinque notati sunt, ut in S. galericulata & peregrina.*

SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Fl. lapp.* 239. *Fl. svec.* 499; 538. *Hort. cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 310. — galericulata.

Lysimachia cærulea galericulata f. Gratiola cærulea. *Bauh. pin.* 246.

Lysimachia galericulata. *Dalech. hist.* 1060.

Habitat in Europæ *litoribus.* ♃

SCUTELLARIA foliis integerrimis: inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. *It. gotl.* 212. *Fl. svec.* 500; 539.* — hastifolia.

Scutellaria folio non serrato. *Riv. mon.* 77.

Habitat ad litora Sueciæ *rarius.* ♃

An varietas præcedentis? certe maxime affinis.

SCUTELLARIA foliis cordato-ovatis subintegerrimis, floribus axillaribus. *Hudſ. angl.* 232. — minor.

Cassida palustris minima, flore purpurascente. *T. Raj. angl.* 3. *p.* 244.

Habitat in Angliæ *paludibus.* ♃
Affinis nimium præcedentibus duabus.

integrifolia. 8. SCUTELLARIA foliis sessilibus ovatis: inferioribus obsolete serratis; superioribus integerrimis.
Scutellaria foliis integerrimis. *Gron. virg.* 91.
Scutellaria cærulea virginiana, lamii aut potius teucrii folio, minor. *Pluk. alm.* 338. *t.* 313. *f.* 4.
Scutellaria, teucrii folio, marilandica. *Raj. suppl.* 31
Habitat in Virginia, Canada.

hyssopifolia. 9. SCUTELLARIA foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 91.
Cassida mariana hyssopifolia. *Pet. act. angl.*
Habitat in Virginia.

peregrina. 10. SCUTELLARIA foliis subcordatis serratis, spicis elongatis secundis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. upf.* 17 *Roy. lugdb.* 311.
Cassida. *Colum. ecphr.* 1. *p.* 187 *t.* 189.
Lamium peregrinum f. Scutellaria. *Bauh. pin.* 231.
Habitat in nemoribus Florentiæ, Liburni.
Alia *huic simillima Calycibus lanatis, pilis griseis;* Corollæ *galea apice pilosa.* Bracteis *ovatis, brevibus.*

indica. 11. SCUTELLARIA foliis subovatis obtusis crenatis petiolatis, racemis nudiusculis. *Osb. it.* 244.
Serratula amara. *Rumph. amb.* 5. *p.* 459. *t.* 170. *f.* 1.
Scutellaria sinica, betonicæ folio, floribus albis. *Pluk. amalth.* 190. *t.* 441. *f.* 1.
Habitat in China.
Planta *minor;* Folia *suborbiculata, subovata, obsolete serrata, petiolata.* Racemus *terminalis:* Bracteis *linearibus, brevissimis.* Calyces *brevissimi absque tubo* ... Corollæ *angustæ, longiusculæ.*

altissima. 12. SCUTELLARIA foliis cordato oblongis acuminatis serratis, spicis subnudis.
Scutellaria orientalis altissima, urticæ folio. *Tournef. cor.* 11.
Habitat in Oriente.

cretica. 13. SCUTELLARIA villosa, foliis cordatis obtusis obtuseque serratis, spicis imbricatis: bracteis setaceis. *Roy. lugdb.* 311.
Cassida cretica fruticosa, folio catariæ, flore albo, *Tournef. cor.* 11.
Habitat in Creta.
Statura Nepetæ, tota hirsuta. Calyces *Scutellariæ.* Corollæ *fere* Teucrii, *minutæ, extus hirtæ:* Lab... *sup...*

superius videtur minimum, emarginatum; an itaque Scutellariæ vera species an Teucrii?

PRUNELLA.

PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *vulgaris.*
Prunella bracteis cordatis. *Hort. cliff.* 316. *Fl. suec.* 498; 540. *Mat. med.* 309. *Roy. lugdb.* 314.
Brunella major, folio non dissecto. *Bauh. pin.* 260.
Brunella. *Dod. pempt.* 136.
β. Brunella cærulea, magno flore. *Bauh. pin.* 261. *It. gotl.* 219 228. *grandiflora*
Brunella 1, non vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 42.
Habitat in Europæ *pascuis.* ♃
Planta α *in apricis procumbens, pollicaris; in nemoribus erecta pedalis; β* grandiflora *in rupium fissuris plerumque nascitur.*

PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. *laciniata.*
Brunella folio laciniato. *Bauh. pin.* 261.
Brunella 11, non vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 43.
Brunella minor alba laciniata. *Bauh. pin.* 261.
Brunella verbenulæ folio, flore cæruleo. *Vaill. parif.* 22. *t.* 5. *f.* 1.
Habitat in Europæ *pascuis rarius.* ♃
Fructificatio omnino P. vulgaris, a qua olim orta; structura hodie persistens; adeoque tantillum distincta.

PRUNELLA foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessilibus. *Sauv. monsp.* 141. *hyssopifolia*
Brunella hyssopifolia. *Bauh. pin.* 261.
Brunella angustifolia integra hirsutior. *Moris. hist.* 3. *p.* 364. *f.* 11. *t.* 5. *f.* 7.
Habitat Monspelii. ♃

CLEONIA.

CLEONIA. *lusitanica.*
Prunella bracteis pinnato-dentatis ciliatis. *Loefl. it.* 148. *Mill. ic.* 47. *t.* 70.
Prunella odorata lusitanica, flore violaceo. *Barr. ic.* 561.
Clinopodium lusitanicum spicatum & verticillatum. *Tournef. inst.* 195.
Bugula odorata lusitanica. *Corn. canad.* 46. *Moris. hist.* 3. *p.* 391. *s.* 11. *t.* 5. *f.* 4.
Habitat in Lusitania, Hispania. ☉
Folia *sinuato-serrata.* Bracteæ, *ut in Melamp. nemoroso, pinnatifidæ apicibus in spinas molles desinentibus.*

Flores *intra singulas bracteas singuli.* Corollæ *albo-violaceæ.*

PRASIUM.

majus. 1. PRASIUM foliis ovato-oblongis serratis. *Hort. cliff.* 309. *Hort. upf.* 173.

Lamium arboreum perenne creticum. *Zan. hist.* 112. *t.* 46. *Raj. hist.* 561.

Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucrii facie, flore albo. *Moris. hist.* 3. *p.* 408. *s.* 11. *t.* 21. *f.* 3.

Teucrium fruticans, amplo & albo flore, italicum. *Barr. ic.* 895.

Habitat in Sicilia, Romæ *& in agro* Tingitano. ♄

minus. 2. PRASIUM foliis ovatis crena utrinque duplici. *Hort. cliff.* 309. *

Lamium fruticans, teucrii folio lucido, calyce & flore magno candido: tantilla purpura varie notato. *Cup. cathol.* 106.

Habitat in Sicilia. ♄

An hæc sufficienter specie a priori distincta, ulterius indagandum.

PHRYMA.

Leptostachya 1. PHRYMA. *Amœn. acad.* 3. *p.* 19.

Leptostachya. *Mitch. gen.* 9.

Amaranthi siculi bocconis spica, floribus parvis purpureis propendentibus, herba floridana. *Pluk. amalth.* 59. *t.* 380. *f.* 5.

Verbenaca mariana, rosæ chinensis folio, seminibus deorsum tendentibus. *Pet. mus.* 694.

Verbena racemo simplicissimo, floribus sessilibus, calycibus fructus reflexis racemoque appressis. *Gron. virg.* 92. *Roy. lugdb.* 536.

Habitat in America *septentrionali.* ♃

Caulis *pedalis, obtuse tetragonus, læviusculus, brachiatus.* Folia *opposita, petiolata, ovata, acuta, scabriuscula, grosse serrata.* Spicæ *terminales, solitariæ.* Flores *oppositi, remoti.* Bracteæ *ternæ, subulatæ: inferior longitudine calycis; laterales erectæ, breves.* Flores *horizontales, deflorati mox cernui.* Calyx *cylindricus, striatus, basi supra gibbus, durus, ore bilabiatus: Lab. superiore angusto, purpurascente, tridentato; inferiore bifido.* Corolla *albida, figura Dodartiæ, sed parva: Labio superiore extus purpurascente.*

AN-

ANGIOSPERMIA.

BARTSIA.

1. BARTSIA foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. coccinea.
Bartsia foliis alternis. *Hort. cliff.* 235. *Gron. virg.* 92. *Amæn. acad.* 1. *p.* 160. *Kalm. it.* 3. *p.* 100.
Pedicularis f. cristæ galli affinis virginiana, ajugæ multifido folio; apicibus coccineo, floribus pallidis in spicam congestis. *Pluk. alm.* 283. *t.* 102. *f.* 5. *Raj. suppl.* 400.
Horminum, tenui coronopi folio, virginianum. *Moris. hist.* 3. *p.* 395. *f.* 11. *t.* 13. *f.* 28.
Habitat in Virginia, Noveboraco. ♃

2. BARTSIA foliis alternis lanceolatis integerrimis, floralibus ovatis dentatis. pallida.
Bartsia foliis alternis bidentatis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 356*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin. Demidoff.*

3. BARTSIA foliis superioribus alternis serratis, floribus lateralibus. *Hudf. angl.* 233. viscosa.
Euphrasia latifolia viscata serrata. *Moris. blæs.* 264.
Euphrasia major lutea latifolia palustris. *Raj. hist.* 772. *angl.* 3. *p.* 285.
Euphrasia lutea palustris. *Pluk. alm.* 142. *t.* 27. *f.* 5.
Euphrasia lutea latifolia palustris. *Moris. hist.* 3. *p.* 432.
Alectorolophos italica luteo-pallida. *Barr. rar.* 209. *t.* 665.
Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ *paludibus ad rivulos.* ☉

4. BARTSIA foliis oppositis cordatis obtuse serratis. *Hort. cliff.* 325. *Fl. suec.* 515; 541. *Roy. lugdb.* 298. alpina.
Euphrasia caule simplici, foliis cordatis sessilibus obtuse serratis. *Fl. lapp.* 246.
Euphrasia rubra Westmorlandica, foliis brevibus obtusis. *Raj. angl.* 4. *p.* 312.
Pedicularis genus montanum. *Oed. dan. t.* 43.
Clinopodium alpinum hirsutum. *Bauh. pin.* 225. *Pluk. alm.* 110. *t.* 163. *f.* 5.
Clinopodium alpinum. *Pon. bald.* 343.
Teucrium alpinum, coma purpureo-cærulea. *Bauh. pin.* 247.
Euchelina. *Hall. helv.* 624.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Allobrogicis, Baldo, Vallicis. ♃

RHINANTHUS.

orientalis. 1. RHINANTHUS corollis labio superiore subulato incurvo.

Elephas orientalis, flore magno proboscide incurva. *Tournef. cor.* 48. *itin.* 2. *p.* 299. *t.* 299.

Habitat in Oriente.

Calyx *quadrifidus : lacinia prima (sub rostro corollæ) ovata ; lateralibus utrinque reflexis ; quarta recta, obtusa.*

Elephas. 2. RHINANTHUS corollis labio superiore subulato recto. *Roy. lugdb.* 298.

Elephas italica ; flore magno proboscide surrecta. *Tournef. cor.* 48.

Elephas campoclarensium. *Col. ecphr.* 1. *p.* 186. *t.* 188.

Euphrasia lutea, floribus elephantis caput cum proboscide referentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 432. *s.* 11. *t.* 24. *f.* 14.

Scordio affinis Elephas ob florem. *Bauh. pin.* 248.

β. Elephas orientalis, flore parvo, proboscide surrecta. *Tournef. cor.* 48. *itin.* 3. *p.* 54. *

Habitat in umbrosis Italiæ. ☉

Habitus *præcedentis*, *at* Flos *diversus Calyce trifido laciniis duabus reflexis : tertia majore erecta, plicata, acuta.*

Crista galli. 3. RHINANTHUS corollarum labio superiore compresso breviore. *Fl. lapp.* 248. *Fl. suec.* 503; 549. *Hort. cliff.* 325. *Roy. lugdb* 298.

α. Pedicularis pratensis lutea s. Crista galli. *Bauh. pin.* 163.

β. Crista galli angustifolia montana. *Bauh. pin.* 163. *prodr.* 86.

γ. Crista galli mas. *Bauh. hist.* 3. *p.* 436.

Habitat in Europæ *pratis* ☉

Trixago. 4. RHINANTHUS calycibus hirsuto-tomentosis, foliis obtuse serratis, caule simplicissimo.

Bartsia foliis oppositis lanceolatis obtuse serratis. *Sp. pl.* 1. *p.* 602.

Trixago apula unicaulis. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 199. *t.* 197. *Moris. hist.* 3. *p.* 427. *s.* 11. *t.* 24. *f.* 8.

Crista galli spicata, flore luteo magno, messanensis. *Raj. hist.* 769.

Chamædrys unicaulis spicata. *Bauh. pin.* 248.

Antirrhinum folio dissecto *Bauh. pin.* 211.

Habitat in Palæstinæ, Italiæ, Monspelii *maritimis humentibus, inter juncos.* ☉

5. RHI-

RHINANTHUS foliis fublanceolatis pilofis integerrimis. *Fl. zeyl.* 238. — indica.
Hyffopus zeylanicus tenellus pratenfis. *Burm. zeyl.* 122.
Habitat in Zeylona.

RHINANTHUS corollis fauce patente, foliis finuato-dentatis. *Gron. virg.* 192. † — virginica.
Habitat in Virginia.
Affinis Gerardiæ flavæ?

EUPHRASIA.

EUPHRASIA foliis dentato palmatis, floribus fubcapitatis. — latifolia.
Euphrafia foliis ovatis, floribus fpicatis. *Sauv. monfp.* 139.
Euphrafia purpurea minor. *Bauh. pin.* 111. *Magn. monfp.* 95. *t.* 94.
Euphrafia purpurea minor. *Bauh. prodr.* 111. *Raj. hift.* 774.
Euphrafia pratenfis latifolia italica. *Bauh. pin.* 234. *Morif. hift.* 3. *p.* 430 *f.* 11. *t.* 24. *f.* 8. *Raj. hift.* 773.
Euphrafia tertia latifolia pratenfis. *Col. ecphr.* 200. *t.* 202. *f.* 2.
Odontites foliis circa radicem ovatis ferratis, ceteris lanceolatis extremitate trifidis. *Segu. ver.* 1. *p.* 270.
Habitat in Apulia, Italia, Monfpelii. ☉

EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. lapp.* 247. *Fl. fuec.* 516; 543. *Mat. med.* 315. *Roy. lugdb.* 299. *Hall. helv.* 628. — officinalis.
Euphrafia caule ramofo, foliis ovatis acute dentatis. *Hort. cliff.* 325
Euphrafia officinarum. *Bauh. pin.* 233.
Euphrafia minor. *Dill. app.* 53.
Euphrafia. *Cam. epit.* 767.
Habitat in Europæ *pafcuis aridis*. ☉

EUPHRASIA foliis linearibus tricufpidatis. — tricufpidata.
Euphrafia anguftis & tricufpidatis foliis, floribus ex albo purpureis. *Pluk. alm.* 142. *t.* 177. *f.* 1. *Zan. hift.* 110. *t.* 76.
Habitat in Italia. ☉

EUPHRASIA foliis linearibus, omnibus ferratis. *Hort. cliff.* 346. *Fl. fuec.* 517; 544. *Roy. lugdb.* 299. — Odontites.
Euphrafia pratenfis rubra. *Bauh. pin.* 234.

 Euphra-

Euphrasia altera. *Dod. pempt.* 55.

β. Euphrasia sylvestris major purpurea latifolia. *Col. ecphr.* 1. *p.* 201. *t.* 202. *f.* 1.

Habitat in Europæ *arvis pascuisque sterilibus.* ⊙

lutea. 5. EUPHRASIA foliis linearibus serratis: superioribus integerrimis. *Leyss. hal.* 543.

Euphrasia pratensis lutea. *Bauh. pin.* 234. *Moris. hist.* 3. *p.* 432. *s.* 11. *t.* 24. *f.* 16.

Euphrasia lutea montana angustifolia major altera. *Col. ecphr* 1 *p.* 204. *t.* 203.

Habitat in Europæ *australis montosis aridis.* ⊙

linifolia. 6. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus integerrimis, calycibus villoso-viscidis.

Euphrasia foliis linearibus. *Sauv. monsp.* 138.

Euphrasia foliis lini angustioribus. *Bauh. pin.* 234.

Euphrasia linifolia. *Col. ecphr.* 2. *p.* 68. *t.* 69.

β. Pedicularis annua lutea tenuifolia viscosa pomum redolens. *Garid. aix.* 351.

Habitat in Italia, Helvetia, Gallia. ⊙

Planta β differt Foliis *lineari-lanceolatis, nec perfecte linearibus;* Calycibus *villoso-viscidis, nec glabris;* Corollis *clausis, nec stamine brevioribus.*

MELAMPYRUM.

cristatum. 1. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Fl. Suec.* 510; 545.

Melampyrum luteum angustifolium. *Bauh. pin.* 234.

Melampyrum luteum, linariæ folio. *Bauh. prodr.* 1[illegible]

Melampyrum angustifolium cristatum. *Pluk. alm.* 2[illegible] *t.* 99. *f.* 2.

Habitat in Europæ *borealis pratis asperis.* ⊙

Variat floribus albis.

arvense. 2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis. *Fl. svec.* 511; 546.

Melampyrum foliis laciniatis laxe spicatis. *Roy. lugdb.* 298.

Melampyrum purpurascente coma. *Bauh. pin.* 234.

Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.

Melampyrum lanuginosum bæticum. *Bauh. pin.* 234.

Habitat in Europæ *agris.* ⊙

3. ME-

MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceolatis: summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Fl. svec.* 512, 547. nemorosum
Melampyrum coma cærulea. *Bauh. pin.* 234.
Parietaria sylvestris. 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 44.
Habitat in Europæ *borealis nemoribus.* ⊙

MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis clausis. *Fl. svec.* 513; 548. pratense.
Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis. *Fl. lapp.* 240.
Melampyrum luteum latifolium. *Bauh. pin.* 243.
Habitat in Europæ *borealis pratis siccis.* ⊙

MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Fl. svec.* 514; 549. sylvaticum
Melampyrum floribus sparsis sessilibus binatis, foliis omnibus indivisis. *Hall. helv.* 627.
Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis. *Cels. upf.* 32. *Fl. lapp.* 240.
Habitat in Europæ *borealis sylvis.* ⊙
Differt a præcedente corollis dimidio brevioribus, limbo hiantibus; iisque totis flavis, nec tubo albis.

LATHRÆA.

LATHRÆA caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis. Clandestina
Lathræa foliis cordatis, floribus fasciculatis. *Guett. stamp.* 454. *Dalib. paris.* 191.
Clandestina flore subcæruleo. *Tournef. inst.* 652.
Dentaria aphyllos purpurea, cespite denso. *Raj. extr.* 116.
Dentaria aphyllos, flore purpureo. *Raj. hist.* 1230.
Orobanche montana. *Rudb. elys.* 2. *p.* 233. *f.* 14.
Orobanche flore majore ex cæruleo purpurascente. *Bauh. pin.* 87. *prodr.* 31. *Burs. III:* 155. *Rudb. elys.* 2. *p.* 229. *f.* 2. *Raj. hist.* 1227. *Moris. hist.* 3. *p.* 502.
Orobanche s. Dentaria aphyllos purpurea, cespite denso. *Moris. hist.* 3. *p.* 503. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 15.
Planta clandestina, s. Madrona. *Dalech. hist.* 960.
Clandestina, Madronna, Occulta. *Borel. obs.* 38.

Habi-

Habitat in umbrosis Galliæ, Pyrenæorum, Italiæ. ♃
Caulis *infra terram corymbosus, ut fructificationes solæ supra terram emineant solitariæ in singulo ramo.*

Phelypæa. 2. LATHRÆA corollis campanulato-patentibus.
Phælypæa lusitanica, flore luteo. *Tournef. cor.* 47.
Orobanche elegantissima verna, flore luteo. *Grisl. lus. Moris. hist.* 3. *p.* 502. *
β. Phelypæa orientalis, flore coccineo, *Tournef. cor.* 47.
Habitat in Lusitaniæ *umbrosis.* ♃

Anblatum. 3. LATHRÆA corollarum labiis indivisis. †
Anblatum orientale, flore purpurascente. *Tournef. cor.* 48.
Habitat in Oriente. ♃

Squamaria. 4. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis pendulis labio inferiore trifido. *Fl. svec.* 518; 550. * *Dalib. paris.* 191.
Orobanche, radice dentata, major. *Bauh. pin.* 88.
Orobanche radice squamata, foliis rotundis, flore pendente & suave rubente, sundboensis. *Rudb. elys.* 2. *p.* 284. *f.* 17.
Orobanche radice dentata altius radicata, foliis & floribus albo-purpureis. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 3. *Moris. hist.* 3. *p.* 503. *s.* 12. *t.* 16. *f.* 14.
Habitat in Europæ *frigidioris umbrosissimis.* ♃

SCHWALBEA.

americana. 1. SCHWALBEA. *Gron. virg.* 92. *
Euphrasia major mariana, floribus spicatis amplis: tubis longioribus; summis oris profunde incisis. *Pluk. mant.* 73. *t.* 348. *f.* 2 ?
Habitat in America *septentrionali.*

TOZZIA.

alpina. 1. TOZZIA.
Tozzia alpina lutea, alsines folio, radice squamata. *Mich. gen.* 20, *t.* 16.
Euphrasia lutea alsinefolia, radice squamata. *Bauh. pin.* 234. *prodr.* 111.
Dentaria buguloides, radice globosa: squamulis myontoideis, alpina. *Mentz. pug. t.* 9 *f.* 3. 4.
Orobanche buglossoides, radice rotunda, squamulis myontoideis, alpina. *Moris. hist.* 3. *s.* 12. *t.* 16. *f. antepenult.*

Ano-

Anonyma f. gregorii, radice dentariæ. *Col. ecphr.* 2. *p.* 49. *t.* 50.

Habitat in Alpibus Helveticis, Auftriacis, Italicis, Pyrenæis, *locis afperis, humidis.* ♃

PEDICULARIS.

* *Caule ramofo.*

PEDICULARIS caule ramofo, calycibus callofo-punctatis, corollis labio obliquis. *It. w. goth.* 40. *Mat. med.* 314. — paluftris.

Pedicularis caule ramofo erecto, calycibus bifidis crenatis. *Hall. helv.* 621. *Fl. fvec.* 505; 551.

Pedicularis pratenfis rubra elatior. *Raj. hift.* 700.

Pedicularis danica maxima. *Lob. illuft.* 147.

Habitat in Europæ *feptentrionalis paludibus.* ☉

PEDICULARIS caule ramofo, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *It. w. goth.* 40. — fylvatica.

Pedicularis caule ramofo, floribus folitariis calycibus quinquefidis. *Fl. fvec* 504; 552.

Pedicularis caule ramofo, floribus folitariis remotis. *Fl. lapp.* 241. *Hort. cliff.* 326.

Pedicularis pratenfis purpurea. *Bauh. pin.* 163.

Fiftularia. *Dod. pempt.* 556.

Habitat in Europæ *fylvis paludofis.* ☉

PEDICULARIS caule fubramofo, corollis galea roftrato-acuminatis, calycibus fubhirfutis. *Kran. auftr.* 183. *n.* 3. — roftrata.

Pedicularis alpina, foliis alternis: pinnulis incifis, floribus fparfis roftratis purpureis. *Hall. helv.* 621. *t.* 16. *f.* 1.

Pedicularis alpina, filicis folio, minor. *Bauh. pin.* 163.

Alectorolophus alpina 3 minor. *Cluf. hift.* 2. *p.* 210.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Auftriæ.

* * *Caule fimpliciffimo.*

PEDICULARIS caule fimplici, floribus terno-verticillatis, corollis claufis, calycibus crenatis, capfulis regularibus. *Fl. Svec.* 506; 553. — Sceptrum Carolin.

Pedicularis capfulis fubrotundis regularibus. *Roy. lugdb.* 299.

Pedicularis alpina, folio ceterach. *Helv. flor.* 39. *t.* 39.

Sce-

Sceptrum carolinum. *Rudb. it.* 1. *t.* 1. *Fl. lapp.* 24. *t.* 4. *f.* 4. *Hort. cliff.* 326. *Oed. dan. t.* 26.
Habitat in Sueciæ, Borussiæ, Rutheni *spongiosis; sylvaticis, riguis.* ♃
Scapus *nudus.* Spica *interrupta ex Verticillis triflor. foliolo exceptis.* Corolla *non hians.* Folia *pinnatifida crenata.*

verticillata. 5. PEDICULARIS caule simplici, foliis quaternis. *Kra. aust.* 183. *n.* 4.
Pedicularis alpina, floribus purpureis spicatis, foliis pinnatis verticillatis. *Hall. helv.* 623. *t.* 17. *f.* 1.
Alectorolophus alpina 2, floribus purpureis. *Clus. hi.* 2. *p.* 210
Filipendula montana altera. *Bauh. pin.* 163.
Habitat in Sibiria, Helvetia, Austria. ♃

resupinata. 6. PEDICULARIS caule simplici, foliis lanceolat. serratis crenulatis, floribus resupinatis.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin*, *D. Demidoff.*
Caulis *pedalis, lævis, simplicissimus.* Folia *lanceolata indivisa, profunde serrata serraturis crenulatis, alterna.* Flores *ex alis superioribus solitarii, sessiles.* Calyx *lævis, obtusus, bifidus, integer.* Corolla *saturatissime purpurea, resupinata: Galea adunca, compressa; Vexillum amplum, rotundatum.*

recutita. 7. PEDICULARIS caule simplici, staminibus floris galea longioribus.
Pedicularis alpina, foliis alternis pinnatis, floribus ex atro rubentibus in spicam densam congestis. *Hall. helv.* 623. *t.* 16. *f.* 2.
Habitat in Helvetiæ *summis Alpibus.*

tristis. 8. PEDICULARIS caule simplici, corollarum galea margine villosis.
Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis: pinnulis obtusis acute serratis. *Gmelin.*
Habitat in Sibiria.
Caulis *simplicissimus, spithamæus.* Folia *alterna, pinnatifida, serrulata.* Flores *in spicam s. capitulum congesti.* Corollæ *obtusæ, flavæ: galea parum incurva margine villosa.*

flammea. 9. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis retro imbricatis.
Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis obtusis laciniis imbricatis crenatis. *Fl. lapp.* 244. *t.* 11. *f.* 2. *Fl. Svec.* 509. ; 556. Pedi-

Pedicularis caule erecto non ramoso, pinnis foliorum retroversis imbricatis. *Hall. helv.* 622.
Pedicularis alpina, folio ceterach. *Bauh. pin.* 163.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃

PEDICULARIS caule simplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calycibus hirsutis. **hirsuta.**
Pedicularis caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. *Fl. lapp.* 245. *t.* 4. *f.* 3. *Fl. svec.* 508; 555. *Oed. dan. t.* 30?
Habitat in Lapponiæ *Alpibus.* ♃

PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis serratis, calycibus rotundatis glabris, corollis galea uncinatis acutis. **incarnata.**
Pedicularis foliis alternis: pinnis semipinnatis, floribus laxe & longissime spicatis. *Allion. pedem.* 54. *t.* 12. *f.* 2? *sed calyces villosi acutiores.*
Habitat in Sibiria.
Folia *Radicalia pinnata, pedalia: pinnis pinnatifidis, serratis;* Caulina *pinnatifida fere ad basin, serrata.* Caulis *lævis, plusquam pedalis, Foliis alternis.* Spica *nuda, Calycibus semiglobosis, quinquedentatis, glabris.* Corolla *incarnata: Galea falcata & uncinata, acuta, valde adunca.*

PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatifidis serratis, calycibus bifidis obtusis. *Oed. dan. t.* 12. **lapponica.**
Pedicularis caule simplici, foliis lanceolatis semipinnatis serratis acutis. *Fl. lapp.* 242. *t.* 4. *f.* 1. *Fl. svec.* 507; 554. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299.
Habitat in Alpibus Lapponicis *frequens.* ♃

PEDICULARIS caule simplici, spica foliosa, corollis galea acutis emarginatis, calycibus quinquedentatis. **comosa.**
Pedicularis foliis alternis: pinnis semipinnatis, floribus rostratis ochroleucis dense spicatis. *Allion. pedem.* 51. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat in Alpibus Italicis. ♃
Calyx 5*dentatus, tubulosus, integerrimus, parum pilosus.* Corolla *labio superiore acuto, sed emarginato: dentibus duobus, acutis, nutantibus.*

PEDICULARIS caule simplici, calycibus crenatis, corollis galea rostrato-aduncis. **tuberosa.**

Pedi-

Pedicularis alpina, foliis alternis pinnatis: pinnis pinnatis, floribus ochroleucis rostratis in spica congestis. *Hall. helv.* 620. *t.* 15. *Sauv. monsp.* 24
Filipendula montana, flore pediculariæ. *Bauh. pin.* 1
Alectorolophus montana, flore luteo. *Barr. ic.* 4 *Bocc. mus.* 315. *t.* 8.
Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis. ♃
Folium in caule modo unicum s. alterum.

GERARDIA.

tuberosa. 1. GERARDIA foliis subovatis tomentosis repand longitudine caulis. †
Gerardia humilis, bugulæ foliis, asphodeli radi *Plum. gen.* 31. *ic.* 75. *f.* 2.
Habitat in America *calidiore.*

delphinifolia. 2. GERARDIA foliis linearibus pinnatifidis, caule su ramoso. *Amæn. acad.* 4. *p.* 318. *
Habitat in India *Orientali.* ⊙

purpurea. 3. GERARDIA foliis linearibus.
Digitalis foliis linearibus, floribus remotis. *Gron. vi* 193.
Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis p vis angustis. *Banist. virg.* 1926. *Gron. virg.* 1. *p.* 72.
Digitalis virginiana rubra, foliis & facie antirrhini vu garis. *Pluk. mant.* 65. *t.* 388. *f.* 1.
Habitat in Virginia, Canada. ⊙
Caules *pedales*, *filiformes*, *simplicissimi aut brachia læves.* Folia *linearia*, *integerrima*, *opposita*, *sæpe alterna.* Flores *oppositi: Pedunculis unifloris*, *filifo mibus*, *aut sessiles.* Calyces *læves*, *parvi*, *campanu ti*, *quinquedentati.* Corollæ *saturatissime purpureæ a rotatæ aut campanulatæ aut tubulosæ; Sic variat c rollæ figura.*

flava. 4. GERARDIA foliis lanceolatis pinnato-dentatis, ca le simplicissimo.
Anonymos floribus flavis speciosis digitali-æqualib *Gron. virg.* 94.
Digitalis lutea elatior, jaceæ nigræ foliis. *Banist. vi* 1926. *Pluk. mant.* 64. *t.* 368.
Digitalis procerior floridana, jaceæ nigræ dissectis f liis, floribus albis amplioribus. *Pluk. amalth.* 7 *t.* 389. *f.* 1.

Habi-

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis *pedalis s. altior.* Folia *opposita, lanceolata, subpetiolata (Lycopi aut Jaceæ), basi incisa pinnatim sinubus patulis.* Spica *terminalis, laxa, ex floribus oppositis, magnis. flavis.* Antheræ *in duas spinas deorsum tendentes.* Stamen *quintum deest.*

GERARDIA foliis oblongis duplicato-serratis, caule paniculato, calycibus crenatis. — pedicularis.

Pedicularis foliis lanceolatis pinnatifidis serratis, floribus pedunculatis. *Gron. virg.* 68.

Digitalis, verbesinæ foliis e regione binis, americana, capsularum apicibus longissimis filamentis donata. *Pluk. mant.* 64.

Digitalis mariana, filipendulæ folio. *Raj. suppl.* 397.

Habitat in Virginia, Canada.

Corollæ *extus pubescentes, oblongæ.* Calycis *dentes crenati; exsiccatione nigra evadit; ut Pedicularis; folia opposita & corollæ patulæ.*

GERARDIA foliis ovatis serratis, bracteis linearibus hispidis. *Osb. it. t.* 9. — glutinosa.

Habitat in China.

Caulis *teretiusculus, erectus; ramis brevioribus.* Folia *opposita, petiolata, ovata, acuta, pollice latiora, profunde serrata, subvillosa.* Racemi *terminales, solitarii ex floribus oppositis brevissime pedunculatis.* Calyces *acuti, 5partiti, lacinia superiore majore.* Bractea *filiformis una alterave calyci adjacet ejusdem longitudinis, pilis glutinosis, uti calyx hispida.*

CHELONE.

CHELONE foliis lanceolatis serratis: summis oppositis. *Hort. cliff.* 493. *Gron. virg.* 70. — glabra.

Chelone acadiensis, flore albo. *Tournef. act.* 1706.

Chelone floribus speciosis pulcherrimis, colore rosæ damascenæ. *Gron. virg.* 71. *Mill. ic.* 62. *t.* 93.

Digitalis mariana, persicæ folio. *Raj. supp.* 397.

Digitalis mariana, serratis densioribus rigidis & angustis foliis, semine fegopyri triquetro. *Pluk. mant.* 64. *t.* 348. *f.* 3.

Habitat in Virginia, Canada. ♃

CHELONE caule foliisque hirsutis. — hirsuta.

Anonymos flore pallide cæruleo digitalis insta summis caulibus dispofito, foliis villosis acum tis. *Gron. virg.* 71.

Digitalis virginiana, panacis colonii foliis, flore am pallescente. *Pluk. mant.* 64.

Digitalis flore pallido transparente, foliis & caule li hirsutie imbutis. *Banist. virg.* 1928.

Habitat in Virginia.

Huic stamen quintum longum cum Anthera villosiss D. Jussieu.

Pentstemon. 3. CHELONE foliis amplexicaulibus, panicula dic toma.

Chelone foliis inferioribus ovatis acuminatis integ mis, superioribus amplexicaulibus lanceolatis d tatis, corollis patentibus bilabiatis. *Arduin. spec. t.* 5.

Asarina caule erecto, foliis lanceolatis amplexic libus, panicula dichotoma. *Mill. dict.*

Dracocephalus latifolius glaber, lysimachiæ lute liis. *Moris. hist.* 3. *p.* 417. *s.* 11. *t.* 21. *f.* 2.

Pentstemon. *Mitch. gen.* 14.

Habitat in Virginia.

Caulis *herbaceus*, *brachiatus.* Folia *ovato-lanceol opposita*, *amplexicaulia*, *denticulata*, *acuminata*, *ut que viridia.* Caules & Ramuli *terminantur pedu lo dichotomo.* Calyces *quinquepartiti. In prima dic tomia flores communiter bini*, *propriis pedicellis.*

GESNERIA.

acaulis. 1. GESNERIA foliis lanceolato-ovatis serratis subpe latis terminali-confertis, pedunculis trifloris fo brevioribus. *Amæn. acad.* 5. *p.* 400. *

Gesneria rupestris indivisa, foliis oblongis rugo summo caule dispositis, floribus singularibus ad a *Brown. jam.* 262.

Rapunculo affinis anomala vasculifera, folio oblo serrato, flore coccineo tubuloso. *Sloan. jam.* 59. 1. *p.* 159. *t.* 102. *f.* 1.

Habitat in Jamaica.

humilis. 2. GESNERIA foliis lanceolatis serratis sessilibus, dunculis ramosis multifloris.

Gesneria humilis, flore flavescente. *Plum. gen.* 27. *ic.* 133. *f.* 2.

Digitalis folio oblongo serrato ad foliorum alas florida. *Sloan. jam.* 60. *hist.* 1. *p.* 162. *t.* 104. *f.* 2. *Raj. suppl.* 396.

Habitat in America australi. ♄

GESNERIA foliis ovato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Hort. cliff.* 318. — tomentosa.

Gesneria amplo digitalis folio tomentoso. *Plum. gen.* 27. *ic.* 134.

Habitat ad Americæ meridionalis *ripas.*

ANTIRRHINUM.

* *Caulibus laxis. Foliis angulatis.*

ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff.* 32. *Hort. upf.* 175. *Roy. lugdb.* 295. *Guett. stamp.* 2. *p.* 210. *Gort. gelr.* 358. *Gron. orient.* 75. — Cymbalaria

Cymbalaria. *Bauh. pin.* 306. *Cam. epit.* 860. *Dalech. hist.* 1322.

Habitat in rupibus & muris antiquis Basileæ, Parisiis, Harlemi. ☉

ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff.* 323. *Hort. upf.* 175. *Gron. virg.* 68. *Roy. lugdb.* 295. — Elatine.

Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo. *Bauh. pin.* 253.

Elatine. *Cam. epit.* 754.

Elatine folio acuminato, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 253.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ *arvis.* ☉

ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. upf.* 175. *Hort. cliff.* 323. *Roy. lugdb.* 295. — spurium.

Elatine folio subrotundo. *Bauh. pin.* 253.

Veronica femina. *Dod. pempt.* 42.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ *arvis.* ☉

ANTIRRHINUM foliis hastatis, caule erecto ramosissimo. † — ægyptiacum

Linaria memphitica pumila, hastato folio tricuspidi, flore luteo. *Lipp.*

Habitat in Ægypto.

** *Foliis oppositis; Florum calcari brevi obtusiuscul*

villosum. 5. ANTIRRHINUM foliis omnibus oppositis ov villosis, caulibus simplicibus, floribus oppo lateralibus.

Antirrhinum saxatile minus, origani folio viscoso villoso, flore albo amplo. *Barr. ic.* 597.

Linaria hispanica, nummulariæ folio villoso. *Tour inst.* 169.

Habitat in Hispania. *Cl. Alstræmer.* ♃.

Folia minuta, pedunculis breviora. Tota planta de sime pilosa.

origanifolium. 6. ANTIRRHINUM foliis plerisque oppositis ob gis, floribus alternis.

Antirrhinum, foliis oppositis lanceolatis, floribu xe racemosis. *Roy. lugdb.* 297.

Antirrhinum saxatile, foliis serpilli. *Bauh. pin. prodr.* 106. *Burs. XII.* 8; 9.

Antirrhinum saxatile villosum, origani folio glutin *Barr. ic.* 598.

Antirrhinum saxatile, alsines folio unctuoso & vi so. *Barr. ic.* 1102; 1103.

Orontium saxatile thymi folio, flore rubello. *Barr* 1313.

Habitat in Pyrenæis, Monte aureo, Massiliæ. ☉

Planta polymorpha, varians foliis ovatis & lanceol forte filia A. minoris, a quo distinguitur ramis li sis; Foliis caulinis omnibus oppositis, floriferis men alternis; Floribus duplo majoribus.

minus. 7. ANTIRRHINUM foliis plerisque alternis lan latis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Hort.* 324. *Fl. svec.* 502; 558.

Antirrhinum arvense minus. *Bauh. pin.* 212.

Antirrhinum tertium. *Cam. epit.* 922.

Habitat in Europæ *cultis, ruderatis, glareosis.* ☉

Folia infima, per tria paria, tantum opposita.

*** *Foliis oppositis. Florum calcari exquisito.*

triphyllum. 8. ANTIRRHINUM foliis ternis ovatis. *Hort.* 324. *Hort. ups.* 174. *Roy. lugdb.* 295. *Sauv. mo* 165.

Linaria triphylla minor lutea. *Bauh. pin.* 212.

Linaria hispanica. *Clus. hist.* 1. *p.* 320.

β. L

Linaria triphylla cærulea. *Bauh. pin.* 312.
Habitat in umbrosis montibus Valentinis & Hyblæis *circa* Syracusas. ⊙

ANTIRRHINUM foliis lanceolatis sparsis: inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 296. **triste.**
Linaria tristis hispanica. *Dill. elth.* 201. *t.* 164. *f.* 199. *Mill. ic.* 166.
Habitat Gibraltariæ.

ANTIRRHINUM foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoso, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 324. *Roy. lugdb.* 296. **triornithophorum.**
Linaria americana maxima, purpureo flore. *Herm. lugdb.* 376. *t.* 377. *Raj. hist.* 1884.
Linaria, flore purpureo, americana. *Riv. mon.* 81.
Habitat in Lusitania, America.
Corollæ labium superius fornicatum est. Planta humanæ altitudinis.

ANTIRRHINUM foliis quaternis linearibus, caule florifero erecto spicato. *Hort. upf.* 174. **purpureum**
Antirrhinum foliis linearibus sparsis, nectariis subulatis recurvis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 296.
Linaria purpurea magna. *Bauh. hist.* 3. *p.* 460.
Linaria purpurea major odorata. *Bauh. pin.* 213.
Linaria altera purpurea. *Dod. pempt.* 183.
Habitat ad radices Vesuvii.
... ut Folia ex omnibus alis conferti. Flores parvi.

ANTIRRHINUM foliis lineari-lanceolatis ternis, caule erecto racemoso. **Linarioides.**
Habitat in Europa australi.
Simillimum A. Linariæ, sed Caules *angustiores;* Folia *terna.* Flores *racemosi, simillimi, verum labium corollæ superius albidum, nec flavum. Reliqua conveniunt.*

ANTIRRHINUM foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus ...ato-capitatis. **bipunctatum.**
...rhinum foliis lanceolato-linearibus, floribus in sum...ate caulis confertis parvis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 205?

Antirrhinum erectum, foliis linearibus: imis verticil latis, pauciflorum. *Sauv. monsp.* 165.
Linaria lutea parva annua. *Bauh. hist.* 3. *p.* 457.
Habitat in Hispaniæ, Italiæ arvis. ☉
Caulis *spithamæus*, *Ramis strictis*, *ad angulum recto exeuntibus.* Folia *lanceolata*, *sessilia*, *plana*, *patentia vix carnosa*, *fere lævia: inferiora quaterna.* Flores *subspicati*, *pauci*, *sessiles.* Corollæ *flavæ*, *punctis duo bus fuscis in palato glabro versus labium superius. Labium superius bipartitum*, *replicatum*, *lanceolatum erectum.*

sparteum. 14. ANTIRRHINUM foliis subulatis canaliculatis carnosis: inferioribus ternis, caule paniculato: corollisque glaberrimis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 277.
Habitat in Hispania. *Læfl.* ♂
Radix *altero anno florida.* Caulis *pedalis*, *glaberrimus paniculatus*, *erectus*, *minus strictus: ramis virgatis.* Folia *primordialia*, *antequam caulem erigit*, *terna oblonga; reliqua alterna*, *subulata*, *canaliculata*, *glabra*, *carnosa*, *recta.* Flores *racemosi.* Calyces *glabri.* Corollæ *flavæ*, *palato glabro cum tinctura rubicunda in retuso gibbo palati. Differt ab* A. bipunctato *floribus pedunculatis*, *triplo majoribus*, *ut tota planta multoties majore.*

monspessulanum. 15. ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Roy. lugdb.* 297. *Sauv. monsp.* 47.
Linaria, capillaceo folio, odora. *Bauh. pin.* 213. *prod.* 106. *n.* 4 *Dill. elth.* 199.
Linaria odorata monspessulana. *Bauh. hist.* 3. *p.* 459.
Habitat in Gallia. ♃
Calcar corollæ rectum brevissimum, *ut ipso calyce brevius.* Flores *odorati. Simillimum A. sparteo*, *cui calcar longitudine floris.*

repens. 16. ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis: inferne quaterni, calycibus capsulæ æqualibus.
Antirrhinum foliis linearibus alternis sæpius oppositis acuminatis, floribus laxe spicatis. *Roy. lugdb.* 2..
Antirrhinum foliis lanceolato linearibus sparsis, calycinis laciniis capsulæ æqualibus. *Guett. stamp.* 2. 204. *Dalib. parif.* 186.

Lina-

Linaria angustifolia, flore cinereo striato. *Dill. elth.* 198. *t.* 163. *f.* 197.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia. ☉

Flores inodori.

ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. upf.* 174. **arvense.**

Antirrhinum foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. *Roy. lugdb.* 297.

Linaria arvensis cærulea. *Bauh. pin.* 213. *prodr.* 107. *Dill. elth.* 199. *t.* 163. *f.* 198.

Linaria pumila, foliolis carnosis, flosculis minimis flavis. *Bauh. pin.* 213. *Dill. elth.* 200.

Linaria quadrifolia lutea. *Bauh. pin.* 213.

Linaria tetraphylla lutea. *Col. ecphr.* 1. *p.* 299. *t.* 300. *f.* 1.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ *arvis.* ☉

Flores spicati Bractea reflexa, minuti: Calcare recurvo. Folia glabra.

ANTIRRHINUM foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymbosis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 204. *Dalib. parif.* 186. **pelisserianum.**

Antirrhinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis sæpe ternis. *Sauv. monsp.* 166.

Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Vaill. parif.* 118. *Magn. monsp.* 159. *Barrel. ic.* 1162.

Linaria cærulea minor. *Lob. illustr.* 103.

Linaria cærulea calcaribus longis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 461.

Habitat in Gallia, Italia. ☉

Flores in capitulum s. corymbum calcaribus longis.

ANTIRRHINUM foliis caulinis linearibus alternis, radicalibus lanceolatis quaternis, calycibus villosis cauli approximatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 319.* **viscosum**

Habitat in Hispania. ☉

Planta erecta, statura A. pelisseriani, at flores magnitudine Linariæ.

[A]NTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus sparsis villosis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus spicatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 277. **saxatile.**

Linaria minor viscosa, flore luteo. *Morif. blef.*
Habitat in Hispania. ♃

glaucum. 21. ANTIRRHINUM foliis quaternis subulatis ca sis caulibus erectis, floribus spicatis. *Amæn. aca p.* 277. *
Linaria foliis confertis linearibus carnosis. *Hall.* 306.
Linaria maritima, foliis succulentis. *Buxb. cent.* 23. *t.* 37.
Linaria foliis carnosis cinereis. *Bauh. pin.* 213?
Habitat in Europa *australi* Oriente. ⊙
Calcar cæruleis striis. Sequenti nimis affine.

multicaule. 22. ANTIRRHINUM foliis quinis linearibus, flo capitatis. *Hort. cliff.* 324. *Roy. lugdb.* 296.
Linaria sicula multicaulis, molliginis folio. *Boc* 38. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in Sicilia, Oriente. ⊙
Caules *juncei, laxi.* Folia *linearia, obtusa.*

alpinum. 23. ANTIRRHINUM foliis quaternis lineari-lance tis, caule diffuso, floribus racemosis calcari re *Roy. lugdb.* 297. *Sauv. monsp.* 165.
Linaria quadrifolia supina. *Bauh. pin.* 213.
Linaria 3. stitiaca. *Clus. hist.* 1. *p.* 322.
β. Linaria cærulea repens. *Bauh. pin.* 213.
γ. Linaria foliis carnosis cinereis. *Bauh. pin.* 213. *ex*
Habitat in Helvetia, Austria, Baldo, Styria, Pyren
Folia lanceolata verticillis remotissimis ; calycum lacinia longior.

supinum. 24. ANTIRRHINUM foliis subquaternis linearib caule diffuso, floribus subspicatis nectario recurv *Roy. lugdb.* 296. *Dalib. paris.* 186. *Sauv. monsp.* 48.
Linaria pumila supina lutea. *Bauh. pin.* 213.
Linaria hispanica 5. *Clus. hist.* 1. *p.* 321.
Habitat in Galliæ, Hispaniæ *arenosis.*
Calcar reflexum est. Folia *fere filiformia ut in sparteo, at racemi stricti, Corollæ calcar recurva & Calycis foliolum superius reliquis longius.*

bicorne. 25. ANTIRRHINUM foliis oppositis ovato-oblo serratis, caule erecto floribus racemosis, capsuli cornibus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 17. *

Anti

Antirrhinum foliis copiosis oblongis dentatis, capsula corniculata reflexa. *Burm. afr.* 211. *t.* 75. *f.* 3.
Habitat ad Cap. b. Spei. ☉

**** *Foliis alternis. Floribus calcaratis.*

ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis glabris, pedunculis axillaribus: fructifer reflexis elongatis, caule procumbente. **reflexum.**
Linaria pusilla procumbens latifolia, flore pallido: rictu luteo. *Raj. hist.* 755.
Habitat in Barbaria. *Brander.* ☉
Caules *filiformes, spithamæi.* Folia *alterna, ovata, subpetiolata, remota.* Pedunculi *axillares, solitarii, uniflori, longitudine foliorum; absoluta florescentia duplo longiores reflexi versus terram.* Calyx *acuminatus.* Corollæ *calcar longitudine floris.* Capsula *globosa.*

ANTIRRHINUM foliis alternis linearibus remotis, floribus paniculatis: pedunculis folio longioribus strictis. **pedunculatum.**
Linaria lusitanica maritima, polygalæ folio. *Tournef. inst.* 169?
Habitat in Hispania. *C. Alstræmer.*
Caules *spithamæi, lignosi, ramosissimi.* Folia *lanceolata, lævia, facie Polygoni avicularis.* Pedunculi *stricti, foliis triplo longiores.* Calyx *lævis.* Corollæ *luteæ, extus cæruleo striatæ.*

ANTIRRHINUM foliis alternis cordatis amplexicaulibus. **dalmaticum**
Linaria foliis lanceolatis alternis, caule suffruticoso. *Mill. dict.* 13.
Linaria latifolia dalmatica, magno flore. *Bauh. pin.* 212. *prodr.* 106.
Linaria maxima, folio lauri. *Bauh. hist.* 3. *p.* 458. *Buxb. cent.* 1. *p.* 95. *t.* 24.
Habitat in Creta, Armenia *unde innotuit* 1594. *C. B.* ○
Flores ex alis foliorum, solitarii, pedunculati.

ANTIRRHINUM foliis lanceolatis hirtis alternis, floribus spicatis: foliolo calycino supremo maximo. *Hort. cliff.*? *Mill. dict.* 10. **hirtum.**
Habitat in Hispania. ☉

Caules *aliquot simplices*, *spithamæi*, *non ramosi*. Folia *lanceolata* (*Lavandulæ*), *alterna*. Flores *dense spicati*, *colore & magnitudine A. Linariæ*. Calycis *foliolum superius duplo majus quam reliqua*. Capsulæ *subrotundæ*.

nceum. 30. ANTIRRHINUM foliis linearibus alternis, caule paniculato virgato, floribus racemosis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 277. *

Habitat in Hispania. *Læfling.* ☉

aistifolium. 31. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuosa.

Linaria genistæ folio glauco, flore luteo. *Herm. par. app.* 9. *Dill. elth.* 202. *Raj. suppl.* 391.

Linaria flore pallido: rictu aureo. *Bauh. pin.* 213.

Linaria pannonica 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 321.

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* Austria *inferiore.*

Caules *paniculati*, *subdecumbentes vel erectiusculi*. Folia *alterna*, *lanceolata*, *glabra*, *acuminata*, *omnino* Genistæ *tinctoriæ*. Racemi *longi*, *in paniculam dispositi*, *a calyce ad calycem flexuosi*: Floribus *alternis*, *distantibus*, *pedicellis longitudine calycis*. Calyx *quinquepartitus*, *glaber*, *acutus*, *longitudine capsulæ*. Corollæ *luteæ*, *magnitudine A. Linariæ*.

inifolium. 32. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis alternis trinerviis, floribus racemosis, pedunculis distantibus bractea brevioribus.

Linaria americana, parvo flore luteo. *Bauh. pin.* 212. *prodr.* 106.

Linaria constantinopolitana, lini sativi folio, flore luteo. *Tournef. cor.* 9. *Buxb. cent.* 1. *p.* 16. *t.* 25. *f.* 2. *mala.*

Habitat in Italiæ *maritimis.* ♃

Caules *teretes*, *erecti*, *læves*, *Ramis alternis*. Folia *lanceolata s. angusto-lanceolata*, *alterna*, *remota*, *lævia*, *obsolete trinervia*, *exquisite acuminata*. Racemus *rectus*, *longus*. Bracteæ *lanceolatæ*, *sæpe flore longiores*. Pedunculi *longitudine calcaris*. Calyces *acuti*, *breves*. Corollæ *luteæ palato interius villoso*; *calcari recto*, *longitudine floris*.

Linaria. 33. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus

ribus imbricatis. *Fl. svec.* 501; 557. *Mat. med.* 313. *Roy. lugdb.* 297.
Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Hort. cliff.* 325.
Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. *Guett. stamp.* 2. *p.* 203.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212.
Osyris. *Fuchs. hist.* 543 *Cam. epit.* 930.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃
Palatum villosum fulvum.
Conf. Linaria lutea montana, genistæ tinctoriæ folio. *Bauh. pin.* 213.
Bursero lecta in monte S. Bernhardi, qua parte augustam vallem spectat, videtur hujus varietas Floribus tantum dimidio minoribus.

PELORIA. *Amæn. acad.* 1. *p.* 55. *t.* 3. Linariæ *proles hybrida, constans, radicibus infinite se multiplicans, charactere fructificationis diversissima. Corolla regulari, quinquefida, quinquecorniculata, pentandra, ut genus proprium constitueret, nisi fructus semper abortiret; naturæ prodigium.*

ANTIRRHINUM foliis lineari lanceolatis alternis, floribus racemosis, calycibus corolla longioribus, caule erecto. *Roy. lugdb.* 296. *Hort. upf.* 174. — chalepense.
Linaria chalepensis minor erecta, flore albo lineis violaceis. *Moris. hist.* 3 *p.* 502. *f.* 5. *t.* 35. *f.* 9.
Linaria annua angustifolia, flosculis albis longis caudatis. *Triumf obs.* 87. *t.* 87. *f.* 2. *Raj. hist.* 1884.
Habitat in Italia. ☉

* * * * * *Corollis ecaudatis.*

ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upf.* 175. *Mat. med.* 312. — majus
Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. *Vir. cliff.* 61. *Hort. cliff.* 324. *n* 4. *Roy. lugdb.* 294.
Antirrhinum majus. rotundiore folio. *Bauh. pin.* 211
Antirrhinum luteo flore. *Bauh. pin.* 211.
Antirrhinum latifolium, pallido amplo flore. *Bocc. mus.* 2. *p.* 49. *t.* 41.
Antirrhinum majus alterum, folio longiore. *Bauh. pin.* 211.

Antir-

Antirrhinum. *Dod. pempt.* 182. *Lob. ic.* 404.
Habitat in Europæ *australis maceriis, sepibus.* ♂
Variat α. *Caule erecto. Foliis ovatis.*
β. *Caule diffuso virgato; Foliis lanceolatis.*

rontium. 36. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, floribus su[...] spicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. *Ho[...] upf.* 176.
Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus fl[...] res superantibus. *Hort. cliff.* 324. *Fl. suec.* 520; 55[...]
Antirrhinum arvense majus. *Bauh. pin.* 212.
Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. *Dod. pempt.* 212.
Habitat in Europæ *agris & arvis.* ☉
Capsula dehiscens refert cranium Simiæ, venena[...] planta.

sarina. 37. ANTIRRHINUM foliis oppositis cordatis cren[...] tis, corollis ecaudatis, caulibus procumbentibu[...] *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 295.
Asarina S. Hederula saxatilis. *Lob. ic.* 601.
Hedera saxatilis, magno flore. *Bauh. pin.* 306.
Habitat in rupibus Vegauio conterminis, Genevæ. ♃
Caules *prostrati, dependentes.* Folia *obtuse lobata [...] profunde crenata, pilosa.* Corollæ *absque calcari.*

iolle. 38. ANTIRRHINUM foliis oppositis ovatis tomento[...] sis, corollis ecaudatis, caulibus procumbentibus.
Antirrhinum hispanicum villosum, origani folio glutino[...] so. *Tournef. inst.* 168. *Barr. ic.* 598. (*cui perpera[...] calcar*).
Habitat in Hispania. ♃
Caules *prostrati, fragiles.* Folia *caulina opposita, mo[...] lissima.* Pedunculi *calyce longiores.* Corolla *Asarin[...] villosa, alba palato flavo, Labio superiore rubro-str[...] ato. Calcar nullum.*

****** *Corollis hiantibus.*

bellidifolium. 39. ANTIRRHINUM foliis radicalibus oblongis se[...] ratis, corollis calcaratis patulis. *Hort. cliff.* 498. *Ro[...] lugdb.* 295.
Antirrhinum foliis imis spathulatis, summis digitatis. *Sauv. monsp.* 67.
Linaria bellidis folio. *Bauh. pin.* 212. *prodr.* 106. *t.* 106.
Linaria odorata. *Dod. pempt.* 184.

Dodar-

Dodartia foliis radicalibus oblongo-ovatis serratis, caulinis linearibus integerrimis, floribus spicatis terminalibus. *Mill. dict. n. 2.*

Habitat Monspelii ; in agris inter Lugdunum & Viennam, *interque* Lugdunum & Gratianopolin. ♂

Corolla calcari recurvato , sed habitus ab Antirrhinis alienus ; hinc genuinam Linariæ speciem non esse statuit Raj. extr. 166. *; sed Dodartiæ. Mill. dict.* Folia *ramea parva , tripartita , a radicalibus latis serratis diversissima.*

canadense. 2. ANTIRRHINUM foliis linearibus alternis, corollis caudatis hiantibus : labio inferiore explanato.

Antirrhinum caule simplicissimo longissimo, foliis caulinis linearibus ; stolonum procumbentium lanceolatis minimis. *Gron. virg.* 67.

Habitat in Virginia, Canada. ⊙

Radix *fibrosa.* Caulis *erectus , filiformis , pedalis, vix ramosus.* Folia *alterna, remota, linearia, glabra.* Racemus *terminalis, rarior: floribus alternis, pedicellatis.* Calyx *quinquepartitus , acutus.* Corrollæ *labium superius breve , reflexum.* Lab. *inferius magnum, patens , dependens. Calcar subulatum.*

Obs. Linaria pumila lusitanica , floribus palato carentibus. *Tournef. inst.* 170. *Corollæ palato carent præter labium inferius longius prominens , mihi non rite nota planta.*

CYMBARIA.

dаurica. CYMBARIA.

Cymbaria daurica pumila incana, linariæ folio, magno flore luteo guttato. *Amm. ruth.* 47. *t.* 1. *f.* 2.

Habitat in Dauriæ *montanis , apricis , saxosis.*

CRANIOLARIA.

fruticosa. CRANIOLARIA foliis lanceolatis dentatis.

Gesnera arborescens, amplo flore fimbriato & maculoso. *Plum. gen.* 27. *t* 137.

Habitat in America *calidiore :* Havana. ♄

Folia *lanceolata , serrata.* Pedunculi *laterales multiflori.* Corolla *oblonga, interne punctata margine ciliato.* Fructus *mihi ignotus.*

2. CRA-

annua. 2. CRANIOLARIA foliis cordatis angulatis lobat *Mill. dict.*
Martynia annua villosa & viscosa, aceris folio, flo albo tubo longissimo. *Ehret. pict.* 1. *f.* 2. *Jacq. h* *t.* 110.
Habitat in Americes *Carthagena.* ☉
Corollæ tubus filiformis, longissimus. Flos albus.

MARTYNIA.

perennis. 1. MARTYNIA caule simplici, foliis serratis.
Martynia foliis serratis. *Hort. cliff.* 322. *t.* 18.*
Martynia perennis, folio subrotundo rugoso, flore cæruleo, radice dentariæ. *Ehret. pict. t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Americæ *Carthagena.* ♄
Radix Dentariæ, moliniformis.

annua. 2. MARTYNIA caule ramoso, foliis integerrimis angulatis.
Martynia foliis dentatis. *Hort. cliff.* 322.
Martynia annua villosa & viscosa, folio subrotundo flore magno rubro. *Mart. cent.* 42. *t.* 42. *Ehret. pi* *t.* 1. *f.* 1.
Craniolaria. *Læfl. it.* 225.
Habitat in Americes *Vera Cruce.* ☉
Calyx *exterior diphyllus, lanceolatus.* Perianthium *monophyllum, ovatum, subquinquelobum, latere inferio usque ad basin dehiscens.* Fructus *rostro incurvo, long uncinato.*

TORENIA.

asiatica. 1. TORENIA. *Amœn. acad.* 3. *p.* 25. *Osb. it.* 210.
Euphrasiæ affinis pusilla planta. *Pluk. amalth.* 85. 373. *f.* 2.
Asarinæ foliis & facie capsula bivalvi lignosa. *Pluk. amalth.*, 19. *t.* 360. *f.* 3 ?
Hederæ terrestris species. *Com. mal.* 35.
Kaka-pu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 103. *t.* 53.
Habitat in India. *Toren.*
Variat Foliis glabris & villosis: Floribus majoribus & minoribus.

BESLERIA.

melittifolia. 1. BESLERIA pedunculis ramosis, foliis ovatis.

Besle-

[K]esleria melissæ tragi folio. *Plum. gen.* 29. *ic.* 48.
Habitat in America.

[K]ESLERIA pedunculis simplicibus confertis, foliis lanceolatis. **lutea.**
[K]esleria, virgæ aureæ foliis, flore luteo, minor. *Plum. gen.* 29. *ic.* 49. *f.* 1.
[K]esleria, virgæ aureæ foliis, flore luteo, major. *Plum. gen.* 29.
[H]*abitat in* America.

[K]ESLERIA pedunculis simplicibus solitariis, involucris pentaphyllis propriis. *Jacq. hist. t.* 119. **cristata.**
[K]esleria scandens cristata, fructu nigro. *Plum. gen.* 29. *ic.* 50.
Habitat in America.
[Ra]dix *repens.* Folia *ovata, serrata, petiolata.* Pedunculi *laterales, uniflori, terminati Involucro pentaphyllo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus.* Corolla *solitaria, externe hirsuta.* Stamina & Pistilla *mire implexa, forte aut Martyniæ aut distincti generis planta.*

SCROPHULARIA.

[S]CROPHULARIA foliis cordatis serratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. *Hort. upf.* 177. **marilandica**
[Scr]ophularia foliis cordatis oppositis, racemo terminali. *Gron. virg.* 71.
[Sc]rophularia marilandica, longo profunde serrato urticæ folio. *Raj. suppl.* 396.
[Hab]*itat in* Virginia. ♃
[Si]millima *sequenti; duplo altior.* Folia *basi cordata, [se]d non trinervata seu ad nervos usque excisa. Pe[ti]oli utrinque connexi barba minima.*

[SC]ROPHULARIA foliis cordatis trinervatis, caule acutangulo. **nodosa.**
[Sc]rophularia foliis cordatis, racemo terminali. *Hort. cliff.* 322. *Fl. svec.* 520; 560. *Mat. med.* 310. *Roy. lugdb.* 293. *Gron. virg.* 71. *Dalib. paris.* 191.
[Scr]ophularia nodosa fœtida. *Bauh. pin.* 235.
[Scro]phularia. *Cam. epit.* 866.
[Habit]*at in* Europæ *succulentis.* ♃
[Folia] *trinervata ut in Lappa, Petasitide.*

aquatica. 3. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis d rentibus obtusis, caule membranis angulato, ra terminalibus. *Hort. upſ.* 177. *Mat. med.* 311.
Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in c decurrentibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 201.
Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin.* 235. fimbriato. *Læſ. pruſſ.* 248. *t.* 13.
Scrophularia femina. *Cam. epit.* 867.
Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ *humidis.* ♂

auriculata. 4. SCROPHULARIA foliis cordato-oblongis b pendiculatis: subtus tomentoſis, racemis term bus. *Læfl.*
Scrophularia betonicæ folio. *Tournef. inſt.* 166.
Scrophularia aquatica montana mollior. *Barr. rar* *t.* 274.
Betonica aquatica ſeptentrionalium. *Lob. ic.* 53
Habitat in Hiſpania.
Caules *vix ramoſi, acute tetragoni, nudi.* Folia *ſita, petiolata, cordata, oblonga, ſerrata, ſubtu loſa; infra baſin auriculata utrinque Foliolo o parvo, ſeſſili.* Racemus *terminalis.*

Scorodonia. 5. SCROPHULARIA foliis cordatis duplicato-ſer racemo compoſito. *Roy. lugdb.* 296. *Hudſ. angl.*
Scrophularia meliſſæ folio. *Tournef. inſt.* 166.
Scrophularia ſcorodoniæ folio. *Pluk. alm.* 338. *t. f.* 5. *Raj. hiſt.* 766. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 482. *ſ.* 5. *t.* f. 6.
Habitat in Luſitania & Jerſea *inſula Angliæ.*

orientalis. 6. SCROPHULARIA foliis lanceolatis ſerratis pet tis: caulinis ternis, rameis oppoſitis.
Scrophularia foliis lanceolato-linearibus acute ſerr inferne inciſis, racemo compoſito. *Roy. lugdb.* 29
Scrophularia orientalis, foliis cannabinis. *Tournef. co*
Habitat in Oriente. ♃
Racemus compoſitus e pedunculis 3. *ſ.* 4. *dichotomis.*

vernalis. 7. SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis a laribus ſolitariis dichotomis. *Hort. cliff.* 322. *upſ.* 177. *Roy. lugdb.* 293.
Scrophularia flore luteo. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 112. *t.*
Lamium pannonicum 2. exoticum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.*
Habitat in Italia, Helvetia, Auſtria. ♂

8. SCR

SCROPHULARIA foliis glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtusis, superioribus simplicibus, pedunculis subtrifloris axillaribus. trifoliata.
Scrophularia sambucifolia, flore rubro luteo vario pulchro. *Pluk. alm.* 338. *t.* 313. *f.* 6.
Scrophularia subrotundo crasso nigricante folio, flore luteo pallido, capsula turgida. *Bocc. mus.* 2. *p.* 65. *t.* 60.
Habitat in Africa, Corsica. ♂

SCROPHULARIA foliis interrupte pinnatis cordatis inæqualibus, racemo terminali: pedunculis axillaribus geminis dichotomis. sambucifolia.
Scrophularia foliis difformibus, pedunculis axillaribus aggregatis. *Roy. lugdb.* 202.
Scrophularia sambucifolia. *Alp. exot.* 203. *t.* 202. *Mill. dict. t.* 231.
Scrophularia foliis laciniatis. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 112.
Scrophularia sambuci foliis, capsulis maximis. *Moris. hist.* 2. *p.* 483. *s.* 5. *t.* 8. *f.* 6.
Scrophularia lusitanica, maximo flore, foliis dissectis. *Raj. suppl.* 396.
Habitat in Hispania, Lusitania, Oriente. ♃
Caulis *erectus, tetragonus e petiolis in angulos decurrentibus.* Folia *pinnata: foliolis* 5 *s.* 7, *præter alternas oppositiones minutas, cordatis, rugosis, supra glabris, serratis, impari majore.* Racemus *terminalis ex* Pedunculis *axillaribus, geminis, brevissimis, subdichotomis:* Floribus *magnis, purpurascentibus labio inferiore virescente.*

SCROPHULARIA foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Vir. cliff.* 61. *Hort. cliff.* 322. *Roy. lugdb.* 294. *Sauv. monsp.* 247. canina.
Scrophularia Ruta canina dicta. *Bauh. pin.* 236.
Ruta canina. *Clus. hist.* 2. *p.* 209. *Lob. ic.* 2. *p.* 55.
Habitat in Helvetia, Narbona, Italia. ☉
Pedunculi bifidi: Flores sessiles: primo axillari; reliquis alternis.

SCROPHULARIA foliis inferioribus bipinnatis glaberrimis, racemis bipartitis. lucida.
Scrophularia foliis filicis modo laciniatis s. Ruta canina latifolia. *Bauh. pin.* 236.

Scrophularia saxatilis lucida, laserpitii massiliens
lio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 166. *t.* 117.
Scrophularia glauco folio in amplas lacinias d
Tournef. cor. 9. *it.* 1. *p.* 84. *t.* 85.
Habitat in Oriente, Creta, Neapoli, *in ipsis*
Hydrunti. ♃

eregrina. 12. SCROPHULARIA foliis cordatis: superiorib
ternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Hort. cliff*
Roy. lugdb. 293. *Goüan. monsp.* 304.
Scrophularia urticæ folio. *Bauh. pin.* 236.
Scrophularia peregrina. *Cam. hort.* 157. *t.* 43.
Habitat in Italia. ♃

utescens. 13. SCROPHULARIA foliis lanceolatis obtusis
to-dentatis, pedunculis bifidis. *Roy. lugdb.*
Scrophularia lusitanica frutescens, verbenacæ
Tournef. inst. 167. *Raj. suppl.* 396.
Habitat in Lusitania.

occinea. 14. SCROPHULARIA foliis quaternis ovatis, flo
verticillatis spicatis. *Roy. lugdb.* 294.
Scrophularia flore coccineo, foliis urticæ quaternis
lem ambientibus. *Houst. ms.*
Habitat in Vera Cruce.

CELSIA.

rientalis. 1. CELSIA foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 321. *Hort.*
179. *t.* 1. *Roy. lugdb.* 301.
Verbascum orientale, sophiæ folio. *Tournef. cor.* 8. *B*
cent. 5. *p.* 17.
Blattaria orientalis, agrimoniæ folio. *Buxb. cent.*
14. *t.* 20.
Habitat in Cappadocia, Armenia. ☉

DIGITALIS.

urpurea. 1. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corc
obtusis: labio superiore integro. *Hort. upf.* 17
Digitalis foliolis calycinis ovatis. *Hort. cliff.* 318.
lib. paris. 192. acuminatis. *Roy. lugdb.* 292. *G*
gelr. 371.
Digitalis purpurea, folio aspero. *Bauh. pin.* 243.
Digitalis purpurea. *Dod. pempt.* 168.

β. Di

Digitalis alba, folio aspero. *Bauh. pin.* 229.
Habitat in Europa *australiore.* ♂

DIGITALIS calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido. *Hort. upf.* 178. — lutea.
Digitalis foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis. *Hort. cliff.* 318. *Roy. lugdb.* 293. *Dalib. parif.* 192.
Digitalis major lutea f. pallida, parvo flore. *Bauh. pin.* 224.
Digitalis lutea, minore flore. *Morif. hift.* 2. *p.* 479. *f.* 5. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Galliæ, Italiæ *fabulofis.* ♃
Spica apice ab initio nutat.

DIGITALIS calycinis foliolis ovatis obtusis, corollæ labio inferiore longitudine floris. — ferruginea.
Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis, corollis villosis: labio longissimo. *Buttn. cunon.* 226.
Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 292.
Digitalis angustifolia, flore ferrugineo. *Bauh. pin.* 244. *Riv. mon.* 98.
Digitalis latifolia, flore ferrugineo. *Morif. hift.* 2. *p.* 478. *f.* 5. *t.* 8. *f.* 2. 3.
Digitalis lutea non ramosa, scorzoneræ folio. *Buxb. cent.* 5. *p.* 25. *t.* 49.
Habitat in Italia, Constantinopoli. ♃

DIGITALIS foliis decurrentibus. — Thapfi.
Digitalis hispanica purpurea minor. *Tournef. inft.* 165.
Digitalis, verbasci folio, purpurea minor perennis hispanica. *Barr. ic.* 1185.
Digitalis, angusto verbasci folio, montana. *Bocc. muf.* 2. *p.* 108. *t.* 85.
Habitat in Hispania. ♃
Species *D. purpureæ.* Folia *tomentosa, venosa, serrata: inferiora lanceolato-ovata; superiora lato-lanceolata; omnia decurrentia & lateribus decurrentibus reflexa.* Racemus & Flores *D. purpureæ.* Corolla *purpurea fauce pallida punctis sanguineis sparsis; Limbus quadrifidus: lobo superiore indiviso; inferiore longiore ciliato. Anne* Filia *Digitalis purpureæ e Verbasco lapso?*

DIGITALIS foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris basi adnatis. — obscura.

Digitalis hispanica angustifolia, flore nigricante. *T nef. inst.* 166.
Digitalis angustifolia hispanica. *Bocc. mus.* 2. *p.* 136.
Habitat in Hispania. ♄
Caulis *suffruticosus*, *lignosus*. *Rami oppositi*, Folia *angusto-lanceolata*, *basi quasi adnata*, *gla ubi non floret conferta*, *alias alterna*. Racemi *minales*. Bracteæ *lanceolatæ*. Calycis *foliola ov acutiuscula*. Corollæ *cernuæ*, *obtusæ*, *obscure pu rascentes ore villoso: labio superiore integro; in paulo longiore; lateralibus brevioribus superiore.*

nariensis. 6. DIGITALIS calycinis foliolis lanceolatis, cor bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Mill. dict. t.*
Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo term laxe spicato. *Hort. cliff.* 318.
Digitalis acanthoides canariensis frutescens, flore au *Comm. hort.* 2. *p.* 105. *t.* 53.
Digitali affinis canariensis, solidaginis acutis foliis l ter pilosis, flore aureo cucullato. *Pluk. alm.* 4 325. *f.* 2.
Habitat in Canariis. ♄

BIGNONIA.

atalpa. 1. BIGNONIA foliis simplicibus cordatis ternis, c erecto, floribus diandris. *Jacq. amer.* 25.
Bignonia foliis simplicibus cordatis. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 289.
Bignonia arborea, foliis ovatis verticillato-tern siliqua gracili longissima. *Brown. jam.* 264.
Bignonia arbor, folio singulari undulato, siliquis gissimis & angustissimis. *Plum. spec.* 5. *ic.* 57.
Bignonia americana, arbor syringæ cæruleæ folio, purpureo. *Duham. arb.* 1. *p.* 104. *t.* 41.
Bignonia urucu foliis, flore sordide albo intus ma purpureis & luteis adsperso, siliqua longissima & gustissima. *Catesb. car.* 1. *p.* 49. *t.* 29.
Kawara Fisagi. *Kæmpf. jap.* 841. *t.* 842.
Cambulu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 75. *t.* 41.
Habitat in Japonia, Carolina. ♄
Arbor *erecta*. Folia *terna*. Cirrhi *nulli*. Flores *dri: staminibus duobus antheriferis; reliquis castratis.* Variat *foliis cordatis & ovatis.*

2. B

BIGNONIA foliis simplicibus lanceolatis, caule volubili. — *sempervirens.*
Bignonia foliis ovato-lanceolatis conjugatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 291.
Gelseminum s. Jasminum luteum odoratum virginianum scandens sempervirens. *Catesb. car.* 1. *p.* 53. *t.* 53. *Raj. hist.* 1769.
Syringa volubilis virginiana, myrti majoris folio, alato semine, floribus odoratis luteis. *Pluk. alm.* 359. *t.* 112. *f.* 5.
Habitat in Virginia.
Folia *opposita.* Siliquæ *cordatæ*, *simplices.*

BIGNONIA foliis conjugatis: cirrho brevissimo arcuato tripartito. — *ungvis cati.*
Bignonia americana, capreolis aduncis donata, siliqua longissima. *Tournef. inst.* 164.
Gelseminum indicum hederaceum tetraphyllum, folio subrotundo acuminato. *Sloan. jam.* 90. *hist.* 1. *p.* 208.
Clematis quadrifolia, flore digitalis luteo, claviculis aduncis. *Plum. amer.* 80. *t.* 94.
Clematis myrsinites, amplioribus foliis, americana tetraphyllos. *Pluk. alm.* 109. *t.* 163. *f.* 2.
Habitat in Barbados, Domingo.

BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis; foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, siliquis linearibus. — *æquinoctialis.*
Bignonia bifolia scandens, siliquis latis & longioribus, semine lato. *Plum. spec.* 5. *ic.* 55. *f.* 1.
Habitat in Cayenna.

BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-ovatis, floribus racemosis, pedunculis trifloris. *Jacq. amer.* 25. *hist. t.* 116. — *paniculata.*
Bignonia bifolia scandens, flore violaceo odoro, fructu ovato duro. *Plum. spec.* 5. *ic.* 56. *f.* 1.
Habitat in America *calidiore.*

BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis: foliis cordatis, caule muricato. *Vir. cliff.* 60. *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 289. — *crucigera.*
Bignonia scandens, flore atro flavo minori subtus albicante. *Gron. virg.* 73.
Bignonia scandens bifolia & trifolia, ligno cruce signato. *Plum. ic.* 48. *t.* 58.

Pseudo-Apocynum folliculis maximis obtusis, semi-bus amplissimis alis membranaceis. *Moris. hist.* 672. *s.* 15. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat in Virginia *&* *australiori* America.
Caulis *volubilis*, *scaber*, *transversim dissectus cru* *repraesentat.*

capreolata. 7. BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis: foliolis c-dato-lanceolatis; foliis imis simplicibus. *Vir. cliff.* *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 289.
Bignonia americana capreolis donata, siliqua brevi. T. *Breyn. ic.* 33. *t.* 25. *Duham. arb.* 1. *p.* 104. *t.*
Clematis americana siliquosa tetraphyllos. *Dod. act.*
Clematis tetraphylla americana. *Bocc. sic.* 31. *t.* 15. 31. *Zan. hist.* 74. *t.* 2. *Raj. hist.* 1329.
Habitat in America.

pubescens. 8. BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis: foliolis c-dato ovatis subtus pubescentibus. *Mill. dict. n.* 14.
Habitat in Campechia. ♄
Flores lutei.

triphylla. 9. BIGNONIA foliis ternatis: foliolis ovatis acumi-tis, caule fruticoso erecto. *Mill. dict. n.* 15. †
Habitat in Vera Cruce. ♄
Flores albi.

pentaphylla. 10. BIGNONIA foliis digitatis: foliolis integerrimis ovatis. *Hort. cliff.* 497.
Bignonia arbor pentaphylla, flore roseo, major & minor, siliquis planis. *Plum. spec.* 5. *Catesb. car.* 1. *p.* *t.* 37. *Brown. jam.* 263. *n.* 1.
Nerio affinis arbor siliquosa, folio palmato s. digitat flore albo. *Sloan. jam.* 154. *hist.* 2. *p.* 62. *Raj. dend.* 114.
Guari pariba. *Marcgr. bras.* 108. *t.* 118.
Habitat in Jamaica, Caribaeis, *agris humidioribus*, *ad ripas.* ♄

Leucoxylon 11. BIGNONIA foliis digitatas: foliolis integerrim ovatis acuminatis.
Bignonia foliis imis digitatis, superioribus simplicib s. ternatis, caule erecto arboreo. *Mill. dict. n.* 1
Leucoxylon arbor siliquosa, quinis foliis, floribus rii, alato semine. *Pluk. alm.* 215. *t.* 200. *f.* 4.
Habitat in America. ♄

12. BI-

BIGNONIA foliis digitatis: foliolis pinnatifidis. **radiata.**
Bignonia flore luteo, foliis radiatis & elegantissime dissectis. *Few. peruv.* 1. *p.* 731. *t.* 22. *Roy. lugdb.* 289.
Habitat in Peru.

BIGNONIA foliis pinnatis: foliolis incisis, caule geniculis radicatis. *Hort. cliff.* 217. *Hort. upf.* 178. *Gron. virg.* 73. *Mill. ic.* 43. *t.* 65. **radicans.**
Pseudo-Gelseminum siliquosum. *Riv. mon.* 101.
Pseudo-Apocinum hederaceum americanum, tubuloso flore phoeniceo, fraxini folio. *Moris. hist.* 3. *p.* 612. *s.* 15. *t.* 3. *f.* 1.
Gelseminum hederaceum indicum. *Corn. can.* 102. *t.* 103.
Bignonia fraxini foliis, coccineo flore minore. *Catesb. car.* 1. *p.* 65. *t.* 65.
Habitat in America. ♄

BIGNONIA foliis pinnatis: foliolis serratis, caule erecto firmo, floribus racemosis. *Mill. dict. n.* 4. **stans.**
Bignonia fruticosa, foliis pinnatis ovatis, floribus luteis. *Brown. jam.* 264.
Bignonia arbor, flore luteo, fraxini folio. *Plum. spec.* 5. *ic.* 54.
Apocyno affine Gelseminum indicum hederaceum fruticosum minus. *Sloan. jam.* 216. *hist.* 2. *p.* 63.
Habitat in America. ♄

BIGNONIA foliis decompositis, foliolis incisis, geniculis cirrhosis. *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 290. **peruviana.**
Clematis peruana, digitalis flore, folio fraxini. *Pluk. alm.* 108. *t.* 162. *f.* 4?
Habitat in Peru. ♄

BIGNONIA foliis bipinnatis: foliolis integris subcordatis acutis. *Fl. zeyl.* 236. **indica.**
Arbor siliquosa malabarica, cordato folio, fructu maximo oblongo plano. *Raj. hist.* 1741.
Palega pajanelli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 77. *t.* 43.
Arbor siliquosa malabarica, folio majore mucronato, fructu maximo oblongo plano. *Raj. hist.* 1741.
...elli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 79. *t.* 45.
...*tat in* India.

rulea. 17. BIGNONIA foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis integris.

Arbor guajaci latiore folio, bignoniæ flore cæruleo, fructu duro in duas partes dissiliente, seminibus alatis imbricatim positis. *Catesb. car.* 1. *p.* 42. *t.* 42.

Habitat in Carolina. ♄

CITHAREXYLON.

acreum. 1. CITHAREXYLON ramis teretibus, calycibus dentatis.

Citharexylon fruticosum, cortice cinereo, foliis oblongo-ovatis oppositis, petiolis marginatis pedatis, floribus spicatis. *Brown. jam.* 264.

Citharexylon arbor laurifolia americana, foliorum venis late candicantibus. *Pluk. alm.* 108. *t.* 162. *f.* 1.

Jasminum arborescens racemosum foliis lauri. *Plum. ic.* 157. *f.* 1.

Habitat in America *meridionali.* ♄

undatum. 2. CITHAREXYLON ramis teretibus, calycibus truncatis.

Citharexylon fruticosum, foliis subellipticis, petiolis pedatis, calycibus truncatis, spicis terminalibus longioribus. *Brown. jam.* 265. *t.* 28. *f.* 2.

Habitat in Jamaica. ♄

Folia obovata sunt.

HALLERIA.

lucida. 1. HALLERIA. *Hort. cliff.* 323.

Halleria foliis ovatis longitudinaliter serratis. *Roy. lugdb.* 289.

Lonicera foliis lucidis acuminatis dentatis, fructu rotundo. *Burm. afr.* 244. *t.* 89. *f.* 3.

Solanum flore periclymeni. *Amm. herb.* 591.

β. Halleria foliis lanceolato-ovatis superne serratis. *Roy. lugdb.* 289.

Lonicera folio acuto serrato, flore pendulo, fructu oblongo. *Burm. afr.* 243. *t.* 89. *f.* 1.

Habitat in Æthiopia.

CRESCENTIA.

Cujete 1. CRESCENTIA. *Læfl. it.* 225. *Jacq. hist. t.* 111.

Crescentia foliis lanceolatis utrinque attenuatis. *Hort. cliff.* 327. *Mill. dict. n.* 1.

Cujete foliis oblongis & angustis, magno fructu ovato. *Plum. gen.* 23. *ic.* 109.
Arbor americana cucurbitifera, folio longo mucronato, fructu oblongo. *Comm. hort.* 1. *p.* 137. *t.* 71.
Cujete angustifolia, fructu minori globoso aut ovato. *Plum. gen.* 23.
Cujete minima, fructu duro. *Plum. gen.* 23.
Crescentia foliis oblongo-ovatis, fructu rotundo, cortice fragili. *Mill. dict. n.* 2.
Cujete latifolia, fructu putamine fragili. *Plum. gen.* 23. *ic.* 109.
Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali. *Pluk. alm.* 124. *t.* 171. *f.* 2.
Arbor cucurbitifera americana, folio subrotundo. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. *p.* 172. *Raj. hist.* 1667.
Habitat in Virginiæ, Jamaicæ, Brasiliæ *apricis.* ♄
Species una an plures distinctæ α-δ inquirant autoptæ, mihi α sola visa est.

GMELINA.

GMELINA. *Fl. zeyl.* 230. * asiatica.
Michelia spinosa, floribus luteis. *Amm. act. petrop.* 8. *p.* 218. *t.* 18.
Lycium maderaspatanum indici alpino putati æmulum, foliis minoribus & majoribus bijugis & grandioribus, aculeis horridum. *Pluk. alm.* 234. *t.* 305. *f.* 3. & *t.* 97. *f.* 2.
Habitat in India. ♄

PETREA.

PETREA. *Hort. cliff.* 319. * *Mill. dict. Jacq. hist. t.* 114. volubilis.
Habitat in America. ♄
Obiit egregius Petreus 1742. *ætatis* 32. *variolis correptus, longiori vita dignissimus, utpote qui Floræ indicæ domicilia exstruxit in Europa omnium splendidissima.*
Capsula obovata, bilocularis, apice plano, recondita in tubo calycis. Semina solitaria.

LANTANA.

LANTANA foliis ternis, caule inermi, spicis oblongis imbricatis. trifolia.
Camara trifolia, purpurascente flore. *Plum. gen.* 32. *ic.* 70.

Myrobatindum ſpicatum, viburni foliis ex adv
nis. *Vaill. act.* 1722. *p.* 277.
Habitat in America *calidiore.*
An ſequentis ſola varietas.

annua. 2. LANTANA foliis oppoſitis, caule inermi, ſp
longis. *Hort. upſ.* 180.
Periclymenum rectum humilius, ſalviæ folio ru
flore purpureo, fructu oblongo eſculento pu
Sloan. jam. 164. *hiſt.* 2. *p.* 82. *t.* 195. *Raj. de*
Habitat in America *calidiore* ☉

involucrata. 3. LANTANA foliis oppoſitis, caule inermi,
capitato-umbellatis involucrato folioſis. *Am*
4. *p.* 319.
Camara arboreſcens, ſalviæ folio. *Plum. gen.*
71. *f.* 2.
Viburnum americanum odoratum, folio parvo
lato, floribus & baccis folio interceptis. *Pl*
386. *t.* 114. *f.* 5. *Herm. parad.* 384.
Habitat in America *meridionali.* ♄

Camara. 4. LANTANA foliis oppoſitis, caule inermi ram
ribus capitato-umbellatis aphyllis.
Lantana foliis oppoſitis petiolatis, floribus ca
Hort. cliff. 349. *Roy. lugdb.* 290.
Camara alia, flore variegato, non ſpinoſa. *Plum*
32. *ic.* 71. *f.* 1.
Viburnum americanum non ſpinoſum, meliſſæ
floribus coccineis. *Pluk. alm.* 385. *t.* 114. *f.*
Viburnum americanum, urticæ foliis, lamii odor
ribus miniatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 151. *t.* 78.
β. Periclymenum rectum, urticæ folio hirſuto m
flore flavo. *Sloan. jam.* 163.
Habitat in America *calidiore.* ♄

aculeata. 5. LANTANA foliis oppoſitis, caule aculeato ra
floribus capitato-umbellatis.
Lantana foliis oppoſitis petiolatis, caule acu
Hort. cliff. 498. *Hort. upſ.* 380. *Roy. lugdb.*
Myrobatindum viburnifolium ſpinoſum, floribus
neis. *Vaill. act.* 1722. *p.* 276.
Viburnum americanum odoratum, urticæ foliis
ribus, ſpinoſum, floribus miniatis. *Pluk. alm*
t. 233. *f.* 5.
Habitat in America *calidiore.* ♄

6. L

LANTANA? foliis oppositis sessilibus, floribus racemosis. salvifolia

Frutex africanus, foliis conjugatis salviæ angustis, floribus hirsutis. *Herm. afr.* 10.

Habitat in Æthiopia. ♄

Fructum non vidi, ideoque de genere dubius.

LANTANA? foliis alternis sessilibus, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 320. *Roy. lugdb.* 290. africana.

Lantana floribus solitariis. *Gen. plant.* 632.

Jasminum africanum, ilicis folio, flore solitario ex alis foliorum proveniente. *Comm. rar.* 6. *t.* 6.

Habitat in Æthiopia. ♄

Genus etiamnum, ignoto fructu, dubium est.

CORNUTIA.

CORNUTIA. *Hort. cliff.* 319. pyramidata

Cornutia flore pyramidato, foliis incanis. *Plum. gen.* 32. *ic.* 106. *f.* 1.

Agnanthus viburni folio. *Vaill. act.* 1722. *p.* 273.

Habitat in Caribæis, Campechia. ♄

LOESELIA.

LOESELIA. *Roy. lugdb.* 299. ciliata.

Royena foliis acute dentatis & veluti spinosis, flore luteo. *Houst. mss.*

Habitat in Vera Cruce.

CAPRARIA.

CAPRARIA foliis alternis, floribus geminis. *Jacq. list. t.* 115. biflora.

Capraria foliis alternis, corollis quinquefidis. *Hort. cliff.* 320. *Roy. lugdb.* 301. *Brown. jam.* 268.

Capraria curassavica. *Herm. parad.* 110. *t.* 110.

Gratiolæ affinis frutescens americana, foliis agerati s. veronicæ erectæ majoris. *Comm. hort.* 1. *p.* 79. *t.* 40.

Lysimachiæ peruvianæ affinis americana procumbens, ononidis vernæ frutescentis folio singulari glabro. *Pluk. alm.* 237. *t.* 98. *f.* 4.

Habitat in Curassao; *in* Græcia *Wheler.* ♄

Conferatur Capraria *peruviana, agerati Foliis absque pediculis. Fewill. per.* 1. *p.* 764. *t.* 48.

2. CA-

urantifolia. 2. CAPRARIA foliis ternis dentatis, floribus solita[...] ramis alternis. *Amœn. acad.* 5. *p.* 399. *
Phælypea erecta, foliis sessilibus angustis auritis [...] apicem serratis oppositis s. verticillatis, floribus [...]gularibus alaribus. *Brown. jam.* 269.
Veronica caule hexangulari, foliis saturejæ ternis [...]ratis. *Sloan. jam.* 81. *hist.* 1. *p.* 196. *t.* 124. *f.*[...]
Habitat in Jamaicæ *inundatis.*

gratioloides. 3. CAPRARIA foliis oppositis ovalibus glabris, pedunculis solitariis folio longioribus.
Gratiola floribus pedunculatis, foliis ovatis cren[...] *Gron. virg.* 129.
Ruellia pedunculis solitariis unifloris longitudine fo[...]rum. *Gron. virg.* 73. *
Habitat in Virginiæ *aquosis.*

SELAGO.

corymbosa. 1. SELAGO corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus fasciculatis.
Selago caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 3[...] *Roy. lugdb.* 300.
Camphorata africana umbellata frutescens. *Comm. hort.* 2. *p.* 79. *t.* 40. *Raj. suppl.* 130.
Millefolio affinis maderaspatana, camphoratæ foliis [...]diatim nascentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 39. *Raj. suppl.* 2[...]
Habitat in Æthiopia. ♃

[...]rastra, 2. SELAGO spicis corymbósis hirsutis, foliis verticillatis linearibus.
Valeriana africana fruticans, foliis longis & angustissimis. *Comm. hort.* 2. *p.* 219. *t.* 110.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Frutex *ramis alternis, strictis, basibus foliorum elevatis scaber.* Folia *confertim verticillata, sena, linearia, acuta, glabra.* Spicæ *oblongæ, terminales, sessiles, imbricatæ:* Bracteis *longitudine florum.* Glum[...] *bivalves, sessiles, compressæ, acutæ, unifloræ.* Per[...]anthium *cartilagineum, brevissimum, ore quinquedentato, cum semine deciduum, glaberrimum ut vix teneatur.* Corollæ. *Tubus filiformis; Limbus laciniis [...] subæqualibus, linearibus, hirsutis.* Stamina 4, *filiformia, subæqualia, longitudine corollæ: Antheris incumbentibus.* Stylus *filiformis.* Stigma *simplex.*

3. SE-

rapunculoides.

SELAGO spicis corymbosis, foliis dentatis. *Amœn. acad.* 4. p. 319. & 6. *afr.* 20.*
Rapunculus foliis angustissimis dentatis, floribus umbellatis. *Burm. afr.* 113. *t.* 42. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. *Burmannus.* ♃

coccinea.

SELAGO spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus integerrimis; superioribus lanceolato-subulatis subdentatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 21. *
Habitat ad Cap. b. Spei.

spuria.

SELAGO spicis corymbosis, foliis linearibus denticulatis.
Melampyrum africanum spicatum, foliis angustissimis. *Burm. afric.* 115. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄
Caulis *suffrutex.* Folia *linearia, alterna, conferta.* Spica *ovato-oblonga, obtusa, arctæ imbricata*; bracteis *oblongis, membranaceis.* Corollæ *quinquefidæ, violaceæ: tubo filiformi longo.* Stamina *didyma: duobus eminentibus.* Stylus *capitatus.* Capsula *bivalvis.*

Lychnidea.

SELAGO spica terminali, foliis subpetiolatis lanceolatis obtusiusculis serratis subtomentosis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 19. *
Lychnidea villosa, foliis oblongis dentatis, floribus spicatis. *Burm. afr.* 13. *t.* 49. *f.* 4.
Habitat ad Cap. b. Spei.

tomentosa.

SELAGO racemis ramosis, foliis obovatis crenatis tomentosis, caule prostrato. *Amœn. acad.* 6. *afric.* 22. *
Planta. *Pluk. phyt.* 319. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b Spei. ☉ *David. Royen* & *J. Burmannus.*

dubia.

SELAGO? racemo simplici, foliis linearibus alternis, floribus diandris.
Thymelæa foliis angustissimis linearibus, flosculis spicatis. *Burm. afr.* 130. *t.* 47. *f.* 3.
Thymelæa æthiopica spicata glabra foliis longioribus angustis. *Pluk. mant.* 180. *t.* 445. *f.* 6.
Erianoides parva, foliis in caule raris, spica in summo caule oblonga ex foliolis & flosculis confertis composita. *Raj. suppl.* 245.

Vale-

Valeriana africana fruticans, foliis ericæ. *Comm.* 2. *p.* 221. *t.* 111?

Habitat in Æthiopia. ♄

Caulis *erectus*, *ramosus.* Folia *conferta*, *linearia* cemi *simplices*, *terminales*, *longissimi*, *erecti.* rollæ *tubus filiformis*, *longissimus*, *limbo* spa *parvo*, *obtuso.* Germen *ovatum.* Stigma *sim* Stamina *modo* 2 *intra tubum corollæ: antheri* *cumbentibus*, *linearibus.* Fructus *ignotus; hinc* *dubium.*

HEBENSTRETIA.

dentata. 1. HEBENSTRETIA foliis dentatis. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 300.

Valerianella africana, foliis angustis, flore macul bicante notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 247. *t.* 109.

Valerianoides flore monopetalo, semine unico obl *Raj. suppl.* 245.

Pedicularis foliis angustissimis dentatis, floribus spi *Burm. afric.* 114. *t.* 42. *f.* 2.

Habitat in Æthiopia.

integrifolia. 2. HEBENSTRETIA foliis integerrimis. *Hort.* 497. *Roy. lugdb.* 300.

Habitat in Æthiopia.

ERINUS.

alpinus. 1. ERINUS floribus racemosis.

Erinus. *Sauv. monsp.* 116.

Ageratum serratum alpinum. *Bauh. pin.* 221.

Ageratum purpureum. *Dalech. hist.* 1184.

β. Ageratum minus saxatile, flore albo. *Barr. rar.* 2 1192.

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspelii.

africanus. 2. ERINUS floribus lateralibus sessilibus, foliis lanc latis subdentatis.

Buchnera foliis obtusis serratis. *Hort. cliff.* 501.* *Ro* *lugdb.* 300.

Lychnidea villosa, foliis ex alis floriferis, florum pe lis cordatis. *Burm. afric.* 139. *t.* 50. *f.* 1.

Euphrasia æthiopica, drabæ foliis, summis oris flo iorum altius divisis. *Pluk. mant.* 83. *Raj. suppl.* 4

β. Buchne-

chnera foliis acutis dentatis. *Hort. cliff.* 501. * *Roy. lugdb.* 300.
bitat in Æthiopia.

INUS foliis lanceolato-ovatis ferratis. **peruvianus.**
chnidea veronicæ folio, flore coccineo. *Few. peruv.* .*p.* 25. *f.* 3.
bitat in Peru, Cap. b. Spei.

INUS foliis laciniatis. **laciniatus.**
ychnidea verbena tenuifoliæ folio. *Few. peruv.* 3. *p.* 35. *t.* 25.
bitat in Peru.

BUCHNERA.

CHNERA foliis dentatis oppositis, florum tubo lævi. **americana.**
tusa f. Verbasci species, caule non ramoso, floribus violaceis. *Gron. virg.* 74. *
bitat in Virginia, Canada.

UCHNERA foliis integerrimis alternis, calycibus scabris. **asiatica.**
bitat in Zeylona, China.
alis ramis alternis, habitu Euphrasiæ, obtuse tetragonus. Folia *lineari-lanceolata, scabra, integerrima, alterna, versus basin opposita.* Spicæ *longæ floribus alternis remotis.* Calyces *quinquepartiti, scabri:* Tubus *corollæ filiformis, calyce duplo longior, cervice incurvato, stamina 4 includente;* Lymbus *quinquefidus, purpureus: laciniis 2 superioribus brevissimis reflexis; tribus reliquis obovatis subæqualibus.*

UCHNERA foliis lanceolatis subdentatis, calycibus tomentosis fructu longioribus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 18. **africana.**
ununcularis æthiopica, rutæ caninæ aspero & fragili folio. *Pluk. alm.* 283. *t.* 310. *f.* 3.
bitat in Æthiopia.
illima B. asiaticæ. Calyces *etiam apice lineares, fructu longiores, sed molliores nec scabri.* Flos *albus.* Planta *exsiccata evadit tota nigra.*

BROWALLIA.

WALLIA pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 318. **demissa.**
7. *Hort. upsf.* 179. *
at in America *australi*, Panama. ☉

2. BRO-

elata. 2. BROWALLIA pedunculis unifloris multifloris[que]
Habitat in Peru. ☉
Simillima *B. demissæ, sed* Caulis *duplo major, rig[idus]* *crassitie dimidii digiti, quasi fruticosus;* Rami *[lon]giores longitudine fere ipsius caulis, quod non [in]* *missa.* Folia *floralia huic fere glabra.* Peduncu[li] *uniflori, alii triflori, quinqueflori & ultra.* Co[rol]la *saturate cæruleo-violacea, nec dilute violacea.*
Conf. Browallia foliis lanceolatis petiolatis longis, [cau]le ramoso, radice annua. *Mill. ic.* 68. *quæ. refer[t]* *ge diversam plantam. B. elatam a C. Millero [...]*

LINNÆA.

borealis. 1. LINNÆA floribus geminatis. *Fl. lapp.* 250. *t.* 4. *Hort. cliff.* 320. *Fl. svec.* 522; 562. *t.* 1.* *[Mat.] med.* 517. *Hall. helv.* 608. *Segu. veron.* 1. p. *Sauv. meth.* 137. *Kalm. it.* 2. *p.* 263. *Gort. ingr.*
Serpillifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 346. *t.* 21.
Campanula serpillifolia. *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 35. *upf.* 1720. *p.* 96. *t.* 1. *Oed. dan. t.* 3.
Nummularia norvegica, flore purpureo. *Kyll. act.* 2. *p.* 346. *f.* C.
Habitat in Sueciæ, Sibiriæ, Helvetiæ, Russiæ, Ca[nadæ] *sylvis antiquis, muscosis, acerosis, sterilibus, umbro[sis].*
Sempervirens. Bacca *sicca, trilocularis.* Semina [...] Æstivatio *eadem cum Lonicera.* Florescit *mense [...]* *rescentiæ cum Pæonia flore pleno.*

SIBTHORPIA.

europæa. 1. SIBTHORPIA foliis reniformibus subpeltatis cr[ena]tis.. *Amæn. acad.* 3. *p.* 22. * *Loefl. it.* 150. *
Chrysoplenium cornubiense. *Pet. herb. t.* 6. *f.* 11
Alsine spuria pusilla repens, foliis saxifragiæ aureæ. *[Raj.]* *angl.* 3. *p.* 352. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat in Cornubiæ Devioniæ, Lusitaniæ *udis a[...]* *ribus, ad margines rivulorum.* ♃

africana. 2. SIBTHORPIA foliis orbiculatis integris crenatis, [pe]dunculis solitariis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 22.
Chrysosplenii foliis planta aquatica, flore flavo pe[nta]petalo. *Shaw. afric.* 149. *f.* 149.
Habitat in Africa.

peregrina. 3. SIBTHORPIA foliis reniformibus crenatis, pedu[ncu]lis geminis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 22.

Pla[...]

Planta. *Pluk. phyt.* 257. *f.* 5.
Habitat in Oriente.

LIMOSELLA.

LIMOSELLA. *Fl. lapp.* 249. *Fl. svec.* 521; 565. *Hall. helv.* 629. *Dalib. paris.* 193. — aquatica.
...osella annua. *Lind. als.* 156. *t.* 5.
...ntaginella. *Hall. jen.* 23. *t.* 6. *f.* 2.
...ntaginella palustris. *Bauh. pin.* 190. *Moris. hist.* 3. *p.* 605. *f.* 15. *t.* 2. *f.* 1.
...rgula perpusilla, lanceolatis foliis. *Læs. pruss.* 261. *t.* 81.
...ine palustris repens, foliis lanceolatis. *Pluk. alm.* ... *t.* 74. *f.* 4.
...ine palustris exigua, foliolis lanceolatis. *Mentz. pug.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
...itat in Europæ *septentrionalis inundatis.* ☉. ♃

STEMODIA.

STEMODIA. *Amæn. acad.* 5. *p.* 399.* — maritima.
...modiacra maritima odorata, foliis minoribus sessilibus denticulatis hastatis; floribus solitariis alaribus. *Brown. jam.* 261. *t.* 22. *f.* 2.
...rdium maritimum fruticosum procumbens. *Sloan. ...* 66. *hist.* 1. *p.* 175. *t.* 110. *f.* 2.
...itat in Jamaica.

OBOLARIA.

OBOLARIA. *Hort. cliff.* 323. *Gron. virg.* 74. — virginica.
...anche virginiana, radice coralloide, summo cau... foliis subrotundis. *Moris. hist.* 3. *p.* 504. *f.* 12. *t.* 16. ...3. *Pluk. alm* 273. *t.* 209. *f.* 6. *Raj. suppl.* 595.
...tat in Virginia.

OROBANCHE.

OROBANCHE caule simplicissimo lævi; staminibus ...ertis. — lævis.
...anche caule simplici cæruleo, bracteis brevibus. *...v. monsp.* 4.
...anche majore flore. *Bauh. pin.* 88. *Moris. hist.* 3. *...*, *t.* 16. *f.* 2.
...che magna purpurea monspessulana. *Bauh. hist.* ... 782.
... Monspelii.

major. 2. OROBANCHE caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Læfl. it.* 151. *
Orobanche caule ſimpliciſſimo. *Hort. cliff.* 321. *Fl.* 519. 562. *Roy. lugdb.* 299. *Dalib. pariſ.* 190. *gelr.* 368.
Orobanche caule ſimplici, bracteis longioribus. *monſp.* 5.
Orobanche major garyophyllum olens. *Bauh. pin.*
Orobanche. 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 270.
Rapum geniſtæ. *Lob. ic.* 2. *p.* 89.
Habitat in Europæ *agris, pratis ſiccis, paraſitica primis radicum Diadelphiæ. Michel monograph. Orobanche.*

cernua. 3. OROBANCHE caule ſimpliciſſimo, corollis recurvatis, bracteis ovatis corolla brevioribus. *Læfl.* 152. *
Habitat in Hiſpania.

ramoſa. 4. OROBANCHE caule ramoſo, corollis quinquefi
Orobanche caule ramoſo. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lu* 299. *Hall. helv.* 610. *Dalib. pariſ.* 191. *Gort.* 369. *Oſb. it.* 58.
Orobanche ramoſa. *Bauh. pin.* 88.
Orobanche. *Cam. epit.* 311.
Habitat in Europæ *ſiccis.*

virginiana. 5. OROBANCHE caule ramoſo, corollis quadridentatis.
Orobanche caule ramoſo, floribus diſtantibus. *G virg.* 168.
Orobanche minor virginiana lignoſior, per totum caulem floribus minoribus onuſta. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 9. *Raj. ſuppl.* 595.
Habitat in Virginia.

uniflora. 6. OROBANCHE caule unifloro, calyce nudo.
Orobanche aut Helleborine affinis marilandica, caule nudo, unico in ſummitate flore. *Raj. ſuppl.*
Dentariæ ſ. Anblato cordi affinis, flore pallide cæru *Gron. virg.* 70.
Gentiana minor aurea, flore ſimplici amplo defl pallide flaveſcente. *Pluk. mant.* 89. *t.* 348. *f.* 3.
Aphyllon. *Mitch.* 25.
Habitat in Virginia.

7. ORO

OROBANCHE caule unifloro, flore subspathaceo. Ægineti
Æginetia. *Sp. pl.* 1. *p.* 632.
Tsjem-Cumulu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 97. *t.* 47.
Habitat in Malabaria.
Folia *nulla.* Caules *simplicissimi, stricti, teretes lineis tribus, uniflori.* Spatha *obvestit florem.*

DODARTIA.

DODARTIA foliis linearibus integerrimis glabris. orientalis.
Mill. dict. t. 27.
Dodartia. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 297.
Dodartia orientalis, flore purpurascente. *Tournef. cor.* 47. *itin.* 3. *p.* 208. *t.* 208.
Habitat in monte Ararat, Tataria. ♃

DODARTIA foliis ovatis serratis villosis. indica.
Habitat in India.
Caules *teretiusculi, villosi, subramosi.* Folia *ovata, petiolata, obtuse serrata, villosa, pollicis extimo latiora.* Racemus *terminalis Foliis minoribus.* Flores *oppositi, secundi, subsessiles.* Calyx *obtusus, villosus.* Corolla *flava, labio exteriore recto brevi.*

LIPPIA.

LIPPIA capitulis pyramidatis. americana
Habitat in Vera Cruce. ♄
Frutex Caulibus *teretibus, pallidis, ad genicula compressis.* Folia *lanceolato-ovata, extra medium serrata, petiolata, scabra, opposita.* Pedunculi *axillares, oppositi, brevissimi, capitati.* Capitula *retrorsum imbricata squamis innumeris, tetragona, ovata, magnitudine pisi, flosculo inter singulam squamam.*

LIPPIA capitulis hemisphæricis. *Jacq. amer.* 25. † hemisphærica.
Habitat in America *meridionali.* ♄

SESAMUM.

SESAMUM foliis ovato-oblongis integris. *Hort.* orientale.
cliff. 318. *Fl. zeyl.* 318.
Sesamum pedunculo inter duas glandulas. *Vir. cliff.* 60. *Roy. lugdb.* 292. *Gron. orient.* 76.
...mum veterum. *Bauh. pin.* 27.
...talis orientalis Sesamum dicta. *T. Burm. zeyl.* 87. 38. *f.* 1.

Schit elu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 105. *t.* 54.
Habitat in Zeylona, Malabaria. ⊙
Caulis *erectus, teres, pilosus: Ramis paucis, inferne* [illegible] *loccatis.* Folia *opposita, petiolata, oblongo-ovata, integerrima, venosa, pilis parvis adspersa.* Flores *axillares, solitarii.* Pedunculo *brevissimo, ad cujus basin* Bracteæ *duæ, lineares, breves & intra singulas* Glandula *lutea, perforata.* Calyx 5 *partitus, dehiscens, subæqualis.* Corolla *Digitalis, alba, obsolete 5loba, obtusa: infima productiore rotundata:* Stamina 4, *duobus superioribus; inter quæ filamenti quinti rudimentum castratum.*

indicum. 2. SESAMUM foliis inferioribus trifidis. *Roy. lugdb.* 292.
Sesamum indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 204. *t.* 76. *f.* 1.
Sesamum alterum, foliis trifidis, orientale, semine obscuro. *Pluk. alm.* 344. *t.* 109. *f.* 4.
Habitat in India. ⊙

MIMULUS.

ringens. 1. MIMULUS erectus, foliis oblongis linearibus sessilibus. *Hort. upf.* 176. *t.* 2. * *Act. upf.* 1741. *p.* 82.
Euphrasia floridana, lysimachiæ glabræ siliquosæ foliis quadrato caule, ramosior. *Pluk. amalth.* 83. *t.* 393. *f.* 3.
Lysimachia galericulata f. Gratiola elatior non ramosa. *Gron. Virg.* 69.
Gratiola canadensis latifolia, flore magno cæruleo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 265.
Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. *Morif. hist.* 2. *p.* 479. *f.* 5. *t.* 8. *f.* 6. *Raj. hist.* 769.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

luteus. 2. MIMULUS repens, foliis ovatis. †
Gratiola foliis subrotundis nervosis, floribus luteis. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 745. *t.* 34.
Habitat in Peru.

RUELLIA.

blechum. 1. RUELLIA foliis ovatis integerrimis, spicis ovatis bracteis interioribus geminis, floribus binis sessilibus. *Amœn. acad.* 5. *p.* 400. *
Barleria pyramidata, flore cæruleo. *Plum. gen.* 31. *ic.* 42. *f.* 3.

Blechum

Blechum foliis oblongo ovatis, spicis crassis foliatis conico-quadratis subhirsutis. *Brown. jam.* 261.
Brunella elatior, flore albo. *Sloan. jam.* 65. *hist.* 1. *p.* 173. *t.* 109. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ♃
Caules *prostrati, dichotomi, læves, subtetragoni.* Folia *opposita, ovata, vix pubescentia, integerrima denticulis obsoletis.* Petioli *ciliati.* Spicæ *laxæ, tetragonæ, constructæ ex foliis floralibus cordatis: intra singula* Bracteæ *binæ, lanceolatæ, breves; intra has* Flores 2, *sessiles: altero extra alterum.*

RUELLIA foliis petiolatis, floribus verticillatis sub sessilibus. *Hort. upf.* 178. — strepens.
Ruellia foliis petiolatis, fructu sessili conferto. *Hort. cliff.* 318. *Gron. virg.* 73. *Roy. lugdb.* 291.
Ruellia strepens, capitulis comosis. *Dill. elth.* 300. *t.* 249 *f.* 321.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃

RUELLIA foliis petiolatis, pedunculis longis subdivisis nudis. *Hort. upf.* 179. * — clandestina
Ruellia foliis sessilibus, pedunculis trifloris. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 291.
Ruellia capsulis teretibus. *Dill. elth.* 328. *t.* 248. *f.* 320.
Habitat in Barbados.

RUELLIA foliis integerrimis pedunculis dichotomis lateralibus calycibus sessilibus: lacinia suprema majore. — paniculata
Ruellia pedunculis multifloris dichotomis folio longioribus. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 292.
Speculum veneris majus impatiens. *Sloan. jam.* 59. *hist.* 1. *p.* 158. *t.* 100. *f.* 2. *Raj. suppl.* 389.
Habitat in Jamaica. ♃
Planta *tripedalis:* Ramis *erectis, nec patulis.* Folia *scabriuscula; caulina, quæ decidunt dum floret, majora: rameis relinquunt basin petioli truncatam spinescentem.* Pedunculi *oppositi, dichotomi, longitudine petiolorum.* Bracteæ *lanceolatæ longitudine pedunculorum.* Corollæ *purpurascentes, non campanulatæ, sed bilabiatæ:* Labio *superiore bifido; inferiore trifido æquali.*

RUELLIA foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. — tuberosa.
Ruellia capsulis angulosis. *Dill. elth.* 328.

Ruellia humilis, flore cæruleo, aſphodeli radice. *Plum. gen.* 12.

Gentianella flore cæruleo, integro vaſculo ſeminali ex humidi contactu impatiente. *Sloan. jam.* 52. *hiſt.* 1. *p.* 149. *t.* 95. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 370.

Habitat in Jamaica. ♃

maculata. 6. RUELLIA foliis obovatis verticillis obvallatis ſpinis inermibus bifurcatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 320.

Planta *Pluk. phyt.* 279. *f.* 7.

Habitat in India.

biflora. 7. RUELLIA floribus geminis ſeſſilibus.

Ruellia minore folio, floribus gemellis. *Dill. elth.* 33.

Habitat in Carolina.

criſpa. 8. RUELLIA foliis ſubcrenatis lanceolato-ovatis, capitulis ovatis folioſis hiſpidis. *Oſb. it.* 240.

Adhatoda luzanenſis, ſpica plana. *Pet. gaz. t.* 73. *f.* 6.

Habitat in India. *Osbeck.* ♃

Radix *lignoſa, repens.* Caules *digitales, ſimpliciſſimi, articulati, teretiuſculi.* Folia *lanceolato-ovata, ſub petiolata, pilis adſperſa, margine reflexo undulato criſpa ſ. crenata.* Capitula *ad genicula, lateralia, ſolitaria, ovata, imbricata Foliis ovatis, acuminatis, piloſo-ſcabris, intra quæ flores Calyce 5-partito hirſuto lineari.* Corolla *flava.* Stamina 4.

repanda. 9. RUELLIA foliis lanceolatis obtuſe dentatis petiolatis, caule repente.

Prunella molucca. *Rumph. amb.* 6. *p.* 30. *t.* 13. *f.* B.

Habitat in Java.

Herba *repens.* Caules *herbacei, filiformes, articulati, læves.* Folia *oppoſita, petiolata, lanceolata, obtuſa, glabra, obtuſe inæqualiter dentata.* Spicæ *axillares, pedunculatæ:* Floribus *oppoſitis;* Bracteis *linearibus brevioribus;* Calycibus *ariſtato-piloſis.*

ringens. 10. RUELLIA foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis ſeſſilibus, caule procumbente. *Fl. zeyl.* 234. *Oſb. it.* 229.

Upudali. *Rheed. mal.* 10. *p.* 125. *t.* 64.

Habitat in India.

antipoda. 11. RUELLIA foliis mucronato-ſerratis, caule repente, floribus ſubſpicatis terminalibus quinis ternisve. *Fl. zeyl.* 235. *

Gen-

Gentianella utriusque Indiæ impatiens, foliis agerati Snopgrafs barbadenſibus. *Pluk. mant.* 167. *t.* 186. *f.* 2.
Crusta ollæ. *Rumph. amb.* 5. *p.* 460. *t.* 170. *f.* 2.
Peetjanga-pulpani. *Rheed. mal.* 9. *p.* 115. *t.* 59.
Habitat in Indiis. ☉

BARLERIA.

BARLERIA ſpinis verticillorum ſenis, foliis enſiformibus longiſſimis ſcabris. *Amœn. acad.* 4. *p.* 320. * — longifolia
Anchuſa anguſtifolia, verticillis longis aculeis armatis. *Pluk. alm.* 30. *t.* 133. *f.* 4.
Habitat in India.

BARLERIA ſpinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. — solanifolia.
Barleria aculeata, ſolani folio anguſtiore, flore cæruleo. *Plum. gen.* 31 *ic.* 43. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali.*

BARLERIA ſpinis axillaribus quaternis, foliis integerrimis. — Prionitis.
Barleria foliis integerrimis, ſpinis lateralibus. *Roy. lugdb.* 231. *Fl. zeyl.* 231. *
Prionitis. *Hort. cliff.* 486.
Lycium indicum, ſpinis quaternis ad foliorum ſingulorum exortum. *Seb. theſ.* 1. *p.* 21. *t.* 13. *f.* 1.
Melampyro cognata maderaſpatana, ſpinis horrida. *Pluk. alm.* 243. *t.* 119. *f.* 5.
Hyſtrix frutex. *Rumph. amb.* 7. *p.* 22. *t.* 13.
Coletta-Veetla. *Rheed. mal.* 9. *p.* 77. *t.* 41.
Habitat in India. ♃

BARLERIA ſpinis axillaribus oppoſitis ſolitariis, foliis ſubrotundis integerrimis. — buxifolia.
Barleria americana ſpinoſiſſima fruteſcens, buxi folio parvo. *Amm. herb.* 104.
Caraſchulli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 91. *t.* 47.
Habitat in Indiis.

BARLERIA foliis oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobusque linearibus acutis. *Oſb. it.* 225. *t.* 8. — cristata.
Melampyro cognata maderaſpatenſis, quam ipſe habuit. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 429. *ſ.* 11. *t.* 23 *f.* 7.
Habitat in India. ♄

Caulis *teres.* Folia *oblongo-ovata, utrinque acuta, gerrima.* Flores *axillares, sessiles.* Calyx *quad titus foliolis 2 ovatis, acuminatis serrato-spino alternis brevioribus, linearibus, acutis, integerr patentibus.* Corolla *cærulea, monopetala, erecta fundibuliformis, patens, quinquefida: lobis subæqualibus: quinto profundius diviso.* Stam. *menta 4, quorum 2 tubo corollæ longiora, filifor* Antheris *oblongis; 2 brevissima in fundo corollæ: theris emarcidis.* Pistilli *Germen ovatum.* Stylus *formis, longitudine majorum staminum* Stigm *tusum.* Capsula *longitudine calycis, compressa, a bilocularis, bivalvis; valvulis cymbiformibus di mento longitudinali, margine altero spina elastica.* mina *in singulo loculo 2, compressa.*

coccinea. 6. BARLERIA inermis, foliis ovatis denticulatis p latis

Barleria solani folio, flore coccineo. *Plum. gen ic.* 43. *f.* 1.

Habitat in America *meridionali.*

DURANTA.

plumieri. 1. DURANTA calycibus frutescentibus cont *Jacq. amer.* 26.

Duranta spinosa. *Sp. pl.* 1. *p.* 637.

Castorea repens spinosa. *Plum. gen.* 30.

β. Duranta inermis. *Sp. pl.* 1. *p.* 637.

Castorea racemosa, flore cæruleo, fructu cr *Plum. gen.* 30. *ic.* 79.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Ellisia. 2. DURANTA calycibus frutescentibus erectis. *amer.* 26.

Ellisia acuta. *Amæn. acad.* 5. *p.* 400.* *Læfl. it.* 19

Ellisia frutescens quandoque spinosa, foliis ovatis que acutis ad apicem serratis, spicis alaribus. *B jam.* 262. *t.* 29. *f.* 1.

Habitat in Jamaica. ♄

OVIEDA.

spinosa. 1. OVIEDA foliis ovalibus dentatis.

Valdia cardui folio, fructu subcæruleo. *Plum. g ic.* 256.

H

Habitat in America *meridionali.* ♄
Folia opposita, petiolata, oblonga, dentata. Flores *corymbosi.*

OVIEDA foliis lanceolatis subrepandis. mitis.
Habitat in Java. ♄
Frutex. Folia *opposita, petiolata, lanceolata, subrepanda, glabra.* Corymbi *dichotomi.*

VOLKAMERIA.

VOLKAMERIA spinis petiolorum rudimentis. *Jacq. hist. t.* 117. aculeata.
Clerodendrum fruticosum spinosum, foliis inferioribus confertis; superioribus oppositis, pedunculis tripartitis trifloris alaribus. *Brown. jam.* 262. *t.* 20. *f.* 2.
Ligustroides. *Hort. cliff.* 489.
Duglassia spinosa, ligustri folio. *Amm. herb.* 576.
Ligustrum aculeatum, fructu testiculato. *Plum. spec.* 17. *ic.* 164. *f.* 1.
Paliuro affinis ligustrifolia spinosa, flore monopetalo difformi. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. *p.* 137. *t.* 166. *f.* 2. 3. *Raj. dendr.* 95. *Pluk. phyt.* 352. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, Barbados. ♄

VOLKAMERIA ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 231. * inermis.
Jasminum litoreum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 86. *t.* 46.
Periclymeni similis myrtifolia arbor maderaspatensis. *Pluk. alm.* 287. *t.* 211. *f.* 4. *mala.*
Habitat in India. ♃

CLERODENDRUM.

CLERODENDRUM foliis simplicibus cordatis tomentosis. *Fl. zeyl.* 232. * infortunatum.
Peragu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 41. *t.* 25. *Raj. hist.* 1571.
Clerodendrum folio lato & acuminato. *Burm. zeyl.* 66. *t.* 29.
Habitat in India. ♄

CLERODENDRUM foliis simplicibus lanceolatis integerrimis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 320. * *Osb. it.* 228. 11. fortunatum.
Habitat in India. ♄

VITEX.

Agnus Castus. 1. VITEX foliis digitatis serratis, spicis verticill
Vitex. *Cam. epit.* 105. *Hort. cliff.* 327. *Roy. lugdb.*
Gron. virg. 169. *Mat. med.* 319. *Gron. orient.*
Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispo
Bauh. pin. 475.
β. Vitex latiore folio. *Bauh. pin.* 475.
Vitex folio serrato. *Bauh. hist.* 1. *p.* 205.
Habitat in Siciliæ & Neapolis *paludosis.* ♄

trifolia. 2. VITEX foliis ternatis quinatisque integerrimis,
culis dichotomis.
Vitex trifolia minor indica. *Pluk. alm.* 390. *t.* 2
5. *Fl. zeyl.* 413.
Piperi similis, fructus striatus, femina. *Bauh. pin*
Logondium vulgare. *Rumph. amb.* 4. *p.* 48. *t.* 18.
Caranosi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 13. *t.* 10. *Raj. hist.* 15
Habitat in India.
Foliola *ovata, acuta, integerrima, subtus tomento*

Negundo. 3. VITEX foliis quinatis ternatisque serratis, flo
racemoso-paniculatis. *Osb. it.* 92.
Vitex trifolia minor indica serrata. *Pluk. alm.* 39
zeyl. 414.
Negundo arbor mas. *Bauh. hist.* 1. *p.* 189.
Logondium litoreum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 50. *t.*
Bemnosi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 15. *t.* 11. *Raj. hist.* 157
Habitat in India. ♄
Foliola 3. *s.* 5, *ovato-lanceolata, sinuato-serrata,*
nuda venosa.

pinnata. 4. VITEX foliis pinnatis integerrimis, paniculis t
tomis.
Pistacio-vitex. *Fl. zeyl.* 415.*
Habitat in Zeylona. ♄

BONTIA.

daphnoides. 1. BONTIA.
Bontia arborescens, thymelææ facie. *Plum. gen.*
Bontia laureolæ facie. *Dill. elth.* 57. t. 49. *f.* 57.
Olea sylvestris barbadensis, folio angusto pingu
ter crenato. *Pluk. alm.* 269. *t.* 209. *f.* 3. *Raj. den*
Habitat in Antillis. ♄

1. AVICI

AVICENNIA.

ICENNIA foliis utrinque nitidis. *Jacq. americ.* nitida.
t. 112. *f.* 1.

ICENNIA foliis fubtus tomentofis. *Jacq. americ.* germinans.
t. 112. *f.* 2.

ennia. *Fl. Zeyl.* 57. *Mat. med.* 42. *Sp. pl.* 1. *p.* 110.
a foliis integris oblongis oppofitis, petiolis craf-
brevisfimis fubamplexantibus, floribus racemofis.
wn. *jam.* 263.
le laurocerafi foliis, flore albo tetrapetalo. *Sloan.*
156. *hift.* 2. *p.* 66. *Raj. dendr.* 115.
ridium. *Bauh. pin.* 511.
a. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
at in Indiis. ♄
hanc fpeciem ex fententia D. Jacquini autoptæ.

COLUMNEA.

UMNEA scandens.
mnea fcandens, phœniçeo flore, fructu albo. *Plum.*
28. *ic.* 89. *f.* 1.
enes major herbacea hirfuta oblique affurgens,
is ovatis crenatis oppofitis: alternis minoribus,
ibus geminatis ad alas alternas. *Brown. jam.* 270.
nculus fruticofus, foliis oblongis integris villofis
adverfo fitis, flore purpureo villofo. *Sloan. jam.*
hift. 1. *p.* 157. *t.* 100. *f.* 1.
mnea fcandens, flore lutefcente, fructu albo.
n. gen. 28.
at in Martinicæ *fylvis.*
Folia, Corollæ villofa. Folia *ovata, ferrata, petiolata.*

ACANTHUS.

NTHUS foliis finuatis inermibus. *Hort. cliff.* mollis.
Hort. upf. 181. *Mat. med.* 318. *Roy. lugdb.*
Sauv. monfp. 278.
thus fativus f. mollis virgilii. *Bauh. pin.* 383.
nus Acanthus f. Branca urfi. *Bauh. hift.* 3. *p.* 75.
at in Italiæ, Siciliæ *humentibus, duris.* ♃
NTHUS foliis pinnatifidis fpinofis. *Hort. cliff.* fpinofus.
Roy. lugdb. 304.
thus aculeatus. *Bauh. pin.* 383
s fylveftris. *Dod. pempt.* 719.
n Italiæ *humentibus.* ♃ diofcoridis
THUS foliis lanceolatis integerrimis margine
is. *Gron. orient.* 192. † Acan-

Acanthus dioscoridis vel sativus. *Rauv. itin.* *Moris. hist. 3. p. 604. Raj. suppl. 636.*
Habitat in Libano.

ilicifolius. 4. ACANHTUS foliis repandis dentato-spinosis, c fruticoso aculeato. *Osb. it. 92.*
Acanthus malabaricus, agrifolii folio. *Pet. sicc. gaz. t. 94. f. 15.*
Frutex indicus spinosus, foliis agrifolii, siliqua g nata brevi. *Raj. hist. 1766. Pluk. phyt. 261. f. 4*
Carduus aquaticus s. indorum Dilivaria. *Cammell. 6. n. 16.*
Aquifolium indicum. *Rumph. amb. 6. p. 163. t. 7*
Paina schylli. *Rheed. mal. 2. p. 93 t. 48.*
Habitat in Indiæ *cœnosis salsis maritimis.* ♃
Calyx ex foliolis 6 imbricatis, sed corolla præcedenti

maderaspatensis. 5. ACANTHUS foliis quaternis obsolete dentatis mibus, calycibus ciliatis.
Adhatoda maderaspatensis, calyce barbato, folii tus villosis. *Pet. mus. 23.*
Habitat in India.

PEDALIUM.

Murex. 1. PEDALIUM.
Murex. *Fl. zeyl. 440.* *
Hyoscyamus maritimus, fructu tribuli aculeato, nospermos s. dispermos. *Herm. zeyl. 42.*
Kaku-Taly. *Rheed. mal. 10. p. t. 72.*
Habitat in Malabaria, Zeylona. *Dav. Royen.* ⊙
Caulis *simplex.* Folia *opposita, obovata, obtusa,* d *ta, truncata, nuda, petiolis utrinque glandulosis.* res *axillares, solitarii parvi.* Fructus *nutans.*

MELIANTHUS.

major. 1. MELIANTHUS stipulis solitariis petiolo adn *Hort. cliff. 492. Hort. ups. 181. Roy. lugdb. 40*
Melianthus africanus. *Herm. lugdb. 414. t. 415.*
Habitat in Æthiopiæ *succulentis.* ♃

minor. 2. MELIANTHUS stipulis geminis distinctis. *Hort. 492. Roy. lugdb. 402.*
Melianthus africanus minor fœtidus. *Comm. rar. 4.*
Melianthus hysiquanensis minor fœtidus. *Raj. dendr.*
Habitat in Æthiopia. ♃

Ca

Classis XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

MYAGRUM.

MYAGRUM siliculis biarticulatis dispermis, foliis retrorsum sinuatis denticulatis. *Hort. upʃ.* 182. * perenne.
Myagrum foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 329. *Gort. gelr.* 404.
Myagrum monospermum. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. *Mapp. alʃat.* 266. *t.* 266.
Habitat in Germania. ♃

MYAGRUM siliculis sulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-sinuatis. *Hort. upʃ.* 182. * orientale.
Myagrum orientale, folio raphani, capsulis rugosis. *Herm. lugdb.* 2. *p.* 2.
Habitat in Oriente. ☉

MYAGRUM siliculis sulcatis pilosis rugosis, foliis oblongis obtusis dentatis. *Hort. upʃ.* 103. * rugosum.
Habitat in Europa *auʃtrali.* ☉

MYAGRUM siliculis lævibus subtorosis, foliis lyratis. hispanicum.
Myagrum hispanicum minus, raphani folio. *Tournef. inʃt.*
Habitat in Hispania. ♂
Caulis pilis raris reflexis ʃcaber. Racemi *virgati, longi.* Folia *lyrata, dentata, petiolata, oblonga.* Siliculæ *sphæricæ, læves, nec ʃulcatæ rugoʃæ aut ʃtriatæ; con...* *Corpore oblongo, pedicellato, cylindrico, ʃt...i-* *cui Silicula ovata inʃidet collo anguʃtiore: articulo* *inferiore biloculari inani, ʃuperiore monoʃpermo.* Co- *rollæ luteæ.*

MYAGRUM siliculis obcordatis subsessilibus, foliis amplexicaulibus, siliculis obcordatis. *Hort. upʃ.* 182. * perfoliatum
Hort. cliff. 328. *Roy. lugdb.* 330. *Sauv. monʃp.* 77.
Myagrum monospermum latifolium. *Bauh. pin.* 109. *prodr.* 52. *t.* 51. *Moriʃ. hiʃt.* 2. *p.* 267. *ʃ.* 3. *t.* 21. *f. ult.*
Habitat inter Helvetiæ, Galliæ *ʃegetes.* ☉

Siliculæ

Siliculæ *triloculares, sed monospermæ, s. in medio tantum semine fœtæ.*

fativum. 6. MYAGRUM siliculis obovatis pedunculatis pol... mis. *Hort. cliff.* 328. *Fl. suec.* 541; 564. *Roy.* 330. *Dalib. paris.* 193.

Myagrum sylvestre. *Bauh. pin.* 109.

β. Myagrum sativum *Bauh. pin.* 109.

Camelina f. Myagrion. *Dod. pempt.* 532.

γ. Alysson foliis auriculatis glabris profunde de... *Hall. helv.* 537.

Myagrum fœtidum. *Bauh. pin.* 109. *Lind. alsa* *t.* 1.

Habitat in Europa *inter linum.* ⊙

paniculatum. 7. MYAGRUM siliculis lentiformibus orbiculati... ctato-rugosis. *Hort. cliff.* 328. *Fl. svec.* 542; *Roy. lugdb.* 330. *Hall. helv.* 536. *Dalib. paris.*

Myagrum monospermum hirsutum, siliquis rot... *Læs. pruss.* 174. *t.* 56.

Myagro similis siliqua rotunda. *Bauh. pin.* 109. ... 52. *t.* 52.

Habitat in Europa, *juxta agros.* ⊙

faxatile. 8. MYAGRUM siliculis lentiformi-obovatis glab... liis oblongis serratis scabris, caule paniculato. *vind.* 257. *

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis serratis, ... linis linearibus. *Sauv. monsp.* 122.

Cochlearia perennis saxatilis minima. *Magn. hort.*

Alysson alpinum, foliis circa radicem subovatis ... tis in orbem circumactis. *Segu. ver.* 1. *p.* 378.

Thlaspi petræum myagroides. *Pon. bald.* 337. *t.*

Thlaspi 3. saxatile. *Cam. epit.* 338.

Thlaspi saxatile rotundifolium. *Bauh. pin.* 106. *prod.*

Thlaspi alpinum minus, capitulo rotundo. *Bau...* 107. *prodr.* 48. *n.* 6. *Raj. extr.* 297.

Thlaspi alpinum majus. *Bauh. pin.* 106. *n.* 6. cap... rotundis. *Bauh. prodr.* 49. *t.* 49.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Baldi, Carniolæ, ... spelii. ♃

Plantæ *tres nobis allatæ fuere, an specie divers...* *dixero.*

κ. *Foliis Radicalibus spatulatis scabris, obtusiusculis* *tegerrimis; Caulinis lingulatis, læviusculis; Caul...* *plici. Allion.*

β. ...

...lis Radicalibus ut in α; Caulinis lingulatis, sed basi ...ittatis. Caule aliquot racemis. Seguier.
...is Radicalibus lanceolatis, subdentatis, scabris; ...inis lanceolatis, subdentatis, subpetiolatis. Caule ...quot racemis. Seguier.

...AGRUM siliculis angulatis, foliis tripartitis. *Hasselq.* ægyptium.
...tat in Ægypto.
...is *divaricatus Racemis virgatis.* Folia *petiolata, ...artita vel quinquepartita, dentata.* Capsulæ *duobus ...culis tetragonis.* Flores *lutei.* *An potius Bunias?*

VELLA.

...LA foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. annua.
Hort. cliff. 329. *Hort. upf.* 186. *Roy. lugdb.* 331.
...tium sylvestre, erucæ facie. *Bauh. pin.* 105.
...dium sylvestre valentinum. *Clus. hist.* 2. *p.* 130.
...*in* Hispania. ⊙

...LA foliis integris obovatis ciliatis, siliculis erectis. Pseudo-Cytisus.
...o-Cytisus flore leucoji luteo. *Bauh. pin.* 390.
...facie Alysson fruticans quorundam. *Lob. ic.* 2.
...9. *Bauh. hist.* 1. *p.* 374.
...*in* Hispania *circa oppidum* Aranjuez. *D. Mi-...rt.* ♄
...a *frutescens, Foliis integris, sessilibus, hirtis, ob-...e ovatis. Filamentorum paria connata, castrata.*

ANASTATICA.

...TATICA foliis obtusis, spicis axillaribus hierochuntica.
...imis, siliculis ungulatis spinosis.
...ica. *Hort. cliff.* 328. *Hort. upf.* 183. *Roy. lugdb.*
... *Gron. orient.* 78.
... Rosa de Hiericho dictum. *Morif. hist.* 2. *p.* 228.
... *t.* 25. *f.* 2. 3.
...ierochuntea vulgo dicta. *Bauh. pin.* 484.
...ierochuntica. *Com. hort. t.* 41.
... *in litoribus* Maris rubri, *arenosis* Palæstinæ,
...l. ⊙

...TATICA foliis acutis, spicis folio longiori syriaca.
...liculis ovatis rostratis.
...a quæ Myagrum ex summatra. *Gron. orient.* 78.
...icontea sylvestris. *Bauh. pin.* 484.

Rosa

Rosa hierichuntica alia. *Cam. hort. t.* 42.
Habitat in Syriæ *tectis, ruderibus.* ⊙

SUBULARIA.

aquatica. 1. SUBULARIA. *Fl. lapp.* 253. *Fl. svec.* 527; *Gort. ingr.* 101.
Alyssum palustre, folio junci. *Buxb. act.* 2. *p.* 30. 23. *f.* 1.
Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotu[ndis] sepimento siliculam dirimente. *Pluk. alm.* 180. *t.* [...] *f.* 5. *Ced. dan. t.* 35.
Gramen junceum hybernum, thlaspeos capitulis [...] *ris. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 10. *f. ult.*
Habitat in Europæ *borealis inundatis; lacustribus* [...] *viis.* ⊙

DRABA.

* *Caule nudo.*

alpina. 1. DRABA scapo nudo simplici, foliis lanceolatis [inte]gerrimis. *Fl. lapp.* 255; 570. *Fl. svec.* 524. *Hort.* 333. *Jacq. vind.* 254. *
Alysson alpinum hirsutum luteum. T. *Mill. dict.* 4. *f.* 2.
Sedum alpinum hirsutum luteum. *Bauh. pin.* 28[...]
Leucojum luteum aizooides montanum. *Col. ecph.* [...] *p.* 62.
Bursa pastoris alpina rosea lutea. *Moris. hist.* 2. *p.* [...] *s.* 3. *t.* 20. *f.* 6.
Alysson dalechampi. *Oed. dan. t.* 56.
Habitat in Alpibus Europæ. ♃

verna. 2. DRABA scapis nudis, foliis lanceolatis subin[...] *Hort. cliff.* 333. *Fl. svec.* 523; 567. *Roy. lugdb.* [...] *Hall. helv.* 538. *Gron. virg.* 76.
Bursa pastoris minor, loculo oblongo. *Bauh. pin.* [...]
Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo. T. S[...] *veron.* 1. *p.* 575. *t.* 4. *f.* 3.
Pilosella minor. *Thal. harc.* 84. *t.* 7. *f. E.*
Habitat in Europæ *aridis &* America *septentrionali.*

pyrenaica. 3. DRABA scapo nudo, foliis cuneiformibus trilo[bis] *Læfl. it.* 61. *Jacq. vind.* 255. *
Alysson pyrenaicum perenne minimum, foliis tri[...] *Tournef. inst.* 217. *Allion. pedem. t.* 6.

Ha[bitat]

Habitat in Pyrenæis. ♃
Folia radicalia, imbricata, lingulata, trifida. Scapi nudi floribus 4. f. 5.

* * *Caule folioso.*

DRABA caule ramoso; foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 33. *It. gotl.* 192. * *Fl. svec.* 525. ; 569. *Hall. helv.* 539. — muralis.
Bursa pastoris major loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108. *prodr.* 50. *t.* 50.
Bursa pastoris sublongo loculo affinis pulchra planta. *Bauh. hist.* 2. *p.* 938.
Draba nemorosa. *Sp. plant.* 1. *p.* 643.
Draba minima muralis discoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 272.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ⊙

DRABA scapo unifolio, foliis subhirsutis, siliculis obliquis pedicellatis. — hirta.
Draba foliis hirsutis incanis ad terram ovatis, ad caulem paucissimis dentatis. *Hall. helv.* 539. *Jacq. aust. f.* 3.
Bursa pastoris alpina hirsuta. *Bauh. pin.* 108. *prodr.* 51. *t.* 51.
Habitat *in Alpibus* Helveticis, Lapponicis. *D. C. Solander.*
Simillima D. incanæ, sed Caulis *nudus, in medio folio unico lanceolato.* Petala *alba, emarginata.* Siliculæ *longis glabræ & ovatæ, pedunculo siliqua dimidio breviore; nec subsessiles.*

DRABA foliis caulinis numerosis incanis, siliculis oblongis obliquis. *Fl. svec.* 526; 568. *It. gotl.* 2. * *Hudf. angl.* 244. — incana.
Draba caule ramoso folioso, foliis dentatis. *Fl. lapp.* 254. *Hort. cliff.* 334.
Leucojum f. Lunaria vasculo oblongo intorto. *Pluk. alm.* 215. *t.* 42. *f.* 1.
Habitat *in Alpibus & alpinis* Europæ. ♂

LEPIDIUM.

LEPIDIUM foliis caulinis pinnato-multifidis, ramicis cordatis amplexicaulibus integris. *Hort. cliff.* 331. *Hort. upf.* 183. *Roy. lugdb.* 335. *Gron. orient.* 79. — perfoliatum.
Lepidium spicatum persicum perfoliatum maximum. *Moris. hist.* 2. *p.* 294. *f.* 3. *t.* 25. *f.* 17.

Thlaspi alexandrinum. *Bauh. pin.* 108. *prodr.* 50
hist. 2. *p.* 933. *Raj. hist.* 834.
Thlaspi verum dioscoridis 1. *Zan. hist.* 193.
Raj. hist. 830.
Habitat in Persia, Syria. ⊙

chalepense. 2. LEPIDIUM foliis sagittatis sessilibus dentatis.
acad. 4. *p.* 321. *
Draba chalepensis repens humilior, foliis minus
reis & quasi viridibus. *Moris. hist.* 2. *p.* 314.
Habitat in Oriente.

vesicarium. 3. LEPIDIUM caulium geniculis inflatis.
Lepidium orientale, nasturtii folio, caule ve
Tournef. cor. 15. *Buxb. cent.* 1. *p.* 17. *t.* 26.
Habitat in Iberiæ, Mediæ *aridis.* ⊙

nudicaule. 4. LEPIDIUM scapo nudo simplicissimo, florib
trandris. *Læfl. it.* 155. *
Lepidium foliis filiformibus apice pinnatifidis,
nudo. *Sauv. monsp.* 228; 281.
Nasturtium minimum vernum, foliis tantum ci
dicem. *Magn. monsp.* 187. *t.* 186.
Habitat Monspelii, & *in* Hispania. ⊙
Folia *radicalia multa, linearia, apice pinnatifida* v
tata. Siliculæ *emarginatæ.* Petala *æqualia.* Stam

procumbens 5. LEPIDIUM foliis pinnatifidis: impari majore
po nudo, caulibus prostratis racemiferis.
Lepidium foliis pinnatis: impari majore, caule
cumbente. *Sauv. monsp.* 228.
Naussturtium foliis omnibus alternatim pinnatis.
paris. 194.
Nasturtium pumilum supinum vernum. *Magn.*
185. *t.* 184.
Habitat Monspelii. ⊙
Scapus *erectus, nudus, racemosus.* Caules *plures*
cumbentes, foliosi. Folia *lyrato-pinnatifida lo*
impari majore ovato. Racemi *etiam caules pr*
bentes terminant.

alpinum. 6. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis, scapo
radicato, siliculis lanceolatis mucronatis.
acad. 4. *p.* 321. * *Jacq. vind.* 258. *
Nasturtium alpinum tenuissime divisum. *Bauh. pin.*
Bauh. hist. 2. *p.* 918. *Raj. hist.* 826.

Thl

Thlaspi montanum minimum. *Dalech. hist.* 1180.
Cardamine alpina 3 minima. *Clus. hist.* 2. *p.* 128.
Habitat in Alpibus Schneeberg, Saltzburgensibus, Tyrolensibus, Helveticis, Baldo.

LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *It. al.* 52. *Fl. svec.* 535; 573. *Jacq. virid.* 115. — petræum.
Cardamine pusilla saxatilis montana discoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 273. *bon.*
Nasturtium pumilum vernum. *Bauh. pin.* 105.
Habitat in lapidosis Oelandiæ, Angliæ. ☉

LEPIDIUM floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Vir. cliff.* 63. *Hort. upf.* 183. *Fl. svec.* 2. n. 571. *Mat. med.* 322. *Ray. lugdb.* 335. — sativum.
Lepidium foliis varie divisis incisisque. *Hort. cliff.* 331.
Nasturtium hortense vulgatum. *Bauh. pin.* 103.
Nasturtium hortense. *Dod. pempt.* 771.
Nasturtium hortense crispum. *Bauh. pin.* 104. *prodr.* 44. *t.* 43.
Habitat - - - - - ☉

LEPIDIUM foliis radicalibus pinnatis; caulinis lyratis. *Læfl. it.* 37. * *Amæn. acad.* 4. *p.* 278. * *Act. stockh.* 1755. *p.* 273. *t.* 8; 9. — Cardamine.
Habitat in Hispaniæ *argillosis.* ♂

LEPIDIUM foliis lyratis crispis. — lyratum.
Lepidium orientale, nasturtii crispi folio. *Tournef. cor.* 15. *itin.* 339. *t.* 339.
Habitat in Oriente.

LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Hort. cliff.* 330. *Fl. svec.* 533. *Roy. lugdb.* 334. *Dalib. paris.* 194. — latifolium.
Lepidium latifolium. *Baub. pin.* 97.
Lepidium plinii. *Dod. pempt.* 716.
Habitat in Galliæ, Angliæ *umbrosis, succulentis.* ♃

LEPIDIUM foliis subulatis indivisis sparsis, caule suffruticoso. — subulatum.
Lepidium, capillaceo folio, fruticosum hispanicum. *Tournef. inst.* 216.
Habitat in Hispania. *Læfl.* ♃

Radix *perennis*, *cespitem promens foliorum* & *r*
rum persistentium. Caules *vix spithamæi*, *sim*
subtomentosi, *plures.* Folia *sparsa*, *subulata*, *li*
acuta, *supra plana*, *subtus semiteretia.* Racem
minales & *ex alis supremis foliorum simplices.*
tala *alba.* Siliculæ *omnino L. ruderalis.* Stamina

graminifolium.

13. LEPIDIUM foliis linearibus: superioribus in
rimis, caule paniculato virgato, floribus hexa
Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo
flore albo. *Tournef. inst.* 213.
Habitat in Europa *australi.* ♃
Statura L. sativi: Caulibus *paniculatis*, *virgatis*,
tibus, *lævibus.* Folia *Radicalia prima pinnato*
ta; Caulina inferiora serrata; superiora lineari
gerrima. Flores *hexandri*, *parvi*, *albi.* Ca
purpurascentes.

ruderale.

14. LEPIDIUM floribus diandris apetalis, foliis ra
bus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integer
Fl. svec. 534; 572. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb.*
Nasturtium sylvestre, osyridis folio. *Bauh. pin.*
Nasturtium angustifolium. *Fuchs. hist.* 307.
Habitat in Europæ *ruderatis* & *ad vias.* ☉

virginicum.

15. LEPIDIUM floribus subtriandris tetrapetalis
liis linearibus pinnatis.
Lepidium foliis lanceolato-linearibus serratis.
virg. 76.
Lepidium foliis omnibus lineari-lanceolatis se
Roy. lugdb. 334.
Iberis humilior annua virginiana ramosior. *Mori*
2. *p.* 311. *s.* 3. *t.* 21. *f.* 2. *Sloan. jam.* 80. *hist*
195. *t.* 123. *f.* 3. *Raj. hist.* 827.
Iberis virginiana latifolia ramosa. *Moris. præl.*
Habitat in Virginia, Jamaicæ *glareosis.* ☉

Iberis.

16. LEPIDIUM floribus diandris tetrapetalis, fol
ferioribus lanceolatis serratis; superioribus li
bus integerrimis. *Roy. lugdb.* 334.
Lepidium foliis lanceolato-linearibus serratis.
cliff. 331.
Iberis latiore folio. *Bauh. pin.* 97.
Iberis. *Dod. pempt.* 714.
Habitat in Germania, Gallia, Italia, Sicilia *secus v*

17. L

17. LEPIDIUM floribus diandris tetrapetalis, foliis omnibus pinnato-multifidis. bonarienſe
Lepidium foliis pinnatifidis incifis. *Roy. lugdb.* 335.
Thlaſpi bonarienſe multiſciſſum, flore inviſibili. *Dill. elth.* 281. *t.* 286. *f.* 370.
Habitat in Bonaria. ☉

THLASPI.

1. THLASPI ſiliculis ſuborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 330. * *Roy. lugdb.* 334. peregrinum
Thlaſpi, capſula cordata, peregrinum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 927. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 297. *ſ.* 3. *t.* 18. *f.* 30.
Habitat - - - - -

2. THLASPI ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. lapp.* 251. *Fl. ſvec.* 530; 574. *Hort. cliff.* 330. *Mat. med.* 323. *Roy. lugdb.* 333. arvenſe.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105.
Thlaſpi latius. *Dod. pempt.* 712.
Habitat in Europæ agris. ☉

3. THLASPI ſiliculis ſubovatis ventricoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris. *Roy. lugdb.* 334. alliaceum.
Thlaſpi allium redolens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 297. *ſ.* 3. *t.* 18. *f.* 28.
Scorodo-Thlaſpi ulyſſis aldrovandi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 932.
Habitat in Europa *auſtrali.*
Antecedenti ſimilis, ſed Siliculæ ovato-ventricoſæ, margine minore.

4. THLASPI ſiliculis ſubrotundis, foliis lanceolato-linearibus carnoſis obtuſis. *Sauv. monſp.* 53. 71. *Act. petrop.* 1760 *v.* 5. *p.* 330. *t.* 5. *Gouan. monſp.* 316. ſaxatile.
Lepidium foliis pulpoſis ſubrotundis, antheris lateralibus. *Hall. gœt.* 245.
Thlaſpi parvum ſaxatile, flore rubente. *Bauh. pin.* 107.
Lithonthlaſpi quartum, carnoſo rotundo folio. *Col. ecphr.* 1. *p.* 279. *t.* 277. *f.* 2.
Habitat in Italiæ, G. Narbonenſis, Provinciæ *ſaxoſis.*

[TH]LASPI ſiliculis ſubrotundis piloſis, foliis caulinis [ſa]gittatis villoſis. *Roy. lugdb.* 333. *Sauv. monſp.* 120. hirtum.
[Thlaſ]pi capſulis hirſutis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 922.

Thlaspi villosum, capsulis hirsutis. *Bauh. pin.* 10
prodr. 47. *t.* 47.
Habitat in Italia, Narbona. ♂
Folia Radicalia *ovalia*, *nudiuscula*, *subciliata*. Ca
pubescens. *Folia* Caulina *semiamplexicaulia*, *vill*
mollissima. Calyces *albi*. Petala *alba*, *obovata*,
tegra.

campestre. 6. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis
t.tis incanis. *Hort. cliff.* 330. *Fl. svec.* 531; 575.
lugdb. 333 *Hall helv.* 544. *Dalib. parif.* 196.
Thlaspi arvense, vaccariæ incano folio, majus. B
pin. 106.
Thlaspi latifolium. *Fuchs. hist.* 306.
Habitat in Europæ *arvis, viis argillosis, apricis.* ♂
Folia radicalia sinuato-lyrata.

montanum. 7. THLASPI siliculis obcordatis, foliis glabris rad
libus carnosis obovatis integerrimis; caulinis
plex caulibus, corollis calyce majoribus.
Thlaspi siliculis obverse cordatis, foliis imis spa
latis; summis amplexicaulibus sagittatis. *Sauv.*
121. *Gouan, monsp.* 317.
Thlaspi alpinum, bellidis cæruleæ folio. *Bauh.*
106.
Thlaspi montanum, glasti folio, minus. *Bauh. pin.* 1
Thlaspi montanum, bursæ pastoris fructu. *Col. ecphr.*
p. 275. *t.* 276.
Thlaspi montanum 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 131.
β. Thlaspi perfoliatum minus. *C. B.* 106? *sec. Jac*
nium.
Habitat in Helvetiæ, Austriæ, Italiæ, Monspelii
trosis, *sylvaticis.*

perfoliatum 8. THLASPI siliculis obcordatis, foliis caulinis co
datis glabris subdentatis, petalis longitudine cal
cis, caule ramoso.
Thlaspi foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicau
bus lanceolatis. *Guett. stamp.* 142. *Dalib. parif.* 19
Thlaspi arvense perfoliatum majus. *Bauh. pin.* 10
Barr. ic. 815.
Thlaspi alterum minus, bursæ pastoris fructu. C
ecphr. 278. *t.* 276. *f.* 2.
Thlaspi oleraceum. *Tabern. ic.* 462. *hist.* 851.

Pilo-

Pilosella siliqua. *Cam. hort. t. 7. f. C.*
Habitat in Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ *agris apricis.* ♂
Caules *læves, oleracei.* Corollæ *albæ, vix calyce majores.* Stamina *flore longiora, alba, Antheris lutescentibus.* Silicula *Bursæ pastoris.*

THLASPI siliculis obcordatis, foliis subdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calycis, caule simplici. — alpestre.
Thlaspi vaccariæ folio, bursæ pastoris siliquis. *Bauh. pin.* 105. *prodr.* 47?
Thlaspi perfoliatum minus. *Bauh. pin.* 106.
Thlaspi pumilum 3. *Clus. hist.* 2. *p.* 31.
Habitat in Austria. *Stamina flore longiora.*

THLASPI siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. lapp.* 252. *Fl. suec.* 532; 576. *Hort. cliff.* 330. *Mat. med.* 324. *Roy. lugdb.* 334. *Hall. helv.* 545. *Dalib. paris.* 196. — Bursa Pastoris.
Bursa pastoris major, folio sinuato. *Bauh. pin.* 108.
Bursa pastoris. *Fuchs. hist.* 611.
Bursa pastoris media. *Bauh. pin.* 108.
Habitat in Europæ *cultis ruderatis.* ☉

COCHLEARIA.

COCHLEARIA foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Fl. lapp.* 256. *Fl. svec.* 537; 578. *Hort. cliff.* 332. *Mat. med.* 320. *Roy. lugdb.* 335. — officinalis.
Cochlearia folio subrotundo. *Bauh. pin.* 110.
Cochlearia. *Dod. pempt.* 594.
Habitat in Europæ *borealis litoribus marinis.* ☉. ♂

COCHLEARIA foliis ovato-lanceolatis sinuatis. *Hud. angl.* 248. — anglica.
Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis integerrimis, caulinis subsinuatis. *Mill. dict.*
Cochlearia folio sinuato. *Bauh. pin.* 110. *Raj. hist.* 833.
Cochlearia britannica s. anglica. *Lob. ic.* 294.
Habitat in Angliæ *litoribus marinis.* ♂

COCHLEARIA foliis hastatis angulatis. *Fl. suec.* 538; 579. — danica.
Cochlearia aremorica. *Tournef. inst.* 215.
Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
Cochlearia danica repens. *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.

γ. Cochlearia minor erecta. *Bauh. pin.* 110. *prodr.*
Habitat in Daniæ, Sueciæ *litoribus marinis.* ⊙. ♂

œnlandica 4. COCHLEARIA foliis reniformibus carnosis inte-
rimis. *Hort. cliff.* 498.* *Roy. lugdb* 335.
Cochlearia minima repens insulæ alholmiæ. *Bart.*
3. *p.* 143. *t.* 144.
Cochlearia minima. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 10.
Habitat in Norvegia, Islandia, Grœnlandia. ⊙
Folia radicalia minima, subtus admodum convexa & *nosa, avenia, integerrima, longius petiolata.*

oronopus. 5. COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.*
Fl. svec 539; 579. *Roy. lugdb.* 335. *Dalib.*
195. *Sauv. monsp.* 254.
Ambrosia campestris repens. *Bauh. pin.* 138.
Pseudo-Ambrosia. *Cam. epit.* 596.
Habitat in Europæ *apricis, nudis.* ⊙

rmoracia. 6. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis cr-
tis, caulinis incisis. *Hort. cliff.* 332. *Fl. svec.*
580. *Mat. med.* 321. *Roy. lugdb.* 336.
Raphanus rusticanus. *Bauh. pin.* 96.
Raphanis magna. *Dod. pempt.* 678.
Habitat in Europæ *fossis* & *ad rivulos.* ♃

astifolia. 7. COCHLEARIA foliis caulinis obcordato-sagitt-
amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 332. *Hort. upsf.*
Roy. lugdb. 335.
Lepidium glastifolium. *Bauh. pin.* 97. *Morif. hist.*
p. 312. *f.* 3. *t.* 21. *f.* 3.
Lepidium annuum. *Dalech. hist.* 1297.
Habitat in Ratisbonæ *agris.* ♂

raba. 8. COCHLEARIA foliis caulinis lanceolatis dent-
amplexicaulibus.
Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus denta-
Hort cliff. 331.
Draba umbellata s. major, capitulis donata. *Bauh.*
109. *Morif. hist.* 2. *p.* 313. *f.* 3. *t.* 21. *f.* 1.
Draba 1. vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 123.
Habitat in Austria, Gallia, Italia *ad versuras.* ♃

IBERIS.

semperflo-
rens. 1. IBERIS frutescens, foliis cuneiformibus intege-
mis obtusis. *Hort. cliff.* 330. *Hort. upsf.* 184. *R.*
lugdb. 336. Leu

Leucojum fruticosum umbellatum persicum, foliis leucoji instar sempervirentibus. *Moris. hist.* 2. *p.* 296.
Thlaspi latifolium polycarpon, leucoji foliis. *Bocc. sic.* 55. *t.* 22. *f. a* - 1.
Thlaspi fruticosum, folio leucoji, semperflorens. *Seb. thes.* 1. *p.* 2. *t.* 13. *f.* 4.
Habitat in Sicilia, Persia. ♄

IBERIS frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 336. — sempervirens.
Thlaspi montanum sempervirens. *Bauh. pin.* 106.
Thlaspi montanum candidum. *Dalech. hist.* 1180.
Thlaspi creticum perenne, flore albo. *Barr. ic.* 214. & 734.
Habitat in Cretæ *rupestribus.* ♄

IBERIS suffruticosa, foliis lanceolato - linearibus carnosis acutis integerrimis ciliatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 321.* — saxatilis.
Thlaspi saxatile, vermiculato folio. *Bauh. pin.* 107. *Garid. aix.* 466. *t.* 101.
Lithonthlaspi 3 fruticosius, vermiculato acuto folio. *Col. ecphr.* 1. *p.* 278. *t.* 277. *f.* 1.
Habitat in Italia, Galliæ *australis aridis sabulosis.* ♄

IBERIS frutescens, foliis apice dentatis. — gibraltarica.
Thlaspidium hispanicum, ampliore flore folio crasso dentato. *Dill. elth.* 382. *t.* 287. *f.* 37.
Habitat ad Gibraltariam Hispaniæ. ♄

IBERIS herbacea, foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus lævibus succosis. — rotundifolia.
Thlaspi montanum, serrato cepeæ folio, flore purpurascente umbellato. *Barr. ic.* 848.
Thlaspi alpinum, folio rotundiore carnoso, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 212. *Scheuch. alp.* 50. 143.
Lepidium caule repente, foliis ovatis amplexicaulibus. *Hall. helv.* 546. *Allion, pedem.* 27. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat in Helvetia. ♃
Folia *glabra, mollia: Radicalia petiolata, ovata, integerrima; caulina amplexicaulia, ovata, glabra, integra.* Corollæ *fere Cardamines.*

IBERIS herbacea, foliis linearibus integerrimis, caule herbaceo paniculato, corymbis hemisphæricis. — linifolia.

Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo folio, purpurascente. *Tournef. inst.* 213. *Garid. aix t.* 105.

Habitat in Hispania, Lusitania.

Simillima Lepidio graminifolio. Folia *Radicali dentata, glabra; Caulina linearia, integerrima.* lis *paniculatus.* Corymbi *hemisphærici.* Silicu *vatæ, apice truncato bidentatæ, cum in Lepidii minifolio sint ovatæ acuminatæ. Planta adultior omnia folia dejecit.*

umbellata. 7. IBERIS herbacea, foliis lanceolatis acuminatis inferioribus serratis; superioribus integerrimis. *cliff.* 330. *Hort. upf.* 184. *Roy. lugdb.* 336.

Thlaspi umbellatum creticum, iberidis folio. *pin.* 106.

Draba f. Arabis f. Thlaspi candiæ. *Dod. pempt.*

Habitat in Hetruria, Hispania, Creta. ☉

Fructus *hujus corymbosus hemisphæricus persistit, maræ vero racemosus evadit.*

amara. 8. IBERIS herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. *Hort. upf.* 184.

Iberis foliis obverse lanceolatis, floribus umbe *Guett. stam.* 2. *p.* 146.

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis folio. *Bau* 106.

Thlaspidium folio iberidis. *Riv. tetr.* 112.

Thlaspi umbellatum arvense amarum. *Baub. hist.* 2. *p*

Thlaspi amarum. *Tabern. ic.* 462.

Habitat in Helvetia. ☉

odorata. 9. IBERIS herbacea, foliis linearibus superne dil serratis. *Roy. lugdb.* 336. *Hort. cliff.* 330.

Thlaspi umbellatum creticum, flore albo odoro nus. *Bauh. pin.* 106.

Thlaspi parvum 4, odorato flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 1

Habitat in Alpibus Allobrogicis. ☉

arabica. 10. IBERIS herbacea, foliis ovatis glabris aveni tegerrimis, siliculis basi apiceque bilobis. *A acad.* 4. *p.* 278. *

Thlaspi humile, spica purpurea. *Buxb. cent.* 1. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat in Arabia, Cappadocia. ☉

11. IB

IBERIS herbacea, foliis linearibus pinnatifidis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 278. * *Gouan. monsp.* 319. — pinnata.
Thlaspi umbellatum, nasturtii folio, monspeliacum. *Bauh. pin.* 106.
Thlaspi alterum minus umbellatum, nasturtii hortensis folio, narbonense. *Lob. ic.* 218.
Habitat in Europæ *australis maritimis.*

IBERIS herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplici. *Hort. cliff.* 328. *Fl. svec.* 536; 581. *It. œl.* 139. *Roy. lugdb.* 336. — nudicaulis.
Bursa pastoris minor, foliis incisis. *Bauh. pin.* 108.
Bursa pastoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Nasturtium petræum. *Tabern. ic.* 451.
Habitat in Europæ *arenosis, sylvaticis, nudis, sterilissimis.* ☉

ALYSSUM.

** Suffruticosa.*

ALYSSUM ramis floreis senilibus spiniformibus nudis. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331. *Dalib. paris.* 197. — spinosum.
Thlaspi fruticosum spinosum. *Bauh. pin.* 108.
Leucojum s. Thlaspi spinosum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 931.
Thlaspi spinosum hispanicum. *Barr. ic.* 808.
Habitat in Hispaniæ, Galliæ *cautibus.* ♄
Spinæ e ramis olim foliosis floridisque, etiamnum persistentibus induratis.

ALYSSUM ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato-echinatis. *Hort. upsf.* 185. *Jacq. vind.* 258. * — montanum.
Alyssum foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331.
Thlaspi montanum luteum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 928. *t.* 929.
Habitat in Helvetiæ, Germaniæ *apricis siccis.* ♄

ALYSSUM foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis, caulibus procumbentibus perennantibus. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 331. — halimifolium.
Thlaspi, halimi folio, sempervirens. *Herm. lugdb.* 594. *t.* 595.
Thlaspi parvum, halimi angusto incano folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 45. *t.* 39.
Habitat in Europæ *australis aridis.* ♄

4. ALYS-

saxatile. 4. ALYSSUM caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis mollissimis undulatis integris. *lugdb.* 331. *n.* 6. *Mill. dict. t.* 20. *f.* 1.
Alysson folio leucoji incano, flore luteo. *B. lugdb.* 2. *p.* 3.
Alyssum creticum saxatile, foliis undulatis inc. *Tournef. cor.* 15.
Habitat in Creta. ♄

deltoideum. 5. ALYSSUM caulibus suffrutescentibus prostratis, foliis lanceolato-deltoidibus, siliculis hirtis.
Alysson creticum, foliis angulatis, flore viol. *Tournef. cor.* 15.
Leucojum saxatile, thymi folio, hirsutum cær. purpureum. *Bauh. pin.* 201.
Lithoreo-leucojon minimum supinum. *Col. ecphr.* 282. *t.* 284?
Habitat in Oriente. ♄
Caules *lignosi*, *filiformes*, *diffusi*, *pilosi*, *antiquiores* *tiolorum basibus denticulati*, *flexuosi.* Folia *lan* *ta*, *utrinque uno alterove valido angulo quasi de* *dea*, *viridia*, *raris pilis adspersa.* Racemi *simpl* *pauciflori.* Siliculæ *hirtæ.*

* * *Herbacea.*

incanum. 6. ALYSSUM caule erecto, foliis lanceolatis inc. integerrimis, floribus corymbosis. *Hort. cliff.* *Fl. svec.* 528; 582. *Roy. lugdb.* 331.
Thlaspi fruticosum incanum. *Bauh. pin.* 108.
Thlaspi incanum machliniense. *Clus. hist.* 2. *p.* 132.
Habitat in Europæ *septentrionalioris arenosis*, *apri* ♃. ♂

minimum 7. ALYSSUM caulibus herbaceis diffusis, foliis lin ribus tomentosis, siliculis compressis.
Alyssum procumbens annuum, foliis lineari-lanceo tis subtomentosis. *Sauv. meth.* 70.
Lunaria annua minima hispanica, folio leucoji mari mi. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 6.
Habitat in Hispania. ☉

alycinum. 8. ALYSSUM caulibus herbaceis, staminibus omnib dentatis, calycibus persistentibus. *Jacq. vind.* 114.
Clypeola siliculis bilocularibus tetraspermis. *Ho cliff.* 329.

Thlaspi

Thlaspi Alysson dictum campestre majus. *Bauh pin.* 107.
Alysson minimum. *Clus. hist.* 2. *p.* 133.
Alysson. *Cam. epit.* 558. *f.* 1.
Habitat in Austria, Gallia, Germania. ⊙
Stamina 4. *in medio interius dentata, at* 2 *e basi exserunt squamam lanceolatam longitudine germinis.* Petala *minima, vix manifeste emarginata, lutea, sed antiquata alba evadunt.* Silicula *emarginata.* Calyx *persistens.*

ALYSSUM caule herbaceo, staminibus stipatis pari setarum, calycibus deciduis. — campestre.
Clypeola annua, siliculis bilocularibus dispermis, calycibus caducis. *Sauv. monsp.* 71.
Alysson incanum, serpylli folio, fructu nudo. *Tournef. inst.* 217.
Thlaspi Alysson dictum minus, capsulis majoribus rotundis non foliatis. *Magn. monsp.* 251.
Thlaspi montanum incanum luteum, serpylli folio, majus. *Bauh. pin.* 107. *prodr.* 49?
Habitat in Gallia. ⊙
Simillimum A. calycino petalis caule foliis, sed magis decumbens foliis lanceolato-ovatis. Filamenta *absque dentibus, sed* 2. *solitaria habent utrinque setam filamento non adnatam, at receptaculo insertam. Siliculæ ovatæ, vix compressæ, magis tomentosæ.*

ALYSSUM caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus ovalibus compresso-planis, petalis acuminatis. — clypeatum.
Lunaria siliculis subsessilibus incanis lateralibus. *Roy. lugdb.* 333. *Gron. orient.* 80.
Lunaria leucoji folio, siliqua oblonga majori. *Tournef. inst.* 218.
Leucojum alyssoides clypeatum majus. *Bauh. pin.* 201.
Alysson dioscoridis. *Dod. pempt.* 89.
Habitat in Europa *australi*, Libano. ⊙
Denticulus in medio filamentorum.

ALYSSUM caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis, siliculis inflatis. — sinuatum.
Alyssum foliis lanceolatis repando-dentatis. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 332.
Alyssoides incanum, foliis sinuatis. *Tournef. inst.* 218.
Leucojum incanum, siliquis rotundis. *Bauh. pin.* 201.
Lunaria peregrina. *Clus. hist.* 2. *p.* 134.

Ha-

Habitat in Hispaniæ *incultis, ad vias.* ☉. ♂
Petala *bifida. Filamenta lateralia obsolete dentata.*

creticum. 12. ALYSSUM caule herbaceo erecto, foliis i lanceolatis integerrimis, siliculis inflatis.
Alyssoides fruticosum creticum, leucoji folio i *Tournef. cor.* 15.
Leucojum luteum, utriculato semine. *Alp. exot t.* 118.
Habitat in Creta, Hispania.

Vesicaria. 13. ALYSSUM foliis linearibus dentatis, siliculis tis angulatis acutis.
Vesicaria orientalis, foliis dentatis. *Tournef. c itin. 2. p. 97. t. 14.*
Habitat in Oriente.

hyperboreum. 14. ALYSSUM foliis incanis dentatis, staminibus tuor bifurcatis.
Lunaria foliis ellipticis incondite dentatis. *Kr act. petr.* 1747. *p.* 381. *t.* 15. *f.* 1.
Habitat in America *septentrionali. D. Krascheninni*
Stamina 2. *breviora ungue acuto notata, reliqua basin squama emarginata.*

PELTARIA.

alliacea. 1. PELTARIA. *Jacq. vind.* 260. †
Clypeola perennis, foliis inferioribus petiolati dato-angulatis; superioribus amplexicaulibus la latis, siliculis unilocularibus. *Ard. spec.* 16.
Thlaspi montanum, glasti folio majus. *Bauh. pi*
Thlaspi montanum 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 130.
Habitat in alpibus Istriam *inter & Croatiam, ad Stichenstein versus Schneeberg* Austriæ. *Jacq.* ♃

CLYPEOLA.

Jonthlaspi. 1. CLYPEOLA siliculis unilocularibus monosp *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.*
Thlaspi clypeatum, serpilli folio. *Bauh. pin.* 1
Jonthlaspi minimum spicatum lunatum. *Col. ec p.* 281. *t.* 284.
Habitat in Italiæ, Narbonæ *sabulosis.* ☉

maritima. 2. CLYPEOLA siliculis bilocularibus ovatis disp *Sauv. monsp.* 71.

Thl

Thlaspi Alysson dictum maritimum. *Bauh. pin.* 107.
Thlaspi narbonense, centunculi angusto folio. *Tabern. ic.* 461.
Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ *maritimis.* ♃
Caules prostrati, sæpe perennantes. Folia *viridia, vix incana, adspersa pilis raris simplicibus. Statura Alyssi; sed staminum dentes nulli.* Filamenta *post anthesin subviolacea.* Petala *alba, integra.*

B I S C U T E L L A.

BISCUTELLA calycibus nectario utrinque gibbis, siliculis in stylum coëuntibus. *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.* 336. — auriculata.
Thlaspidium biscutatum villosum, flore calcari donato. *Bauh. pin.* 107. *prodr.* 49.
Leucojum montanum, flore pedato. *Col. ecphr.* 2. *p.* 59. *t.* 61.
Jon Draba alyssoides lutea angustifolia. *Barr. ic.* 230.
Habitat in Italia, Galloprovincia. ☉

BISCUTELLA siliculis orbiculato-didymis a stylo divergentibus. *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.* 337. *Sauv. monsp.* 72. 282. — didyma.
Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium majus. *Bauh. pin.* 107.
Thlaspi clypeatum. *Clus. hist.* 2. *p.* 133.
Jon Draba allyssoides apula spicata. *Col. ecphr.* 1. *p.* 283. *t.* 285.
Habitat in Germania, Gallia, Italia, Hispaniæ *collibus.* ☉
Vulgaris *fructu majori: disco glabro;* Rarior *minore fructu: disco scabro.*

L U N A R I A.

LUNARIA foliis alternis. — rediviva.
Lunaria foliis cordatis. *Hort cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 332.
Viola lunaria major, siliqua oblonga. *Bauh. pin.* 203.
Viola latifolia. Lunaria odorata. *Clus. hist.* 1. *p.* 297.
Habitat in Europa *septentrionaliore.* ♃
Folia alterna exceptis infimis & magis hirta.

LUNARIA foliis oppositis. *Fl. svec.* 2. *n.* 583. — annua.
Lunaria major, siliqua rotundiore. *Bauh. hist.* 2. *p.* 881.
Viola latifolia. *Dod. pempt.* 161. *Dalech. hist.* 805.
Habitat in Germania.
Folia opposita, sed floralia alterna sessilia.

SILI-

SILIQUOSA.

RICOTIA.

ægyptiaca. 1. RICOTIA.
Cardamine foliis fupradecompofitis, filiquis [illegible]laribus pendulis. *Sp. pl.* 1. *p.* 656.
Lunaria foliis fupradecompofitis: foliolis trifi[illegible] quis oblongis pendulis. *Mill. icon.* 169.
Habitat in Ægypto. ☉

DENTARIA.

enneaphyllos 1. DENTARIA foliis ternis ternatis. *Jacq. vind.*
Dentaria foliis omnibus ternatis. *Roy. lugdb.* [illegible]
Dentaria triphyllos. *Bauh. pin.* 322. *Cluf. hi[illegible]* 121. *n.* 5.
Coralloides triphyllos. *Gefn. fafc.* 4. *t.* 2. *f.* 4.
Ceratia plinii. *Col. ecphr.* 1. *p.* 308. *t.* 307.
Habitat in Auftriæ, Italiæ, *montanis umbrofi[illegible]bus.* ♃

bulbifera. 2. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, fum[illegible]plicibus. *Hort. cliff.* 335. *Fl. fvec.* 565; 58[illegible] *lugdb.* 340. *Hall. helv.* 557.
Dentaria heptaphyllos baccifera. *Bauh. pin.* 32[illegible]
Dentaria IV. baccifera *Cluf. hift.* 2. *p.* 121.
β. Dentaria baccifera, foliis ptarmicæ. *Bauh. pi[illegible]*
Habitat in Europa *auftrali ad radices montium* [illegible] *fas.* ♃

pentaphyllos. 3. DENTARIA foliis fummis digitatis.
α. Dentaria foliis feptenis, fuperioribus quinatis. *helv.* 556.
Dentaria foliis fummis quinatis. *Gefn. fafc.* 1. *t.* [illegible]
Dentaria heptaphyllos. *Bauh. pin.* 322.
Dentaria 8. heptaphyllos. *Cluf. hift.* 2. *p.* 123.
β. Dentaria pentaphyllos, foliis mollibus. *Garid* 152. *t.* 29.
Dentaria pentaphyllos. *Bauh. pin.* 322.
γ. Dentaria pentaphyllos, foliis afperis. *Tourn* 225.
Dentaria 6. pentaphyllos 1. *Cluf. hift.* 2. *p.* 122.
Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis, ali sq

CA

CARDAMINE.

* *Foliis simplicibus.*

RDAMINE foliis simplicibus ovatis integerrimis : bellidifolia.
etiolis longis. *Fl. lapp.* 256. *t.* 9. *f.* 2. *Fl. svec.* 564;
90. *Hall. helv.* 566.
urtium alpinum, bellidis folio; minus. *Bauh. pin.*
5.
tula cardamines æmula *Clus. hist.* 2. *p.* 129.
itat *in Alpibus* Lapponiæ, Helvetiæ, Britanniæ. ♃

RDAMINE foliis simplicibus subcordatis. asarifolia.
rtium montanum, asari folio. *Bocc. sicc.* 5. *t.* 3.
m. *par.* 203. *t* 203. *Raj. hist.* 816.
rtium alpinum, palustre rotundifolium, radice re-
te. *Moris. hist.* 2. *p.* 224.
rtium alpinum bellidis folio; majus. *Bauh. pin.*
05. *prodr.* 46 ?
itat *in Alpibus* Italicis.

RDAMINE foliis simplicibus lanceolatis sinuato- nudicaulis.
tatis, caulibus nudis.
tat *in* Sibiria. *D. Gmelin.*
lanceolatæ Lunariæ. Flores non vidi.

RDAMINE foliis simplicibus oblongis dentatis. petræa.
svec. 2. *n.* 591. *Hudf. angl.* 255.
mine petræa cambrica, nasturtii facie. *Dill. elth.*
t. 61. *f.* 71.
tium petræum. *Pluk. alm.* 261. *t.* 101. *f.* 3.
herb. 50. *f.* 3.
in Angliæ, Arvoniæ, Merviniæ, Succiæ *rupi*
excelsis. ♃

DAMINE foliis inferioribus indivisis, superio- resedifolia
bus trilobis.
rtium alpinum minus; resedæ folio. *Bauh. pin.*
4. *prodr.* 45. *t.* 45. *Bocc. mus.* 2. *p.* 41. *t.* 46.
at *in Alpibus* Helveticis, Pyrenæis.
inferiora ovata, indivisa; superiora trilobo-hasta-
; f. subternata lobis lateralibus minoribus. Statura
lidifoliæ.

* * *Foliis ternatis.*

AMINE foliis ternatis obtusis, caule subnu- trifolia
ic]. *vind.* 654.

Cardamine foliis ternatis. *Hall. helv.* 559. *Fl. svec.* 589.
Cardamine foliis ternatis crenatis, caule simplici. *lapp.* 257. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 346.
Cardamine alpina trifolia. *Clus. hist.* 2. *p.* 127.
Nasturtium alpinum trifolium. *Bauh. pin.* 104.
Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis; *loci... brosis sylvaticis.*

...icana. 7. CARDAMINE foliis ternatis acuminatis, caul... mosissimo.
Nasturtium africanum, foliis ternis, facie christo... rianæ. *Herm. par.* 202. *t.* 202.
Nasturtium africanum, floribus albis spicatis, folii... nis christophorianæ facie. *Pluk. alm.* 152. *t.* 1... 5. *Raj. suppl.* 414.
Habitat in Africa.

* * * *Foliis pinnatis.*

...elidonia. 8. CARDAMINE foliis pinnatis : foliolis quinis in...
Cardamine glabra, chelidonii folio. *T. Barr. ic.* 1...
Nasturtium pyrenæorum aquaticum latifolium, pu... rascente flore. *Herm. par.* 203. *t.* 204.
Habitat in Sibiria, Italia.

...patiens. 9. CARDAMINE foliis pinnatis incisis stipulatis, ... bus apetalis. *It. W-goth.* 26.
Cardamine foliis pinnatis : pinnis laciniatis. *Hort.* 336. *Fl. svec.* 561; 588. *Roy. lugdb.* 345. *Hall.* 557. *Sauv. monsp.* 255.
Cardamine foliis pinnatis : foliolis laciniatis, petali... gacissimis. *Hudf. angl.* 256.
Sisymbrii cardamines species quædam insipida. *B... hist.* 2. *p.* 886.
Habitat in Europæ *nemoribus ad radices montium.* ♂
Planta certe nulla petala habet.

...arviflora. 10. CARDAMINE foliis pinnatis exstipulatis lan... latis obtusis, floribus corollatis.
Nasturtium pratense, parvo flore. *Bauh. prodr.* 44.
Nasturtium pratense, flosculis minimis. *Moris.* p... 290.
Habitat in Europa. ⊙
Simillima *C. impatienti*, *a qua differt* : Caule bre... *ve, minus acutangulo.* Foliis *non stipulatis : fol... la...*

lanceolatis obtusis vix dentatis: nec infimis palmatis, sed ovatis glabris. Stamina *corollæ breviora.* Siliquæ *dimidio minores, erectæ in pedicellis horizontalibus.*

CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *Roy. lugdb.* 345. *Hort. upf.* 188. — graeca.
Nasturtium montanum nanum, rotundo thalictri folio, cyrenæum. *Bocc. muf.* 2. *p.* 171. *t.* 166.
Iso minimo prosperi alpini affinis, siliculis latis. *Bocc. sic.* 84. *t.* 44. *f.* 2.
Habitat in Sicilia, Corsica, *insulis* Græciæ, *inque* Germania. ☉

CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Hort. cliff.* 336. *Fl. svec.* 562; 587. *Roy. lugdb.* 345. *Gron. virg.* 99. — hirsuta.
Nasturtium aquaticum minus. *Bauh. pin.* 104.
Sisymbrium aquaticum alterum. *Cam. epit.* 270.
Habitat in Europæ *areis, hortis, arvis.*

CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. — pratensis.
Cardamine foliis pinnatis; foliolis subrotundis integris. *Fl. svec.* 559; 585. *Dalib. parif.* 198.
Cardamine foliis pinnatis, caule erecto. *Fl. lapp.* 258. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 345.
Nasturtium pratense, magno flore. *Bauh. pin.* 104.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
Nasturtium pratense, folio rotundiore, flore majore. *Bauh. pin.* 104.
Habitat in Europæ *pascuis aquosis.* ♃

CARDAMINE foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *it. W-goth.* 76.* — amara.
Cardamine foliis pinnatis; foliolis subrotundis angulosis. *Hall. helv.* 558. *Fl. svec.* 560; 586. *Dalib. parif.* 199.
Nasturtium aquaticum majus & amarum. *Bauh. pin.* 104.
Habitat in Europæ *septentrionalioris nemoribus.* ♃

CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis lanceolatis basi unidentatis. *Gron. virg.* 99. — virginica.
Alyssum foliis radicalibus pinnatis in orbem positis; caulinis lanceolatis, siliculis compressis. *Gron. virg.* 1. *p.* 170.

Nasturtium, bursæ pastoris folio, virginianum, flo albo, siliqua compressa. *Pluk. alm.* 251. *t.* 101. *f.* 4.
Habitat in Virginia.
Folia *radicalia in orbem digesta, pinnata : foliolis num rosis, fere imbricatis, sublanceolatis, a latere posti denticulo uno brevi juxta basin.* Caulis *minus foliosu foliis raris, sæpius linearibus, integris.* Habitus *Bur pastoris.*

SISYMBRIUM.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

Nasturtium. △ : m. 1. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis : foliolis subcordatis. *Hort. cliff.* 336. *Fl. svec.* 552; 59 *It. scan.* 278. * *Mat. med.* 331. *Roy. lugdb.* 340. *Gro virg.* 170. *Dalib. paris.* 203.
Sisymbria Cardamine. *Fuchs. hist.* 723.
Nasturtium aquaticum supinum. *Bauh. pin.* 104.
Habitat in Europa & America *septentrionali ad fonte inque* Oriente.

tanacetifolium. 2. SISYMBRIUM foliis pinnatis : foliolis lanceolat pinnatis serratis : extimis confluentibus. *Roy. lugd* 659.
Eruca tanaceti foliis. *Moris. hist.* 2. *p.* 231. *s.* 2. *t.*
f. 19.
Eruca fruticosa, foliis tanaceti, indica. *Zan. hist.*
t. 33.
Habitat in Sabaudia.

pyrenaicum. 3. SISYMBRIUM siliquis subovatis, foliis inferiorib lyratis; superioribus bipinnatifidis amplexicaulibu stylis filiformibus.
Raphanus minimus repens luteus, foliis tenuiter div sis. *Moris. hist.* 2. *p.* 236. *s.* 3. *t.* 7. *f.* 1. *Raj. hist* 809.
Alyssum foliis pinnatis multiformibus, floribus racem sis luteis. *Allion. pedem.* 40. *t.* 7.
Habitat in Pyrenæis, Helveticis *alpibus.* ♃
Stylus *capillaris.* Silicula *ovalis.* Petioli *amplexicaules.*

sylvestre. 4. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis : foliolis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 336. *Fl. svec.* *n.* 594. *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. paris.* 204. *Sauv. mons* 228. *Bœhm. lips.* 118. *Gort. gelr.* 399.

Eruca

Eruca palustris, nasturtii folio, siliqua oblonga. *Bauh. pin.* 98.
Eruca quibusdam sylvestris repens, flosculo luteo. *Bauh. hist.* 2. *p.* 866.
Eruca sylvestris minor, luteo parvoque flore. *Bauh. pin.* 98.
Eruca sylvestris. *Fuchs. hist.* 263.
Habitat in Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ *ruderatis.* ♃

SISYMBRIUM siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis. **amphibium**
Sisymbrium foliis pinnatifidis serratis. *Fl. svec.* 551; 593. *palustre.*
Sisymbrium foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. paris.* 203.
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. *Bauh. pin.* 97. *prodr.* 38. *t.* 38. *Fl. lapp.* 262
Sisymbrium foliis simplicibus dentatis serratis. *Hort. cliff.* 336. *Fl. svec.* 550. *Roy. lugdb.* 341. *Hall. helv.* 548. *aquaticum.*
Raphanus aquaticus, rapistri folio. *Bauh. pin.* 97.
Raphanus aquaticus alter. *Bauh. prodr.* 38. *t.* 38.
Sisymbrium aquaticum, foliis variis. *Vaill. paris.* 185. *terrestre.*
Sisymbrium foliis imis integris ovatis serratis, superioribus pinnatis. *Hall. helv.* 548.
Habitat in Europæ *septentrionalioris aquosis.*

SISYMBRIUM foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; supremis integerrimis. *Guett. stamp.* 150. *Dalib. paris.* 204. † **tenuifolium**
Sinapi erucæ folio. *Bauh. pin.* 99.
Eruca tenuifolia perennis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 861. *Vaill. paris.* 50.
Habitat in Italia, Gallia, Helvetia. ♃

SISYMBRIUM siliquis pedunculatis rectis patentibus, foliis lyratis ovatis lævibus. **Indicum.**
Habitat in India *orientali.* ☉
Facies *S. amphibii aut Sinap. arvensis.* Caulis *ramosus, patulus, lævis.* Folia *ovata, lyrata, obsolete dentata, petiolata.* Racemi *axillares, nudi.* Siliquæ *læves, rectæ, pedicellis patentibus, filiformes.* Flores *minuti.*

* * *Siliquis sessilibus axillaribus.*

SYMBRIUM siliquis axillaribus subsessilibus solitariis; foliis dentato-sinuatis. *Hort. upf.* 192. **supinum.**

Eryfimum caule decumbente, filiqua laterali fubfe[illegible] *Roy. lugdb.* 343. *Dalib. parif.* 201.

Eruca fupina alba, filiqua fingulari e foliorum alis eru pente. *Ifnard. act.* 1724. *p.* 295. *t.* 18.

Habitat Parifiis *ad agrorum margines, inque* Hifpan Gotlandia. ⊙

yrifolium. 9. SISYMBRIUM racemo flexuofo, foliis lyratis, ca erecto foliofo. *Amœn. acad.* 4. *p.* 323. *

Hefperis flore albo minimo, filiqua longa, folio p funde dentato. *Bœrh. lugdb.* 2. *p.* 20.

Draba paluftris filiquofa major alpina, burfæ paft folio. *Cup. fic.* 3.

Habitat in Italiæ *montibus fubhumidis.* ⊙

olycera-tium. 10. SISYMBRIUM filiquis axillaribus feffilibus fub tis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Hort. upf.* [illegible] *Sauv. monfp.* 283.

Eryfimum filiquis in alis foliorum feffilibus. *Hort.* [illegible] 337.

Eryfimum polyceratium f. corniculatum. *Bauh.* [illegible] 101.

Irio altera. *Dalech. hift.* 653.

Habitat in Helvetiæ, Italiæ *ruderatis.* ⊙

* * * *Caule nudo.*

murale. 11. SISYMBRIUM fubacaule, foliis lanceolatis finu ferratis læviufculis, fcapis fubfcabris adfcendenti[illegible]

Sifymbrium foliis lanceolatis finuato-ferratis, caule nudo erectiufculo. *Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* [illegible] *Dalib. parif.* 204.

Eruca viminea, iberidis folio, flore luteo. *Barr.* [illegible] 421. *t.* 131.

Habitat in Gallia, Italia. ⊙

Caules *fubfcabri, adfperfi pilis raris rigidis, fupra fin ramofi foliofique.* Folia *petiolata, lanceolata,* [illegible] *racea, lævia, fubtus pilis aliquot vagis adfper dentato-ferrata.* Scapi *longi, primum decumben dein adfcendentes,* Calyces *femipatentes raris pil apice fornicati.* Corollæ *luteæ, obtufiffimæ, mag diametro foliorum.* Siliquæ *craffiufculæ, compre fculæ, valvulis obfolete carinatis.*

monenfe. 12. SISYMBRIUM acaule, foliis pinnato-dentatis fi pilofis.

Eruca

Eruca monensis laciniata, flore luteo majore. *Dill. elth.* 135. *t.* 111. *f.* 135.
Eruca perennis & saxatilis, radice crassa e rupe victoriæ. *Tournef. schol.*
Habitat in insula Mona *Angliæ*, rupe Victoriæ *Galloprovinciæ.* ♃
Simillimum *præcedenti magnitudine plantæ, foliorum, florum, fructuum.* Radix *perennis.* Folia *pinnatifida, linearia, raris pilis adspersa: pinnis remotis, obtusiusculis, sæpius septenis.* Scapi *erecti, læves.* Calyces *clausi.* Petala *lutea, integra.*

SISYMBRIUM acaule, foliis lyratis lævibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. **vimineum**
Eruca pumila sicula, bursæ pastoris folio. *Bocc. sic.* 19. *t.* 10.
Eruca, minimo flore, monspeliensis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 862. *f. mala.*
Eruca vinealis, parvis luteis floribus. *Moris. blæs.* 263.
Habitat in Sicilia, Monspelii.
Facies *duorum præcedentium, sed* Folia, *licet parva & digiti longitudine, lyrata omnino Barbareæ, obtusa, levia.* Scapi *filiformes, erectiusculi.* Flores *lutei, Sophiæ floribus non majores. Petala erecta, obtusa, vix calyce duplo longiora.*

SISYMBRIUM caule subnudo ramoso, foliis radicalibus runcinatis dentatis hispidis. **barrelieri.**
Eruca sylvestris minor lutea, bursæ pastoris folio, italica. *Barr. ic.* 1016. *bona.*
Habitat in Hispania, Italia. *Læfling.* ☉
Folia *radicalia, plurima, lyrata, dentata ut in Taraxaco, licet vix pollicaria, hispida undique setis pellucidis.* Caulis *erectus, rarius hispidus, ramis paucis sub quibus folium subulatum.* Calyces *læves.* Petala *lutea, oblonga, majuscula, integra.* Siliquæ *oblongæ, ad semina torulosæ.*

SISYMBRIUM caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispidis pilis ramosis. *Fl. svec.* 2. *n.* 597. **arenosum.**
[Si]symbrium asperum, foliis pinnatis rectangulis non [d]entatis. *Hall. helv.* 552.
[Er]uca cærulea in arenosis proveniens. *Bauh. pin.* 99. *prodr.* 40. *f. mala. Barr. ic.* 196.

Eruca sylvestris major minorque, foliis subasperis orbem sparsis. *Loes. pruss.* 68. *t.* 13. *bona.*
Habitat in Germania, Helvetia. ⊙
Folia *Radicalia plurima, lanceolato-lyrata, hispida* u*trinque pilis ramosis bifidis s. trifidis*; *Caulina* lan*ceolata, dentata, similiter hispida.* Caulis *hirtus* [pi]*lis raris simplicibus.* Calyces *glabri.* Corollæ *f*[lavæ] *violaceæ.*

[V]alentinum. 16. SISYMBRIUM caule simplici erecto superne glabro, foliis lanceolatis hispidis antrorsum dentatis.
Eruca hirsuta, floribus albis. *Barr. rar.* 423. *t.* 195. 1. *Bocc. mus.* 2. *p.* 84. *t.* 80.
Habitat in Regno Valentino, Madriti. *Læfling.* ⊙
Caulis *erectus, teres, pedalis, tenuior, vix ramosus*, [in]*ferne raris pilis adspersus, superne lævis.* Folia *Ra*[*di*]*dicalia angusto-lanceolata, dentibus quatuor vali*[*dis*] *antrorsum exstantibus, hispida pilis albis simplicibus lon*[*gioribus*] *gioribus & brevioribus.* Caulina *rariora, lanceolato-lin*[*e*]*aria, non dentata.* Pedunculi *filiformes, flore longior*[*es*].

* * * * *Foliis pinnatis.*

[A]sperum. 17. SISYMBRIUM siliquis scabris, foliis pinnatifidis pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Sauv. monsp.* 283. †
Sisymbrium foliis pinnatifidis subdentatis angustissimis. *Sauv. monsp.* 255.
Sinapi parvum, siliqua aspera. *Bauh. pin.* 99. *prodr.* 4[.]
Sinapi monspessulanum, siliqua aspera hirsuta. *Bauh. hi*[*st.*] 2. *p.* 857.
Habitat Monspelii *palustribus.* ⊙

[S]ophia. 18. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis de[com]composito pinnatis. *Fl. svec.* 553; 595. *Dalib. paris.* 204. *Mat. med.* 332.
Sisymbrium corolla calyce minore, foliis multifidis lineraribus. *Fl. lapp.* 261. *Hall. helv.* 337. *Roy. lugdb.* 341
Descurea. *Guett. stamp.* 2. *p.* 164.
Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. *Bauh. pin.* 105
Seriphium Absinthium. *Fuchs. hist.* 2.
Habitat in Europæ *maceriis, muris, tectis.* ⊙

[A]ltissimum. 19. SISYMBRIUM foliis runcinatis flaccidis: foliolis sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Hort. ups.* 193.* *Sauv. monsp.* 229.

Erysi-

rysimum siliquis laxis, foliis hastato-pinnatis. *Hort. cliff.* 338. *Sauv. monsp.* 284.
rysimum foliis sinapi, siliquis longissimis & strictissimis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 26. *t.* 51.
rysimum monspessulanum, sinapios folio. *Walth. hort.* 55. *t.* 22.
bitat in Armenia, Sibiria. ⊙
lyx patentissimus, unde Sinapios affinis.

SISYMBRIUM foliis runcinatis tomentosis, caule lævi. *Amœn. acad.* 4. *p.* 322.* orientale.
rysimum orientale, folio sonchi, flore sulphureo, siliquis longissimis. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 14. *Hall. goett.* 248.
tat in Oriente. ⊙

SISYMBRIUM foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, siliquis erectis. *Fl. svec.* 2. *n.* 596. Irio.
rysimum foliis lyrato pinnatis: extimo hastato. *Fl. svec.* 556. *Dalib. parif.* 201. *Sauv. monsp.* 284.
rysimum latifolium majus glabrum. *Bauh. pin.* 101.
rysimum 11. *Tabern. hist.* 840.
io lævis apulus, erucæ folio. *Col. ecphr.* 1. *p.* 264. *t.* 265.
bitat in Europæ *cultis.* ⊙
ffert a S. altissimo foliis summis non in pinnas lineares longissimas sectis; Foliis omnibus magis dentatis; Caule breviore, minus glabro; Siliquis magis erectis, nec laxis subpendulis. confer. Raj. extr. 123.

SISYMBRIUM foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorsum hispido. *Amœn acad.* 4. *p.* 279.* Lœselii.
api erysimo tragi cognatum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 857.
rysimum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 107.
rysimum hirsutum, siliqua erucæ. *Læs. pruss.* 69. *t.* 14.
rysimum foliis pinnatis: extima pinna triangula, petiolis longis hirsutis. *Hall. gœtt.* 248.
apistrum montanum, irionis folio, macroleptoceratum. *Colum. ecphr.* 1. *p.* 266. *t.* 265.
bitat in Borussia. ⊙

SISYMBRIUM foliis simplicibus spatulato ovatis dentatis amplexicaulibus nudis. barbareæ.
mbrium orientale, barbareæ facie, plantaginis folio. *Tournef. cor.* 16.
itat in Oriente. *Burmannus.*

Statura *Barbareæ*. Folia *ovata* : *petiolo dilatato* , *ceo* , *amplexicauli auriculis liberis* Racemus *nalis*.

* * * * * *Foliis integris.*

strictissimum. 24. SISYMBRIUM foliis lanceolatis dentato- caulinis. *Hort. cliff.* 337. *Hort. upſ.* 192. *Roy.* 341. *Jacq. vind.* 122.
Draba lutea, siliquis strictissimis. *Bauh. pin.* 110.
Arabis quibusdam dicta planta. *Cam. epit.* 342.
Habitat in Helvetiæ, Italiæ, *montibus asperis apricis*.
Folia utrinque pubescentia valdeque venosa. *deflorata violaceæ.*

integrifolium. 25. SISYMBRIUM foliis linearibus integerrimis dunculis glutinoso-hispidis.
Hesperis caule ramosissimo, foliis linearibus, pe lis hispidis. *Gmel.*
Habitat in Sibiria.
Caulis *digiti longitudine.* Folia *linearia* , *glabra* , *fiuſcula.* Racemi *terminales*, *pubescentes* , *viscidi*, res *majuſculi*, *albi.* Siliquæ *lineares*.

ERYSIMUM.

officinale. 1. ERYSIMUM siliquis spicæ adpressis, foliis ru tis. *Hort. cliff.* 337. *Fl. ſvec.* 554; 598. *Ma* 333. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. pariſ.* 200.
Erysimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.
Verbena mas. *Fuchſ. hiſt.* 592.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ☉

barbarea. 2. ERYSIMUM foliis lyratis extimo subrotundo. *ſvec.* 557 ; 599.
Erysimum foliis basi pinnato dentatis apice subrotu *Fl. lapp.* 264. *Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* *Dalib pariſ.* 202.
Eruca lutea latifolia f. Barbarea. *Bauh. pin.* 98.
β. Sisymbrium, erucæ folio glabro, minus & procer *Tournef. inſt.* 226.
γ. Sisymbrium orientale, barbareæ facie, folio rotu *Tournef. cor.* 16.
Habitat in Europa. ♃

Alliaria. 3. ERYSIMUM foliis cordatis. *Hort. cliff.* 338. *Fl. ſ* 558; 600. *Mat. med.* 334. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. pa* 201.

Alliaria

lliaria. *Bauh. pin.* 110. *Fuchs. hist.* 104. *Cam. epit.* 589.
bitat in Europæ *sepibus, cultis, umbrosis.* ♂ *s.* ♃

RYSIMUM foliis lanceolatis dentatis, racemis oppositifoliis, siliquis racemosis subsessilibus, corollis minutis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 415. * — repandum.
bitat in Hispaniæ, Bohemiæ *arvis.* ☉
tura Sisymbrii polyceratii, sed racemi oppositifolii longi. Siliquæ filiformes. Caulis *angulatus.* Folia *argute dentata.*

RYSIMUM foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 263. *Hort. cliff.* 337. *Fl. svec.* 555; 601. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. paris.* 202. — cheiranthoides.
ritis foliis integris lanceolatis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 165.
yagrum siliqua longa. *Bauh. pin.* 109.
melina, Myagrum alterum thlaspi effigie. *Lob. ic.* 225.
bitat ubique in Europæ *arvis.* ☉
bitus *simillimus Cheirantho* Erysimoidi *præter flores minores & siliquas magis patulas.* Stigmata *in hac parva vix divisa, in sequenti quasi ex nodis duobus divaricatis constricta.*

RYSIMUM foliis lanceolatis serratis. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. paris.* 201. *Fl. svec.* 2. *n.* 602. — hieracifolium.
ucojum luteum sylvestre hieracifolium. *Bauh. pin.* 201. *prodr.* 102.
ucojum sylvestre inodorum, flore parvo pallidiore *Raj. hist.* 781.
bitat in Gallia. ♂ ♃

CHEIRANTHUS.

HEIRANTHUS foliis lanceolatis dentatis, caule recto, siliquis tetragonis. *Fl. svec.* 2. *n.* 603. * *Allion. pedem. t.* 8. *f.* 2. — erysimoides.
rysimum foliis integris lanceolatis margine repando-dentatis. *Hort. ups.* 192.
ucojum luteum sylvestre angustifolium. *Bauh. pin.* 202.
ucojum sylvestre. *Clus. hist.* 1. *p.* 299. *Bauh. hist.* 2. *p.* 873.
cojum angustifolium alpinum, flore sulphur[illegible] *Allion. pedem.* 44. *t.* 9. *f.* 3.
itat in Hungaria, Gallia. ♂

2. CHEI-

Cheiri. 2. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis g
ramis angulatis. *Hort. cliff.* 334. *Hort. upſ.* 18
med. 335. *Roy. lugdb.* 337. *Guett. ſtamp.* 2.
Dalib. pariſ. 197. *Gort. gelr.* 382.
Leucojum luteum vulgare. *Bauh. pin.* 202.
Leucojum luteum. *Dod. pempt.* 160.
β. Leucojum luteum, magno flore. *Bauh. pin.* 202.
γ. Leucojum luteum, ferrato folio, flore grandiore
pin. 202. *prodr.* 102.
δ. Leucojum luteum, pleno flore, majus. *Bauh. p*
ε. Leucojum, pleno flore, minus. *Bauh. pin.* 202.
Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ, Hiſpaniæ
tectis. ♂. ♃. ♄

chius. 3. CHEIRANTHUS foliis obovatis aveniis emar
ſiliquis apice ſubulatis. *Hort. upſ.* 187.
Heſperis caule ramoſiſſimo, foliis lanceolatis d
Hort. cliff. 335. *n.* 3. *Roy. lugdb.* 337. *n.* 3.
Heſperis ſiliquis hirſutis, flore parvo rubello. *D*
180. *t.* 147. *f.* 178.
Leucojum thlaſpeos facie. *Herm. par.* 192. *t.* 193.
Habitat in Chio. ☉

maritimus. 4. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutiuſculis,
le diffuſo, antheris eminentibus. *Amœn. ac*
280.*
Heſperis maritima ſupina exigua. *Tournef. inſt.* 2
Leucojum maritimum parvum, folio vireſcente c
ſculo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 877. *Pluk. phyt.* 432. *f.* 2.
Habitat in Europæ *auſtralis maritimis.* ☉
Affinis nimium Ch. chio, ſed major.

feneſtralis. 5. CHEIRANTHUS caule indiviſo, foliis confer
pitatis recurvatis undulatis.
Habitat - - - - ♂
Radix *fibroſa.* Caulis *ſemipedalis, craſſitie digiti*
ctus, nudus. Folia *in apice caulis, conferta i*
tulum more braſſicæ, lanceolata, recurvata, ſe
obtuſa, undata, incana. Racemi *floriferi ſtricti,*
altitudine caulis. Flores & Fructus Ch. incani
nimis affinis, vix tamen varietatem dicerem.

incanus. 6. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrim
tuſis incanis, ſiliquis apice truncatis compreſſis,
le ſuffruticoſo. *Hort. upſ.* 187. *Hort. cliff.* 334.

Leu

...ojum, incano folio, hortense. *Bauh. pin.* 200. *n.*
...4. 5. 6. 7.
... alba & purpurea. *Lob. ic.* 329.
... *in* Hispaniæ *maritimis.* ♃. ♄
... *alba nuda, vixque tomentosa est.*

...IRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis obtusis ...mis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. — annuus.
...ojum incanum minus. *Bauh. pin.* 200.
... *in* Europæ *australis maritimis.* ⊙
... *sola varietas antecedentis? sed annuus.*

...IRANTHUS foliis linearibus subsinuatis, flori- ...sessilibus: petalis undatis, caule suffruticoso. *Loefl.* — tristis
...nthus foliis lanceolato-linearibus acutis glabris, ...is teretibus. *Hort. cliff.* 332. *Hort. upf.* 188.
...ojum minus, breviori folio, obsoleto flore. *Barr.* ...999. *n.* 2.
...ojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore. *Bocc.* ... 148. *t.* 111. *Barr. ic.* 83.
... *in* Hispania, Italia, Monspelii. ♄
... *tristes colore & odore.*

...IRANTHUS foliis subulatis obtusis, calycibus ...vibus, siliquis nodosis mucronatis filiformibus læ...ibus. — trilobus.
...ojum maritimum minimum hispanicum vernum, ...is erucæ. *Tournef. inst.* 221?
...ojum maritimum minimum. *Bauh. pin.* 201. *prodr.* ... *Burs. XI.* 28.
... *in* Hispania *& prope insulas* Stœchadum. ⊙
... *ramosi, patuli, spithamæi, incani.* Folia *lanceo-*...*, obtusa, unico vel duobus utrinque dentibus pro-*...*ioribus.* Calyces *non pilosi.* Corolla *purpurea, ma-*...*ula.* Siliquæ *lineares, teretiusculæ, suturis cari-*...*æ, lateribus torulis nodosæ, apice longo subulato acu-*...*natæ, glabræ.*

...HEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis sub-...mentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis ...mentosis. — littoreus
...ojum maritimum angustifolium. *Bauh. pin.* 201.
...ium maritimum minus. *Clus. hist.* 1. *p.* 298.
... *in Maris* Mediterranei *litoribus.* ⊙
... *pedalis, alterne ramosus, incanus.* Folia *alterna,* ...*olata, carnosa, canaliculata, obtusa, obtuse den-*
tata,

tota, *incana*. Racemi *terminales*. Petala *obc*
purpurascentia, *basi albida*. Stamina *longitudi*
Siliquæ *subulatæ*, *angustæ*, *æquales*, *folio n*
giores, *tomentosæ*.

sinuatus. 11. CHEIRANTHUS foliis tomentosis obtusis
nuatis: rameis integris, siliquis muricatis.
Leucojum maritimum, sinuato folio. *Bauh. pin.* 2
Leucojum maritimum magnum latifolium. *Ba*
2. *p.* 875.
Habitat in Hispaniæ, Monspelii *maritimis.* ♂
Caulis *rectus*, *ut tota planta*, *tomentoso-incanus.*
Radicalia lato-lanceolata, *alternatim dentata*,
Caulina lanceolata, *obtusa*; *canaliculata denti*
ribus duobus obtusis, *in medio positis*; *Rame*
gra nec dentata. Petala *incarnata*, *obtusa*, *ba*
bida. Siliquæ *longissimæ*, *muricatæ*, *tomentosæ*

tricuspidatus. 12. CHEIRANTHUS siliquarum apicibus tride
foliis lyratis. *Hort. cliff.* 335. *Roy. lugdb.* 338.
orient. 80.
Leucojum marinum. *Cam. hort.* 87. *t.* 24. *Mor*
2. *p.* 242. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat in Tripoli *maritimis.* ☉

lacerus. 13. CHEIRANTHUS foliis lacero-dentatis acumi
calycibus pilosis, siliquis nodosis mucronatis.
Leucojum lusitanicum purpureum, foliis elegant
tatis. *Herm. parad.* 193. *t.* 193.
Habitat in Lusitania. ☉

HELIOPHILA.

integrifolia. 1. HELIOPHILA foliis lanceolatis indivisis. N. *L.*
mann.
Cheiranthus foliis lanceolatis integerrimis subhirs
cutis, siliquis teretibus torulosis, caule herb
Amæn. acad. 6. *afr.* 23.*
Leucojum africanum, cæruleo flore, latifolium.
lugdb. 364. *t.* 365.
Nasturtium petræum æthiopicum, siliqua in plu
loculos. *Pluk. phyt.* 432. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei, *locis saxosis incultis.* ☉
Folia subcarnosa pilis albis patentibus: *prima*
☿ *ramea opposita*; *reliqua alterna.*

2. H

HELIOPHILA foliis linearibus pinnatifidis. — *coronopifolia.*
...cojum africanum, cæruleo flore, angusto coronopi folio, majus. *Herm. lugdb.* 364. *t.* 367. *Seb. muf.* 1. *t.* 17. *f.* 5.
...ojum africanum, flore lini cærulei, molluginis folio. *Pluk. alm.* 213. *t.* 200. *f.* 3. *mala.*
...tat ad Cap. b. Spei. ⊙
...a glabra est.

HESPERIS.

HESPERIS caule hispido ramoso patente. *Hort. upf.* 197. *Jacq. vind.* 118. — *tristis.*
...ris caule hispido procumbente. *Hort. cliff.* 335. ... *lugdb.* 338.
...ris montana pallida odoratissima. *Bauh. pin.* 202.
...ris pannonica *Cam. hort. t.* 18.
...t in Hungariæ, Austriæ *arvis.* ♂

HESPERIS caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Hort. cliff.* 335. *Hort. upf.* 138. *Roy. lugdb.* 338. *Dalib. paris.* 197. — *matronalis.*
...peris hortensis. *Bauh. pin.* 202.
...a matronalis. *Dod. pempt.* 161.
...itat in Italia. ♂

HESPERIS caule simplici, foliis lanceolatis dentato-serratis, petalis obtusissimis integris. — *sibirica.*
...tat in Sibiria. ♃
...tus omnibus partibus H. matronalis, ut facile pro varietate haberet; Differt vero Caule *duplo altiore;* Corollis *purpureis, nec albidis; Unguibus petalorum calyce duplo longioribus;* Petalorum *bracteis obtusis ac ne vix emarginatis, cum præcedentis emarginatæ ungue intermedio parvo prominulo.* Folia *longiora, angustiora magis serrata. Cæterum* Sibiria *profert varias plantas majores: Ononidem, Polemonium, Serratulam.*

HESPERIS caule simplici erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis. — *inodora.*
...peris sylvestris inodora. *Bauh. pin.* 202.
...ris 3. *Clus. hist.* 1. *p.* 297.
...t Viennæ Monspelii. ♂
...a H. matronali, ut vix nisi a gnaro distinguatur, sed Folia *fere hastata basi transversali, argute denta-*

dentata præsertim ad basin, magis mollia, nec scabra. Calyces *non colorati.* Petala *obtusa ab mucrone.* Stamina *non extra tubum floris prominentia.*

africana. 5. HESPERIS caule ramosissimo diffuso, foliis petiolatis lanceolatis acute dentatis scabris, siliquis sessilibus.

Hesperis africana, hieraci folio hirsuto, flore minimo purpurascente. *Nis. act.*

Leucojum gallicum, folio halimi. *Bocc. sicc. 77. t. f. 1.*

Habitat in Africa. ☉

Planta *caule foliis siliquis aspera pilis triglochidibus ternis.* Flores *incarnati. Petalis angustis, sublatis, obtusiusculis.* Siliquæ *sessiles, strictæ, teretes, subdepressæ, obtusæ mucrone acuto.*

dentata. 6. HESPERIS foliis dentatopinnatifidis caule lævi.

Hesperis foliis multifidis *Roy. lugb.* 338.

Hesperis flore albo minimo, siliqua longa, folio funde dentato. *Dill. elth.* 179. *t.* 148. *f.* 177.

Habitat in Sicilia. ☉

verna. 7. HESPERIS caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis.

Turritis annua verna, flore purpurascente. *Tourn. inst.* 224.

Leucojum minus rotundifolium, flore purpureo. *B. ic.* 876.

Leucojum maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 201. *Moris. hist. 2. p.* 241. *s.* 3. *t.* 8. *f.* 5.

Leucojum marinum alterum latifolium purpureo violaceum. *Lob. ic.* 333.

Rapistrum floribus leucoji marini. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. *Burs. IV.* 47.

Habitat in Galloprovinciæ *maritimis.*)

ARABIS.

alpina. 1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Hort. cliff.* 335.

α. Arabis foliis amplexicaulibus dentatis, caule erecto simplici. *Roy. lugdb.* 338. *Hall. helv.* 561.

Arabis caule simplici, foliis ovatis utrinque dentatis *Fl. lapp.* 257. *Fl. svec.* 565; 604.

Draba

Draba alba siliquosa repens. *Bauh. pin.* 109.
Draba 3, succulento folio. *Clus. hist.* 2. *p.* 125.
Arabis foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuso ramoso. *Roy. lugdb.* 339.
Draba alba siliquosa. *Bauh. pin.* 109.
Draba 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 24.
Habitat in Alpibus Helveticis, austriacis, Lapponicis.
Vere varians ex loco planta. α. brevis erecta alpina; β. inferne procumbens magna; hinc facie diversissima.

ARABIS caule nudo. *Amœn. acad.* 358. *t.* 4. *f.* 20. * grandiflora.
Habitat in Sibiria. ♃

ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Vir. cliff.* 64. *Fl. svec.* 567; 605. *Roy. lugdb.* 339. *Dalib. paris.* 200. thaliana.
Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exortum ramorum solitariis. *Hort. cliff.* 339.
Bursæ pastoris similis siliquosa major. *Bauh. pin.* 108.
Pilosella siliquosa minor. *Thal. harc.* 8 . . *t.* 7. *f. D.*
Habitat in Europæ *septentrionalioris sabulosis.* ☉

ARABIS foliis glabris: radicalibus lyratis; caulinis linearibus. *Gron. virg.* 99. lyrata.
Cheiranthus caule filiformi lævi, foliis lanceolatis: infimis incisis. *Gron. virg.* 1. *p.* 76.
Habitat in Canada. *D. Kalm.* ☉
Statura & habitus A. thalianæ, præter quod folia radicalia lyrata, glabra, & flores majores.

ARABIS foliis caulinis sublyratis, rameis lanceolatis incisis. Halleri.
Sisymbrium foliis imis barbareæ, superioribus integris dentatis. *Hall. opusc.* 101. *t.* 1. *f.* 1. *
Nasturtium barbareæ foliis. *Bauh. pin.* 105. *prodr.* 46.
Habitat in Harcynia *ad Clausthal, locis humectis.*

ARABIS foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris. *Gron. virg.* 100. canadensis.
Eruca virginiana, bellidis majoris folio. *Pluk. alm.* 136. *t.* 86. *f.* 8.
Turritis foliis lanceolatis dentatis: radicalibus maximis. Siliquis compressis sulcatis. *Gron. virg.* 2. *p.* 77?
Habitat in Canada.

Planta *erecta, pedalis s. bipedalis, lævis.* Folia *lato-lan-lata, 4 vel 5 denticulis crassis remotis serrata utri-* Racemus *terminalis nudus, & ex summis ali-vel tres laterales racemi.*

endula. 7. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis ancipitibus nearibus, calycibus subpilosis. *Hort. upf.* 191.*
Turritis latifolia hirsuta, siliquis pendulis. *Amm. ruth.*
Habitat in Sibiria. ⊙
Folia *scabra: Caulina minus, quam sequentis, amp-caulia, serrata.* Caulis *scaber pilis raris rigidis.* -dunculi *longi, filiformes, laxi.* Calyces *apicibus-ti.* Siliquæ *læves, nutantes, laxæ.*

urrita. 8. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis -nis linearibus, calycibus subrugosis. *Hort. upf. Jacq. vind.* 118.
Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentati-bris. *Sauv. monsp.* 73.
Turritis perraro ramifera, foliis lanceolatis obscure -tatis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 162. *Dalib. parif.* 20
Leucojum hesperidis folio. *Tournef. inst.* 221.
Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *B. muf.* 2. *p.* 81. *t.* 72. *Barr. ic.* 353.
Turrita major, plateau. *Cluf. hist.* 2. *p.* 126.
Habitat in Helvetiæ, Hungariæ, Galliæ, Siciliæ *f-bus montosis.* ⊙
Folia *Radicalia ovali-oblonga, crassa, incana, mar-undata.* Caules *pedales, vix ramosi.* Folia *am-xicaulia, dentata: suprema serrata; minus in-* Siliquæ *lineares, compressæ, subsessiles, læves, r-dæ, alternæ, ad latus inferius flexæ.*

TURRITIS.

abra. 1. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis, cau-nis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Hort. cli* 339. *Fl. svec.* 544; 606. *Roy. lugdb.* 339. *Hall. he-* 560. *Dalib. parif.* 203.
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. *Bau. pin.* 112.
Habitat in Europæ *pascuis siccis apricis.* ♂

irsuta. 2. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplex-caulibus. *Hort. cliff.* 339. *Fl. svec.* 545; 607. *Ro-lugdb.* 339. *Dalib. parif.* 62.

Erysi-

[E]ryſimo ſimilis hirſuta, non laciniata, alba. *Bauh. pin.* 101. *prodr.* 42. *t.* 42.
[Ha]*bitat in* Sueciæ, Germaniæ, Angliæ *paſcuis ſylva*ticis.

BRASSICA.

* *Stylo obtuſiuſculo.*

[B]RASSICA foliis cordatis amplexicaulibus glabris: radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. *Hort. upſ.* 190. — orientalis.
[Br]aſſica campeſtris 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 127.
[Br]aſſica campeſtris perfoliata, flore albo. *Bauh. pin.* 112. *Segu. ver.* 1. *p.* 380.
[Br]aſſica orientalis perfoliata, flore albo, ſiliqua quadrangula. *Tourneſ. cor.* 16.
[Hab]*itat in* Oriente, Monſpelii. ⊙

[B]RASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 339. *Fl. ſvec.* 546; 608. *Roy. lugdb.* 344. — campeſtris.
[Br]aſſica campeſtris perfoliata, flore luteo. *Læſ. pruſſ.* 29. *Fl. lapp.* 265.
Habitat in agris, non argilloſis, Europæ. ⊙

[B]RASSICA radice cauleſcente fuſiformi. *Hort. cliff.* 339. *Fl. ſvec.* 547; 609. *Mat. med.* 328. *Roy. lugdb.* 344. *Dalib. pariſ.* 199. — Napus.
[N]apus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 95.
[N]apus. *Dod. pempt.* 674.
[N]apus ſativa. *Bauh. pin.* 95.
Habitat in arenoſis maritimis Gotlandiæ, Belgii, Angliæ. ♂
[F]olia *Radicalia lyrata, glabra. Caulina amplexicaulia, cordato-oblonga, obſolete denticulata.* Calyx *patens, proximus Sinapios.*

[B]RASSICA radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Hort. cliff.* 339. *Hort. upſ.* 190. *Mat. med.* 329. *Roy. lugdb.* 344. — Rapa.
[Ra]pa ſylveſtris. *Raj. hiſt.* 800.
[Ra]pa ſativa rotunda. *Bauh. pin.* 89.
[Rap]um. *Cam. epit.* 218.
[Ra]pa ſativa oblonga ſ. femina. *Bauh. pin* 89.
[Hab]*itat in arvis* Angliæ, Belgii. ♂

oleracea. 5. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. *cliff.* 338. *Hort. upf.* 189. *Mat. med.* 327. *Roy.* 343.

sylvestris. Brassica maritima arborea s. procerior ramosa. *hist.* 2. *p.* 208. *Raj. hist.* 796

viridis. β. Brassica alba vel viridis. *Bauh. pin.* 111.

rubra. γ. Brassica capitata rubra. *Bauh pin.* 111.

capitata. δ. Brassica capitata alba. *Bauh pin.* 111.

sabauda. ε. Brassica alba crispa. *Bauh. pin.* 111.
Brassica undulata. *Ren... spec.* 113.

laciniata. ζ. Brassica laciniata rubra. ... *hist* 2 *p.* 832.

selenisia. η. Brassica angusto apii folio ... *pin* 112.

sabellica. θ. Brassica fimbriata. *Bauh. pin.* 112.
Brassica sabellica. *Renealm. spec.* 1.. *t.* 133.

botrytis. ι. Brassica cauliflora *Bauh pin.* 111. *Renealm. spe* *t.* 133 *Cam. epit.* 253.

Napobrassica κ. Brassica radice napiformi. *Tournef. inst.* 219.
Napo Brassica. *Bauh. pin.* 111. *prodr.* 54.

gongylodes. λ. Brassica gongylodes. *Bauh. pin.* 111.
Brassica caulo-Rapa. *Bauh. hist.* 2. *p.* 829.
Caulo Rapum *Cam. epit.* 251.
Habitat in maritimis Angliæ. ♂

chinensis. 6. BRASSICA foliis ovalibus subintegerrimis, flo amplexicaulibus lanceolatis, calycibus ungue rum longioribus. *Amœn. acad.* 4. *p.* 281. *
Habitat in China. ♂

violacea. 7. BRASSICA foliis lanceolato - ovatis glabris i dentatis. *Hort. upf.* 191.
Habitat in China. ♂

* * Erucæ *siliquis stylo ensiformi.*

Erucastrum. 8. BRASSICA foliis dentato-pinnatifidis, caule h siliquis lævibus.
Sisymbrium foliis pinnato dentatis. *Hort. cli* *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. paris.* 205. sub Sisym
Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Bauh.*
Eruca sativa. *Fuchs. hist.* 262.
Habitat in Europæ *australioris ruderatis.* ☉

Eruca. 9. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, siliq bris. *Hort. upf.* 190. *Mat. med.* 330.
Sisymbrium foliis pinnatifidis: laciniis exteriori joribus, caule hirsuto. *Hort. cliff.* 337.

Eruca latifolia alba. *Bauh. pin.* 98

Sinapi alterum genus *Fuchs. hist.* 539.

Habitat in Helvetia. ☉

BRASSICA foliis dentato pinnatifidis, siliquis hispidis tectis calyce tumido. vesicaria.

Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis retrorsum hispidis. *Hort. upsf.* 191.

Eruca halepensis, caulibus & siliquis hirsutis. *Moris. hist.* 2. *p.* 228.

Habitat in Hispania *Læfling.* ☉

Radix fusiformis. Folia *lanceolata, pinnatifido-dentata, supra glabra.* Caulis *pilosus, ramosus.* Racemi *erecti, terminales.* Corollæ *flavæ venis saturatioribus.* Calyx *floris cylindricus, in fructu vero ventricosus inflatus persistens evadit.* Siliquæ *venter calyce non longior pistillo remanente lanceolato. Differt itaque ab Eruca calyce, sub fructu, inflato vesicario; Foliis non lyratis, sed lanceolatis;* Siliquis *hispidis retrorsum nec glabris;* Calycibus *persistentibus ad maturitatem fructus, nec deciduis.*

SINAPIS.

SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis rostro longioribus. *Hort cliff.* 338. *Fl. svec.* 548; 610. *Roy. lugdb.* 343. *Hall. helv* 554 *Dalib. parisf.* 200. arvensis.

Rapistrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95.

Fuchs. hist. 257.

Habitat in agris Europæ. ☉

SINAPIS siliquis retrorsum hispidis apice subtetragonis compressis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 280. * orientalis.

Sinapi orientale maximum, rapi folio. *Tournef. cor.* 17.

Habitat in Oriente. ☉

SINAPIS siliquis hispidis: rostro obliquo longissimo. *Hort. cliff.* 338. *Hort. upsf.* 191. *Roy. lugdb.* 343. *Dalib. parisf.* 200. alba.

Sinapi apii folio. *Bauh. pin.* 99.

Sinapi sativum alterum. *Dod. pempt.* 707.

Habitat in agris Belgii, Angliæ, Galliæ. ☉

SINAPIS siliquis glabris apice tetragonis. *Hort. cliff.* ... *Fl. svec.* 549; 611. *Mat. med.* 326. *Roy. lugdb.* ... *Dalib. parisf.* 199. nigra.

Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
Habitat in aggeribus ruderatis Europæ *ſeptentri ris.* ☉

pyrenaica. 5. SINAPIS ſiliquis ſtriatis ſcabris, foliis runcinati bus.
Eryſimum, dentis leonis folio, perenne pyren *Tournef. inſt.* 228.
Habitat in Pyrenæis. *D. Monnier.* ♃
Folia *runcinata, lævia, coſta albida, radicaliu niis triangulis denticulatis: caulinorum lan* Caulis *læviuſculus.* Flores *racemoſi, parvi, lut* liquæ *rectiuſculæ, ſtriatæ, ſcabræ, pilis ſurſu ctantibus obſoletis.*

juncea. 6. SINAPIS ramis faſciculatis, foliis ſummis lanc integerrimis. *Hort. upſ.* 191. *
Sinapi indicum maximum, lactucæ folio. *Her* 230. *t.* 230.
Habitat in Aſia, China. ☉

incana. 7. SINAPIS ſiliquis racemo appreſſis lævibus, fo ferioribus lyratis ſcabris; ſummis lanceolatis, ſcabro. *Amæn. acad.* 4. *p.* 281. *
Eryſimum foliis ſubincanis, ſiliquis breviſſimis. *parad.* 115. *t.* 115. *Vaill. pariſ.* 51.
Habitat in Gallia, Luſitania, Hiſpania. ☉

lævigata. 8 SINAPIS ſiliquis lævibus patulis foliis lyratis ſummis lanceolatis, caule lævi. *Amæn. acac* 281. *
Eryſimi varietas. *Herm. par.* 155.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ☉. ♂

erucoides. 9. SINAPIS ſiliquis lævibus æqualibus, foliis lyra longis glabris, caule ſcabro. *Amæn. acad.* 4. *p*
Sinapi hiſpanicum pumilum album. *Tournef. inj*
Eruca ſylveſtris, flore albo, italica. *Barr. ic.*
Habitat in Italia, Hiſpania *ad vias, vineas.* ☉

hiſpanica. 10 SINAPIS foliis duplicato-pinnatis: laciniis line *Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.
Sinapi hiſpanicum, naſturtii folio. *Tournef. in*
Habitat in Hiſpania.

RAPHANUS.

PHANUS siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *Hort. upf.* 188. *Mat. med.* 325. *Roy. lugdb.* 344. — sativus.

anus minor oblongus. *Bauh. pin.* 96.
anus major orbicularis f. rotundus. *Bauh. pin.* 96.
anus niger. *Bauh. pin.* 96.
anus chinensis annuus oleiferus.
at in China. ☉. ♂

HANUS siliquis teretibus articulatis lævibus uni- laribus. *Hort. cliff.* 340. *Fl. svec.* 568; 612. *Roy.* 344. *Hall. helv.* 555. *Dalib. parif.* 198. *Sauv. p.* 285. — Raphanistrum.

rum flore albo, siliqua articulata. *Bauh. pin.* 95.
rum flore albo striato. *Bauh. hist.* 2. *p.* 851.
rum flore albo lineis nigris depicto. *Bauh. pin.* 95.
rum flore luteo. *Bauh. pin.* 95.
at inter segetes Europæ.

HANUS siliquis teretibus torulosis villosis, foliis ribus pinnatifidis. — sibiricus.

nus foliis pinnatis: pinnis confluentibus, siliquis tibus articulatis unilocularibus. *Gmel.*
tat in Sibiria.
us Erucæ; planta *pygmæa.* Caules *maxima ex par- di.* Folia *radicalia & caulina pinnatifida, linea-* Corollæ *magnæ, flavæ.* Siliquæ *teretes, pedi- æ, moniliformes, uti caulis villosæ, rostro oblon-* Figura *Cardamines alpinæ insipidæ. Col. ecphr. p.* 69. *hanc refert.*

BUNIAS.

IAS siliculis divaricato-bicornibus basi spinosis. — cornuta.
astoris orientalis, drabæ foliis, siliquis cornutis. *ef. cor.* 15.
in Sibiria. *D. Gmelin.*
maxime singularis. Silicula *transversim ovalis, que desinens in cornu f. spicam longissimam vali- , ut referat silicula duo cornua; in medio siliculæ arvæ* 4 *undique directæ.*

siliculis tetragonis: angulis bicristatis. iis antrorsum sinuatis. *Hort. upf.* 182. *Sauv.* 185. — Erucago.

Bunias. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344.
Eruca monfpeliaca, filiqua quadrangula echinata. *B. pin.* 99. *prodr.* 41 *t.* 41.
Habitat Monfpelii *in agris humidiufculis.* ☉

orientalis. 3. BUNIAS filiculis ovatis gibbis verrucofis.
Bunias foliis retrorfum finuatis. *Hort. upf.* 186.
Crambe foliis pinnato-haftatis. *Roy. lugdb.* 330.
Crambe orientalis, dentis leonis folio, erucaginis fa... *Tournef. cor.* 41.
Habitat in Ruffia. ♃

Cakile. 4. BUNIAS filiculis ovatis lævibus ancipitibus.
Crambe foliis fucculentis linearibus pinnato-dent... *Sauv. monfp.* 280.
Raphanus filiquis ovatis angulatis monofpermis. *H. cliff.* 340. *Fl. fvec.* 569; 613. *Roy. lugdb.* 344. *G. virg.* 98. *Sauv. monfp.* 285.
Eruca maritima italica, filiqua haftæ cufpidi fimili. *B. pin.* 99.
Cakile ferapionis. *Lob. ic.* 223.
Habitat in Europæ, Africæ, Americæ *maritimis.* ☉

ISATIS.

tinctoria. 1. ISATIS foliis radicalibus crenatis: caulinis fagittat... filiculis oblongis. *Fl. fvec.* 543; 614. *Dalib. parif.* ...
Ifatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 330.
Ifatis fylveftris f. anguftifolia. *Bauh. pin.* 113.
Ifatis fylveftris. *Fuchf. hift.* 330.
β. Ifatis fativa f. latifolia. *Bauh. pin.* 113.
Habitat ad litora maris Baltici & *oceani* Europæ. ...

lufitanica 2. ISATIS foliis radicalibus crenatis: caulinis fagitt... pedunculis fubtomentofis.
Ifatis fylveftris minor lufitanica. *Herm. lugdb.* 678.
Ifatis orientalis maritima canefcens. *Tournef. cor.* 1... *Buxb. cent.* 1. *p.* 4. *t.* 5.
Habitat in Hifpania & Oriente. ☉
Vix a præcedente fufficienter diftincta, fed annua & minor.

armena. 3. ISATIS foliis integerrimis cordatis poftice obtufis, f... liculis cordatis.
Ifatis armena foliis brafficæ profoliatæ, fructu cordifor... canefcente. *Tournef. cor.* 14. *Buxb. cent.* 1. *p.* 3. *t.* ...
Habitat in Armeniæ *pratis ficcioribus ad rivulos.*

4. ISA-

ISATIS foliis omnibus dentatis. *ægyptica.*
Habitat in Ægypto.

CRAMBE.

CRAMBE foliis cauleque glabris. *Fl. svec.* 570; 615. *maritima.*
Crambe foliis cordatis crispis carnosis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 329.
Brassica maritima monospermos. *Bauh. pin.* 112.
Brassica marina sylvestris multiflora monospermos. *Lob. ic.* 245.
Habitat ad litora Oceani *septentrionalis.* ♃

CRAMBE foliis scabris, caule glabro. *orientalis.*
Crambe foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 330.
Rapistrum orientale, acanthi folio. *Tournef. cor.* 14.
Habitat in Oriente.

CRAMBE foliis cauleque scabris. *Hort. upf.* 193. *hispanica.*
Crambe foliis subcordatis crenatis scabris. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 329.
Rapistrum maximum rotundifolium monospermum. *Corn. canad.* 147. *t.* 148. *Moris. hist.* 2. *p.* 266. *f.* 3. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Hispania. ☉

CLEOME.

CLEOME floribus gynandris tetrandris, foliis simplicibus, caule fruticoso. *fruticosa.*
Habitat in India. ♄
Caulis *frutescens*, *teres*, *ramosus*. Folia *ovali-oblonga*, *integerrima*, *glabra*, *petiolata*, *alterna*. Racemi *terminales*, *simplices*. Calyces *tetraphylli*, *patentes*, *ovato-lanceolati*. Petala 4, *unguibus oblongis*, *subrotunda*, *adscendentia*. Germen *pedicello longissimo*, *in cujus medio stamina* 4, *sæpe duo inferiora basi coalita*. Antheræ *ovales*, Siliqua *oblonga*.

CLEOME floribus gynandris, foliis subseptenatis, caule aculeato. *heptaphylla*
Cleome foliis hexandris, foliis septenis, caule spinoso, siliquis pendulis. *Mill. dict.*
Sinapistrum indicum spinosum, foliis 5, 6, 7 numero incertis. *Burm. zeyl.* 215.

Sinapistrum ægyptium heptaphyllum, flore carneo, jus spinosum. *Herm. lugdb.* 564. *Sloan. jam.* 80. 1. *p.* 194.
Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve m *Moris. hist.* 2. *p.* 288.
β. Sinapistrum indicum majus quinquefolium asp *Raj. suppl.* 418.
Habitat in Indiis. ⊙

pentaphylla. 3. CLEOME floribus gynandris, foliis quinatis, c inermi.
Cleome floribus gynandris, foliis digitatis. *Hort.* 341. *Hort. ups.* 193. *Fl. zeyl.* 239.* *Roy. lugdb.*
Sinapistrum indicum pentaphyllum, flore carneo, nus non spinosum. *Herm. lugdb.* 564. *Sloan. ja hist.* 1. *p.* 294. *Rai. hist.* 859.
Papaver corniculatum acre quinquefolium ægypti minus. *Pluk. alm.* 280.
Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve mi *Moris. hist.* 2. *p.* 289.
Quinquefolium lupini folio. *Bauh. pin.* 326.
Capa veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 43. *t.* 24. *Raj. suppl.* 4
Habitat in Indiis. ⊙

triphylla. 4. CLEOME floribus gynandris, foliis ternatis, cau inermi.
Sinapistrum indicum triphyllum, flore carneo, n spinosum. *Herm. lugdb.* 564. *t.* 565. *Raj. suppl.* 4
Habitat in Indiis. ⊙
Tres præcedentes (2, 3, 4,) ex eadem planta olim gnatas evincunt Folia imprimis floralia sessilia; F res gynandri, hexandri; Petala adscendentia; Sili pedicellatæ & Habitus, vix itaque specie sufficiente diversæ.

tetrandra. 5. CLEOME floribus icosi-tetrandris, foliis quinatis. *F zeyl.* 240. *
Sinapistrum zeylanicum pentaphyllum viscosum, flor flavo. *Burm. zeyl.* 215. *t.* 99.
Habitat in Zeylona. ⊙

viscosa. 6. CLEOME floribus dodecandris, foliis quinatis tern tisque. *Fl. zeyl.* 241. *
Sinapistrum zeylanicum triphyllum & pentaphyllun viscosum, flore flavo. *Mart. cent.* 25. *t.* 25.

Aria-

..veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 41. *t.* 23.
..*itat in* Zeylona, Malabaria. ☉
..*ola obovata.*

..LEOME floribus dodecandris, foliis ternatis. *Fl.* dodecandra.
zeyl. 242. * *Hall. gœt.* 257.
..apistrum triphyllum pumilum glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. *Burm. zeyl.* 216. *t.* 100. *f.* 1.
..apistrum indicum triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. *p.* 149. *t.* 124. *f.* 1.
..*itat in* Indiis. ☉
..*ola lanceolato-ovata.*

..LEOME floribus superioribus masculis tetrandris, polygama.
..oliis ternatis: foliolis sessilibus margine subaculeatis.
..ome erectum triphyllum, floribus solitariis alaribus.
Brown. jam. 272.
..apistrum indicum triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. *p.* 194. *t.* 124. *f.* 1. *bona.*
..*bitat in* Jamaica.
..lanta (*sicca mihi visa, unica*) Caule *erecto, læviusculo, parum ramoso.* Folia *longius petiolata: foliolis ovato-lanceolatis, margine aculeis vix conspicuis scabris, sessilibus.* Racemi *longi:* Flore *infimo fertili, reliquis minutis tetrandris masculis.* Siliqua *intra calycem sessilis.*

..LEOME foliis hexandris, foliis septenatis quinatisque, caule spinoso. *Mill. dict. n.* 7. *Jacq. amer.* 26. spinosa.
..enaya. *Marcgr. bras.* 33. *t.* 34.
..*itat in* America *meridionali.*
..*a digitata, glabriuscula.* Rami *divaricati.* Spinæ *ex stipulis binis foliorum, post eorum casum persistentes induratæ.* Samina *flore longiora, sed non gynandra.*

CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis lineari-lanceolatis serratis. *Jacq. amer.* 26. † serrata.
..*bitat in* America *meridionali.* ☉

..LEOME floribus hexandris, foliis simplicibus subrotundo-ovatis, siliquis gladiatis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 1. arabica.
..*tat in* Arabia.
..*ta tota pubescenti-viscosa.*

12. CLE-

ornithopodioides. 12. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: fo ovali lanceolatis.
Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, fi teretibus torosis. *Hort. cliff.* 341. * *Hort. upf. Roy. lugdb.* 340.
Sinapistrum orientale triphyllum, ornithopodii fi *I. Dill. elth.* 359. *t.* 266. *f.* 345. *Buxb. cent.* 1. *t.* 9 *f.* 24.
Habitat circa Peram *in agris.* ☉

violacea. 13. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis fol isque: foliolis lineari-lanceolatis integerrimis
Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, fil subulatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 340. *g.et.* 258.
Trifolium siliquosum, flore violaceo, lusitanicum. *ic* 866.
β. Sinapistrum peregrinum alterum, flore luteo. *Ba* 865. *melior.*
Habitat in Lusitania. ☉

monophylla 14. CLEOME floribus haxandris, foliis simplicibu tiolatis ovato-lanceolatis. *Fl. zeyl.* 243. *
Sinapistrum zeylanicum viscosum, folio solitario, flavo, siliqua tenui. *Burm. zeyl.* 217. *t.* 100. *f.* 2
Tsieru-veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 63. *t* 34.
Habitat in India. ☉

capensis. 15. CLEOME floribus hexandris, foliis simplicibus libus lineari-lanceolatis, caule angulato.
Habitat ad Cap. b. Spei, & *in* India.
Caulis *simplex, strictus, facie Epilobii.* Folia *Ge lineari-lanceolata, stricta, glabra.* Corymbus *Epilobio.*

Cl

Classis XVI.

ONADELPHIA

PENTANDRIA.

WALTHERIA.

ALTHERIA foliis ovalibus plicatis ferrato-dentatis, capitulis pedunculatis. — americana.
ltheria foliis cordato-ovatis ferratis. *Hort. cliff.* 342.
oy. *lugdb.* 348.
nosp.rm-Althæa arborescens villosa, folio majore.
ard. *act.* 1721. *p.* 362. *t.* 14.
thææ similis americana, flore luteo. *Herm. lugdb.*
p. 267. *
tonica arborescens, foliis amplioribus. *Pluk. alm.* 67.
150. *f.* 6.
hæa americana pumila, flore luteo spicato. *Breyn.*
t. - - *t.* 57.
bitat in Bahama, Barbiches, Surinamo. ♄

ALTHERIA foliis ovatis ferratis plicatis, capitulis sessilibus. *Roy. lugdb.* 348. *n.* 1 * — ir...
lochia foliis oblongis obtusis ferratis tomentosis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 343.
tonica arborescens, villosis foliis profunde venosis, oribus ex alis foliorum glomeratis. *Pluk. mant.* 31.
tat in India. ♄

ALTHERIA foliis lanceolatis ferratis, capitulis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 348. *Fl. zeyl.* 244. * — angustifolia.
onosperm-Althæa arborescens villosa, flore minore.
ln. act. 1721. *p.* 278. *t.* 14.
tonica arborescens maderaspatana villosa, foliis profunde venosis. *Pluk. alm.* 67. *t.* 150. *f.* 5.
bitat in America.
li 5 *longi sunt.*

HERMANNIA.

RMANNIA foliis ovatis plicatis crenatis tomentosis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347. — althæifolia

Her-

Hermannia capensis, althææ folio. *Pet. gaz.* 53. *f.* 2.
Ketmia africana frutescens, foliis mollibus & in
Comm. hort. 2. *p.* 151. *t.* 79.
Habitat in Æthiopia. ♄
Pedunculi ex axillis foliorum, sæpius terni, apic res in singulo duos, sub foliolis tribus lancet proferentes.

alnifolia. 2. HERMANNIA foliis cuneiformibus plicatis cre emarginatis. *Hort. cliff.* 342 *Roy. lugdb.* 34
Ketmia africana vesicaria fruticans & erecta, alni latioribus & majoribus. *Comm. hort.* 2. *p.* 155.
Habitat in Æthiopia. ♄

trifurcata. 3. HERMANNIA foliis lanceolatis integris tridenti que. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 24 *
Althæa africana frutescens, floribus aureis cochl pendulis minoribus. *Volk. norib.* 24. *t.* 24.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

hyssopifolia 4. HERMANNIA foliis lanceolatis obtusis serratis. *cliff.* 342. *Hort. upſ.* 195. *Roy. lugdb.* 347.
Althæa africana frutescens, floribus aureis cochl pendulis minoribus. *Volk. norib.* 24. *t:* 24.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia Lavandulæ latiora, obtusa, superne serrata. lyces *inflati.* Corollæ *umbone brevissimo sulph reflexo.*

lavendulifolia. 5. HERMANNIA foliis lanceolatis obtusis integerr *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.
Hermannia frutescens, folio lavendulæ latiore & so, flore parvo aureo. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 273. *elth.* 179. *t.* 147. *f.* 176.
Habitat in Æthiopia. ♄

trifoliata. 6. HERMANNIA foliis ternatis sessilibus plicatis sis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.
Hermannia frutescens, folio oblongo molli co hirsuto. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 273.
Habitat in Æthiopia. ♄
Affinis *H. alnifoliæ.* Foliola *plicata retusa serrata teralia minora.*

triphylla. 7. HERMANNIA foliis ternatis petiolatis planis vatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 25. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

8. HE

ERMANNIA foliis lanceolatis pinnatifidis. grossulari-
rmannia foliis obovatis acute incisis, pedunculis bi- folia.
floris. *Roy. lugdb.* 347.
bitat in Æthiopia. ♄

ERMANNIA foliis tripartitis: media pinnatifida. pinnata.
Hort. cliff. 342. *Roy. lugdb.* 348.
rmannia frutescens, folio multifido tenui, caule ru-
bro. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 273.
tmia africana vesicaria, uvæ crispæ foliis. *Comm.*
rar. 7. *t.* 7.
oides frutex æthiopicus, parvis coronopi foliis, ad
podos caulem radiatim ambientibus. *Pluk. mant.* 50.
t. 344. *f.* 3.
bitat in Æthiopia. ♄

MELOCHIA.

ELOCHIA floribus umbellatis oppositifoliis, cap- pyramidata.
sulis pyramidatis pentagonis: angulis acutis, foliis nu-
dis. *Hort. cliff.* 343. *Fl. zeyl.* 245. *Læfl. it.* 255. *
elochia herbacea tenuissima ramosa, foliis oblongo-
ovatis, umbellulis lateralibus foliis approximatis.
Brown. jam. 276.
thæa brasiliana frutescens, incarnato flore, fagopyri
semine. *Pluk. alm.* 25. *t.* 131. *f.* 3.
bitat in Brasilia. ♃

ELOCHIA floribus umbellatis axillaribus, capsulis tomentosa.
pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis
tomentosis.
elochia frutescens, foliis subincanis villosis oblongo-
ovatis crenato-serratis, floribus racemosis, cortice
fusco. *Brown. jam.* 276.
butilon herbaceum procumbens, betonicæ folio, flo-
re purpureo. *Sloan. jam.* 97. *hist.* 1. *p.* 220. *t.* 139. *f.* 1.
abitat in America *meridionali.*
aules *virgati.* Folia *ovato-lanceolata, crenata, tomen-*
tosa, plicata. Pedunculi *umbellati, oppositifolii*: Flo-
res *purpurei, majusculi.*

ELOCHIA floribus solitariis, capsulis depressis pen- depressa.
tagonis: angulis obtusis ciliatis. *Roy. lugdb.* 348.
ochia erecta minor, foliis ovatis serratis: petiolis
niculatis. *Brown. jam.* 276.

Abu-

Abutilon americanum, ribesii foliis, flore carne
 ctu pentagono aspero. *Houst. mss. Mill. dict. t*
Habitat Havanæ.

concatenata. 4. MELOCHIA racemis confertis terminalibus,
 lis globosis sessilibus. *Fl. zeyl.* 247. *
Alcea indica, flosculis parvis, fasciculatim ramı
 fixis. *Pluk. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 5.
Habitat in India *utraque.* ♃

corchorifolia. 5. MELOCHIA floribus capitatis sessilibus, capsu
 rotundis. *Fl. zeyl.* 246.
Melochia corchori folio *Dill. elth.* 221. *t.* 176.
Althæa peregrina, longiore betonicæ folio, flori
 bis perexiguis, capitulis arcte conglomeratis.
 alm. 25. *t.* 44. *f.* 5.
Tsieru uren. *Rheed. mal.* 9. *p.* 143. *t.* 73.
Habitat in India. ☉
Pl. *duriuscula, diffusa, Ramis scabris, virgatis,*
 subcordata, obtusiuscula, nuda, plicata, sublobat
 rata. Flores *capitati, sessiles, terminales.* C
 dilute purpurascentes fundo flavo.

supina. 6. MELOCHIA floribus capitatis, foliis ovatis s
 caulibus procumbentibus.
Alcea supina pusilla, geranii exigui maritimi foli
 cie, maderaspatensis, fructu in summo caule
 rato, pericarpio duro. *Pluk. alm.* 14. *t.* 19

Habitat in India.

DECANDRIA.

CONNARUS.

monocarpos 1. CONNARUS. *Fl. zeyl.* 248. *
Rhus zeylonicus trifoliatus, phaseoli facie, floril
 piosis spicatis. *Burm. zeyl.* 199. *t.* 89.
Phaseolus arborescens zeylanicus monocarpos.
 Suppl. 438.
Habitat in India. ♄

HUGONIA.

Mystax. 1. HUGONIA spinis oppositis revolutis. *Fl. ze*
Ægoceratos arbor zeylanica, lauri fructu, cort
 stum olente. *Raj. dendr.* 45

My

...yllax frutex baccifer malabaricus, fructu calyculato rotundo monopyreno. *Raj. hist.* 1570.
...dira canni. *Rheed. mal.* 2. *p.* 29. *t.* 19.
...itat *in* India.

GERANIUM.

Staminibus 7. *fertilibus: pedunculis umbelliferis;*
a Fruticosa.

fulgidum. ...RANIUM calycibus monophyllis, foliis tripartitis incisis: intermedia majore, umbellis geminis, caule fruticoso carnoso. *Vir. cliff.* 67. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 353. *Burm. ger.* 52.
...anium africanum, folio alceæ, flore coccineo fulgidissimo. *Dill. elth.* 156. *t.* 130. *f.* 137.
...anium surinamense, chelidonii folio, flore coccineo, petalis æqualibus. *Till. pis.* 68. *t.* 26.
...itat *in* Æthiopia. ♄

inquinans. ...RANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis, caule fruticoso. *Hort. upf.* 195. *Burm. ger.* 46.
...anium calycibus monophyllis, foliis florentibus erectis, foliis subcordatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.
...anium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo. *Dill. elth.* 151. *t.* 125. *f.* 151, 152.
...anium africanum arborescens, malvæ folio plano lucido, flore elegantissimo kermesino. *Mart. cent.* 3. *f.* 3.
...itat *in* Africa. ♄
...ia *digitis tacta inquinant colore ferrugineo.*

papilionaceum. ...RANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: alis carinaque minutis, foliis angulatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 345. *Hort. upf.* 197. *Roy. lugdb.* 353. *Burm. ger.* 49.
...anium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato. *Dill. elth.* 124. *t.* 128. *f.* 155.
...anium africanum arborescens, malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis. *Mart. cent.* 15. *t.* 15.
...at *in* Africa. ♄
...a 3 *inferiora calycinis foliolis minora sunt; superiora retusa.*

etulinum. 4. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis ovatis æqualiter ferratis planis, caule fruticofo. *Burm. ger.*
Geranium frutefcens, folio fubrotundo dentato, flore purpureo. *Burm. afr.* 92. *t.* 33. *f.* 2.
Geranium frutefcens, folio lato dentato, flore ma rubente. *Burm. afr.* 92. *t.* 33. *f.* 1.
Geranium fruticofum, betulæ folio, africanum. *fuppl.* 513.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

fcabrum 5. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cunei-mi-trifidis multifidisve fcabris, caule fruticofo. *Am. acad.* 4. *p.* 281.* *Burm. ger.* 39. *f.* 39.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

ucullatum. 6. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cuc tis dentatis, caule fruticofo. *Hort. cliff.* 345. *upf.* 196. *Roy. lugdb.* 353. *Burm. ger.* 42.
Geranium africanum arborefcens, foliis cucullatis gulofis. *Dill. elth.* 155. *t.* 129. *f.* 156.
Geranium africanum arborefcens, ibifci folio rotu carlinæ odore. *Herm. lugdb.* 274. *t.* 275. *Seb.* *t.* 26. *f.* 2.
Geranium africanum arborefcens, ibifci folio ang fo, floribus amplis purpureis. *Mart. cent.* 28. *t.*
Habitat in Africa. ♄.

gibbofum. 7. GERANIUM calycibus monophyllis, caule fruti geniculis carnofis gibbofis, foliis fubpinnatis op tis. *Burm. ger.* 50.
Geranium calycibus monophyllis, geniculis nodofis liis duplicato-pinnatifidis. *Hort. upf.* 345. *Roy. lugdb.*
Geranium calycibus monophyllis, caule carnofo no fo: internodiis filiformibus, foliis lobato-pinnatifi *Roy. lugdb.* 354.
Geranium africanum noctu olens tuberofum & no fum, aquilegiæ foliis. *Herm. lugdb.* 284. *t.* 285. *bot.* 111. *t.* 111. *Burm. afric. t.* 37. *f.* 2.
Habitat in Africa. ♄

carnofum. 8. GERANIUM calycibus monophyllis, caule frutico fo: articulis carnofo-gibbofis, foliis pinnatifidis la niatis, petalis linearibus. *Amæn. acad.* 281. * *Bu ger.* 51.
Geranium africanum carnofum, petalis anguftis al cantibus. *Dill. elth.* 153. *t.* 127. *f* 154.
Habitat in Æthiopia. ♄

9. GE-

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis quinque-lobis integerrimis glabris peltatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352. *Burm. ger.* 48. *Mill. dict. t.* 140. — peltatum.

Geranium africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriæ maculatis splendentibus & acetosæ sapore. *Comm. præl.* 52. *t.* 2.

Habitat in Africa. ♄

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis glabris obovatis carnosis crenatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352. *Burm. ger.* 47. — acetosum.

Geranium africanum frutescens, folio crasso & glauco, acetosæ sapore. *Comm. præl.* 54. *t.* 4.

Habitat in Africa. ♄

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato orbiculatis incisis zona notatis, caule fruticoso. *Hort. upsf.* 196. *Burm. ger.* 43. — zonale.

Geranium africanum arborescens, alchemillæ hirsuto folio, floribus rubicundis. *Comm. præl.* 51. *t.* 1.

Habitat in Africa. ♄

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus, caule fruticoso. *Hort. upsf.* 196. *Burm. ger.* 40. — vitifolium.

Geranium africanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth.* 152. *t.* 126. *f.* 153.

Habitat in Africa. ♄

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis, caule fruticoso. *Hort. upsf.* 196. *Burm. ger.* 41. — capitatum.

Geranium calycibus monophyllis, floribus capitatis, foliis cordatis lobatis crenatis pilosis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.

Geranium africanum frutescens, malvæ folio laciniato odorato. *Herm. lugdb.* 277. *t.* 278.

Habitat in Africa. ♄

β. Herbacea.

GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordatis sublobatis crenato-dentatis glabris subciliatis, caule subherbaceo. — tabulare.

Geranium calycibus monophyllis, foliis peltatis rotundis angulosis dentatis glabris, caule fruticoso. *Burm. ger.* 44. *t.* 1. *f.* 44.

Geranium africanum, hederæ arboreæ folio, flore pu-
purpureo. *Raj. suppl.* 514.
Geranium africanum, floribus rubellis, foliis gla-
cordiformibus serratis circulo purpureo inscrip-
Raj. suppl. 514.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Caules *prostrati, strigosi s. hispidi; superiore parte*
nui. Folia *Alchemillæ, reniformi-cordata, subl.*
denticulata, nuda, ad marginem hirta, umbilico
tracto purpurascente. Pedunculi *longissimi*,
Flores *purpurei; distincta planta a G. zonali.*

alchimilloides. 15. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis c-
culatis palmatis incisis pilosis, caule herbaceo. *Vir.*
345. *Hort. upſ.* 197.* *Roy. lugdb.* 354. *Burm. ger.*
Geranium calycibus monophyllis longissimis sessili-
fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. *Hort.*
345.
Geranium africanum, alchimillæ hirsuto folio, flo-
albidis. *Herm. lugdb.* 282. *t.* 283. *Stiss. bot.* 107. *t.*
Habitat in Africa. ♃

odoratissimum. 16. GERANIUM calycibus monophyllis, caule c-
so brevissimo, ramis herbaceis longis, foliis cor-
Hort. cliff. 345. *Roy. lugdb.* 354. *Burm. ger.* 45.
Geranium africanum humile, folio fragrantissimo
li. *Dill. elth.* 157. *t.* 131. *f.* 138.
Habitat in Africa. ♃

alceoides. 17. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis te-
tis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto.
Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaph-
lis, foliis lyrato-multifidis, cotyledonibus lob-
Burm. ger. 36.
Geranium africanum hirsutum, uvæ crispæ folio la-
niato, flore duabus maculis purpureis. *Raj. suppl.*
Geranium folio alceæ tenuiter laciniato. *Mart.*
16. *t.* 16.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Statura *G. grossularioides, sed quadruplo majus &*
losum, nec glabrum. Folia *Chelidonii laciniati,*
nata, profunde trifida & laciniata. Calyces *bre-*
tubo hirto. Flores *similes.*

grossularioides. 18. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cor-
tis subrotundis lobatis crenatis, caule herbaceo la-
Burm. ger. 53.

Gera-

Geranium pedunculis bifloris, foliis cordatis incisis glabris, caulibus filiformibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 351.

Geranium africanum, uvæ crispæ folio, calyculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis. *Herm. lugdb.* 287. *t.* 289.

Habitat in Africa. ♃

Caules *filiformes, procumbentes.* Folia *cordata, glabra, incisa.* Pedunculi *calycibus monophyllis. Planta tota glabra est.*

althæoides. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato-ovatis plicatis sinuatis crenatis, caule herbaceo prostrato. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 354. *Burm. ger.* 54.

Geranium, folio althææ, africanum, odore melissæ. *Bærh. lugdb.* 1. *p.* 263.

Habitat in Africa. ♃

coriandrifolium. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis bipinnatis linearibus squarrosis, caule herbaceo læviusculo.

Geranium foliis coriandri. *Riv. pent. t.* 106.

~~Geranium africanum, coriandri. *Riv. pent. t.* 106.~~

Geranium africanum, coriandri folio, floribus incarnatis, minus. *Herm. lugdb.* 279. *t.* 280.

Habitat in Æthiopia. ⊙

myrrhifolium. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis bipinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calycibus strigosis. *L. Burm. ger.* 59.

Geranium africanum, betonicæ folio laciniato & maculato, floribus incarnatis. *Herm. lugdb.* 279. *t.* 281.

Geranium africanum tuberosum, anemones folio, flore incarnato. *Herm. par.* 179. *t.* 178.

Geranium æthiopicum, myrrhidis folio 3, flore magno striato. *Breyn. cent.* 129. *t.* 59.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

Calyces adspersi pilis pellucidis subulatis nitentibus.

prolificum. GERANIUM calycibus monophyllis, scapis radicalibus, umbella composita.

Geranium africanum, myrrhidis folio, flore albicante, radice rapacea. *Comm. hort.* 2. *p.* 125. *t.* 63.

proliferum. Geranium calycibus monophyllis, foliis pinnatim divisis, foliis tri- & quinquepartitis linearibus, radice turbinata. *Burm. ger.* 70.

pinnatum. γ. Geranium calycibus monophyllis, foliis pinnatis: foliolis ovatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 677. *Burm. ger.* 66.
Geranium africanum, astragali folio. *Comm. præl.* t. 3.

auritum. δ. Geranium calycibus monophyllis, foliis oblongis integris tripartitisque, pedunculis radicalibus. *Sp.* 679. *Burm. ger.* 61.
Geranium africanum, foliis plerumque auritis, floribus ex rubro purpurascentibus. *Comm. hort.* 2. *p.* 12. t. 61.

longifolium. ε. Geranium calycibus monophyllis, foliis simplicibus oblongo lanceolatis, radice tuberosa. *Burm. ger.* f. 67.

oxaloides. ζ. Geranium calycibus monophyllis, foliis ovato-lanceolatis carnosis radice rapacea. *Burm. ger.* 71. *f.* 71.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

lobatum. 23. GERANIUM calycibus monophyllis, caule truncato, scapis subradicalibus, umbella composita.
Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda, foliis lobatis crenatis hirsutis. *Roy. lugdb.* 352. *Burm. ger.* 58.
Geranium africanum noctu olens tuberosum, vitis foliis hirsutis. *Comm. hort.* 2. *p.* 126. *t.* 62.

hirsutum. β. Geranium calycibus monophyllis, foliis ovatis laciniatis rugosis, radice turbinata. *Burm. ger.* 68. *f.*

pinnatifidum γ. Geranium calycibus monophyllis, foliis duplicato pinnatifidis: laciniis linearibus obtusis, radice turbinata. *Burm. ger.* 69. *f.* 69.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

triste. 24. GERANIUM calycibus monophyllis sessilibus, scapis bifidis monophyllis.
Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda. *Hort. cliff.* 344. *Hort. upf.* 197; foliis pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 352. *Burm. ger.* 57.
Geranium triste. *Corn. can.* 109. *t.* 110.
Geranium noctu olens æthiopicum, radice tuberosa foliis myrrhidis latioribus at angustioribus. *Breyn. cent.* 126. *t.* 58.
Habitat ad Cap. b Spei. ♃
Folia *ad radicem diversa latiora & angustiora.* Petala *tristi colore viridi-luteo-pallida, omnibus maculis rufa excepto solo margine eorum.*

* * Sta-

* * *Staminibus quinque fertilibus.*

GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, scapis radicalibus. L. *Burm. ger.* 30. romanum.

Geranium myrrhinum tenuifolium, amplo flore purpureo. *Barr. rar.* 568. *t.* 1245.

Habitat Romæ *in plateis.* ♃

Simillimum G. cicutario, sed Caules nulli; nullæ maculæ in basi petalorum.

GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis. *Hort. cliff.* 314. *Fl. svec.* 579; 625. *Mat. med.* 337. *Roy. lugdb.* 352. *Hall. helv.* 369. *Dalib. parif.* 208. *Burm. ger.* 33. cicutarium

Geranium, cicutæ folio, minus & supinum. *Bauh. pin.* 319.

Geranium supinum. *Dod. pempt.* 63.

Habitat in Europæ *sterilibus cultis.* ☉

GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. L. *Burm. ger.* 29. moschatum

Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319.

Habitat in Oriente. ☉

Simillimum G. cicutario & caulescens; herba ambrosiaca.

GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis incisis: superioribus lyrato-pinnatifidis. L. *Burm. ger.* 35. chium.

Geranium chium vernum, caryophyllatæ folio. *Tournef. cor.* 20. *Mart. cent.* 4. *t.* 4.

Habitat in Chio. ☉

Cotyledones cordati, integri, retusi, regulares, nec oblique cordati ut G. gruino & ciconio. Caules G. cicutario majores. Macula nulla ad basin petalorum superiorum.

GERANIUM pedunculis submultifloris, floribus pentandris, foliis cordatis incisis crenatis scabris, caulibus procumbentibus. maritimum

Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis crenato-incisis obtusis, caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 451.

Geranium minimum procumbens, folio betonicæ. *Moris. hist.* 2. *p.* 512. *s.* 5. *t.* 35. *f.* 10.

Geranium pusillum maritimum, althææ f. betonicæ folio. *Pluk. phyt.* 31. *f.* 4.
Habitat in Angliæ *maritimis.*
Flores sæpe petalis mutilati; umbella sæpe foliosa.

malacoides. 30. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. *Hort. cliff.* 3.. *Hort. upf.* 198. *Roy. lugdb.* 352. *Sauv. monsp.* 1.. *Burm. ger.* 34.
Geranium folio althææ. *Bauh. pin.* 318.
Geranium malacoides. *Lob. ic.* 662.
Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis ... nato incisis obtusis, caulibus procumbentibus. *R.. lugdb.* 391.
Habitat in Italiæ, G. narbonensis, Angliæ *maritimis.*

glaucophyllon. 31. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis ovatis serratis incanis lineatis.
Geranium ægypticum glaucophyllon, rostris longissimis plumosis. *Dill. elth.* 150. *t.* 124. *f.* 150.
Geranium pusillum argenteum, heliotropii minoris folio. *Shaw. afr.* 260. *t.* 260.
β. Geranium glaucum. *Burm. ger.* 62. *f.* 62.
Habitat in Ægypto.

arduinum. 32. GERANIUM pedunculis submultifloris, floribus pentandris foliis cordatis quinquelobis, scapis radicalibus.
Habitat ad Cap. b. Spei. *Burmannus.* ♃
Folia cordata, 5-loba, crenata, obtusa; subtus scabra. Scapi radicales. Caules nulli.

gruinum. 33. GERANIUM pedunculis submultifloris, floribus pentandris, foliis ternatis lobatis. *Burm. ger.* 3..
Geranium pedunculis multifloris pentandris. *Hort. cliff.* 498. *Hort. upf.* 198. *γ.*
Geranium pedunculis bifloris pentandris, radice annua. *Vir. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 352.
Geranium latifolium, acu longissima. *Bauh. pin.* 31..
Geranium speciosum annuum, longissimis rostris creticum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 479.
Habitat in Creta. ☉

ciconium. 34. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtusis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 282. * *Burm. ger.* 28.

Gera-

…anium cicutæ folio, acu longissima. *Bauh. pin.* 139. *prodr.* 138.
…ranium apulum coriandrifolium. *Col. ecphr.* 1. *p.* 136. *t.* 135.
…itat Monspelii, *inque* Vallesia, Italia. ☉

* * *Staminibus decem fertilibus. a Perennia.*

…ERANIUM pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis linearibus subdivisis obtusis. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Burm. ger.* 9. — tuberosum.
…anium tuberosum majus. *Bauh. pin.* 318.
…nium bulbosum. *Lob. hist.* 377.
…itat *in* Anglia, Italia. ♃

…RANIUM pedunculis bifloris, calycibus inflatis, …illo longissimo. *Hort. cliff.* 343. * *Roy. lugdb.* 350. …rm. *ger.* 10. — macrorrhizum.
…nium batrachioides odoratum. *Bauh. pin.* 318. *Mor. hist.* 2. *p.* 514. *s.* 4. *t.* 16. *f.* 15.
…anium batrachioides longius radicatum odoratum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 477.
…itat *in* Italia. ♃

…ERANIUM pedunculis bifloris foliisque alternis, …lycibus subaristatis, caule erecto petalis undula…is. *Burm. ger.* 11. *Jacq. vind.* 122. — phæum.
…anium pedunculis bifloris alternatim cauli integro …perne nudiusculo insidentibus. *Hort. cliff.* 343. * …ort. *upsf.* 198. *Roy. lugdb.* 350.
…nium montanum fuscum. *Bauh. pin.* 318.
…nium batrachioides hirsutum, flore atro-ruben…. *Bauh. pin.* 318.
…nium 1. pullo flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 99.
…itat *in Alpibus* Pannonicis, Helveticis, Styriacis. ♃

…ERANIUM pedunculis bifloris, foliis caulinis tri…bis integris serratis: summis subsessilibus. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Burm. ger.* 7. — nodosum.
…nium nodosum. *Bauh. pin.* 318.
…nium 5, 6, plateau. *Clus. hist.* 2. *p.* 101.
…itat *in* Delphinatu. ♃

…ANIUM pedunculis bifloris altero breviore, fo… quinquelobis: lobis medio dilatatis, petalis bilobis …so-reticulatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 282. *Burm. ger.* 6. — striatum.

Geranium romanum verficolor f. ftriatum. *Park. p* 229. *Morif. hift.* 2. *p.* 516. *f.* 5. *t.* 10. *f.* 24. *hift.* 1063.
Habitat in Italia. ♃
Folia macula fufca ad finus in pagina fuperiore.

ylvaticum. 40. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis fubpel quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto, pe emarginatis. *Fl. lapp.* 266. *Fl. fvec.* 572; 617. *cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351. *Burm. ger.* 12.
Geranium batrachioides, folio aconiti. *Bauh. pin.*
Geranium 2. batrachioides minus. *Cluf. hift.* 2. *p.* 9
Habitat in Europæ *borealis fylvis.* ♃

paluftre. 41. GERANIUM pedunculis bifloris longiffimis d natis, foliis quinquelobis incifis, petalis int *Amæn. acad.* 4. *p.* 323. *Burm. ger.* 13.
Geranium fanguineum majus. *Befl. eyft. vern.* 1. *f.* 2.
Geranium batrachioides paluftre, flore fanguineo. *app.* 55. *elth.* 160. *t.* 134. *f.* 161. *Hall. opufc.* 10
Habitat in Ruffia, Germania. ♃
Simile G. fylvatico, fed Petala integra; pedunculi lo pedicelli ante florefcentiam recurvati, poft flore tiam declinati.

pratenfe. 42. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis fubpel multipartitis pinnato-laciniatis rugofis acutis, pe integris. *Hort. cliff.* 344; *Fl. fvec.* 573. 618. *lugdb.* 350. *Hall. helv.* 367. *Burm. ger.* 16.
Geranium batrachioides, Gratia dei germanorum. *B pin.* 318.
Geranium 3. batrachioides majus. *Cluf. hift.* 2. *p.*
Habitat in Europæ *borealis pratis.* ♃

argenteum. 43. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis fubpel feptempartitis trifidis tomentofo-fericeis, pet emarginatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 324. *Burm. ger.*
Geranium argenteum alpinum. *Bauh. pin.* 318. *P phyt.* 186. *f.* 3. longius radicatum. *Pon. bald.* 3 *t.* 342. *Segu. ver.* 1. *p.* 471. *t.* 10.
Geranium argenteum montis baldi. *Bauh. hift.* 3 474.
Habitat in Baldi *fummis rupibus.* ♃

44. GE

GERANIUM pedunculis bifloris, caule dichotomo erecto, foliis quinquepartitis incisis: summis sessilibus. *Gron. virg.* 101. *Burm. ger.* 17. maculatum
Geranium batrachioides americanum maculatum, floribus obsolete cæruleis. *Dill. elth.* 158. *t.* 132. *f.* 159.
Habitat in Carolina, Virginia, Sibiria. ♃

β. Annua

GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Burm. ger.* 18. robertianum.
Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-trive partitis, lobis pinnatifidis, calycibus hirsutis. *Hort. cliff.* 344. *Fl. svec.* 578; 619. *Mat. med.* 336. *Dalib. paris.* 207. *Roy. lugdb.* 351.
Geranium robertianum primum. *Bauh. pin.* 319.
Geranium 3. *Fuchs. hist.* 206.
Habitat in Europæ borealis rupibus. ♂
Calyx *pilosus, decem-carinatus, ex foliolis* 1 & 3 *exterioribus tricarinatis;* 2 & 5 *unicarinatis;* 4 *bicarinato.* Petala *integra.*

GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis elevato-rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *It. gotl.* 228.* *Fl. svec.* 574; 620. *Dalib. paris.* 208. *Sauv. monsp.* 207. *Burm. ger.* 19. lucidum.
Geranium lucidum saxatile. *Bauh. pin.* 318.
Geranium saxatile. *Thal. herc.* 44. *t.* 5.
Geranium rotundifolium saxatile montanum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 138. *t.* 137.
Habitat in Europæ rupibus umbrosis. ☉

GERANIUM pedunculis bifloris, petalis emarginatis, arillis hirtis, cotyledonibus trifidis medio truncatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 323.* *Burm. ger.* 14. bohemicum
Geranium batrachioides bohemicum, capsulis nigris hirsutis. *Dill. elth.* 159. *t.* 133. *f.* 160.
Geranium bohemicum batrachioides annuum. *Raj. hist.* 1063.
Geranium batrachioides minus annuum purpureo-cæruleum. *Moris. præl.* 267. *hist.* 2. *p.* 511. *f.* 5. *t.* 15. *f.* 1. *mala.*
Habitat in Bohemia? ☉
Petala calyce majora. Calyces aristati.

GERANIUM pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, caule ramoso erectiusculo, calycibus muticis, arillis lævibus. *Burm. ger.* 21. molle.

Gera-

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis rotundatis: laciniis obtusiusculis, capsulis hirsutis. *Fl. svec.* 577; 624. *Dalib. paris.* 206.
Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus semiquinquefidis mollibus & latissimis. *Hall.* helv. 366. * *Sauv. monsp* 207.
Geranium columbinum minus, majori flore & foliis bifidis. *Magn. monsp.*
Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. paris.* 79. *t.* 15. *f.* 3.
Habitat in Europa *ad plateas.* ⊙
Petala semibifida. Calyces submutici, corolla breviores. Pedicelli declinati.

dissectum. 49. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 282.* *Burm.* ger. 15. *Fl. svec.* 2. *n.* 622.
Geranium majus, foliis imis longis ad usque pediculum divisis. *Moris. hist.* 2. *p.* 511. *s.* 5. *t.* 3. *f.* Vaill. *paris. t.* 15. *f.* 2.
Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculis brevioribus, caule erecto. *Hall. helv.* 366.
Habitat in Europa *australiore.* ⊙
Calyces aristati. Pistillum villosum. Petala *sanguinea bifida calyce non longiora.* Stipulæ *colorata.*

carolinianum. 50. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus aristatis, foliis multifidis, arillis hirsutis. *Roy. lugdb.* 351. *Gron. virg.* 100. *Burm. ger.* 24.
Geranium columbinum carolinum, capsulis nigris hirsutis. *Dill. elth.* 162. *t.* 135. *f.* 162.
Habitat in Carolina, Virginia. ⊙
Petala emarginata. Calyces villosi aristati maturi rubri. Arilli villosi atri.

columbinum. 51. GERANIUM pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis: laciniis acutis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Fl. svec.* 576; 6[illegible] *Dalib. paris.* 207. *Burm. ger.* 22.
Geranium columbinum, foliis dissectis, pediculis florum longissimis. *Vaill. paris.* 79. *t.* 15. *f.* 4.
GERANIUM foliis ad nervum quinquefidis, pediculo longissimo, caule prostrato. *Hall. helv.* 367.
Habitat in Gallia, Helvetia, Germania.
Pedunculi *foliis longiores.* Calyces *maxime aristati.*

52. GE

GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus arista-tis, petalis integris, arillis hirsutis, foliis subdigi-tatis pinnatifidis. *Amœn. acad. 6. afr. 26.** — incanum.
[Ger]anium pedunculis bifloris, foliis multipartitis: la-[ci]niis linearibus. *Roy. lugdb.* 331. *Burm. ger.* 26. *t.* 26.
[Ger]anium africanum tenuifolium robertiani divisuris. *Pluk. phyt.* 186. *f.* 4.
[Hab]itat *ad* Cap. b. Spei.
[Fo]lia *Potentillæ argenteæ, subtus tomentosa.*

GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris [o]btusissimis longitudine calycis, caule prostrato, [fo]liis reniformibus incisis. *Burm. ger.* 20. — rotundifolium.
[Ger]anium pedunculis bifloris, foliis subrotundis mul-[tifi]dis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 344. *Fl. svec.* [5]75; 621. *Roy. lugdb.* 351. *Hall. helv.* 365. *Dalib. [pa]ris.* 206.
[Ger]anium folio malvæ rotundo. *Bauh. pin.* 318.
[Ger]anium alterum. *Fuchs. hist.* 205.
[Ger]anium columbinum majus, flore minore cæruleo. *Vaill. paris.* 79. *t.* 15. *f.* 1.
[Hab]itat *in* Europæ *cultis.* ☉
[Peta]la *integra obtusa incarnata. Calyces mucronati. Planta subviscosa.*

GERANIUM pedunculis bifloris, petalis bifidis, [ca]ule diffuso, foliis reniformibus palmatis lineari-[bu]s acutis. *Burm. ger.* 23. — pusillum.
[Ger]anium columbinum humile, flore cæruleo mini-[m]o. *Raj. angl.* 3. *p.* 359. *t.* 16. *f.* 2.
[Ger]anium columbinum tenuius laciniatum. *Bauh. pin.* [31]8. *prodr.* 138.
[Hab]itat *in* Anglia, Gallia. ☉
[Simi]le *G. rotundifolio, sed minus. Foliorum segmenta [a]cuta, nec obtusa. Petala bifida, cærulea. Calyces [mu]tici.*

* * * * *Uniflori.*

GERANIUM pedunculis subunifloris, foliis quin-[que]partitis acutis: foliolis pinnatifidis. *Burm. ger.* 3. — sibiricum.
[Habita]t *in* Sibiria. ♃
[Caule]s *pedales, diffusi, divaricati.* Folia *quinquepartita: [foliola] pinnatifidis. Pedunculus e singula bifurcatura.*

Caulis

Caulis *longus, uniflorus, in medio geniculatus brac* *2. oppositis, subulatis.* Corolla *alba striis purpur* *petalis vix emarginatis.* Calyx *5-phyllus, arista* Arillis *subvillosis.*

sanguineum 56. GERANIUM pedunculis unifloris, foliis quinq partitis trifidis orbiculatis. *Burm. ger.* 3.
Geranium pedunculis simplicibus unifloris. *Hort. c* 343. *Fl. svec.* 571; 616; *Roy. lugdb.* 350. *h* *helv.* 365. *Dalib. paris.* 206.
Geranium sanguineum, maximo flore. *Bauh. pin.*
Geranium VII. hæmatodes. *Clus. hist.* 2. *p.* 202.
β. Geranium hæmatodes lancastriense, flore eleganter st to. *Dill. elth.* 163. *t.* 136. *f.* 163.
Habitat in Europæ *pratis siccis umbrosis.* ♃

grandiflorum. 57. GERANIUM pedunculis simplicibus unifloris, liis tripartito-multifidis linearibus tomentosis. *Bu* *ger.* 1.
Geranium frutescens incanum, flore magno luteo di tato. *Burm. afric.* 88. *t.* 34. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♃

ENDECANDRIA.

BROWNÆA.

coccinea. 1. BROWNÆA. *Jacq. amer.* 26. *hist. t.* 121.
Harmesias Rosa de monte. *Læfl. it.* 278. *
Habitat in America *meridionali.* ♄

DODECANDRIA.

PENTAPETES.

phœnicea. 1. PENTAPETES foliis hastato-lanceolatis serrat *Mill. dict. t.* 201.
Alcea indica, lucido hastato folio, flore blattariæ ph niceo. *Pluk. phyt.* 255 *f.* 3. *Raj. suppl.* 523.
Alcea fruticosa pentaphylloidis æmula, floribus am nissime rubellis, calyce producto. *Pluk. phyt.* 12 *f.* 4.
Blattaria zeylanica, flore amplo coccineo. *Comm. hor* 1. *p.* 11. *t.* 6.
Flos impius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 288. *t.* 100. *f.* 1.

Sia-

…min. *Rheed. mal.* 10. *p.* 1. *t.* 1.
…bitat *in* India. ⊙
…tyledones *bipartitæ.* Pedunculi *axillares, gemini.* Involucrum *uniflorum, triphyllum, deciduum.* Flores *cernui.* Stamina 15: *inter horum singula tria Filamentum castratum, longitudine corollæ, petaloideum, coloratum.*

…ENTAPETES foliis ovatis repandis. *Amæn. acad.* …1. *p.* 407. suberifolia
…ntapetes. *Fl. zeyl.* 250. *
…erospermadendrum suberis folio anguloso subtus incano, floribus albis. *Amm. act. petr.* 8. *p.* 215. *t.* 14.
…bitat *in* India. ♄

…ENTAPETES foliis cordatis repandis. *Amæn. acad.* …1. *p.* 407. acerifolia.
…rospermadendrum folio aceris, flore fructuque majore. *Am. act. petr.* 8. *p.* 216. *t.* 16; 17.
…bitat *in* India.

POLYANDRIA.

BOMBAX.

…OMBAX floribus pentandris. *Jacq. amer.* 26. pentandrum
…ombax foliis digitatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 220. *Hort. upf.* 148.
…ombax foliis digitatis, brachiis erecto-patentibus. *Brown. jam.* 277.
…ylon caule inermi. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 437.
…ossypium javanense, salicis folio. *Bauh. pin.* 430.
…ophoros javana. *Rumph. amb.* 1. *p.* 194. *t.* 80.
…ja-panjala. *Rheed. mal.* 3. *p.* 59. *t.* 49, 50, 51. *Raj. hist.* 1899.
…bitat *in* Indiis. ♄
…olia 7-9; *tenerior aculeata, adultior vix ac ne vix.*

…OMBAX floribus polyandris, foliis quinatis. *Jacq. amer.* 26. Ceiba.
…ylon foliis digitatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 221. *Hort. upf.* 148.
…n caule aculeato. *Hort. cliff.* 75. *Roy. lugdb.* 437.
…ypium arboreum, caule spinoso. *Bauh. pin.* 430.
…ypium arboreum maximum spinosum, folio digitato, lana sericea grisea. *Sloan. jam.* 159. *hist.* 2. *p.* 72.
Moul-

Moul-elavou. *Rheed. mal.* 3. *p.* 61. *t.* 52. *Raj.* 1899.
Habitat in Indiis. ♄
Arbor caudice aculeato est.

heptaphyllum. 3. BOMBAX floribus polyandris, foliis septenatis. *amer.* 26. †
Habitat in America. ♄
Arbor caudice inermi.

ADANSONIA.

Bahobab. 1. ADANSONIA.
Baobab. *Alp. ægypt.* 66. *t.* 67.
Baobab f. Abavi. *Bauh. hist.* 1. *p.* 110.
Abavo arbor, radice tuberosa. *Bauh. pin.* 434.
Guanabanus scaligeri. *Bauh. hist.* 1. *p.* 109. *Raj.* 1371.
Habitat in Senegal, Ægypto. ♄
Genus & Habitus nimium affinia Bombaci; differt fructificatio tantum farina obducente semina lanæ.

SIDA.

spinosa. 1. SIDA foliis cordato-oblongis serratis, stipulis setaceis, axillis subspinosis. *Hort. upf.* 199. *Fl. z.* 254. *Roy. lugdb.* 349.
Sida foliis cordato-ovatis serratis, capsulis quinis cuspidatis. *Hort. cliff.* 346.
Alcea, carpini folio, americana frutescens, flosculis luteis, semine duplici rostro. *Comm. hort.* 1. *p.* 3.
Althæa carpini folio, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. *t.*
Althæa virginiana bidens, pimpinellæ majoris acuti folio, flosculis minimis luteis. *Pluk. alm.* 25. *t.* 9.
Habitat in India *utraque.* ⊙

alba. 2. SIDA foliis cordatis subrotundis, stipulis setaceis axillis subtrispinosis.
Malva bicornis, sanguisorbæ folio villoso & glab *Dill. elth.* 214. *t.* 171. *f.* 210.
Althæa rostrata coromandeliensis, pimpinellæ majoris lio subrotundo, semine bicorni. *Pluk. alm.* 26. *t.* 9.
Habitat in India. ⊙
Simillima S. spinosæ, sed folia rotunda. Flores albi gmatibus purpureis; Petiolorum apices purpurascen tota demum planta major.

3. SIDA

SIDA foliis lanceolato-rhomboidibus serratis, axillis subbispinosis. *Vir. cliff.* 68. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upsf.* 199. *Fl. zeyl.* 252.* *Gron. virg.* 101 *Roy. lugdb.* 349. Malvinda unicornis, folio rhomboide, perennis. *Dill. elth.* 216. *t.* 172. *f.* 212. — rhombifolia.
Althæa carpini folio, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. *t.* 6. *f.* 2.
Althæa pernambucana, carpini folio, flosculis minimis. *Moris. hist.* 2. *p.* 528. *s.* 5. *t.* 19. *f. ult.* mal.
Habitat in India utraque. ♄. ☉

SIDA foliis orbiculatis plicatis serratis. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upsf.* 200. *Fl. zeyl.* 253.* *Roy. lugdb.* 349. — alnifolia.
Malvinda stellata alnifolia. *Dill. elth.* 215. *t.* 172. *f.* 211.
Habitat in India. ☉

SIDA foliis cuneiformibus retusis serratis subtus tomentosis. — retusa.
Althæa indica, latiori folio cordiformi ad summum sinuato. *Pluk. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 2.
Sagarium. *Rumph. amb.* 6. *p.* 44. *t.* 19.
Habitat in India. ☉
Varietatem *S. alnifoliæ statuit Dillenius, mihi distincta visa est.*

SIDA foliis ovalibus retusis serratis, stipulis linearibus ciliatis, seminibus muricatis. *Amœn. acad.* 5. *p.* 401.* — ciliaris.
Malva minima supina, foliis oblongis serratis, pedunculis unifloris monophyllis, calyce exteriore remoto, foliolis angustissimis ciliatis. *Brown. jam.* 282.
Malva minor supina, betonicæ folio, flore coccineo, seminibus asperis. *Sloan. jam.* 96. *hist.* 1. *p.* 217. *t.* 137. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

SIDA foliis cordatis subangulatis serratis villosis. — cordifolia.
Malva bicornis, ballotes folio molli. *Dill. elth.* 211. *t.* 171. *f.* 209.
Althæa maderaspatana, subrotundo folio molli & acuto, multipilis. *Pluk. alm.* 25. *t.* 131. *f.* 2.
Habitat in India, Cap. b. Spei. ☉
annua. Calyx *simplex.* Seminum *rostra, deci-corolla, in fasciculum longitudine calycis promi-t.* Calyx *pilosus.*

triquetra. 8. SIDA foliis cordatis serratis subtomentosis, ramis triquetris.
Sida *trisulcata*, caule trisulcato. *Jacq. amer.* 26.
Habitat in America *calidiore. D. Jacquin.* ♄
Frutex *tripedalis, ramis subtomentosis, triquetris, teribus sulco obtuso excavatis.* Folia *cordata absque angulis, mollissima, obsolete tomentosa, obtuse serrata, acuminata.* Pedunculi *axillares, uniflori.* Corolla *lutea, basi purpurea.* Stamina *lutea.* Stylus *quinquefidus.*

umbellata. 9. SIDA foliis cordatis subangulatis subtomentosis, floribus umbellatis, capsulis birostratis. *Amæn. acad.* p. 401. *
Sida major assurgens suffruticosa & subvillosa, foliis cordatis subangulatis, capsulis depressis. *Brown. jam.* 281?
Habitat in Jamaica.

jamaicensis. 10. SIDA foliis ovatis serratis tomentosis, floribus axillaribus subpedunculatis, seminibus quinis bicornibus. *Amæn. acad.* 5. *p.* 401. *
Sida humilior foliis ovatis serratis distiche sitis, petiolis & pedunculis brevibus, ramulis floriferis foliatis alaribus. *Brown. jam.* 280.
Habitat in Jamaica.

paniculata. 11. SIDA foliis cordato oblongis acuminatis serratis subtus tomentosis, pedunculis capillaribus longissimis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 401. *
Sida humilior ramosa teres, foliis cordatis serrato-acuminatis, pedunculo simplici unifloro: altero bifloro foliato. *Brown. jam.* 280.
Habitat in Jamaica.

periplocifolia. 12. SIDA foliis oblongis integerrimis, caule paniculato. *Fl. zeyl.* 251. *Loefl. it.* 237.
Sida foliis ovatis lanceolatis, caule paniculato. *Roy. lugdb.* 349.
Sida erecta glabra, foliis cordatis acuminatis integris subtus incanis, pedunculis longissimis tenuissimis. *Brown. jam.* 280.
Abutilon periplocæ acutioris folio, fructu stellato. *Dill. elth.* 4. *t.* 3. *f.* 3.
Alcea orientalis, scammoniæ folio, major, floribus ... *Pluk. alm.* 17. *t.* 74. *f.* 7. β. Si...

Sida foliis subrotundo-cordatis acuminatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 350.
Abutilon amplissimo folio, caule villoso. *Plum. spec.* 2. *ic.* 3.
Habitat in America *calidiore*, Zeylona. ☉. ♄

SIDA foliis cordatis serratis hispidis, pedunculis multifloris terminalibus glomeratis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 402. * — urens.
Sida urticata, foliis cordatis serratis, floribus capitatis, pedunculis communibus alaribus. *Brown. jam.* 280.
Habitat in Jamaica.

SIDA foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus subsolitariis, capsulis septemlocularibus rotundis depressis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 402. * — viscosa.
Sida viscosa & villosa, foliis cordatis acuminatis, petiolis longis, pedunculis tenuibus solitariis. *Brown. jam.* 280.
Althæa populi folio villoso leviter serrato. *Sloan. jam.* 98. *hist.* 1. *p.* 222. *t.* 139. *f.* 4.
Habitat in Jamaica

* * *Multicapsulares.*

SIDA foliis cordatis oblongis indivisis, capsulis multilocularibus longitudine calycis: loculis lanceolatis. — americana.
Abutilon vesicarium, flore luteo, majus. *Plum. ic.* 1. *t.* 2. *mala.*
Habitat in Jamaica.
Folia duplo longiora quam lata, valde tomentosa, serrata, petiolis duplo longiora. Capsulæ *magnitudine S. Abutili*, 12-*loculares*, *tomentosæ*, *loculamentis desinentibus in acumen lanceolatum longitudine ipsius capsulæ*, *minime ad suturam interiorem excisis.* Calyx *tomentosus.* Pedunculus *folio brevior*

SIDA foliis subrotundo-cordatis indivisis, pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus: corniculis bifidis. *Roy. lugdb.* 349. *Hort. cliff.* 346. *Hort. ups.* 198. *Gron. virg.* 78. — Abutilon.
Althæa theophrasti, flore luteo. *Bauh. pin.* 316.
Althæa altera s. Abutilon. *Cam. epit.* 668.
Habitat in Indiis. ☉
Pilus nigri pilosi.

asiatica. 17. SIDA foliis cordatis indivisis, stipulis reflexis, [pe]dunculis longioribus, capsulis multilocularibu[s] [ob]tusis calyce brevioribus. *Amæn. acad.* 4. *p.* 3[..]
Abutilon indicum, flore luteo minore. *Fl. zeyl.* [..]
Alceæ affinis indica Abutilon dicta, flore parvo, [fo]liis mollibus profunde venosis, siliculis lanugi[n..]
Pluk. phyt. 126. *f.* 5.
Habitat in India. ☉

indica. 18. SIDA foliis cordatis sublobatis, stipulis refl[..] pedunculis longioribus, capsulis multilocula[..] scabris calyce longioribus. *Amæn. acad.* 4. *p.* 3[..]
Abutilon indicum. *Comm. hort.* 2. *t.* 1. *Bauh. hist.* 959. *Moris. hist.* 2. *p.* 531. *f.* 5. *t.* 19. *f.* 4.
Althææ theophrasti similis. *Bauh. pin.* 316.
Habitat in India. ☉

occidentalis. 19. SIDA foliis cordatis sublobatis, stipulis patent[..] pedunculis petiolo brevioribus, capsulis mu[ltilo]cularibus pendulis obtusis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 3[..]
Abutilon vesicarium, flore, fructuque majore crispo. *Dill. elth.* 7. *p.* 6. *t.* 6.
Habitat in America. ☉

crispa. 20. SIDA foliis cordatis sublobatis crenatis toment[..] capsulis cernuis inflatis multilocularibus cre[..] repandis. *Læfl. it.* 240.
Abutilon vesicarium crispum, floribus melinis pa[..] *Dill. elth.* 6. *t.* 5. *f.* 5.
Abutilon americanum, fructu subrotundo pendu[..] capsulis vesicariis crispis conflato. *Mart. cent.* 29.
Abutilon aliud vesicarium. *Plum. ic.* 15. *t.* 25.
Habitat in Carolina, Providentia, Bahama.
Capsulæ obtusæ, compressæ, carina hirtæ. Pedunculi [pe]*tiolo breviores.*

cristata. 21. SIDA foliis angulatis: inferioribus cordatis, su[pe]rioribus panduriformibus, capsulis multiloculari[..]
Sida foliis crenatis: inferioribus dentatis obtusis, [su]perioribus acuminatis. *Roy. lugdb.* 349.
Sida foliis cordatis obsolete serratis. *Hort. cliff.* [..]
Abutilon lavateræ flore, fructu cristato. *Dill. elth.* *t.* 2. *f.* 2.
β. Sida foliis inferioribus cordato-angulatis, superio[ri]bus hastatis, petalis integerrimis. *Roy. lugdb.* 3[..] *Hort. upf.* 199.
Habitat in Mexico. ☉

* * * *Involucratæ.*

SIDA capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris. *Linn. act. upf.* 1743. *p.* 137. *t.* 2. capitata.
Sida hirta assurgens, foliis angulato-cordatis obtuse lobatis dentatis, floribus conglobatis, capitulis foliolatis, pedunculis validis alaribus. *Brown. jam.* 281.
Malva caule erecto hispido, foliis erectis crenatis difformibus. *Roy. lugdb.* 357.
Malva frutescens hirsuta, floribus luteis in capitulum congestis. *Plum. spec.* 2. *ic.* 169. *f.* 1.
Malva aspera major aquatica ex hortensium rosarum genere, flore minore luteo, semine aculeato. *Sloan. jam.* 96. *hist.* 1. *p.* 217. *Raj. suppl.* 320.
Habitat in Caribæis, *locis paludosis.* ♃

SIDA capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris, foliis palmatis. † radiata.
Alcea hirsutissima frutescens. *Plum. spec.* 2. *t.* 19.
Habitat in America.
Genere proprio forte hæc & S. capitata jungi possent monente Læflingio.

N A P Æ A.

NAPÆA pedunculis nudis lævibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 18. hermaphrodita.
Sida foliis palmatis: laciniis lanceolato-attenuatis. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upf.* 198. *Roy. lugdb.* 348.
Malva virginiana, ricini folio. *Herm. lugdb.* 22. *t.* 23.
Habitat in Virginia. ♃
Folia cordata, quinqueloba, acuminata, plana. Pedunculi floribus 3. *f.* 4.

NAPÆA pedunculis involucratis angulatis, foliis scabris, floribus dioicis. *Gron. virg.* 102. *Amæn. acad.* 3. *p.* 18. * dioica.
Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, mas. *Ehret. pict.* 8. *f. distincta.*
Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, femina. *Ehret. pict.* 7. *f.* 1.
Althæa magna aceris folio, cortice cannabino, floribus parvis, semina rotatim in summitate caulium, singula singulis cuticulis rostratis cooperta ferens. *Banist. virg.* 1928.
Habitat in Virginia. ♃

Flores *feminæ gaudent etiam staminibus, at anti minimæ, effœtæ & steriles sunt.* Folia *subpeltata ad petiolum usque aperta, 2- s. 7-loba, rugosa.* I res *in capitula digesti.*

A L T H Æ A.

fficinalis. 1. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Hort. c* 348. *Hort. upf.* 204. *Mat. med.* 338. *Roy. lugdb.* : *Dalib. parif.* 210. *Gort. gelr.* 410.
Althæa dioscoridis & plinii. *Bauh. pin.* 315.
Althæa. *Fuchs hist.* 15. *Cam. epit.* 667.
β. Althæa laciniato folio. *Bauh. pin.* 316.
Habitat in Hollandiæ, Angliæ, Galliæ, Sibiriæ *su midis.* ♃

nnabina. 2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superiori digitatis. *Hort. upf.* 205. *Sauv. monfp.* 200. *Jacq. v* 124.
Althæa foliis compositis scabris. *Hort. cliff.* 349. *R lugdb.* 357.
Alcea cannabina. *Bauh. pin.* 316.
Alcea fruticosa, cannabino folio. *Clus. hist.* 2. *p.*
Habitat in Hungaria, Italia, G. Narbonensi, *ad varum margines.* ♃

irsuta. 3. ALTHÆA foliis trifidis piloso-hispidis supra glab *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 357. *Dalib. parif.* 2 *Sauv. monfp.* 200. *Jacq. vind.* 125.
Alcea hirsuta. *Bauh. pin.* 317.
Alcea hirsuta minima, flore cæsio, hispanica. *Barr.* 1169.
Alcea villosa. *Dalech. hist.* 594.
Habitat in Galliæ, Italiæ, Hispaniæ, Austriæ *sepi*
Caules *diffusi, ut tota planta, hirti pilis patulis, Folia supra glabra. Calyx exterior 8-phyllus; i rior longitudine corollæ, acuminatus.* Corolla *in nato-alba, crenulata.*

A L C E A.

ea. 1. ALCEA foliis sinuato-angulosis. *Hort. cliff.* 348. *H upf* 204. *Mat. med.* 349. *Roy. lugdb.* 357.
Malva rosea, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 315.
Malva hortensis. *Dod. pempt.* 652.
Habitat in Oriente. ♂

ALCEA foliis palmatis. *Hort. cliff.* 348. *Hort. upf.* 204. *Roy. lugdb.* 357. — ficifolia.
Malva rofea, folio ficus. *Bauh. pin.* 315.
Malva rofea fimplex peregrina. *Tabern. hift.* 315.
Habitat in Oriente. ♂
Vix fufficienter a præcedente diftincta.

MALVA.

* *Foliis indivifis.*

MALVA foliis cordatis crenatis tomentofis, fpicis oblongis hirtis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 401. * — fpicata.
Althæa fpicata, betonicæ folio villofiffimo. *Sloan. jam.* 97. *hift.* 1. *p.* 218. *t.* 138. *f.* 1.
Malva affurgens fubvillofa, viminibus tenuioribus lentis, floribus feffilibus, fpicis oblongis. *Brown. jam.* 282.
Habitat in Jamaica.

MALVA foliis cordatis crenatis tomentofis, floribus lateralibus congeftis, caule fruticofo. *Fl. zeyl.* 255. * — tomentofa.
Malva foliis cordatis crenatis villofis. *Hort. cliff.* 347. *Roy. lugdb.* 357.
Althæa orientalis bidens, fubrotundis foliis, floribus parvis luteis. *Pluk. amalth.* 11. *t.* 356. *f.* 1 ?
Habitat in India. ♄
Caulis *frutefcens, tomentofus.* Folia *fine lobis cordata, tomentofa.* Calyx *inferior triphyllus.* Seminum *roftra, deciduo flore, breviffima, angulos fructus retufi conftituentia.*

MALVA foliis ovato-oblongis acutis, floribus glomeratis, arillis denis tricufpidatis. *Hort. cliff.* 346. * *Hort. upf.* 201. — coromandeliana.
Althæa coromandeliana, anguftis prælongis foliis, femine bicorni. *Pluk. mant.* 10.
Habitat in America ? ☉
Flores axillares glomerati. Fructus truncatus apice hirtus.

MALVA foliis cordatis obtufis fcabris, floribus feffilibus glomeratis arillis denis muticis crenulatis. — gangetica.
Malva indica, abutili fubrotundo folio, flore luteo fpicato. *Pluk. phyt.* 74. *f.* 6.
Habitat in India. ☉

Soror M. cotomandelianæ, *sed rigidior.* Folia *e obtusissima, serrata, strigosa.* Stipulæ *lineares.* i *ad ramorum apices glomerati, sessiles, lutei.* S *disco retuso, mutica, margine superiore tubercu nutis crenulata.*

americana. 5. MALVA foliis cordatis crenatis, floribus later solitariis, terminalibus spicatis. *Roy. lugdb.* 3.
Althæa americana pumila, flore luteo spicato. . *cent.* 124. *t.* 57.
Habitat in America. ⊙

* * *Foliis angulatis.*

peruviana. 6. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis cis secundis axillaribus, seminibus denticulat
Habitat in Peru. *B. Jussieu.* ⊙
Caulis *erectus, tripedalis, pilis rarioribus sæpius g* Folia *septemlobata, plicata, glabra, venosa, acı rata; petiolis longitudine folii.* Stipulæ *ovato-ı latæ.* Pedunculus *axillaris, nudus, longus. secunda, sursum versa, recurvata ante floresc* Corollæ *parvæ purpureæ.* Semina 10, *supra rata dentibus alternis plurimis.*

limensis. 7. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobati cis secundis axillaribus, seminibus lævibus. *acad.* 4. *p.* 325. *
Habitat in Peru, Lima. ⊙
Soror M. peruvianæ, *sed flores cærulei, nec pu*

bryonifolia. 8. MALVA foliis palmatis scabris, caule tom fruticoso, pedunculis multifloris. *Roy. lugd*
Althæa frutescens, bryoniæ folio. *Bauh. pin.* 316. *p*
Althæa profunde serrato s. dentato folio. *Ba* 2. *p.* 955.
Habitat in Hispania. ♄
Planta belle echinata per discum foliorum.

capensis. 9. MALVA foliis subcordatis laciniatis glabris, arborescente. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 2c
Malva capensis frutescens, grossulariæ folio ı glabro. *Dill. elth.* 208. *t.* 169. *f.* 206.
β. Malva capensis frutescens, grossulariæ folio ı hirsuto. *Dill. elth.* 209. *t.* 169. *f.* 207.
scabrosa. *γ.* Malva caule fruticoso pilis simplicibus, folii tis, floribus erectiusculis, petalis incumber *Amæn. acad.* 4. *p.* 325.

Malva africana frutescens, flore rubro. *Comm. hort.* 2. p. 171. t. 86.
Malva africana frutescens, flore parvo carneo unguiculis atrorubentibus. *Pluk. amalth.* 140. t. 431. f. 5.
Habitat in Æthiopia. ♄
Differt scabrosa γ. pilis foliorum & caulis simplicibus nec compositis, floribus erectiusculis nec cernuis, sed naturalis soror, ut parum referat, utrum distinguatur nec ne.

MALVA caule repente, foliis multifidis. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 201. — **caroliniana.**
Abutilon repens, alceæ foliis, flore helvulo. *Dill. elth.* 5. t. 4. f. 4.
Abutilon carolinianum repens, alceæ foliis, gilvo flore. *Mart. cent.* 34. t. 34.
Habitat in Carolina. ☉

MALVA caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Hort. cliff.* 347. *Fl. svec.* 580; 626. *Mat. med.* 339. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 363. *Gron. virg.* 79. *Dalib. paris.* 209. — **rotundifolia**
Malva sylvestris, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 314.
Malva sylvestris pumila. *Fuchs. hist.* 508.
Habitat in Europæ *ruderatis, viis, plateis.* ☉

MALVA caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis, calycibus glabris patentibus. *Amœn. acad.* 3. p. 416. — **parviflora.**
Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatim genicula ambientibus. *Moris. hist.* 2. p. 521. *Raj. hist.* 598.
Malva tingitana, flore cæruleo, parva. *Pluk. phyt.* 44. f. 2.
Habitat in Barbaria. ☉
Differt a M. rotundifolia: Caule *erectiusculo triplo majore;* Foliis *acutioribus apice peticli adscendente.* Calycibus *glabris, inferiore lineari nec lanceolato.* Floribus *sessilibus.* Calycibus *maturo fructu purpurascentibus.* Arillis *supra rugosis & ad latera dentatis.*

MALVA caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. — **sylvestris.**
Malva caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 347. *Fl. svec.* 581; 627. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 362. *Dalib. paris.* 208.

Malva sylvestris, folio sinuato. *Bauh. pin.* 314.
Malva sylvestris recta. *Cord. hist.* 114.
Habitat in Europæ *campestribus.*
Caulis & petioli hujus villosi; at sequentis Petio latus superius villosum.

mauritiana. 14. MALVA caule erecto herbaceo, foliis quinque tis obtusis, pedunculis petiolisque glabriusc
Malva hederaceo folio. *Bauh. pin.* 315. *Hort. ups.*
Malva major tertia. *Dalech. hist.* 586.
β. Malva folio ficus altera. *Bauh. pin.* 315. *prodr.*
Habitat in Italia, Lusitania, Hispania. ☉
Similis præcedenti. Huic Folia costis 5; illi 7. Hu lyx exterior lanceolatus, illi ovatus. Huic coroll guinea magis, illi cærulescens.

hispanica. 15. MALVA caule erecto, foliis semiorbiculatis c tis, calyce exteriore diphyllo. *Læfl. it.* 157
Malva rotundifolia glabra ex hispania, flore ampl bello. *Pluk. alm.* 238. *t.* 44. *f.* 3.
Habitat in Hispania. ☉
Caules *diffusi, adscendentes, hirti.* Folia *cordato- tunda, vix lobata, crenata.* Stipulæ *lanceolatæ.* dunculi *solitarii, uniflori, folio longiores.* Calyx *rior diphyllus, deficiente tertio interiore foliol Interior 5fidus lobis cordatis s. sinubus promi bus.* Corolla *incarnata.*

verticillata. 16. MALVA caule erecto, foliis angulatis, floribus laribus glomeratis sessilibus, calycibus scabris. *Vi* 356. *Hort. cliff.* 502. *Hort. ups.* 200. *Roy. lugdb.*
Malva sinensis erecta, flosculis albis minimis. *lugdb.* 1. *p.* 268.
Malva annua rotundifolia, floribus omnium mi albis pentaphyllis verticillatim genicula ambien *Moris. hist.* 2. *p.* 521. *Raj. hist.* 598.
Habitat in China. ☉

crispa. 17. MALVA caule erecto, foliis angulatis crispis, bus axillaribus glomeratis.
Malva foliis angulatis crispis, floribus axillaribu meratis. *Hort. cliff.* 347. *Hort. ups.* 200.
Malva foliis crispis. *Bauh. pin.* 315.
Malva crispa. *Dod. pempt.* 653.
Habitat in Syria. ☉

18. MA

MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriuscu-lis. *Hort. cliff.* 347. *Fl. svec.* 582; 628. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 363. *Dalib. paris.* 209. — Alcea.
Alcea vulgaris major. *Bauh. pin.* 316.
Alcea vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 25.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia. ♃

MALVA foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Hort. upsf.* 202. *Fl. svec.* 2. *n.* 629. — moschata.
Malva montana s. Alcea rotundifolia laciniata. *Col. ecphr.* 1. *p.* 148. *t.* 147.
Alcea folio rotundo laciniato. *Bauh. pin.* 316.
Alcea vulgaris minor. *Bauh. pin.* 316.
Habitat in India, Gallia. ♃
Caule hispidæ sunt.

MALVA foliis palmatis dentatis, corollis calyce minoribus. — ægyptia.
Alcea ægyptia, geranii folio. *Lipp. ægypt. mss.*
Habitat in Ægypto.
Habitus *antecedentis, sed tenerior.* Caules *filiformes, debiliores, scabri.* Folia *radicalia quinqueloba, subdentata, obtusa; superiora tripartita, linearia, dentata.* Flores *axillares, solitarii, pedunculis longitudine petiolorum.* Calyx *exterior setis 3; interior latus, semiquinquefidus, acutus.* Corollæ *cærulescentes..*

MALVA foliis radicalibus quinquepartitis trilobis linearibus, pedunculis folio caulino longioribus, caule procumbente. *Amæn. acad.* 4. *p.* 283. * — tournefortiana.
Malva maritima galloprovincialis, geranii folio. *Tournef. inst.* 98.
Malva minor maritima tenuifolia procumbens. *Herm. parad.* 9. *t.* 9.
Malva tenuifolia humilis maritima galloprovincialis, foliis inferioribus ad geranium accedentibus. *Pluk. alm.* 238. *t.* 44. *f.* 4.
Habitat in Galloprovinciæ, Hispaniæ *maritimis.* ☉

MALVA foliis lobatis villosis, caule erecto, calycibus brevissimis, capsulis globosis striatis: loculis polyspermibus. — abutiloides.
Abutilon althæoides, flore carneo, fructu globoso. *Dill. elth.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Providentia, Bahama. ♃

Planta

Planta facie Althææ, alta, distincta a reliquis Pe- piis subglobosis, striatis, loculis minime extus ctis, polyspermibus.

LAVATERA.

* *Caule fruticoso.*

arborea. 1. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangu- bus tomentosis plicatis, pedunculis confertis floris axillaribus. *Hort. ups.* 202.
Lavatera foliis septemangularibus obtusis plicatis losis, caule fruticoso, floribus ad alas conf *Hort. cliff.* 348. *Roy lugdb.* 355.
Malva arborea veneta dicta, parvo flore. *Bauh. pin.*
Malva arborescens. *Dod. pempt.* 653.
Habitat inter Pisas & Liburnum. ♂

micans. 2. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangu- bus acutis crenatis plicatis tomentosis, racemis minalibus. *Roy. lugdb.* 356.
Malva foliis mollibus undulatis: in margine supe micis sulphureis ad solem splendentibus do *Moris. hist.* 1. *p.* 523. *s.* 5. *t.* 17. *f.* 9.
Malva hispanica. *Moris. præl.* 285.
Habitat in Hispania, Lusitania. ♄

olbia. 3. LAVATERA caule fruticoso, foliis quinquelo hastatis, floribus solitariis. *Hort. ups.* 202.
Lavatera foliis quinquangularibus acutis crenatis cinia media productiore. *Hort. cliff.* 348. *Roy. lu* 355.
Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore. *B pin.* 316.
Althæa frutescens, folio acuto virente molli, fl specioso. *Pluk. phyt.* 8. *f.* 1.
Althæa arborea olbia in galloprovincia. *Lob. ic.* 65
Habitat in Olbia *insula* Galloprovinciæ. ♄
Variat *Foliis primi anni maximis, insequentium vero l ge minoribus, quod affinibus commune. Simillima* trilobæ, *sed huic flores solitarii pedunculo brevissi huic Calyx exterior acuminatus, fere tripartitus, lo gitudine interioris.*

triloba. 4. LAVATERA caule fruticoso, foliis subcorda subtrilobis rotundatis crenatis, stipulis cordati pedunculis unifloris aggregatis.

Lava-

... foliis subcordatis emarginatis obsolete trilo- ...enatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. ... lugdb. 355.
... foliis subcordatis trilobis obtusis serratis vil- ... *Hort. cliff.* 347.
... frutescens, folio rotundiore incano. *Bauh. pin.*

... fruticans hispanica, aceris monspessulani in- ... foliis, grandiflora saponem spirans. *Pluk. alm.* ... 8. *f.* 3.
... *in* Hispania. ♄
... *tomentosa: tota pilis minimis glutiniferis, eisque ...tis aliis pilis majoribus apice stellatis.* Pedun- ... *tres pluresve ex alis petiolorum, uniflori.* Flos ... *pallide purpurascens.* Calyx exterior *in fru-* ... *plo longior est.*

...ATERA caule fruticoso, foliis septemangula- ... tomentosis plicatis, racemis terminalibus. ... *lugdb.* 355. † lusitanica.
... frutescens lusitanica, folio ampliore minus in- ... *Tournef. inst.* 97.
... *in* Lusitania, Cap. b. Spei. ♄

...ATERA caule fruticoso, foliis cordatis indivi- ...enatis acuminatis tomentosis, pedunculis foli- ... unifloris. *Amæn. acad.* 4. *p.* 400. * americana.
... *in* Jamaica. ♄

* * *Caule herbaceo.*

...TERA caule herbaceo, fructibus denudatis, ...bus incisis. *Hort. upf.* 203. thuringiaca.
... foliis inferioribus cordato-subrotundis, su- ...ribus lobatis crenatis, calycibus utrinque in- ... caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.
... thuringiaca. *Cam. hort.* 12. *t.* 6.
... thuringiaca grandiflora. *Dill. elth.* 9. *t.* 8. *f.* 8.
... flore majore. *Bauh. pin.* 316.
... *in* Pannonia, Thuringia, Tataria, Suecia, *ad* ... ♄

...ERA caule erecto, ramis inferioribus diffu- ...dunculis confertis unifloris, foliis lobatis ...ribus acutis. *Hort. upf.* 202. * cretica.
...etica annua altissima, flore parvo ad alas ...ito. *Tournef. cor.* 2.

Mal-

Malva annua hirsuta, foliis hederæ instar angu
Moris. hist. 2. *p.* 521. *s.* 5. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Creta. ⊙

trimestris. 9. LAVATERA foliis glabris, caule scabro herb
pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis.
upf. 203.
Lavatera foliis trilobis: lacinia media productiore
le herbaceo. *Hort. cliff.* 348.
Lavatera foliis ovato-lanceolatis: inferne angulat
dunculis unifloris, caule herbaceo. *Roy. lugdb.*
Sauv. monsp. 101.
Malva folio vario. *Bauh. pin.* 315. *prodr.* 137.
β. Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis se
caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.
Habitat in Syria, Hispania, G. Narbonensi.

MALOPE.

Malacoides. 1. MALOPE foliis ovatis crenatis supra glabris.
cliff. 347. *Hort. upf.* 206. *Roy. lugdb.* 357.
Malva betonicæ folio. *Moris. hist.* 2. *p.* 522. *s.* 5.
f. 11. *Bocc. sic.* 15. *t.* 8. *f.* 2.
Alcea betonicæ folio, flore purpureo violaceo. *Ba*
1189.
Habitat in Hetruriæ *pratis* & Mauritania.

URENA.

lobata. 1. URENA foliis angulatis. *Hort. cliff.* 348. *Hort.*
200. *Fl. zeyl.* 256. *Roy. lugdb.* 358.
Urena sinica, xanthii facie. *Dill. elth.* 340. *t.* 3
412.
Trifolio adfinis indiæ orientalis, xanthii facie. *B*
cent. 82. *t.* 35.
Habitat in China. ♄

sinuata. 2. URENA foliis sinuato-palmatis: sinubus obtusis.
zeyl. 257.
Alcea indica frutescens, foliis in lacinias varie diss
Pluk. alm. 15. *t.* 74. *f.* 1.
Alcea indica frutescens. *Pluk. alm.* 15. *t.* 5. *f.* 3. *me*
Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus
cisis, flore solitario. *Burm. zeyl.* 150. *t.* 69. *f.*
Habitat in India. ♄

3. URE

NIA foliis haſtato-ſubcordatis indiviſis ſerratis, procumbens
procumbente.
in Chinæ *monticulis. Osbeck.* ♄
fruteſcens, procumbens, repens, ramoſiſſimus.
magnitudine Origani, ſubcordata, integra nec
, lævia, argute ſerrata. Flores *foliis majores*

GOSSYPIUM.

YPIUM foliis quinquelobis, caule herbaceo herbaceum.
Hort. upſ. 203. *Mat. med.* 341.
ium caule decumbente. *Hort. cliff.* 350. *Roy.*
359.
um fruteſcens, ſemine albo. *Bauh. pin.* 430.
ium. *Cam. epit.* 203. *Rumph. amb.* 4. *p.* 33. *t.* 12.
in America. ☉

YPIUM foliis trilobis integerrimis, ſubtus tri- barbadenſe.
dulofis. *Hort. upſ.* 204.
ium fruteſcens annuum, folio trilobo, barbaden-
Pluk. alm. 172. *t.* 188. *f.* 1.
in Barbados. ♂. ♄
3 *ſub coſtis foliorum, quæ non in præcedente.*

YPIUM foliis palmatis: lobis lanceolatis, cau- arboreum.
ruticoſo.
ium caule erecto. *Hort. cliff.* 350. *Gron. orient.*
Roy. lugdb. 359.
ium latifolium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 37. *t.* 13.
um arboreum, caule lævi. *Bauh. pin.* 430.
um herbaceum f. Xylon maderaſpatenſe, rubi-
flore, pentaphylleum. *Pluk. alm.* 172. *t.* 188.

iti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 55. *t.* 31.
in Indiæ *arenoſis.* ♄

YPIUM foliis trilobis quinquelobisve acutis, hirſutum.
ramoſo hirſuto. *Mill. dict. n.* 4.
mericanum præſtantiſſimum, ſemine vireſcen-
Tournef. inſt. 101.
in America. ☉

HIBISCUS.

US foliis ovatis acuminatis ſerratis, caule ſim- Moſcheutos
no, petiolis floriferis *Hort. upſ.* 205. *Gron. virg.*

Hibi-

Hibiscus foliis ovatis crenatis: angulis lateralibus soletis. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358.
Alcea rosea peregrina, forte Rosa moscheutos *Corn. canad.* 144. *t.* 145. *Moris. hist.* 2. *p.* 53 *t.* 19. *f.* 6.
Habitat in Canada, Virginia. ♃
Flos petiolo insidet uti Turneræ ulmifoliæ.

paluſtris. 2. HIBISCUS caule herbaceo simplicissimo, foliis tis subtrilobis subtus tomentosis, floribus axillaribus
Althæa palustris. *Bauh. pin.* 316. (*ex horto C. B. ferus.*)
Althæa hortensis f. peregrina. *Dod. pempt.* 655.
Habitat in Virginia. *Gronov.* Canada. *Kalm.* ♃
Habitus *H. Moscheutos.* Caules *sesquipedales*, *tomosi*, *annui.* Folia *lato-ovata*, *obtuse serrata*, *via*, *acuminata*, *subtus tomentosa.* Pedunculi *ex lis foliorum superiorum solitarii*, *petiolo longiores niflori*, *non e petiolo enati*, *geniculati.* Flos *max*

populneus. 3. HIBISCUS foliis cordatis integerrimis, caule arboreo calycum exteriore truncato. *Fl. zeyl.* 258. *
Alcea malabariensis, abutili folio, flore majore ex bo flavescente. *Raj. hist.* 1069.
Novella litorea. *Rumph. amb.* 2. *p.* 224. *t.* 74.
Bupariti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 51. *t.* 29.
Habitat in India. ♄
Calyx *exterior monophyllus*, *fere integerrimus*, *omnino indivisus.*

tiliaceus. 4. HIBISCUS foliis cordatis subrotundis indivisis minatis crenatis, caule arboreo, calycum exte re decemcrenato. *Roy. lugdb.* 532. *Fl. zeyl.* 25
Malva arborea maritima, folio subrotundo minori cuminato subtus candido, cortice in funes duc *Sloan. jam.* 93 *hist.* 1. *p.* 215. *t.* 134. *f.* 4.
Alcea malabarica, abutili folio, flore minore ex flavescente exterius aspero. *Raj. hist.* 1070.
Alcea indica sinarum, flore luteo malvaceo. *P amalth.* 6. *p.* 355. *f.* 5.
Althæa maritima arborescens diffusa, foliis orbicul cordatis crenatis subtus cineris. *Brown. jam.* 28
Novella. *Rumph. amb.* 2. *p.* 218. *t.* 73.
Pariti f. Tali-pariti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 53. *t.* 30.
Habitat in India. ♄
Stipulæ ovales, *majusculæ*, *obtusæ.*

5. H

IBISCUS foliis cordatis trilobis repandis integerrimis. — simplex.

lva arborea, folio rotundo, flore liliaceo. *Sloan.* m. 95. *hist.* 1. *p.* 95. *t.* 134. *f.* 1. 2. 3?

itat in Asia. ♄

nta *mihi triennis*, Caule *indiviso*, *recto*, *crassiusculo*. Folia *integerrima*, *cordata*, *triloba*; *obtusiuscula*, *glabra margine inæquali*, *nervis subtus poro mellifero*. Flores *non vidi*.

IBISCUS foliis ovatis acuminatis serratis glabris, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 260.* — Rosa sinensis.

a javanica arborescens, flore pleno rubicundo. *eym. cent.* 121. *t.* 56.

festivalis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 24. *t.* 8.

ru-pariti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 25. *t.* 16.

itat in India. ♄

ISCUS foliis cordatis denticulatis, ramis hirtis, calycibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoso. — brasiliensis.

mia frutescens, mori folio, flore purpureo. *Plum.* c. 1. *ic.* 160. *f.* 1?

itat in Brasilia. ♄

tex *parvus*, *caule*, *ramis*, *petiolis*, *pedunculis*, *calycibus hirtis*. Folia *cordata serrato-dentata*. Stipulæ *subulatæ*. Pedunculi *uniflori*, *foliis longiores*. Calyx exterior 8-*phyllus linearis*, *patens*. Interior *dimidio brevior*. Capsula 5-*cocca*, *non longior calyce interiore*. Facies *H. mutabilis*.

ISCUS foliis lanceolato-ovatis acuminatis serratis, is scabris, caule herbaceo. — hirtus.

fruticosa malabariensis, angustis foliis rigidiusculis, floribus amœne rubellis, semine papposo. *Pluk.* 14. *t.* 254. *f.* 3.

at in India.

ta parva. Caulis & *præsertim Pedunculi*, *nec non* *lia* & *Calyces subtus pilis rigidiusculis hirta*: Folia *lanceolata*, *argute serrata*. Corolla *purpurea*. sulæ *subrotundæ*. *Semina lanata*.

CUS foliis cordato-quinquangularibus obsolete tis, caule arboreo. *Hort. upf.* 205. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 358. *Brown. jam.* 286. *n.* 7. — mutabilis

Althæa arborea Roſa ſinenſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.*
ſ. 5. *t.* 18. *f.* 2.
Roſa ſinenſis. *Ferr. flor.* 493. *t.* 497. *Mer. ſur.* 31.
Flos horarius. *Rumph. amb.* 4. *p.* 27. *t.* 9.
Hina-pariti. *Rheed. mal.* 6. *p.* 66. *t.* 38. 39. 40. 4
Habitat in India. ♄

Malvaviſcus 10. HIBISCUS foliis cordatis crenatis: angulis la
libus extimis parvis, caule arboreo. *Hort.*
349. *Roy. lugdb.* 358.
Hibiſcus fruteſcens, foliis angulatis cordatis acum
tis, petalis ab uno latere auritis. *Brown. jam.*
Malvaviſcus arboreſcens, flore miniato clauſo. *D*
elth. 210. *t.* 170. *f.* 208.
Malva folio hederaceo, flore coccineo. *Plum. ſpe*
ic. 169. *f.* 2.
Alcea indica arborea, folio molli, flore amplo
ganter coccineo. *Pluk. alm.* 14. *t.* 257. *f.* 1.
Habitat in Mexico. ♄

ſpinifex. 11. HIBISCUS foliis cordatis crenatis indiviſis, ca
lis ſpinis exſtantibus.
Abutilon americanum fruticoſum, folio ſubrotun
flore luteo, fructu aculeato majore. *Plum. ſpe*
ic. 1.
Habitat in America *meridionali.* ♄

ſyriacus. 12. HIBISCUS foliis cuneiformi-ovatis: ſuperne
ſo-dentatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 350. *H*
upſ. 205.
Alcea arboreſcens ſyriaca. *Bauh. pin.* 316.
Alcea arboreſcens. *Cam. hort.* *t.* 3. 4.
Habitat in Syria. ♄

ficulneus. 13. HIBISCUS foliis quinquefido-palmatis, caule
leato, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 498. *R*
lugdb. 359. *Fl. zeyl.* 269. *
Ketmia zeylanica, fici folio, perianthio oblongo
tegro. *Dill. elth.* 190. *t.* 157. *f.* 190.
Habitat in Zeylona.

Sabdariffa. 14. HIBISCUS foliis ſerratis: inferioribus ovatis in
viſis; ſuperioribus tripartitis, caule inermi, flo
bus ſeſſilibus.
Hibiſcus inermis, foliis ſerratis: inferioribus ova
integris; ſuperioribus trilobis. *Hort. cliff.* 350. *Fl. ze*
262. *Roy. lugdb.* 359.
Althæ

...a indica, gossypii folio, acetosæ sapore. *Raj.* ... 1900.
...acetosa indica mitis, foliis superioribus gossypii ...modum tripartito-divisis. *Pluk. alm.* 15. *t.* 6. *f.* 2.
...cus inermis, foliis serratis: infimis indivisis; ...diis tripartitis; summis quinquepartitis. *Roy.* ...*b.* 359.
...a indica, magno flore. *Bauh. pin.* 317.
...a americana. *Clus. hist.* 2. *p.* 26.
...*tat in* Indiis. ⊙

...ISCUS foliis serratis: superioribus palmatis ...quepartitis subtus uniglandulosis, caule aculea-...floribus sessilibus. **cannabinus.**

... benghalensis spinosissima, acetosæ sapore, flo-...luteo pallido: umbone purpurascente. *Comm.* ... 1. *p.* 35. *t.* 18.
...a indica, foliis digitatis, flore magno sulphu-...: umbone atro-purpureo, petiolis spinosis. ...*et.* *t.* 6. *f.* 1.
...*it in* India. ⊙

... *quinquepedalis; adspersus aculeis sursum erectis; ...is paucis; simplicibus.* Petioli *patentes, longitu-... foliorum, adspersi subtus aculeis rectis.* Folia *...eriora indivisa ovata; media 3loba; superiora 5-...tito-digitata, inermia nervo medio subtus basi glan-...so.* Calyx *Exterior subulatus, erectus, aculeatus; ...rior hispidus glandula in singulo foliolo.* Fructus *...otundus, pilosus, calyce tectus.*

...ISCUS recurvato-aculeatus, foliis trilobis ca-...ibus exterioribus appendiculatis, stipulis semi-...datis; floribus pedunculatis. **surattensis.**

...-crinium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 46. *t.* 16.
...cus foliis palmato-digitatis quinquepartitis: la-...is lanceolatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 264. *
... spinosa maderaspatana saporis acidi, foliis pro-...de laciniatis, cannabis in modum pentaphyllæa. ... *alm.* 15. *t.* 5. *f.* 4.
...m-poulli. *Rheed. mal.* 6. *p.* 75. *t.* 44.
... *in* India.

... & *statura antecedentis.* Folia *inferiora ovato-...oba, acuta, serrata: superiora hastato-triloba, la-...ere quam longa.* Aculei *recurvi* & *pili recti per caulem, ramos, petiolos, pedunculos.* Stipu-

læ *dimidiato-cordatæ s. paria stipularum cordata.*
lyx *pilis strigosus: exterior valde singularis, cuj*
dii in medio extrorsum aucti foliolo parvo ovato.

Manihot. 17. HIBISCUS foliis palmato-digitatis septenpa
Hort. cliff. 350. *Hort. upf.* 206. *Roy. lugdb.*
Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulph
Dill. elth. 189. *t.* 156. *f.* 189.
Alcea sinica, manihot stellato folio, capsula longa
la pyramidata quinquefariam divisa. *Pluk. am*
p. 355. *f.* 2.
Habitat in Indiis. ♄

Abelmoschus. 18. HIBISCUS foliis subpeltato-cordatis septemang
bus serratis hispidis. *Hort. cliff.* 349. *Hort. up*
Fl. zeyl. 261. * *Mat. med.* 342. *Roy. lugdb.*
Alcea hirsuta, flore flavo, semine moschato. *M*
bras. 45. *t.* 45. *Brown. jam.* 285. *n.* 4.
Alcea ægyptiaca villosa. *Bauh. pin.* 317.
Flos moschatus. *Mer. surin.* 42. *t.* 42.
Granum moschatum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 38. *t.* 15
Cattu-gasturi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 71. *t.* 38.
Habitat in Indiis. ♄

esculentus 19. HIBISCUS foliis quinquepartito-pedatis; caly
interioribus latere rumpentibus.
Alcea americana annua, flore albo (flavo potius),
mo fructu pyramidali sulcato. *Comm. hort.* 1.
t. 19. *Raj. suppl.* 518.
Alcea maxima, malvæ roseæ folio, fructu decago
cto crassiore breviore esculento. *Sloan. jam.*
1. *p.* 223. *t.* 133. *f.* 3. *Brown. jam.* 284. *n.* 3.
Okra. *Kalm. it.* 2. *p.* 209.
Quingambo. *Marcgr. bras.* 31.
Habitat in Indiis. ⊙

clipeatus. 20. HIBISCUS foliis cordatis angulatis, capsulis
natis truncatis hispidis.
Ketmia amplissimo folio angulato, capsulis tr
hispidis. *Plum. spec.* 3. *t.* 160. *f.* 2.
Habitat in America. ⊙

vitifolius. 21. HIBISCUS foliis quinquangularibus acutis se
caule inermi, floribus pendulis. *Fl. zeyl.* 2
Althæa indica, vitis folio, flore amplo flavo per
Herm. lugdb. 26. *t.* 28.

Ka

tou-Beloeren. *Rheed. mal. 6. p. 79. t. 46.*
bitat in India. ☉

IBISCUS foliis cordato-haſtatis, pedunculis alter- zeylonicus.
is, unifloris geniculatis. *Fl. zeyl.* 266. *
bitat in Zeylona. ☉

IBISCUS foliis inferioribus cordatis acuminatis ſer- virginicus.
atis; ſuperioribus haſtatis. *Gron. virg.* 102.
cea ſ. Bamia americana, parvo flore, petalis rotun-
dioribus. *Pluk. phyt.* 6. *f.* 4.
bitat in Virginiæ *paludoſis, ſalſis.* ♃
ulis *viridis, erectus, anguſtior.* Folia *caulina corda-*
o-oblonga, demum haſtata, viridia, ſubtomentoſa, tri-
ervia, tenuiſſime ſerrata. Pedunculi *uniflori: ex alis*
litarii; in ſummitate ſubracemoſi, nudi.

IBISCUS foliis inferioribus cordatis angulatis, ſu- Pentacarpos
perioribus ſubhaſtatis, floribus ſubnutantibus, piſtillo
ernuo.
biſcus foliis cordatis angulatis ſerratis, ſtipulis ſetace-
is divaricatis. *Hort. cliff.* 350. *Roy. lugdb.* 359.
tmia paluſtris, foliis lobatis ſubrotundis inferna parte
molli ſubcinerea lanugine, flore purpureo magno.
Mich. flor. 54. *Tozzet. it.* 2. *p.* 309.
tmia paluſtris minor, folio anguſto, flore parvo pur-
puraſcente, fructu depreſſo pentagono. *Zannich. venet.*
55. *t.* 91.
tat in paludoſis Venetiæ. ♃
ta *antecedenti nimis affinis; ſed fructu parum di-*
rſo; forte a præcedenti orta? Caulis *tripedalis,*
nguſtus. Folia *caulina cordato-oblonga; ſuperiora ha-*
ſtata, viridia, ſubtrinervia, ſubtus tomentoſa, tenuiſ-
ſime ſerrata. Pedunculi *axillares in ſummitate plan-*
tæ. ſolitarii, nudi, petiolo longiores, uniflori. Ca-
lyx *inferior patens, radiis ſubulatis, vix longitudine*
interioris. Corolla *patens, dilute rubra, ſubnutans.*
Stamina *lutea tota; Antheræ ſaturatius.* Stylus *cer-*
nuus cum ſtaminibus, albus; Stigmata 5, *capitata,*
incarnata.

IISCUS foliis tripartitis inciſis, calycibus inflatis. Trionum.
rt. upſ. 206.
um. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 35.
veſicaria. *Bauh. pin.* 317.

Alcea peregrina ſoliſequa. *Lob. ic.* 656.

β. Ketmia veſicaria africana. *Tournef. inſt.* 101.

Alcea veſicaria capitis b. ſpei. *Moriſ. præl.* 2*

2. *p*. 533.

Habitat in Italia, Africa. ⊙

S T E W A R T I A.

Malacodendron. 1. STEWARTIA. *Act. upſ.* 1741. *p*. 79. *t*. 2. *car*. 3. *p*. 13. *t*. 13. *Duham. arb.* 2. *p*. 284. *t*. 78. *virg*. 101.

Malacodendron. *Mitch. gen.* 16.

Habitat in Virginia. ♄

Folia *Ceraſi, acutiſſime ſerrata, ſubtus villoſa.*

C A M E L L I A.

japonica. 1. CAMELLIA.

Tſubakki montanus ſ. ſylveſtris, flore roſeo ſi

Kæmpf. amœn. 850. *t.* 851.

β. Tſubakki hortenſis, flore pleno maximo roſ tenſis. *Kæmpf. amœn.* 852.

Roſa chinenſis. *Edw. av.* 2. *p*. 67. *t*. 67.

Habitat in Japonia, China. ♄

C

Classis XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA.

* *Corollis bicalcaratis.*

FUMARIA scapo nudo. *Hort. cliff.* 351. * *Gron. virg.* 103. *Roy. lugdb.* 393. — Cucullaria.

Fumaria tuberosa insipida. *Corn. canad.* 127.

Fumaria siliquosa, radice grumosa, flore bicorporeo ad labia conjuncto, virginiana. *Pluk. alm.* 162. *t.* 90. *f.* 3. *Raj. suppl.* 475.

Capnorchis americana. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 309.

Bicucullata canadensis, radice tuberosa squamata. *Act. parif.* 1733.

Habitat in Virginia, Canada. ♃

Radix *tuberosa.* Folium *radicale tricompositum.* Scapus *nudus, Racemo simplici; bracteæ vix ullæ;* Nectarium *duplex corollam basi bicornem efficiens.*

FUMARIA floribus postice bilobis, caule folioso. — spectabilis.

Habitat in Sibiria. *D. Demidoff.*

Planta *eximia floribus speciosissimis, maximis.* Habitus *Fumariæ bulbosæ, sed majora omnia.* Rami *ex alis rariores.* Caulis *erectus.* Racemus *absque bracteis.* Corollæ *magnitudine extimi articuli pollicis, postice in duos lobos æquales, rotundatos divisæ.*

* * *Corollis unicalcaratis.*

FUMARIA caule simplici, bracteis longitudine florum. — bulbosa.

Fumaria caule simplicissimo diphyllo, floribus calyce destitutis. *Hort. cliff.* 351. *Vir. cliff.* 70. *Fl. svec.* 585, 631. * *Mat. med* 344. *Roy. lugdb.* 394.

Fumaria bulbosa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143. — *cava.*

Aristolochia. *Fuchs. hist.* 91.

Fumaria bulbosa, radice non cava, minor. *Bauh. pin.* 144. — *intermedia.*

Fumaria bulbosa, radice non cava, major. *Bauh. pin.* 144. — *solida.*

Habitat in Europæ *nemoribus & umbrosis.* ♃
Conurgunt has plantas specie: Radix *carnosa, sim*
Varietas *β. Plantæ primi anni, producentis bra*
integras, quæ subsequentibus fissæ evadunt. Ge
radicales duæ, trivalves. Caulis *simplex, suban*
tus, unico ramo; Foliorum *structura decompo*
Racemus *bracteis immixtus, terminalis, solitari*
Corolla, Calyx minimus, Semina, Stamina, Sili
structura; Tempus vernum. Species *reliquæ pro*
notis distinctissimæ.

sempervirens. 4. FUMARIA siliquis linearibus paniculatis, caule ere
Hort. upf. 207.
Fumaria caule erecto ramoso, siliquis filiformibus
rymbosis. *Hort cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394.
Fumaria siliquosa sempervirens. *Corn. canad.* 57. *t.*
Moris. hist. 2. *p.* 259. *s.* 3. *t.* 12. *f.* 1.
Capnoides T. *Mill. dict. t.* 78.
Habitat in Canada, Virginia. ⊙
Color Corollæ proprius cum populari suo Aquilegia
nadensi.

capnoides. 5. FUMARIA siliquis linearibus tetragonis, cauli
diffusis acutangulis.
Fumaria caule ramoso diffuso, siliquis oblongis, rad
perenni. *Hort. cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394.
Fumaria lutea. *Bauh. pin.* 143.
Fumaria lutea montana. *Dalech. hist.* 1294.
Fumaria tingitana, radice fibrosa, perennis, flore ex
bo flavescente, siliquis curtis. *Pluk. alm.* 262. *t.*
f. 2.
Habitat in Gallia, Italia, Mauritania. ⊙

enneaphylla. 6. FUMARIA foliis triternatis: foliolis cordatis.
Fumaria hispanica saxatilis, foliis amplioribus cordi
mibus, semine compresso. *Tournef. inst.* 422.
Fumaria enneaphyllos hispanica saxatilis. *Bocc.*
2 *p.* 83. *t.* 73. *Raj. suppl.* 475. *Barr. ic.* 42.
Fumaria radice fibrosa, foliis ad petiolum sinuatis c
floribus. *Pluk. alm.* 162.
Habitat in Hispaniæ, Siciliæ *saxosis.*

officinalis. 7. FUMARIA pericarpiis monospermis racemosis, ca
diffuso.
Fumaria pericarpiis monospermis. *Hort. cliff.* 252.
svec. 584; 630. *Mat. med.* 343. *Roy. lugdb.* 394. *H*
helv 605.

Fuma

maria officinarum & dioscoridis. *Bauh. pin.* 143.
maria. *Fuchs, hist.* 338. *Cam. epit.* 890.
itat in Europæ *agris cultis.* ☉

MARIA pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sauv. monsp.* 263. — **spicata.**
naria minor tenuifolia. *Bauh. pin.* 143. *Segu. ver.* 2. *p.* 111.
maria tenuifolia erecta hispanica purpurea. *Barr. ic.* 41.
maria minor tenuifolia præcox, semine lini. *Moris. hist.* 2. *p.* 262. *s.* 3. *t.* 12. *f.* 13.
pnos tenuifolia. *Clus. hist.* 2. *p.* 208.
bitat in Hispania, G. Narbonensi, Veronæ *ad agros, vias.*
rietates qui statuat hanc & sequentem esse Fumariæ officinalis vix erret, dictitante fructu. An *hybridæ?* Spica *ex flosculis arcte congestis est.* Folia *glauca. Flores vernales.*

UMARIA pericarpiis monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. — **capreolata.**
maria viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens. *Bauh. pin.* 143.
maria major scandens, flore pallidiore. *Raj. hist.* 405.
bitat in G. Narbonensi, Anglia. ☉
dunculi partiales recurvati sunt, & Foliola extrema in cirrhos transeunt.

UMARIA siliquis linearibus, foliis cirrhiferis. — **claviculata.**
maria foliis cirrhiferis, floribus spicatis. *Hort. cliff.* 351. *. *Roy. lugdb.* 394. *Gort. gelr.* 413.
maria claviculis donata. *Bauh. pin.* 143. *Moris. hist.* 2. *p.* 266. *s.* 3. *t.* 12. *f.* 3.
maria alba latifolia. *Raj. angl.* 3. *p.* 335.
bitat in Angliæ *locis uliginosis saxosis.*

FUMARIA siliquis globosis acutis inflatis, foliis cirrhiferis. *Hort. ups.* 207. — **vesicaria.**
maria foliis cirrhiferis, siliquis ovatis inflatis pendulis. *Hort. cliff.* 351. *Roy. lugdb.* 394.
maria alba visicaria, capreolis donata, sub exitum autumni florens, æthiopica. *Pluk. alm.* 400. *t.* 335. *f.* 3.
icapnos africana scandens. *Bærh. lugdb.* 1. *p.* 310. 310.
itat in Æthiopia. ☉

Foliorum *Foliola terminalia protrahuntur in cirrhos* dunculi *oppositifolii floribus* 1-4. Siliquæ *ovatæ gnæ, inflatæ, pendulæ, s. potius* Siliquæ *lanceo tectæ pericarpio baccato cavo.*

MONNIERIA.

trifolia. 1. MONNIERIA. *Læfl. it.* 197. *
Habitat in Cumana *Americæ.* ⊙
Caulis dichotomus. Folia ternata. Flores albi, spic fida.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

* *Cristatæ (flores appendice penicilliformi.)*

incarnata. 1. POLYGALA floribus cristatis spicatis, caule baceo ramoso erecto, foliis alternis subulatis.
Polygala mariana, angustiori folio, flore purp *Pluk. mant.* 153. *t.* 438. *f.* 5.
Polygala marilandica, foliis tenuissimis, spica parva pacta in summo caule flosculis carneis. *Raj. suppl*
Habitat in Virginia, Canada. ⊙
Caulis *spithamæus, pedalis, erectus filiformis, angu* Rami *communiter tres, in alis summis, longi, sti.* Folia *subulata, plana, acutissima, remota pius vix in caule octo.* Spicæ *terminales, solit oblongæ, vividissime incarnatæ;* Corollæ, *alis c nis triplo longiores, instructæ Penicillo multifid latato, incarnato, uti corollæ erecto.*

vulgaris. 2. POLYGALA floribus cristatis racemosis, cau herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis l ri-lanceolatis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 136.
Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus di herbaceis. *Vir. cliff.* 70. *Hort. cliff.* 352. *Fl.* 586; 632. *Roy. lugdb.* 393.
Polygala major. *Bauh. pin.* 215.
Polygala vulgaris major. *Clus. hist.* 1. *p.* 324. *paris.* 161. *t.* 32. *f.* 1.
β. Polygala vulgaris. *Bauh. pin.* 215.
Habitat in Europæ *pratis, & pascuis siccis.* ♃

3. P

POLYGALA foliis criſtatis racemoſis, caulibus erectiuſculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Jacq. vind.* 262. **amara.**
Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, flore cæruleo, ſapore admodum amaro. *Bauh. pin.* 215.
Polygala buxi minoris folio. *Vaill. pariſ.* 161. *t.* 32. *f.* 2.
Habitat in Galliæ, Auſtriæ *ſubalpinis montoſis.*
Filia P. vulgaris, ſed Folia majora: radicalibus decuplo majora, cæterum nimis affinis.

POLYGALA floribus criſtatis racemoſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Sauv. mon p.* 53. **monſpelia**
Polygala annua erecta anguſtifolia, floribus coloris obſoleti carneis lineis virgatis. *Magn. monſp.* 208.
Polygala acutioribus foliis monſpeliaca. *Bauh. pin.* 207.
Polygala vulgaris coloris obſoleti, foliis anguſtiſſimis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 338. *Raj. hiſt.* 1336.
Habitat Monſpelii *in collibus ſterilibus.* ☉

POLYGALA floribus criſtatis, racemis nudis, caulibus herbaceis erectis ſuperne ramoſis, foliis linearibus. *Amæn. acad.* 5. *p.* 402. * **paniculata**
Polygala herbacea minor erecta, foliis linearibus, ſpica multiplici terminali folioſa. *Brown. jam.* 287.
Habitat in Jamaica.

POLYGALA floribus criſtatis, racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis. **ſibirica.**
Polygala multicaulis. *Amm. ſibir.* 43, 44, 45.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Habitus *antecedentis.* Folia *inferiora ovata; ſuperiora lanceolata.* Racemus *unus (raro duo), lateralis, laxus, absque bracteis, ad exortum pedicellorum partialium.*

POLYGALA floribus criſtatis racemoſis, bracteolis triphyllis, foliis lineari-lanceolatis, caule ſuffruticoſo. **bracteolata**
Polygala floribus criſtatis racemoſis, carina criſtis longiore, caule ſuffruticoſo, foliis lineari-lanceolatis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 137.
Polygala africana glabra, florum galea binis criſtis fimbriatis ornata, ex involucro magno dipetalo erumpente. *Pluk. alm.* 300. *t.* 53. *f.* 2.
Polygala fruteſcens anguſtifolia ramoſa, floribus in ſummitate velut umbellatis. *Raj. ſuppl.* 640.

β. Po-

β. Polygala floribus cristatis racemosis: carina cristis b viore, caule suffruticoso, foliis lineari-subula *Amæn. acad.* 2. *p.* 137.
Polygala foliis lineari-subulatis. *Hort. cliff.* 353.
Polygala frutescens, foliis linearibus, flore majore p pureo. *Burm. afric.* 202. *t.* 73. *f.* 2.

γ. Polygala floribus cristatis racemosis, caule erecto f fruticoso simplicissimo, foliis subulatis. *Amæn. a* 2. *p.* 137.
Polygala foliis linearibus acutis, flore purpureo min *Burm. afric.* 203. *t.* 73. *f.* 3. *Breyn. cent. t.* 49.

δ. Polygala floribus cristatis alternis, caule erecto suf ticoso ramoso, foliis linearibus obtusis scabris. *A acad.* 2. *p.* 138.
Polygala æthiopica, angustis hirsutis foliis, flore obs te purpureo. *Pluk. mant.* 153. *t.* 404. *f.* 6.
Polygala folio lineari-obtuso, flore albente mini *Burm. afric.* 204. *t.* 73. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄
Variat foliis lanceolatis, linearibus, subulatis.

rtifolia. 8. POLYGALA floribus cristatis carina lunulata, ca fruticoso, foliis lævibus oblongis obtusis. *Amæn. a* 2. *p.* 138.
Polygala foliis lanceolatis obtusis, caule frutesce *Hort. cliff.* 353.
Polygala arborea myrtifolia, floribus albis: intus pur reis. *Comm. hort.* 1. *p.* 87. *t.* 46. *Raj. suppl.* 640.
Polygala arborea, myrtilli subrotundis foliis, fructu gno tordylii. *Pluk. mant.* 153. *t.* 437. *f.* 4.
Polygala frutescens, foliis oblongis glabris, flore p pureo. *Burm. afric.* 200. *t.* 73. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

* * *Imberbes (flores absque penicillo carinali) frutescentes.*

nna. 9. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus solit a caule arboreo, foliis obtusis petiolatis. *Amæn. ac* 2. *p.* 140.
Penæa arborescens, buxi folio aspero. *Plum. spec. ic.* 214. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ♄

rsifolia. 10. POLYGALA floribus imberbibus racemosis, ca arboreo, foliis senioribus oblongo-ovatis, recenti subovatis. *Amæn. acad.* 140. Poly

olygala foliis ramorum provectiorum oblongo-ovatis, tenellorum subovatis, caule arboreo. *Hort cliff.* 353. *
olygala fruticosa, foliis glabris ovatis, capsulis subrotundis emarginatis, racemis minoribus laxis alaribus. *Brown. jam.* 287. *t.* 5. *f.* 3.
bitat in America *calidiore.* ♄

POLYGALA floribus imberbibus spicatis axillaribus, caulibus suffruticosis, foliis ovalibus. — chinensis.
olygala arborea, foliis lanceolato-ovatis, capsulis compressis bilobis ultra medietatem divisis. *Brown. jam.* 287.
bitat in India. ♄
ules *pedales, decumbentes, lignosi, non glabri.* Folia *ovalia, integerrima, magnitudine extimi pollicis, subpetiolata, nuda, obtusa cum mucrone.* Rami *laterales, rarissimi.* Spicæ *laterales, foliis sæpe longiores, virides.*

POLYGALA floribus imberbibus racemosis, caulibus fruticosis, foliis minutissimis ellipticis. — microphylla.
lygala lusitanica frutescens, magno flore, foliis minimis. *Tournef. inst.* 175.
bitat in Lusitania, Hispania. *Alstræmer.* ♄
ules *fruticosi, virgati, pedales, filiformes, virides, dentati basibus foliorum deciduorum.* Folia *omnium minutissima, alterna, remota, sessilia, subulata s. elliptica, caduca.* Racemi *terminales, breves.* Flores *majusculi.*

POLYGALA floribus imberbibus sparsis: carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. — Chamæbuxus.
Amæn. acad. 2. *p.* 140. *Jacq. vind.* 126.
amæbuxus flore coluteæ. *Bauh. pin.* 471.
onymos flore coluteæ. *Clus. hist.* 1. *p.* 105.
bitat in Austriæ, Helvetiæ, Alsatiæ *montanis.* ♄

POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule arboreo spinoso, foliis ovalibus mucronatis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 141. * — spinosa.
bitat in Æthiopia. ♄

POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule arborescente, foliis triquetris mucronato-spinosis. — Heisteria.
ium africanum frutescens, ericæ folio. *Comm.* *t.* 2. *p.* 193. *t.* 97. *Seb. muf.* 2. *t.* 62. *f.* 8.

Thym-

Thymbra capensis, nepetæ theophrasti foliis acul[...] flore parvo purpureo. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229. *f.* 5
Heisteria. *Hort. cliff.* 352. * *Roy. lugdb.* 393.
Habitat in Æthiopia. ♄
Polymorpha *planta : Tenera ab adulta facie diver[...] ma :*
α. Foliis ovatis margine carinaque ciliatis.
β. Foliis linearibus scabris.
γ. Foliis subulatis pilosis.

* * * *Imberbes herbaceæ, caule simplicissimo.*

[...]nega. 16. POLYGALA floribus imberbibus spicatis, ca[...] erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lance[...] tis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 139. *t.* 2. * *Mill. dict.* te[...] *t.* 5. *Gron. virg.* 103.
Polygala caule simplici erecto, foliis ovato-lan[...] latis alternis integerrimis, racemo terminali ere[...] *Gron. virg.* 1. *p.* 80. * *Mat. med.* 345.
Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in[...] stigio singulari e flosculis albis composita. *[...] suppl.* 640.
Habitat in Virginia, Pensylvania. Marilandia. ♃

[...]tea. 17. POLYGALA floribus imberbibus oblongo-cap[...] tis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis l[...] ceolatis acutis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 140.
Polygala floridana lutea, floribus in capitulum co[...] stis. *Pluk. amalth.* 175. *t.* 438. *f.* 6.
Polygala f. Flos Ambervalis floribus luteis in cap[...] lum oblongum congestis. *Pluk. alm.* 301. *Raj. su[...]* 639.
Polygala virginiana, flore luteo capitato. *Pet. sicc.*
Habitat in Virginia. ☉

iridescens. 18. POLYGALA floribus imberbibus globoso capit[...] caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceol[...] obtusiusculis. *Amæn acad.* 2. *p.* 140. *Gron. virg.* 1[...]
Polygala foliis lanceolatis alternis, caule simplicissi[...] corymbo terminali capitato. *Gron. virg.* 1. *p.* 8[...]
Polygala rubra virginiana, spica parva compa[...] *Pluk. alm.* 300.
Habitat in Virginia. ☉
Caulis *spithamæus f. pedalis, angulatus, absque ram[...] erectus.* Folia *alterna, linearia f. lineari-lanceol[...] lævia, integerrima.* Capitulum *terminale, subglobo[...]*
e[...]

... albo viride, cum obsolete rubri mixtura in alis ...orum.

POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis sub...ifloris, caule herbaceo erecto, foliis linearibus al...rnis. *Fl. zeyl.* 269. **triflora.**
...itat in Zeylona. ☉

POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis mul...ifloris lateralibus, caulibus diffusis herbaceis, fo...liis acutis. *Fl. zeyl.* 270. * **glaucoides.**
...itat in Zeylona. ♃

* * * * *Imberbes herbaceæ ramosæ.*

POLYGALA floribus imberbibus, capsulis ciliato-dentatis, caule herbaceo erecto. *Fl. zeyl.* 268. **ciliata.**
...itat in India. ☉
...riat Foliis cordatis, Caulibus semipedalibus, ramosis.

POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis squar...osis, caule herbaceo ramoso erecto. **sanguinea.**
...lygala mariana, angustiori folio, flore purpureo. *Pluk. mant.* 153. *t.* 437. *f.* 5.
...itat in Virginia. *Kalm.* ☉
...lis spithamæus f. pedalis, firmus, angulatus, ramo...sus, erectus, ramis caule altioribus. Folia *alterna, an...gusto-lanceolata.* Spicæ *terminales, laxæ, sangvineæ, ...ovatæ; decidunt enim flosculi inferiores maturi, dum ...novelli accrescunt, unde Pedunculus lacerus f. squar...rosus.*

POLYGALA floribus imberbibus spatio remotis, foliis linearibus verticillatis, caule herbaceo ramo...o. *Gron. virg.* 103. **verticillata.**
...lygala caulibus filiformibus, foliis linearibus alter...nis, pedunculis spicatis. *Gron. virg.* 1. *p* 172.
...lygala foliis imberbibus spicatis, caule erecto her...baceo filiformi ramoso, foliis linearibus. *Amæn. acad.* 2. *p.* 159.
...lygala mariana quadrifolia minor, spica parva albi...cante. *Pluk. mant.* 153. *t.* 438. *f.* 4.
...lygala quadrifolia minima marilandica, spicis flo...m parvis albentibus. *Raj. suppl.* 639.
...tat in Virginia. ☉
...a sæpius quina ad genicula, interdum alterna. Spi...*æ albæ, angustissimæ flosculis remotis.*

24. PO-

cruciata. 24. POLYGALA floribus imberbibus, foliis qua
Amæn. acad. 2. *p.* 138. *Gron. virg.* 163.
Polygala quadrifolia f. cruciata, floribus ex viridi
tibus in globum compactis. *Pluk. alm.* 301.
suppl. 639.
Habitat in Virginia.

SECURIDACA.

erecta. 1. SECURIDACA caule erecto. *Jacq. amer.* 27.
Securidaca fruticosa, foliis subrotundis, ramulis
simis, spicis laxis terminalibus. *Brown. jam*
Habitat in Jamaica. ♄

scandens. 2. SECURIDACA caule scandente. *Jacq. amer.* 27
Spartium scandens, fructu cristato & alato, floro
Plum. spec. ic. 247. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ♄

DECANDRIA.

NISSOLIA.

arborea. 1. NISSOLIA caule arboreo erecto. *Jacq. amer.* 2
Habitat in America. ♄
Arbor foliis ternatis est.

fruticosa. 2. NISSOLIA caule fruticoso volubili. *Jacq. amer.*
Habitat in America. ♄

ERYTHRINA.

herbacea. 1. ERYTHRINA foliis ternatis, caulibus simplici
fruticoso-annuis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.*
Coral caroliniensis, hastato folio. *Dill. elth.* 107.
f. 106.
Corallodendron humile, spica florum longissima,
crassissima. *Catesb. car.* 49. *t.* 49.
Habitat in Carolina, Missipi. ♃

Corallodendrum. 2. ERYTHRINA foliis ternatis inermibus, caule
reo aculeato. *Hort. cliff.* 354. *Hort. upf.* 207. *Fl*
275. *Roy. lugdb.* 373.
Erythrina arborea spinosa & non spinosa, foliis
beis ternatis. *Brown. jam.* 288.

occidentalis. Ceratia f. Siliqua sylvestris spinosa arbor indica.
pin. 402.

Co

oral arbor americana. *Comm. hort.* 1. *p.* 211. *t.* 108.
Mouricou. *Rheed. mal.* 6. *p.* 13. *t* 7. [*orientalis.*]
elala litorea. *Rumph. amb.* 2. *p.* 230. *t.* 76.
abitat in Indiis. ♄
st quædam differentia inter occidentalem & orientalem, sed vix videtur sufficiens pro specie distincta; aculei enim in orientali nigricantes sunt.

ERYTHRINA foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. [picta.]
elala alba. *Rumph. amb.* 2. *p.* 234. *t.* 77.
abitat in India. ♄
anta mea etiamnum tenera unius anni, simillima E. Corallodendro, a qua differt foliolis albis rachi costisque & aculeis minoribus in utraque pagina, cum illius foliola viridia & inermia sint. Illi glandulæ duæ ad basin folioli imparis, huic vero nullæ; cæterum utriusque caulis & petioli aculeati.

ERYTHRINA foliis simplicibus oblongis. [planisiliqua.]
orallodendron folio singulari oblongo, siliqua plana. *Plum. spec.* 21. *ic.* 102. *f.* 1.
abitat in America. ♄

PISCIDIA.

PISCIDIA foliolis ovatis. *Jacq. amer.* 27. *Læfl. it.* 275. [Erythrina.]
Erythrina foliis pinnatis, leguminibus membranaceo-tetragonis. *Spec. pl.* 1. *p.* 707.
chthyomethia foliis pinnatis ovatis, racemis terminalibus, siliquis quadrialatis. *Brown. jam.* 296.
oral arbor polyphylla non spinosa, fraxini folio, siliqua alis foliaceis extantibus rotæ molendinariæ fluviatilis aucta. *Sloan. jam.* 143. *hist.* 2. *p.* 39. *t.* 176. *f.* 45. *Raj. dendr.* 108.
seudo-Acacia siliquis alatis. *Plum. spec.* 19. *ic.* 233. *f.* 2.
Habitat in America *calidiore.* ♄

PISCIDIA foliolis obovatis. *Jacq. amer.* 27. [carthaginensis.]
haseolis accedens Coral arbor polyphyllos, foliis durioribus non spinosa. *Pluk. alm.* 293. *t.* 214. *f.* 4.
abitat in America *calidiore.* ♄

BORBONIA.

BORBONIA foliis sublinearibus acutis subtus villosis, capitulis terminalibus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 29.* [ericifol]

Genista africana, ericæ folio, floribus parvis lute capitula congestis. *Raj. suppl.* 105.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

trinervia. 2. BORBONIA foliis lanceolatis trinerviis integerr
Borbonia foliis lanceolatis acuminatis trinerviis. *cliff.* 494.
Frutex æthiopicus, rusci angusto & minore folio. *alm.* 158. *t.* 297. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄

lanceolata. 3. BORBONIA foliis lanceolatis multinerviis integer
Genista africana frutescens, rusci nervosis foliis. *nef. inst.* 644.
Sparteum africanum frutescens, rusci folio caule plexante. *Comm. hort.* 2. *p.* 195. *t.* 98. *Raj.* 107.
Frutex æthiopicus, foliis rusci, floribus papilion sericea lanugine fusca villosis. *Pluk. alm.* 159. *t f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄
Caulis glaber est.

cordata. 4. BORBONIA foliis cordatis multinervi[illegible]teger
Borbonia foliis cordatis acuminatis integ[illegible]is nerviis. *Hort. cliff.* 494. *Roy. lugdb.* 372.
Genista africana frutescens, rusci foliis nervosis, luteo. *Seb. thes.* 1. *p.* 38. *t.* 24. *f.* 3.
Planta leguminosa æthiopica, foliis rusci. *Breyn. t.* 28.
Habitat in Æthiopia. ♄

tomentosa. 5. BORBONIA foliis obovatis villosis.
Genista africana tomentosa, folio cochleariformi, luteo. *Seb. thes.* 1. *p.* 38. *t.* 24. *f.* 1.
β. Genista africana arborescens, folio argentea lan vestito. *Seb. thes.* 1. *p.* 38. *t* 24. *f.* 2.
γ. Lotus fruticosus. *Syst. nat.* 10. *p.* 1179.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *absque stipulis.* Flores *in capitulum uml* Germina *hirsuta.*

crenata. 6. BORBONIA foliis cordatis multinerviis crenatis.
Frutex æthiopicus leguminosus, foliis rusci majc in ambitu spinulis fimbriatis. *Pluk. alm.* 159.

Pla

Planta leguminosa æthiopica, foliis rusci. *Breyn. cent.* 69. *t.* 28.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia cordata, amplexicaulia, reticuloso-venosa, glabra, denticulata, mucronata. Flores *racemosi.*

SPARTIUM.

* *Foliis simplicibus.*

SPARTIUM ramis scabris, foliis superioribus filiformibus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 27.* — *septarium.*
Genista africana, pinastri foliis, floribus spicatis luteis. *Raj. dendr.* 105.
Genista foliis Genistæ hispanicæ: superioribus junceis. *Herm. afric.* 11.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

SPARTIUM ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 356. *Hort. upf.* 208. *Roy. lugdb.* 370. *Sauv. monsp.* 60. *Gron. orient.* 211. — *junceum.*
Spartium arborescens, seminibus lenti similibus. *Bauh. pin.* 396.
Spartium macrolobium. *Renealm. spec.* 34. *t.* 33.
Genista juncea. *Bauh. hist.* 1. *p.* 395.
Habitat in G. Narbonensi, Italia, Sicilia, Turcia. ♄

SPARTIUM ramis lateralibus alternis, foliis alternis lanceolatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 28.* — *capense.*
Genista foliis Genistæ tinctoriæ majoribus. *Herm. afr.* 11.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

SPARTIUM ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 356. *Roy. lugdb.* 370. *Sauv. monsp.* 60. *Osb. it.* 37. — *monospermum.*
Spartium alterum monospermum, semine reni simili. *Bauh. pin.* 396.
Spartium hyposphærolobium. *Ren. spec.* 35. *t.* 33.
Spartium tertium, flore albo. *Bauh. pin.* 369.
Spartium 3. hispanicum. *Clus. hist.* 1. *p.* 103.
Habitat in Hispaniæ *sterilioribus.* ♄

SPARTIUM ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. — *Scorpius.*
Genista spartium spinosum majus, flore luteo. *Bauh. pin.* 394.

Aſpalathus ſecunda monſpelienſis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.*

β. Geniſta-ſpartium ſpinoſum majus ſecundum, flore lido. *Bauh. pin.* 394.

γ. Geniſta ſpartium ſpinoſum majus tertium hirſu *Bauh. pin.* 394.

Aſpalathus alter 111. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 106.

Habitat in Hiſpania, G. Narbonenſi. ♄

Frutex totus ex ſpinis alternis, quibus flores in

* * *Foliis ternatis.*

angulatum. 6. SPARTIUM foliis ſolitariis ternatiſque, ramis ſi gularibus apice floriferis.

Spartium orientale, ſiliqua compreſſa glabra & an ta. *Tournef. cor.* 44.

Habitat in Oriente. ♄

Anguli *tres decurrunt per ramos a ſingulo folio.*

complicatum. 7. SPARTIUM foliis ternatis: foliolis conduplic caulibus inermibus proſtratis glabris, legumi ſcabris.

Cytiſus ramis humifuſis albidis, floribus capitatis t nalibus, foliolis ovalibus glabris aggeſtis. *monſp.* 190.

Cytiſus foliis incanis anguſtis quaſi complicatis. *pin.* 390. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 417.

Cytiſus montis calcaris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 370.

Cytiſus 11. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 94.

Habitat in Hiſpania, Gallia *auſtraliore.* ♄

Foliola *lanceolata, nunquam explicata.* Stamina *na antheris magnis; alterna parvis.*

ſcoparium. 8. SPARTIUM foliis ternatis ſolitariiſque, ramis mibus angulatis. *Hort. cliff.* 356. *Fl. ſvec.* 589; *Roy. lugdb.* 370. *Gort. gelr.* 415.

Geniſta anguloſa & ſcoparia. *Bauh. pin.* 395.

Geniſta. *Dod. pempt.* 761.

Habitat in Europæ *auſtralioris arenoſis.* ♄

radiatum. 9. SPARTIUM foliis ternatis linearibus ſeſſilibus, tiolis perſiſtentibus, ramis oppoſitis angulatis.

Spartium æquicolorum minimum montanum tri lum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294.

Geniſta radiata ſ. ſtellaris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 399.

Habitat in Italia. ♄

Cau

Caules *humiles*: Ramis *oppositis*, *tetragonis*. Folia *opposita*, *ternata*, *subsessilia*: *Foliolis sessilibus*, *linearibus*, *tenuibus*, *subpubescentibus*. Petioli *omnium brevissimi*, *persistentes*, *trigoni*, *gibbi*, *obtusissimi*, *ramulo fulciendo crassiores*. Flores *terminales*, *terni*, *sessiles*, *Bractea acuta*, *decidua suffulti*.

SPARTIUM foliis ternatis, ramis angulatis spinosis. *Hort. cliff.* 356. *Hort. upf.* 208. *Roy. lugdb.* 370. *Sauv. monsp.* 191. *Gron. orient.* 212. **spinosum.**

Acacia trifolia. *Bauh. pin.* 392.

Aspalathus secunda trifolia. *Bauh. hist.* 1. *p.* 375.

Habitat in Europæ *australis asperis maritimis.* ♄

GENISTA.

* *Inermes.*

GENISTA foliis ternatis tomentosis, petiolatis, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 355. *Mat. med.* 347. *Roy. lugdb.* 371. **canariensis.**

Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. *Bauh. pin.* 390.

Cytisus 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 94.

Cytisus canariensis sempervirens & incanus. *Comm. hort.* 2. *p.* 103. *t.* 52.

Cytisus canariensis, fiore candido & citrino. *Seb. thes.* 2. *p.* 6. *t.* 4. *f.* 6. 7.

Cytisus canariensis microphyllos angustifolius prorsus incanus. *Pluk. alm.* 128. *t.* 277. *f.* 6.

Habitat in Hispania, Canariis. ♄

GENISTA foliis ternatis subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinquefloris foliatis, leguminibus hirsutis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 284. * **candicans.**

Cytisus floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. *Sauv. monsp.* 191. *Sp. pl.* 1. *p.* 740.

Cytisus monspessulanus, medicæ folio, siliquis dense congestis & villosis. *Tournef. inst.* 648.

Cytisus sylvestris candicans. *Cæsalp. plant.* 113.

Habitat in Italia, Monspelii. ♄

GENISTA foliis ternatis sessilibus linearibus subtus sericeis. **linifolia.**

Cytisus argenteus linifolius insularum stœchadum *Tournef. inst.* 648.

Habitat in Oriente, Hispania. *Cl. Alstrœmer.* ♄

Frutex *parvus*: *Ramis nodosis*, *dentibus a foliorum casu remanentibus*; *Ramulis foliatis*, *angulatis*, *erectis*, *seri-*

fericeis. Folia *feffilia*, *ternata*, *confertiora*, *al* *Foliolis linearibus*, *fubæqualibus*, *acutis*, *margi* *volutis*, *fubtus tomentofo-fericeis.* Racemi *te* *les.* Calyx *tripartitus: infima trifida.* Corol *tinctoriæ.* Legumina *villofa.*

fagittalis. 4. GENISTA ramis ancipitibus articulatis, foliis to-lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.*
Genifta herbacea f. Chamæ-fpartium. *Bauh. hift.* 393.
Chamæ-Genifta fagittalis. *Bauh. pin.* 395.
Chamæ-Genifta fagittalis pannonica. *Cam. hort.*
Habitat in Germaniæ, Galliæ *arenofis fterilibus.* ♃

tridentata 5. GENISTA ramis triquetris fubarticulatis, folii cufpidatis.
Geniftella fruticofa lufitanica latifolia. *Tournef* 646.
Chamæ-Genifta caule foliato. *Bauh. pin.* 396.
β. Genifta fruticofa lufitanica anguftifolia. *Tourne* 646.
Habitat in Lufitania. *Læfl.* ♄
Præcedenti valde affinis, at majora omnia & articu *morum in folium laterale terminati, non integri* *tricufpidati. Legumina albo-lanata.*

humifusa 6. GENISTA foliis lanceolatis ciliatis, ramis prol ftriatis pilofis.
Genifta orientalis minima humifufa, foliis fubrot ad oras pilofis. *Tournef. cor.* 44.
Habitat in Oriente. *D. Gerard.*

florida. 7. GENISTA foliis lanceolatis fericeis, ramis ft teretibus, racemis fecundis.
Genifta tinctoria hifpanica. *Cluf. hift.* 1. *p.* 101.
Genifta tinctoria frutefcens, foliis incanis. *Baul* 395.
Habitat in Hifpania. ♄

tinctoria. 8. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis ft teretibus erectis. *Hort. cliff.* 355. *Fl. fvec.* 587; *Mat. med.* 347. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 41
Genifta tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.
Genifta tinctoria vulgaris. *Cluf. hift.* 1. *p.* 101.
Habitat in Germania, Anglia. ♄

9. G

GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Hort. cliff.* 355. *Fl. svec.* 588; 635. *Roy. lugdb.* 371. — *pilosa.*
Genista ramosa, foliis hyperici. *Bauh. pin.* 395.
Chamæ-Genista foliis genistæ vulgaris. *Bauh. pin.* 395.
Chamæ-Genista montana hispida. *Bauh. pin.* 396.
Chamæ-Genista prima. *Clus. hist.* 1. *p.* 103.
Habitat in Pannonia, G. Narbonensi, Germania. ♄

* * *Spinæ laterales.*

GENISTA spinis terminalibus, ramis teretibus striatis, foliis lanceolatis simplicibus pubescentibus. — *purgans.*
Genista s. spartium purgans. *Bauh. hist.* 1. *p.* 404.
Habitat Monspelii. ♄
Rami teretes, dense congesti. Folia obtusiuscula, decidua. Legumina compressa.

GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371. — *anglica.*
Genista minor asphaltoides. *Bauh. pin.* 395. *prodr.* 157.
Genistella aculeata. *Lob. ic.* 2. *t.* 93.
Genistella. *Dod. pempt.* 670.
Habitat in Angliæ *ericetis humidiusculis.* ♄

GENISTA spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 417. — *germanica.*
Genista spinosa minor germanica. *Bauh. pin.* 395.
Genistella spinosa. *Riv. tetr.* 67.
Habitat in Germania. ♄

GENISTA spinis decompositis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus pilosis. — *hispanica.*
Genista spinosa minor hispanica villosissima. *Bauh. pin.* 395.
Genistella monspeliaca spinosa. *Bauh. prodr.* 157.
Genistella, montis ventosi, spinosa. *Bauh. hist.* 1. *p.* 400.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♄

Spinæ innocuæ.

GENISTA caule aphyllo, spinis decussatis. — *lusitanica.*
Genista-spartium spinosum minus. *Bauh. pin.* 394.

Scorpius secundus. *Cluf. hist.* 1. *p.* 107. *Bauh.* i *p.* 403.
Habitat in Lusitania, Hispania. ♄

ASPALATHUS.

spinosa. 1. ASPALATHUS foliis fasciculatis linearibus spinam gemmaceam circumstantibus.
Genistella spinosa africana, laricis folio. *Brey t.* 26.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

astroites. 2. ASPALATHUS foliis fasciculatis subulatis m natis glabris, caule villoso, floribus sparsis.
Genista astroites, juniperinis pungentibus foliis, pica, floribus saturate luteis. *Pluk. mant.* 88. *f.* 3. *Raj. dendr.* 104. *Seb. mus.* 1. *t.* 24. *f.* 6.
Habitat in Æthiopia. ♄
Facies juniperi.

capitata. 3. ASPALATHUS foliis fasciculatis linearibus a floribus capitatis, bracteis nudis. *Amœn. acad.* 30.*
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

chenopoda. 4. ASPALATHUS foliis fasciculatis subulatis m natis hirtis, floribus capitatis hirsutissimis.
Genista africana lutea, floribus hirsutis in capitula ginosa conglobatis, foliis corrudæ aculeatis sub tis. *Herm. afr.* 11.
Chamælarix s. Chenopoda monomapatensis. *Breyn* 23. *t.* 11. *Seb. mus.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
Habitat in Æthiopia. ♄

thymifolia. 5. ASPALATHUS foliis fasciculatis subulatis in bus glabris brevissimis, floribus alternis.
Genista minima æthiopica, foliis thymi confertis l dentibus glabris. *Pluk. mant.* 88. *t.* 413. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄

ericifolia. 6. ASPALATHUS foliis fasciculatis subulatis inerm hirsutis, floribus alternis, calycibus linearibus.
Genista æthiopica non spinosa, foliis ericæ villosis ribus parvis spicatis luteis: calycibus longioribu mersis. *Pluk. mant.* 88. *t.* 413. *f.* 6.
Habitat in Æthiopia. ♄

7. ASP

SPALATHUS foliis fasciculatis subulatis, gemmis verruca tomentosa prominentibus nudis. **verrucosa.**
bitat in Æthiopia. ♄

SPALATHUS foliis fasciculatis subulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentissimis, floribus subsolitariis terminalibus. **retroflexa.**
bitat in Æthiopia. ♄

SPALATHUS foliis fasciculatis linearibus inermibus, stipulis acutis persistentibus, floribus solitariis, calycibus laciniis cymbiformibus. **uniflora.**
ista æthiopica glabra, longioribus foliis ex uno puncto plurimis, flore majore luteo. *Pluk. mant.* 8. *t.* 414. *f.* 7.
itat in Æthiopia. ♄
tex ramis alternis, confertis, tomentosis. Folia *teretiuscula, linearia, brevia, mutica.* Flores *solitarii, terminales, sessiles.* Calycis *dentes dilatati in lacinias obtusas, concavas, cymbiformes.* Corollæ *rina tomentosa.*

ASPALATHUS foliis fasciculatis setaceis inermibus hispidis, floribus capitatis. **araneosa.**
ista æthiopica, flore flavo, foliolis inflexis & araneosa lanugine fimbriatis: summo ramulo circa flores glomeratis. *Pluk. mant.* 88. *t.* 414. *f.* 4. *Seb. thes.* 1. *p.* 38. *t.* 23. *f.* 6.
itat in Æthiopia. ♄

SPALATHUS foliis aggregatis obovato-oblongis subtus tomentosis, pedunculis bifloris, leguminibus bilobis dispermibus. **Ebenus.**
lathus arboreus f. Pseudo-Ebenus, buxi folio, flore luteo patulo, siliqua lata brevi chartacea. *Sloan. jam.* 140. *hist.* 2. *p.* 30. *t.* 175. *f.* 1.
a arborescens erecta spinosa, foliis confertis, floribus geminatis. *Brown. jam.* 299.
rtium, portulacæ foliis, aculeatum, ebeni materie. *Plum. spec.* 19. *ic.* 246. *f.* 1.
itat in America *meridionali.* ♄

SPALATHUS foliis quinatis sessilibus, pedunculis unifloris. **indica.**
a foliis quinatis sessilibus, pedunculis axillaribus *axillaribus unifloris, floribus minimis. Fl. zeyl.* 271.*

Lotus tenuifolius maderaspatanus, siliqua singu[illegible] glabra. *Pluk. alm.* 225. *t.* 201. *f.* 2.
Dorycnium indicum, floribus singularibus rubris [illegible] dicellis oblongis, siliquis perexiguis. *Raj. suppl.* [illegible]
Manelli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 69. *t.* 37.
Habitat in India. ♄

quinquefolia. 13. ASPALATHUS foliis quinis sessilibus, ped[illegible] lis spicatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 31. *
Cytisus, angustis parvis acutioribus & incanis fo[illegible] æthiopica, floribus fulva lanugine hirsutis. *Pluk.* [illegible] 128. *t.* 273. *f.* 4.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

cretica. 14. ASPALATHUS foliis trinis cuneiformibus gla[illegible] lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus [illegible] gestis.
Genista arborea cretica, foliis sempervirentibus. [illegible] *hist.* 99. *t.* 39.
Habitat in Æthiopia. ♄

tridentata. 15. ASPALATHUS foliis trinis lanceolatis stipulis [illegible] dentatis mucronatis, floribus capitatis.
Habitat in Æthiopia. ♄

anthylloides. 16. ASPALATHUS foliis trinis lanceolatis æqualibus [illegible] pubescentibus, stipulis nullis, capitulis terminal[illegible]
Anthyllis asphaltoides fruticosa, foliis ternatis æq[illegible] bus capitulis terminalibus sessilibus. *Amœn.* [illegible] 4. *p.* 326. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

argentea. 17. ASPALATHUS foliis trinis linearibus seric[illegible] stipulis simplicibus mucronatis, floribus sparsis [illegible] mentosis.
Cytisus africanus angustifolius sericea lanugine arg[illegible] tatus, spica lagopoide. *Pluk. mant.* 63.
Habitat in Æthiopia. ♄
Rami *pubescentes.* Stipula *sub foliis parum vill[illegible]* Florum *capitula hirsuta.*

callosa. 18. ASPALATHUS foliis trinis subulatis æqualibus, [illegible] pulis subrotundis callosis, floribus spicatis glabri[illegible]
Cytisus trifoliatus, juniperinis foliis, floribus lute[illegible] spicam densiorem adactis. *Pluk. mant.* 63. *t.* 345. *f.* [illegible]
Habitat in Æthiopia. ♄ *D. Royenus plurimas has As[illegible] ronias amicissime communicavit.*

19. ASPA-

ALATHUS foliis pinnato-quinatis obcordatis, pinnata.
nculis capitatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 32. *
ad Cap. b. Spei. ♄

AMORPHA.

RPHA. *Hort. cliff.* 353. *t.* 19. *Hort. upf.* 208. fruticosa.
lugdb. 393. *Mill. dict. t.* 27.
ovis americana, pseudo-acaciæ foliis, flosculis purpureis minimis. *Anglic. hort.* 11. *t.* 4.
in Carolina. ♄

CROTALARIA.

Foliis simplicibus.

ALARIA foliis perfoliatis ovatis margine sca-, perforata.
Amœn. acad. 6. *afr.* 38. *
ad Cap. b. Spei.

ALARIA foliis perfoliatis cordato-ovatis. perfoliata.
ria perfoliatæ folio. *Dill. elth.* 122. *t.* 102. *f.*

in Carolina.

ALARIA foliis caulinis amplexicaulibus cor- amplexi-
alternis, floribus oppositis reniformibus. *Amœn.* caulis.
6. *afr.* 39. *
perfoliata, orbiculatis foliis. *Seb. thes.* 1. *t.* 24.

in Æthiopia. ♄

ALARIA foliis simplicibus lanceolatis, stipu- sagittalis.
tariis decurrentibus bidentatis. *Hort. cliff.*
Gron. virg. 105. *Roy. lugdb.* 374.
a americana, caule alato, foliis pilosis, flori-
thyrso luteis. *Mart. cent.* 43. *t.* 43.
ria hirsuta minor americana herbacea, caule ad
um sagittato. *Herm. lugdb.* 202. *t.* 203. *Pluk.*
122. *t.* 169. *f.* 6.
ria sagittalis glabra, longioribus foliis, ame-
Pluk. alm. 122. *t.* 277. *f.* 2.
in Brasilia, Virginia. ☉

ARIA foliis simplicibus ovatis, subpetio- chinensis.
lpulis minutissimis.
China. ♄

Caules

Caules & *Rami pubescentes; teretes.* Folia *obtusiuscula, integerrima, utrinque subpilosa.* mi *pauciflori, hirti: bracteis lanceolatis, lon pedunculorum.* Calyces *hirti, longitudine* Corollæ *luteæ: vexillo striato.* Stipulæ *mini subulatæ.*

juncea. 6. CROTALARIA foliis simplicibus lanceolatis lato-sessilibus, caule striato. *Hort. cliff.* 357. *upſ.* 210. *Roy. lugdb.* 374. *Trew. ehret. t.* 47
Crotalaria benghalensis, foliis genistæ hirsutis *alm.* 122. *t.* 169. *f.* 5.
Tandela-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 47. *t.* 36.
Habitat in India. ⊙

imbricata. 7. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis acu losis sessilibus, floribus subsessilibus. *Amæ* 6. *afr.* 40. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

retusa. 8. CROTALARIA foliis simplicibus oblongis cu mibus retusis. *Fl. zeyl.* 276. *
Crotalaria asiatica, floribus luteis, folio singul diformi. *Herm. lugdb.* 200. *t.* 201.
Crotalaria major. *Rumph. amb.* 5. *p.* 278. *t.* 9(
Tandale-Cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 45. *t.* 25.
Habitat in India. ⊙
Folia *obovata mucrone recurvato, unde retusa.* læ *minimæ, subulatæ.* Flores *lutei: vexillo pe purpurascente.* Legumen *cylindricum, horizontale.*

sessiliflora. 9. CROTALARIA foliis simplicibus lanceolatis silibus, floribus sessilibus lateralibus, caule
Habitat in China. ⊙
Planta *vix pedalis, Caule erecto, tereti, mini so.* Folia *lanceolata, fere sessilia, supra glal tus pilosa.* Stipulæ *vix manifestæ.* Flores *a sessiles, cærulei: bracteæ duæ, oblongiusculæ.*

triflora. 10. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis glabris, ramis angulatis, pedunculis term ralibus unifloris.
Habitat ad Cap. b. Spei.
Planta tota glabra.

11. C

CROTALARIA foliis simplicibus ovatis, stipulis ...atis declinatis, ramis tetragonis. *Fl. zeyl.* 277.* **verrucosa.**
...laria foliis ovatis, petiolis duplici stipula auctis, ...is tetragonis. *Hort. cliff.* 357. *
...laria foliis solitariis ovatis acutis, caule sulcato. *...rm. zeyl.* 81. *t.* 34.
...laria asiatica, folio singulari verrucoso, floribus ...ruleis. *Herm. lugdb.* 199. *t.* 199. *Raj. hist.* 1893.
...tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 53. *t.* 29.
...tat in India. ☉

* * *Foliis compositis.*

CROTALARIA foliis ternatis obovatis, floribus ...teralibus subracemosis. **latifolia.**
...laria loti folio, flore parvo variegato. *Dill. elth.* ...1. *t.* 102. *f.* 121.
...laria trifolia fruticosa, foliis glabris, flore e luteo ...ridi minore. *Sloan. jam.* 114. *hist.* 2. *p.* 33. *t.* 176. ...1. 2.
...tat in Jamaica. ☉
...ta glabra. Legumina *in calyce sessilia.*

CROTALARIA foliis ternatis ovatis acutis, stipulis ...icordatis lunatis. **lunaria.**
...laria foliis ternatis: foliolis sessilibus, petiolis ...pula duplici auctis. *Hort. cliff.* 357. *
...tat in Africa.

CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, ...pulis nullis, leguminibus pedicellatis. *Fl zeyl.* 278.* **laburnifolia**
...laria asiatica frutescens, foliis luteis amplis, trifolia. *...rm lugdb.* 196. *t.* 197. *Raj. hist.* 1893.
...tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 49. *t.* 27.
...tat in Asia. ☉
...ta glabra. *Legumen in calyce pedunculatum.*

CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, ...pulis setaceis; leguminibus hirsutis. **incana.**
...laria foliis ternatis petiolis nudis. *Hort. cliff.* ...58: * *Hort. upf.* 210. *Roy. lugdb.* 375.
...laria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, flo...bus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente. *Sloan.* ...1. 141. *hist.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 1. *Raj. suppl.* 466.
...tat in Jamaica, Caribæis, Asia. ☉
...ta villosa. Callus gibbus in axillis ramorum. Legu...m *in calyce sessile.*

16. CRO-

alba. 16. CROTALARIA foliis ternatis lanceolato-ovatis, le lævi herbaceo, racemo terminali. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 375.
Anonis caroliniana perennis non spinosa, foli marginibus integris, floribus in thyrso ca *Mart. cent.* 44. *t.* 44.
Habitat in Carolina. ♃

quinquefolia. 17. CROTALARIA foliis quinatis.
Wellia-tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 51. *t.* 28. *suppl.* 465.
Habitat in India.
Foliola angusto-lanceolata, obtusa, sæpe retusa, fu lateralibus brevioribus. Calyces campanulati. racemosi; alterni, glabri.

ONONIS.

* *Herbacea floribus subsessilibus.*

antiquorum. 1. ONONIS floribus solitariis foliolo majoribus, inferioribus ternatis; ramis læviusculis spino
Anonis legitima antiquorum. *Tournef. cor.* 28.
Habitat in Europa *australi.* ♃
Similis O. spinosæ, sed brevior, rigidior, magis sa, fere glabra: pedunculis solitariis, bracte longioribus.

spinosa. 2. ONONIS floribus racemosis geminis, foliis ter superioribus solitariis, ramis inermibus subvi

mitis, α. Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, inermibus. *Hort. cliff.* 359. *Fl. svec.* 622. *Roy.* 375.
Anonis spinis carens purpurea. *Bauh. pin.* 389.
Anonis mitior. 1. *Clus. hist.* 99.

spinosa. β. Ononis floribus subsessilibus lateralibus, caule spi *Hort. cliff.* 359. *Mat. med.* 357.
Anonis spinosa, flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.
Anonis. *Fuchs. hist.* 60.
Habitat in aridis Europæ. ♃
Folia *in caule ternata; Floralia vero simplicia.* Fl *duo propriis pedunculis exeunt simul. Planta pub ti-subviscida; prima æstate inermis; adultior sp evadit, ut recte observavit Læs. pruss.* 17.

repens. 3. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis: foliis s rioribus solitariis, stipulis ovatis.

Anon

onis maritima procumbens, foliis hirsutie pubescen-
ibus. *Pluk. alm.* 33. *Dill. elth.* 29. *t.* 25. *f.* 28.
itat in Angliæ *littoribus maris*, Oriente. ♃
*is admodum præcedenti, differt caulibus procum-
entibus undique diffusis, & quod minor; Flores ex
lis solitarii.*

NONIS floribus subsessilibus lateralibus, foliis ter- minutissima.
atis glabris, stipulis setaceis, calycibus aristis corol-
la longioribus.
onis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis &
ipulis longas setas exerentibus. *Sauv. monsp.* 190.
onis floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis
longissimis. *Roy. lugdb.* 375.
onis lutea sylvestris minima. *Col. ecphr.* 1. *p.* 304.
t. 301.
onis spinosa lutea minor. *Bauh. pin.* 389.
onis lutea montana non spinosa minima. *Barr. ic.*
107.
itat in Italia, Monspelii, Helvetia, Austria.
*ilis O. repenti; calyces glabri aristis corolla longio-
ibus.*

NONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omni- cherleri.
bus ternatis petiolatis pilosis, stipulis serratis mem-
branaceis.
onis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis,
ipulis longas setas exserentibus. *Sauv. monsp.* 189.
nis pusilla villosa & viscosa, purpurascente flore.
Tournef. inst. 408.
onis trifoliis affinis pusilla glabra fruticans cherleri.
Bauh. hist. 2. *p.* 394.
itat in G. Narbonensi, Hispania, Italia. ♃
nis O. minutissimæ, sed Folia *subtus villoso-viscida,
nec glabra.* Stipulæ *divergentes, serratæ, apice lan-
ceolatæ, nec vaginantes, integerrimæ s. setaceæ.* Ca-
lyces *pubescentes, longitudine corollæ; nec glabri, co-
rolla longiores.*

NONIS floribus sessilibus spicatis, bracteis stipula- mitissima.
ibus ovatis ventricosis scariosis imbricatis.
nis stipulis floralibus ovatis membranaceis integer-
nis. *Roy. lugdb.* 376.
nis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill.
h.* 28. *t.* 24. *f.* 27.

Anonis

Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, recta lentiformibus. *Moris. hist. 2. p. 169. f. s. 4.*
Habitat in Barbados, Lusitania. ☉
Folia *Caulina ternata ; floralia simplicia.* Stip Bracteæ *amplexicaules , membranaceo-cartil læves , ovatæ , concavæ, ad flores imbricatæ cam , calyces obtegentes.* Calycis *laciniæ ovata ribus reflexæ , intus adspersæ setis viscosis qua.*

alopecuroides. 7. ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus ova tusis, stipulis dilatatis.
Ononis floribus spicatis. *Hort. cliff.* 358. *Roy. lugd*
Anonis sicula alopecuroides. *Tournef. inst.* 408.
Anonis spicata s. alopecuroides lusitanica non s *Raj. suppl.* 468.
Anonis purpurea spicata alopecuroides major. *lugdb. 2. p.* 33.
Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania. ☉

variegata. 8. ONONIS stipulis bracteisque dentatis, foliis cibus, floribus subpedunculatis. *Roy. lugdb.* 3
Anonis lutea, trixaginis folio, maritima. *Barr. i mala.*
Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angu maritima. *Tournef. inst.* 409.
Habitat in Europæ *australis maritimis ; ex* Hispan *Stræmer.*
Facies *Euphrasiæ, palmaris , ramosa , diffusa , pubescens.* Stipulæ *cordatæ , latissimæ , plicata tatæ, emarginatæ, foliis latiores.* Folia *simplici neiformi-obovata , plicata , argute denticulata. axillares , solitarii , subpedunculati.* Calyces *breviores.*

* * *Floribus pedunculatis.*

Natrix. 9. ONONIS pedunculis unifloris aristatis , foliis t ovatis, stipulis integerrimis. *Hort. cliff.* 358. *lugdb.* 375. *Sauv. monsp.* 189.
Anonis viscosa spinis carens lutea major. *Bauh. pi*
Ononis lutea. *Cam. epit.* 445.
Natrix. *Riv. tetr.* 68.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, *inter segetes.*
Pl

Planta *suffruticosa, pubescenti-viscida.* Folia *ternata, ovata s. ovalia, denticulata, subcarnosa.* Floralia (*non infima racemi*) *simplicia.* Corollæ *flavæ: vexillo extus striis sanguineis.*

ONONIS pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis lanceolatis, stipulis integerrimis. **pinguis.**

Ononis non spinosa, flore luteo variegato. *Bauh. pin.* 389.

Anonis lutea non spinosa, Natrix plinii. *Dalech. hist.* 449.

Anonis lutea mitis oxytriphylla ad foliorum petiolos capreolata. *Pluk. alm.* 33. *t.* 135. *f.* 5.

Habitat in Europa *australi.* ♄

Simillima O. Natrici, sed Caulis *succosior, magis angulatus;* Folia *majora, lanceolato-oblonga; Aristæ pedunculorum longitudine floris, quam in præcedenti breviores.*

ONONIS pedunculis unifloris aristatis, foliis simplicibus: infimis ternatis. **viscosa.**

Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis simplicibusque. *Sauv. monsp.* 189 ?

Ononis lutea viscosa latifolia minor, flore pallido. *Barr. rar.* 840. *t.* 1239.

Anonis viscosa, spinis carens lutea. *Magn. monsp.* 21 ?

Anonis annua erectior latifolia glutinosa lusitanica. *Tournef. inst.* 409.

Habitat Monspelii, & *in* Hispania. ☉

Varietas β *major & Calyces corolla longiores.*

ONONIS pedunculis bifloris aristatis, leguminibus linearibus cernuis. *Roy. lugdb.* 376. **ornithopodioides.**

Ononis siliquis ornithopodii. *Bærh. lugdb.* 2. *p.* 34.

Foenum græcum siculum, siliquis ornithopodii. *Tournef. inst* 409.

Habitat in Sicilia *ad Capo passaro.*

Caulis *erectus, flexuosus: Ramis alternis, brevibus.* Folia *petiolis oblongis, viscosa: foliolis obovatis, serratis: intermedio duplo majore.* Stipulæ *semicordatæ.* Pedunculi *petiolo longiores.* Legumina *linearia, compressa, torulosa, cernua.*

* * * *Fruticosæ.*

ONONIS fruticosa, foliis ternatis carnosis sublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris. **tridentata.**

Anonis hispanica frutescens, folio tridentato carno[s]
Tournef. inst. 408. *Magn. hort.* 16. *t.* 16. *Raj. su[ppl.]*
466.
Habitat in Hispania. ♄
Caulis *erectus*, *paniculatus*. Stipulæ *subulatæ*, [...]
tæ. Foliola *linearia*, *carnosa*, *subcanaliculata*, [...]
ce tridentata, *ad latera denticulis obsoletis*. Racem[us]
terminalis, *parvus*, *hispido-glutinosus*: *pedunculis bi[flo]*
ris. Flos *purpureus*.

crispa. 14. ONONIS fruticosa, foliis ternatis subrotundis [un]
dulatis dentatis viscoso-pubescentibus, peduncu[lis]
unifloris muticis.
Anonis hispanica frutescens, folio rotundiore. *M[agn.]*
monsp. 17. *t.* 17. *Raj. suppl.* 466.
β. Anonis hispanica frutescens, folio rosæ sylve[stris.]
Tournef. inst. 409.
Habitat in Hispaniæ *monte Mariola prope Valentiam.*
Caulis *erectus*, *paniculatus*, *pubescenti-viscosus*. Fo[lio]
la, *obovata*, *obtusa*, *recurvata*, *canaliculata*, *pl[ica]*
ta, *subdentata*, *crispa*. Stipulæ *bifidæ*, *amplex[icau]*
les, *dentatæ*, *uti tota planta piloso-viscidæ*. Flore[s la]
terales, *axillares*, *solitarii*, *pedunculo brevissimo*. Ca[lyx]
quinquepartitus: *laciniis corolla dimidio brevioribus*, [...]
æqualibus, *tridentatis*. Corolla *flava*, *magnit[udine]*
foliorum: *vexillo extus sanguineo-striato*, *ut i[n]*
Natrice, *cui simillima*, *sed crispa*, *magis viscos[a]*
pedunculis muticis, *quosque deflorata valde recur[vat]*
ut fructus cauli approximetur.

fruticosa. 15. ONONIS fruticosa, floribus paniculatis, pedunc[ulis]
subtrifloris, stipulis vaginalibus, foliis ternatis la[n]
ceolatis serratis. *Hort. cliff.* 358. * *Roy. lugdb.* 37[6.]
Anonis montana præcox purpurea frutescens. *Dod[art.]*
act. 4. *p.* 249. *t.* 249.
Anonis purpurea frutescens non spinosa. *Dodart. m[em.]*
57. *t.* 57.
Anonis purpurea verna præcox frutescens, flore [ru]
bro amplo. *Moris. hist.* 2. *p.* 170. *Mill. dict. t.*
Duham. arb. 1. *t.* 58.
Habitat in montibus Delphinatus. ♄
Stipulæ vaginantes quadriaristatæ.

rotundifolia 16. ONONIS fruticosa, pedunculis trifloris, calycibus [tri]
phyllo-bracteatis, foliis ternatis subrotundis. *Hort. c[liff.]*
358. * *Roy. lugdb.* 376.

Cice[r]

Cicer sylvestre latifolium triphyllum. *Bauh. pin.* 347.
Cicer sylvestre tertium. *Dod. pempt.* 525.
Cicer sylvestre verius. *Lob. ic.* 2. *p.* 73.
Habitat in Alpibus Helveticis. ♄
Vexillum pubescens. Alæ carina breviores. Calyces cincti bracteis 3, *cordatis, approximatis, brevioribus.* Folia *parva, integerrima, glabra.*

* * * *

ONONIS spicis sessilibus, leguminibus nutantibus linearibus pilosis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 42. * — cernua.
Lotus africana annua hirsuta, floribus luteis. *Comm. hort.* 2. *p.* 163. *t.* 82.
Habitat ad Cap. b. Spei. ☉

ONONIS racemis pedunculatis longis, foliis ternatis suborbiculatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 41. * — capensis.
Habitat ad Cap. b. Spei. ☉

ONONIS pedunculis unifloris muticis, fructibus cernuis, foliis ternatis subrotundis crenatis. — reclinata.
Ononis pusilla hirsuta, flore ex albo & rubro colore mixto. *Moris. hist.* 2. *p.* 171.
Ononis purpurea non spinosa minor. *Barr. ic.* 354. *mala.*
Ononis annua pumila, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 408.
Habitat in Delphinatu, Hispania, Italia. ☉
Planta *viscoso-pubescens, parva, diffusa, patula.* Folia *petiolata, ternata, orbiculata, crassiuscula, plicata, crenata, viscoso-pubescentia.* Stipulæ *ovales, patulæ, obtusæ, serratæ.* Pedunculi *axillares, uniflori, mutici, longitudine vix foliorum.* Calyces *longitudine pedunculi.* Corollæ *albidæ vexillo subtus purpureo.* Calyx *deflorатus reflectitur apice ad caulem.* Legumen *calyce sesquilongius, villosum.*

ANTHYLLIS.

* *Herbaceæ.*

ANTHYLLIS herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. *Hort. upf.* 221. * *Sauv. monsp.* 237. — tetraphylla.
Anthyllis foliis quinato-pinnatis inæqualibus, floribus lateralibus. *Hort. cliff.* 371. *Roy. lugdb.* 389.
Lotus pentaphyllos vesicaria. *Bauh. pin.* 332.
Trifolium halicacabum. *Cam. hort.* 171. *t.* 47.

 Habi-

Habitat in Italia, Sicilia. ☉
Folium pinnatum tetraphyllum loco pentaphylli, cu
liolum infimum opposito careat. Stamina *diadelph*

Vulneraria. 2. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqua
capitulo duplicato.
Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus: terminal
jore. *Hort. cliff.* 371. *Fl. svec.* 594; 638. *Roy.*
289.
Loto affinis Vulneraria pratensis. *Bauh. pin.* 332.
Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.
β. Vulneraria supina, flore coccineo. *Dill. elth.*
320. *f.* 413.
Habitat in pratis Europæ *borealioris.* ♃

montana. 3. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis æquali
capitulo terminali secundo, floribus obliquatis
Vulneraria foliis pinnatis æqualibus: sub umbell
matis. *Hall. helv.* 569. *Sauv. monsp.* 237.
Barba jovis pumila villosa, flore globoso, purp
Br. *Garid. aix.* 55. *t.* 13.
Astragalus incanus tomentosus, pallido globoso
italicus. *Barr. rar.* 1391. *t.* 722.
Astragalus villosus, floribus globosis. *Bauh. pin.*
Astragalus purpureus. *Dalech. hist.* 1347.
Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galloprov
rupe Victoriæ, Austriæ *monte Anas.* ♃
Caules *simplices, prostrati.* Folia *subduodecimjuga*
pari vix majore. Capituli *folia floralia* 2, *pal*
ut in A. Vulneraria. Corollæ *saturate purpureæ,*
ßeis non longiores. Flores *semiresupinati s. vexil*
latus, nec sursum, spectante.

cornicina. 4. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqua
capitulis solitariis.
Habitat in Hispania. *Læfl.* ☉.
Caulis *ramosus, spithamæus.* Folia *pinnata: folio*
s. 7, *ovali-lanceolatis, impari paulo majore.* Pe
culi *axillares, pilosi, longitudine foliorum.* Cap
lateralia & terminalia, pedunculata, ex 10 *ad* 12
bus, rotunda, pilosa, folio ternato aut pinnato
pta. Calyces *subrotundi, inflati.*

lotoides. 5. ANTHYLLIS herbacea, foliis tripartitis, caly
prismaticis fasciculatis longitudine leguminum.

Lot

Lotus pentaphyllos, filiquis curvis pedes corvinos referentibus. *Bauh. pin.* 332.
Coronopus ex cod. cæsareo. *Dod. pempt.* 109. *male.*
Habitat *in* Hispania *Læfl.* ⊙
Planta *pilosa, procumbens.* Folia *caulina ternata, lateralibus basi coadunatis in unum cuneiforme, intermedio subsessili.* Stipulæ *magnitudine & figura foliorum.* Folia *floralia ternata, sessilia, absque stipulis.* Capitulum *ex* 5, *s.* 6 *floribus, Calycibus admodum oblongis ratione plantæ, angustis, prismaticis, parallelis, pilosis.* Flores *lutei.* Legumina *cylindrica, longitudine calycis, eoque vestita.* Stamen *decimum distinctum.* Habitus *ita antecedentium, ut facies vetet genere distinguere.*

* * *Fruticosæ.*

ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis æqualibus, floribus capitatis. *Hort. cliff.* 371. *Hort. upf.* 221. *Roy. lugdb.* 379. *Sauv. monsp.* 237. — Barba jovis
Barba jovis. *Bauh. pin.* 397.
Barba jovis pulchre lucens. *Bauh. hist.* 1. *p.* 385.
Habitat *in* Italiæ, Hispaniæ, Orientis *rupibus.* ♄

ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis, floralibus ternatis. — heterophylla.
Barba jovis minor lusitanica, flore minimo variegato. *Tournef. inst.* 651.
Habitat *in* Lusitania, Hispania. *Alstrœmer.* ♄
Frutex *procumbens, teres, incanus, subpubescens.* Folia *pinnata, octojuga cum impari, lanceolata, acuta sericea;* Floralia *sessilia, ternata, remota, lanceolata, obtusiuscula.* Pedunculi *breves, apice terminati foliolis tribus floribusque sæpius* 2., *sessilibus, minutis.*

ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, calycibus lanatis lateralibus. — Cytisoides.
Anthyllis fruticosa, foliis ternatis: intermedio productiore. *Hort. upf.* 221.
Cytisus foliis ovatis acutis nitidis, floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 370.
Cytisus incanus, folio medio longiore. *Bauh. pin.* 390.
Cytisus V. *Clus. hist.* 1. *p.* 96.
...tium latifolium, parvo flore. *Barr. ic.* 1182.
Habitat *in* Hispania. ♄
...ina omnia connata.

 Rami

Rami *virgati ut in Spartiis*, *teretes*, *tomentosi*,
Folia *subsessilia*, *ternata*, *elliptico-lanceolata*,
elevatis, *mollia*: *intermedio duplo majore pet*
Infima folia sæpe simplicia. Flores *axillares*, *s*
sæpius bini. Calyces *oblongi*, *cylindrici*, *albo*-
Corollæ *luteæ*: *vexillo lateribus reflexo*, *apice*
ginato.

hermaniæ. 9. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis subp
culatis, calycibus nudis.
α Dorycnium foliis solitariis, floribus ad alas con
Hort. cliff. 370. *
Barba jovis cretica, linariæ folio, flore luteo p
Tournef. cor. 4
Barba jovis cretica. *Riv. tetr.*
Spartium spinosum. *Alp. exot.* 27. *t.* 26.
Habitat in Græcia, Creta, Palæstina. ♄
Calyces *in hac vix ventricosi*, *at Habitus cum p*
denti idem. Flores 4, *pedunculis propriis brev*
Rami *in spinam desinentes.*

erinacea. 10. ANTHYLLIS fruticosa spinosa, foliis simplic
Genista-spartium spinosum, foliis lenticulæ, flo
ex cæruleo purpurascentibus. *Bauh. pin.* 394.
Erinacea. *Clus. hist.* 1. *p.* 107.
Habitat in Hispania. ♄
Tota constat spinis; ad ramorum exortum squama
ta; Folia *oblongo-ovata*, *tomentosa*, *ad flores*
ta sæpius terna.

LUPINUS.

perennis. 1. LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis:
superiore emarginato, inferiore integro. *Mill.*
t. 1 0. *f* 1. *Kalm. it.* 3. *p.* 96. *Gron. virg.* 104.
Lupinus calycibus alternis, radice perenni rep
Gron. virg. 1. *p.* 172.
Lupinus radice reptatrice perenni. *Roy. lugdb.* 53
Lupinus cæruleus minor perennis virginianus rep
Moris hist. 2. *p.* 87. *s.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♃
Folia *ex foliolis* 8, *lanceolatis*, *obtusis*, *glabris.* Ra
mi *longissimi floribus alternis*, *sæpius* 2 *ex singulo*
no puncto, *pedicellis propriis insidentibus.*

2. LUPI

LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro, inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. upf.* 209. *Mat. med.* 350. *Roy. lugdb.* 366. albus.
Lupinus caule compofito. *Hort. cliff.* 359.
Lupinus fativus, flore albo. *Bauh. pin.* 347. *Cluf. hift.* 2. *p.* 228.
Lupinus flore albo. *Riv. tetr.*
Habitat - - - - ☉

LUPINUS calycibus alternis appendiculatis: labio fuperiore bipartito, inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. upf.* 209. hirfutus.
Lupinus peregrinus major f. villofus cæruleus major. *Bauh. pin.* 348. *prodr.* 148.
Lupinus exoticus hirfutiffimus. *Bauh. hift.* 2. *p.* 289.
Habitat in Arabia, Archipelagi *infulis*, Hifpania. ☉
Sylveftris *foliis quinatis, longe petiolatis:* Foliola *lanceolata, bafi anguftiora, pilis ferrugineis adfperfa.* Flores *cærulefcentes. Legumina uti tota planta vefti-ta pilis ferrugineis, denfis, longis. Flores huic fæpe laterales.*

LUPINUS calycibus femiverticillatis appendiculatis: labio fuperiore bifido, inferiore fubtridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. upf.* 367. varius.
Lupinus fylveftris, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 348.
Lupinus fylveftris, flore purpureo, femine rotundo vario. *Bauh. hift.* 2. *p.* 291.
Habitat Meffanæ, Monfpelii *inter fegetes.* ☉
Florum vexilli medio rubri.

LUPINUS calycibus alternis appendiculatis: labio fuperiore bipartito, inferiore integro. anguftifolius.
Lupinus anguftifolius cæruleus elatior. *Raj. hift.* 908.
Lupinns flore cæruleo minore. *Riv. tetr.*
Habitat in Hifpania, Meffanæ *inter fegetes.* ☉
Foliola fere linearia.

LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio fuperiore bipartito, inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. upf.* 209. *Roy. lugdb.* 367. *Sauv. monfp.* 215. luteus.
Lupinus fylveftris, flore luteo. *Bauh. pin.* 348. *Riv. tetr.*
Lupinus flore luteo, femine compreffo vario. *Bauh. hift.* 2. *p.* 291.

Habitat in Siciliæ *arenosis.* ☉
Huic flores subsessiles, odorati, bracteis ovatis.

integrifolius. 7. LUPINUS calycibus alternis appendiculatis, simplicibus oblongis villosis. *Amæn. acad.* 6. *afr*
Habitat ad Cap. b. Spei. ☉

PHASEOLUS.

* *Scandentes.*

vulgaris. 1. PHASEOLUS volubilis, floribus racemosis gem bracteis calyce minoribus, leguminibus pendul
Phaseolus radice annua, caule volubili, legumin pendulis compressis torosis. *Roy. lugdb.* 367. *upf.* 213. *Mat. med.* 351.
Phaseolus vulgaris. *Lob. ic.* 59. *Hort. cliff.* 359.
Smilax hortensis s. Phaseolus major. *Bauh. pin.* 3
coccineus. β. Phaseolus volubilis, floribus racemosis geminis, cteis calyce brevioribus, leguminibus pendul
Phaseolus puniceo flore. *Cornut. canad.* 184.
Phaseolus indicus, flore coccineo s. puniceo. *hist.* 2. *p.* 69.
Habitat in Indiis. ☉

lunatus. 2. PHASEOLUS volubilis, leguminibus acinacif bus sublunatis lævibus.
Phaseolus benghalensis scandens, siliqua acinac mi, semine ovato compresso striato. *Berg. viad*
Habitat in Benghala. ☉
Foliola *lateralia exteriori latere duplo latiora.* F *minimi, virides; alis albis concavis, dein flav tibus; carina spirali.*

namcenus. 3. PHASEOLUS volubilis, florum vexillo revol calycibus concolore. *Hort. cliff.* 359. *
Habitat in Africa. ☉

farinosus. 4. PHASEOLUS volubilis pedunculis subcapitatis minibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *upf.* 214.
Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomen *Nill. act.* 1730. *p.* 577. *t.* 42.
Phaseolus indicus, hederæ folio angulosò, se oblongo lanuginoso. *Raj. suppl.* 348.
Habitat in India.

5. PH.

...SEOLUS volubilis, pedunculis petiolo crassiorbus capitatis, alis subfulcatis difformibus, legumi... linearibus strictis. — vexillatus.

...lus radice annua, leguminibus strictis erectis to... linearibus, caule hirsuto. *Roy. lugdb.* 367.

...lus flore odorato, vexillo amplo patulo. *Dill. elth.* ... *t.* 234. *f.* 302.

... Havanæ. ⊙

... *basi solutæ, bifidæ.* Pedunculi *glabri, reliquis* ...*bus pilosis.* Pedunculus *petiolis crassior.* Flores ... *sessiles, odorati.* Calyx *bracteis 2 minimis.* ...llum *emarginatum, latum, reflexum, pagina in*...*e lineatum.* Alæ *subfalcatæ : dextra ad basin* ...*distincta a basi, quod non in sinistra, unde flos* ...s. Carina *falcata, parum obliquata, rostrata, a*...*bifido.* Legumen *lineare.* Planta *media inter* ...*los & Dolichos.*

...OLUS volubilis, floribus capitatis, calycibus ...tis, vexillis brevibus, alis expansis maximis. — helvulus.

...us radice annua, leguminibus erectis linearibus ...ibus glabris. *Roy. lugdb.* 368.

...us flore helvulo, alis amplis patulis. *Dill. elth.* *t.* 233. *f.* 300.

... *in* Carolina. ⊙

...EOLUS volubilis, floribus laxe spicatis, alis ...udine vexilli. — alatus.

...us flore purpureo, alis amplis longe protensis. ...*lth.* 314. *t.* 235. *f.* 303.

... - - - - ⊙

...OLUS volubilis, vexillis carinaque spiraliter ...olutis. — Caracalla.

...us radice perenni subrotunda, leguminibus fo... ...ngioribus teretiusculis glabris. *Roy. lugdb.* 367.

...lus indicus, cochleato flore. *Triumf. obs.* 93. *t.* ...*aj. hist.* 1890.

... *in* India.

* * *erecti.*

...OLUS caule erectiusculo lævi, bracteis ca...ajoribus, leguminibus pendulis compressis ru... *Hort. upf.* 213. *Amæn. acad.* 4. *p.* 284. — nanus.

...s vulgaris italicus humilis s. minor, albus cum nigricante. *Bauh. hist.* 2. *p.* 358. *Raj. hist.* 885.

Smilax siliqua sursum rigente s. Phaseolus p licus. *Bauh. pin.* 339.
Habitat in India. ☉

radiatus. 10. PHASEOLUS caule erecto tereti, floribus c leguminibus cylindricis horizontalibus. *A* 1742. *p.* 202. *t.* 7. *f.* 2. *Hort. upf.* 213. *Fl. zeyl.*
Phaseolus zeylanicus, siliquis radiatim dige *elth.* 315 *t.* 235. *f.* 304.
Habitat in China, Zeylona. ☉

Max. 11. PHASEOLUS caule erecto anguloso hispid minibus pendulis hirtis. *Hort. cliff.* 499. *R* 367. *Fl. zeyl.* 280. *Gron. orient.* 217.
Phaseolus orthocaulis, Mungo persarum. *H* 887.
Fructus niger, coriandro similis. *Bauh. pin.* 41
Cadelium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 388. *t.* 140.
Habitat in India. ☉

lathyroides. 12. PHASEOLUS? caule erecto, foliolis lance
Phaseolus minor erectus pratensis, foliis oblon xillo minore, siliquis gracilibus. *Brown. jam.*
Phaseolus erectus lathyroides, flore amplo c *Sloan. jam.* 71. *hist.* 1. *p.* 183. *t.* 116. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

sphaerospermus. 13. PHASEOLUS? caule erecto, seminibus hilo tincto. †
Phaseolus erectus, siliquis gracilibus teretibus p mis, seminibus subrotundis hilo nigro. *Bro* 292.
Phaseolus erectus minor, semine sphaerico albi nigro. *Sloan. jam.* 72. *hist.* 1. *p.* 185. *t.* 11 2, 3.
Phaseolus indicus, fructu stricto albo minore n cula. *Pluk. alm.* 290.
Habitat in Indiis. ☉

DOLICHOS.

* *Volubiles.*

sinensis. 1. DOLICHOS volubilis, pedunculis multifloris e leguminibus pendulis cylindricis torulosis. *A* *ead.* 4 *p.* 326.*

Dol

[Do]lichos sinensis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 375. *t.* 134.
[Ha]bitat *in* India. ⊙

[D]OLICHOS volubilis, leguminibus ovato-acinaciformibus, seminibus ovatis hilo arcuato versus alteram [ex]tremitatem. *Roy. lugdb.* 368. *Hort. upf.* 214. *Hass[elq]. it.* 483. — Lablab.
[Pha]seolus ægyptius, nigro semine. *Bauh. pin.* 341.
[Pha]seolus niger Lablab. *Alp. ægypt.* 74. *t.* 75. *Vesl. [æ]gypt.* 27.
[Hab]itat *in* Ægypto. ⊙
[Le]gumina *dorso scabra.* Caules ramique *teretes, retror[s]um scabri.* Pedunculi *semiverticillati.*

[D]OLICHOS volubilis, pedunculis multifloris, leguminibus cylindricis hirsutis apice unguiculo subulato [h]amato, caule hirto. — uncinatus.
[Ph]aseolus hirsutus, siliquis erectis & aduncis. *Plum. [s]pec.* 8. *ic.* 221.
[Hab]itat *in* America.

[DO]LICHOS volubilis, leguminibus capitatis subcy[lin]draceis: apice recurvo concavo. *Hort. upf.* 214. — unguiculatus.
[Phase]ra nigra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 381. *t.* 138. *f.?*
[Hab]itat *in* Barbados.

[D]OLICHOS volubilis, leguminibus subcylindricis [lae]vibus longissimis. — sesquipedalis.
[Hab]itat *in* America. ⊙
[Spec]ies *Phaseoli.* Flores *vexillo supra pallido, intus [ru]fescente.* Legumen *ultra sesquipedale, teretiuscu[lu]m apice unguiculo obtuso gibbo.*

[D]OLICHOS volubilis, leguminibus racemosis hirtis [in]æqualibus, seminibus hilo cinctis. *Jacq. amer.* 27. — altissimus.
Rheed. mal. 8. *p.* - *t.* 36.
[Ha]bitat *in* Indiis.

[D]OLICHOS volubilis, leguminibus racemosis hirtis: valvulis subcarinatis, pedunculis ternis. *Jacq. amer.* 27. *n.* 2. — pruriens.
[Ph]aseolus brasilianus frutescens, lobis villosis pungentibus. *Sloan. jam.* 68. *hist.* 1. *p.* 178.
[Cap]ra pruritus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 393. *t.* 142.
[Na]corana. *Rheed. mal.* 8. *p.* 61. *Fl. zeyl.* 539.
[Habi]tat *in* Indiis.
[Leg]umina *hujus & sequentis hirta urunt.*

8. DO-

urens. 8. DOLICHOS volubilis, leguminibus racemosis transversim lamellatis, seminibus hilo cinctis. *amer.* 27.

Phaseolus americanus frutescens. foliis glabris, pluribus villosis pungentibus, fructu orbiculari hilo nigro ambiente *Pluk. phyt.* 213. *f.* 2.

Phaseolus brasilianus frutescens, lobis villosis pu[...] tibus maximis. *Sloan. jam.* 68. *hist.* 1. *p.* 178.

Phaseolus hirsutus, siliquis articulatis. *Plum. sp[...]* *ic.* 222.

Zoophthalmum siliquis majoribus hirtis transverse[...] tis, pedunculis communibus longissimis flexi[...] *Brown. jam.* 295.

Mucuna. *Marcgr. bras.* 19.

Kaku valli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 63.

Habitat in America *meridionali.* ♄

tetragonolobus. 9. DOLICHOS volubilis leguminibus membranaceo[...] drangulatis.

Lobus quadrangularis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 374. *t.*[...]

Habitat in India.

capensis. 10. DOLICHOS volubilis, pedunculis subbifloris, [...] minibus ellipticis compressis, foliis glabris. [...] *acad.* 6. *afr.* 44.*

Phaseolus africanus luteus, siliquis brevibus dep[...] *Herm. afr.* 17.

Habitat ad Cap. b. Spei.

minimus. 11. DOLICHOS volubilis, leguminibus racemosis [...] pressis tetraspermis, foliis rhombeis.

Dolichos minimus, floribus luteis. *Hort. cliff.* 36[...] 21.* *Hort. upsf.* 214.

Phaseolus exiguus glaber, trifolii foliis, siliqua p[...] compressa. *Burm. zeyl.* 188. *t.* 84. *f.* 2.

Phaseolus minimus fœtidus, floribus spicatis e viridi[...] teis, semine maculato. *Sloan. hist.* 1. *p.* 182. *t.* 115. *f.*

Habitat in Jamaica.

scarabæoides. 12. DOLICHOS volubilis, foliis ovatis tomentosis, fl[...] ribus solitariis, seminibus bicornibus. *Fl. zeyl.* 28[...]

Phaseolus minimus bisnagaricus, foliis argenteo villo[...] siliquis torosis brevibus spadicea hirsutie pubesce[...] bus, fructu parvo scarabæoide nigro. *Pluk. alm.* [...] *t.* 52. *f.* 3

Habitat in India.

13. DO-

OLICHOS volubilis, foliis glabris multangulis den- **bulboſus.**
tis.
ſeolus nervicenſis, foliis multangulis, tuberoſa radice.
uk. alm. 292. *t.* 52. *f.* 4.
ca bulboſa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 373. *t.* 132.
tat in Indiis.

OLICHOS volubilis, foliolis lateralibus extrorſum **trilobus.**
bis: intermedio trilobo. *Hort. cliff.* 360.*
ſeolus maderaſpatanus, foliis glabris trilobis, flori-
s exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemi-
. *Pluk. alm.* 292. *t.* 214. *f.* 3.
at in India.

OLICHOS volubilis, pedunculis bifloris axillari- **ariſtatus.**
s, leguminibus linearibus compreſſis ariſta termi-
li recta.
tat in America. ☉
lis teres. Foliola *lævia*, *ovato-oblonga*, *acuminata.*
dunculi *axillares*, *gemini ſ. biflori.* Legumina
icta, *terminata Ariſta filiformi*, *ſtricta*, *recta*, *a-*
a, *pollicari longitudine.*

OLICHOS volubilis foliolis linearibus obtuſis mu- **filiformis.**
onatis glabris ſubtus pubeſcentibus. *Amæn. acad.*
p. 402.*
chos herbaceus minor, foliis linearibus, ſiliqua po-
ſperma compreſſa. *Brown. jam.* 294.
tat in Jamaica.

OLICHOS volubilis, caule pubeſcente, legumi- **pubeſcens.**
bus ternis ſubſeſſilibus compreſſis piloſis nutantibus.
at in America.
ra Phaſeoli vulgaris, *ſed tota planta mollior*, *pu-*
ſcens. Foliola *ſupra nudiuſcula*: *intermedio ſub-*
mbeo; *lateralibus extus gibbis*, *intus lanceolatis.*
ores axillares, *terni*, *ſeſſiles*, *albo-flaveſcentes ma-*
la fuſca in vexillo. Legumina *oblonga*, *pubeſcentia*,
rum recurvata.

OLICHOS volubilis, caule glabro, petiolis ſub- **purpureus.**
beſcentibus, corollæ alis patentibus.
in Indiis.
purpuraſcens. Foliola *ſubcordata glabra ſubtus*
purpureis reticulata. Calyces *obtecti bracteis*
us. Corolla *læte purpurea.* *Alæ horizontaliter*
patulæ.

patulæ. Carina *sub apice violacea.* Legume *pressum.*

regularis. 19. DOLICHOS volubilis, foliis ovatis obtusis, culis multifloris, petalis æqualis magnitudin ræque. *Gron. virg.* 82.
Habitat in Virginia.

lignosus. 20. DOLICHOS volubilis, caule perenni, ped capitatis, leguminibus strictis linearibus.
Dolichos caule perenni lignoso. *Hort. cliff.* 36
Phaseolus indicus perennis, floribus purpurasce *Eichr. carol.* 36.
Cacara s. Phaseolus perennis. *Rumph. amb.* 5. *t.* 136.
Habitat in India. ♄

polystachios 21. DOLICHOS volubilis, caule perenni, spic gissimis, pedicellis geminis, leguminibus acu compressis. *Gron. virg.* 2. *p.* 106.
Dolichos caule lignoso, pedunculis ex ala plurim ribus spicatis, legumine longo apice sursum nato. *Gron. virg.* 1. *p.* 172.
Habitat in Virginia.

* * *Recti.*

repens. 22. DOLICHOS caule repente, foliis pubescenti vatis, floribus racemosis geminis, leguminibu ribus teretibus. *Amœn. acad.* 5. *p.* 492.
Dolichos maritimus minor repens, pedunculis l ribus, siliquis polyspermibus gracilibus ter *Brown. jam.* 293.
Habitat in Jamaicæ *maritimis.*

ensiformis. 23. DOLICHOS caule suberecto leguminibus gl tricarinatis, seminibus arillatis. *Hort cliff.* 360
Phaseolus suberectus major, siliquis maximis ot glabris: sutura altera nervo majore utrinque. *jam.* 291.
Phaseolus maximus, siliqua ensiformi nervis insi semine albo membranula incluso. *Sloan. hist.* 177. *t.* 114. *f.* 1, 2, 4.
Lobus machæroides. *Rumph. amb.* 5. *p.* 376. *t.* 13
Bara mareka. *Rheed. mal.* 8. *t.* 44.
Habitat in Jamaica.
Legumen rugis elevatis sparsis.

24.

OLICHOS caule erecto flexuoso, racemis axilla- Soja.
bus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdisper-
s. *Fl. zeyl.* 534. *Mat. med.* 363.
olus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris
dido. *Kæmpf. amæn.* 837. *t.* 838.
at in India.

OLICHOS caule perenni lævi, pedunculis biflo- biflorus.
, leguminibus erectis. *Roy. lugdb.* 368.
tat in India.

GLYCINE.

YCINE foliis ternatis radicalibus, caulibus pro- subterranea.
tis flexuosis, pedunculis bifloris.
oloides mariana procumbens, angustiori folio tri-
yllos, flore gemello. *Raj. suppl.* 437.
eolus canadensis minimus, siliquam terra condens.
rt. parif. 140.
idna phaseoloides americana. *Herm. prodr.* 314.
lubi de angola. *Marcgr. bras.* 43. *Raj. hist.* 919.
obi. *Læt. amer. c.* 13.
at in Brasilia, Surinamo. *C. Dahlberg.* ⊙
*ternata, radicalia: foliolis oblongis, nudis, obtu-
culis: petiolo erecto, palmari, triquetro.* Caules
*mares, plures, terræ arcte adpressi, flexuosi, ra-
s foliosi.* Pedunculi *axillares, brevissimi, cernui,
ori.* Flores *sessiles.* Bracteæ 2, *ovatæ, calyci in-
bentes.* Calyx *quadrifidus: superiore emarginata.*
rolla *flava:* Vexillum *obovatum, emarginatum,
tum.* Alæ *longitudine vexilli, oblongæ, obtusæ.*
rina *conformis.* Stamina *diadelpha.* Germen *ob-
gum.* Stylus *latere superiore hirsutus.* Stigma *ob-
m. Defloratus Pedunculus penetrat terram ut in
folio subterraneo, Arachi hypogæa.* Legumen *sub-
iforme, utrinque acutiusculum.*

CINE foliis ternatis nudiusculis, caule piloso, monoica.
emis pendulis, floribus fructiferis apetalis. *Fil.
d.* 2.*
ine bracteata. *Sp. pl.* 1. *p.* 754.
ine foliis ternatis, pedicellis bracteatis. *Gron. virg.*

in Americæ septentrionalis *umbrosis madidis.* ♃
etrorsum griseo-pilosus. Stipulæ *ovatæ, erectæ.*
mi *nutantes, multiflori:* Flores *facie Viciæ
Craccæ:*

Graccæ : Vexillo pallide violaceo ; Alis Carin-bis ; Staminibus Pistilloque instructi , sed , effe-sculi absque fructu. Pedunculi *inferiores lo-dependentes , uniflori :* Flos *Calycis & Pi-dimento , sed mutilatus apetalus , e quo* Legu-*mine uno alterove ; adeoque nuptiæ leges ut i-mirabili.*

javanica. 3. GLYCINE foliis ternatis, caule villoso, petio-sutis, bracteis lanceolatis minutis.
Habitat in India.
Caulis *volubilis Phaseoli , adspersus pilis flavis flexis.* Folia *Phaseoli.* Pedicelli *flavi pilis* Stipulæ *ad petiolos ovali-oblongæ, ad pedun-ro lanceolatæ.* Pedunculi *longitudine foliorum minati* Spica *ovato-oblonga , densa :* Floribus *tibus, violaceis , interstinctis* Bracteis *minutissi-*

comosa. 4. GLYCINE foliis ternatis hirsutis, racemis late-*Gron. virg.* 107.
Glycine foliis ternatis. *Gron virg.* 1. *p.* 85.
Phaseolus marianus scandens , floribus como-*mus.* 453.
Habitat in Virginiæ *umbrosis madidis.*

tomentosa. 5. GLYCINE foliis ternatis tomentosis, racemis ribus brevissimis, leguminibus dispermis. *Gron.* 106.
Ononis caule volubili. *Gron. virg.* 1. *p.* 81.
Anonis phaseoloides scandens, floribus flavis sessi-*Dill. elth.* 30. *t.* 26. *f.* 29.
Habitat in Virginia. ♃

bituminosa. 6. GLYCINE foliis ternatis, floribus racemosis, l-minibus tumidis villosis.
Phaseolus africanus hirsutus bituminosus, siliquis latis, flore flavo. *Herm. lugdb.* 492. *t.* 493.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Caulis *volubilis , obtusangulus , pubescens.* Foliola *ta, glabra, subtus subpubescentia.* Stipulæ *ovatæ cuminatæ , nervosæ.* Racemi *axillares , folio lo-res , pubescentes.* Corollæ *luteæ , striatæ , extu-ceque carinæ violaceæ , obtusissimæ Hedysari.* St-na *diadelpha , non Ononidis.* Legumina *hirta,* l-*ta Crotalariæ.*

7. GL

LYCINE foliis abrupto-pinnatis: pinnis numero-fis obtufis. Abrus.
ycine foliis pinnatis geminis: pinnis ovatis oblon-is obtufis. *Fl. zeyl.* 284. * *Hort. upf.* 228.
afeolus Glycyrrhizites, folio alato, pifo coccineo ra macula notato. *Sloan. jam.* 70. *hift.* 1. *p.* 180. *t.* 112. *f.* 4, 5, 6.
afeolus arborefcens alatus & volubilis major orientalis, fructu coccineo hirto nigro notato. *Pluk. alm.* 294. *t.* 214. *f.* 5.
m indicum minus coccineum. *Bauh. pin.* 212.
s. *Vesl. ægypt.* 25. *Hort. cliff.* 488. *Hill. anat.*
Rumph. amb. 5. *p.* 57. *t.* 32.
l. *Rheed. mal.* 8. *p.* 71. *t.* 39.
tat in Indiæ *argillofis lapidofis.* ♄
s a Glycine diverfiffimus. Plantæ mihi non flo-re.

YCINE foliis impari-pinnatis ovato-lanceolatis. Apios.
rt. upf. 227.
ine radice tuberofa. *Hort. cliff.* 365. *Gron. virg.* 7. *Roy. lugdb.* 391.
s americana. *Corn. canad.* 200. *t.* 201. *Stiff. bot.* *t.* 29.
alus perennis fpicatus americanus fcandens libus, radice tuberofa. *Morif. hift.* 2. *p.* 102. *f.* *t.* 9. *f.* 1.
tat in Virginia. ♃
dubium, forte propius Aftragalis, fed corolla di-fa, imprimis carina lineari maxime falcata.

YCINE foliis impari-pinnatis, caule perenni. frutefcens.
rt. cliff. 361. *Roy. lugdb.* 391.
oloides frutefcens caroliniana, foliis pinnatis, ibus cæruleis conglomeratis. *Hort. angl.* 55. *t.* 15.
at in Carolina. ♄
edenti nimis affinis.

CLITORIA.

TORIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 360. *Hort.* Ternatea.
214. *Fl. zeyl.* 283. *
us indicus, glycyrrhizæ foliis, flore amplo eo. *Comm. hort.* 1. *p.* 47. *t.* 24.
litoridis ternatenfium. *Breyn. cent.* 76. *t.* 31.
eruleus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 56. *t.* 31.

Schonga-Cuſpi. *Rheed. mal.* 8. *p.* 69. *t.* 38.
Habitat in Indiis. ♃

brasiliana. 2. CLITORIA foliis ternatis, calycibus campan ſolitariis. *Hort. upſ.* 215.
Clitoria foliis ternatis. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.*
Planta leguminoſa braſiliana, phaſeoli flore, flore pureo maximo. *Breyn. cent.* 78. *t.* 32.
Habitat in Braſilia.

virginiana. 3. CLITORIA foliis ternatis, calycibus campan ſubgeminis. *Gron. virg.* 111.
Clitoria major ſcandens, floribus geminatis. *B jam.* 298.
Clitorius trifolius, flore minore cæruleo. *Dill. el t.* 76. *f.* 87.
Habitat in Virginia, Jamaica.

mariana. 4. CLITORIA foliis ternatis, calycibus cylindricis. *virg.* 111.
Clitorius marianus trifolius ſubtus glaucus. *Pe* 243.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

Galactia. 5. CLITORIA foliis ternatis, floribus pendulis, ra erecto.
Galactia foliis ovatis glabris pinnato-ternatis, ſpi longis. *Brown. jam.* 298. *t.* 32. *f.* 2.
Phaſeolus minor lacteſcens, flore purpureo. *Sloa* 71. *hiſt.* 1. *p.* 182. *t.* 114. *f.* 4.
Habitat in Jamaica.
Perianthium *quadridentatum: Lacinia ſuperiore feriore majore, obtectum* Bracteis *duabus, mi deciduis.* Corolla *pentapetala: petalis omnibus gis anguſtis; Vexillo cæteris latiore incumbente.* gma *obtuſum.* Legumen *teres.* Semina *ſubr* Racemi *floribus geminis pluribusve.*

PISUM.

ſativum. 1. PISUM petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotu crenatis, pedunculis multifloris. *Hort. upſ.* 2
Piſum ſtipulis crenatis. *Hort. cliff.* 369. *Mat. me*
Piſum. *Cam. epit.* 213.
β. Piſum hortenſe majus. *Bauh. pin.* 342.
γ. Piſum ſine cortice duriore. *Bauh. pin.* 343.

δ. P

um umbellatum. *Bauh. pin.* 344. *umbellatum*
m majus quadratum. *Bauh. pin.* 342. *quadratum*
itat in Europæ *agris.* ⊙
ola conduplicata.

UM petiolis tetraphyllis, ſtipulis crenatis, pedun- arvenſe.
ulis unifloris. *It. w-goth.* 107. * *Fl. ſvec.* 2. *n.* 638.
m pulchrum, folio anguloſo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 297.
oriſ. hiſt. 2. *p.* 47. *ſ.* 2. *t.* 1. *f.* 4.
itat inter Europæ *ſegetes.* ⊙

UM petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato, ſti- maritimum
ulis ſagittatis: pedunculis multifloris. *Fl. ſvec.* 608.
6. *It. w-goth.* 190.*
m ſtipulis integerrimis. *Hort. cliff.* 368.
m marinum. *Raj. hiſt.* 892. *Fl. lapp.* 272.
m ſpontaneum perenne repens humile. *Moriſ. hiſt.*
p. 47. *ſ.* 2. *t.* 1. *f.* 5.
itat in Europæ, Canadæ *borealis litoribus maris*
enoſis. ♃
opæa *planta tota, excepta foliorum pagina ſuperio-*
, leviter pubeſcens. Canadenſis *vero tota glabra &*
plo major. Utraque *foliolis convolutis.*

UM petiolis decurrentibus membranaceis diphyl- Ochrus.
, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 370. *Hort. upſ.*
5.
rus folio integro capreolos emittente. *Bauh. pin.*
3.
ilia ſylveſtris. *Dod. pempt.* 522.
itat inter ſegetes Cretæ, Italiæ. ⊙
ola convoluta.

OROBUS.

OBUS foliis conjugatis ſubſeſſilibus, ſtipulis den- Lathyroid
tis. *Hort. upſ.* 220.
yroides erecta, folio ovato acuminato, cæruleis
iciæ floribus & ſiliquis, ſibirica. *Amm. ruth.* 151.
7. *f.* 2.
itat in Sibiria. ♃
OBUS foliis conjugatis petiolatis, ſtipulis integris. hirſutus.
s caule ſimpliciſſimo, foliolis binis ovatis. *Hort.*
366. *
us latifolius repens, flore cæruleo, foliis & ſiliquis
utis. *Bærh. lugdb.* 2. *p.* 46.

Orobus sylvaticus, foliis circa caulem auricul
Buxb. cent. 3. *p.* 22. *t.* 41.
Habitat in Thracia. ♃

teus. 3. OROBUS foliis pinnatis ovato-oblongis, sti
rotundato-lunatis dentatis, caule simplici.
Orobus alpinus latifolius. *Bauh. pin.* 351. *prodr.*
Burs. XIX. 151.
Habitat in Sibiriæ, Veronæ, Pyrenæorum *alpini*
Habitus *Orobi verni, sed altior, crassior, major.* I
pinnata 4. *s.* 5. *paribus, ovato-oblonga.* Stipulæ
subrotundo-lunares, dentatæ. Caulis *simplex.* Ra
axillares, secundi; floribus numerosis majoribus.

ernus. 4. OROBUS foliis pinnatis ovatis, stipulis semisag
tis integerrimis, caule simplici.
Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus o
acutis. *Hort. cliff.* 366. *Fl. svec.* 595; 641.
lugdb. 366. *Hall. helv.* 602.
Orobus sylvaticus purpureus vernus. *Bauh. pin*
Thal. herc. 80. *t.* 6.
Habitat in Europæ *borealis nemoribus.* ♃

uberosus. 5. OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis se
gittatis integerrimis, caule simplici.
Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus la
latis integris. *Hort. cliff.* 366. *Fl. svec.* 596;
Roy. lugdb. 366.
Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris.
pin. 351.
Astragalus sylvaticus. *Thal. herc.* 7. *t.* 1.
Lathyrus angustifolius, radice tuberosa. *Loes.*
138. *t.* 37.
Habitat in Europæ *borealis pratis & sylvis.* ♃

angustifolius. 6. OROBUS foliis bijugis ensiformibus, stipulis s
tis, caule simplici.
Habitat in Sibiria. ♃
Habitus *antecedentis, sed* Folia *ensiformi-lanceol*
pinnata ex 2. *s.* 3. *oppositionibus, absque cirrho.*
cemi *floribus paucis luteis.*

niger. 7. OROBUS caule ramoso, foliis sexjugis ovato-o
gis. *Hort. cliff.* 366. *Fl. svec.* 597; 643. *Roy.*
366. *Hall. helv.* 603.
Orobus sylvaticus, viciæ foliis. *Bauh. pin.* 352
C

Orobus pannonicus 2. *Cluf. hist.* 2. *p.* 230.
Habitat in Europæ *borealis montosis.* ♃
Foliola convoluta.

OROBUS caule ramoso, foliis bijugis lanceolatis nervosis, stipulis subspinosis. **pyrenaicus.**
Orobus caule ramoso, foliis trijugis lanceolatis nervosis. *Sauv. monsp.* 235.
Orobus pyrenaicus, foliis nervosis. *Tournef. inst.* 235.
Orobus pyrenaicus latifolius nervosus. *Pluk. phyt.* 210. *f.* 2.
Habitat in Pyrenæis. ♃

OROBUS caule ramoso hirsuto decumbente, foliis subseptemjugis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 284. *n.* 66. † **sylvaticus.**
Orobus sylvaticus nostras. *Raj. angl.* 3. *p.* 324. *hist.* 1892. *Act. paris.* 1706. *p.* 87. *t.* 90.
Habitat in Anglia, Gallia. ♃

LATHYRUS.

* *Pedunculis unifloris.*

LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-cordatis. **Aphaca.**
Lathyrus cirrhis aphyllis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 218. *Roy. lugdb.* 362. *Dalib. paris.* 217.
Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. *Bauh. pin.* 345.
Aphaca. *Lob. ic.* 2. *p.* 70.
Habitat in Italia, Gallia, Anglia, Helvetia, *inter segetes.* ⊙
Cirrhus interdum aliquis gerit Foliola conjugata, 2, *lanceolata, reliquis Lathyris simillima, at hoc rarissime.*

LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. **Nissolia.**
Lathyrus foliis solitariis lentiformibus. *Vir. cliff.* 74. *Hort. cliff.* 366. *Roy. lugdb.* 263. *Dalib. paris.* 218.
Lathyrus sylvestris minor. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari, sine capreolis, nissoli. *Magn. hort.* 112. *t.* 112.
Habitat in Gallia, Anglia. ⊙
Cirrhi nulli. Caulis *erectus.* Stipulæ *minimæ, subulatæ.*

LATHYRUS pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. **amphicarpos.**

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radic bus etiam sub terra fructificantibus. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 262. *Sauv. monsp.* 19
Viciæ similis supra & infra terram siliquas gerens. *Bau pin.* 345.
Arachidna s. Arachoides honorii belli. *Bauh. hist.* 2. 323.
Habitat in Syria. ⊙
Conf. Vicia amphicarpa: Aracus homojon. *Clus. ex* 87. *t.* 88.

cera. 4. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyll leguminibus ovatis compressis dorso canaliculatis
Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foli lanceolato-linearibus, internodiis membranace *Sauv. monsp.* 193.
Lathyrus sativus flore purpureo. *Bauh. pin.* 344.
Aracus s. Cicera. *Dod. pempt.* 523.
Habitat in Hispania. ⊙
Medius inter antecedentem & sequentem magnitudi Petioli *latere non membranacei.* Corollæ *rubræ.* Le gumina *dorso canaliculata, at non marginibus acuti uti antecedens & insequens.* Legumen *latum, ova oblongum.*

ivus. 5. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyll tetraphyllisque, leguminibus ovatis compressis dor bimarginatis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Ro lugdb.* 363. *Dalib. parif.* 216. *Sauv. meth.* 193.*
Lathyrus annuus, flore cæruleo, ochri siliqua. *Her lugdb.* 357.
β. Lathyrus sativus. flore fructuque albo. *Bauh. pin.* 34
Lathyrus s. Cicercula. *Dod. pempt.* 522.
Habitat in Hispania, Gallia. ⊙

:onspi- cuus. 6. LATHYRUS pedunculis unifloris calyce brevioribu cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis.
Lathyrus orientalis, flore vix conspicuo. *Bærh. lug* 2. *p.* 42.
Habitat in Oriente. ⊙
Planta *parva, spithamæa s. pedalis.* Caules *obsolete tr angulares.* Stipulæ *subulato-lanceolatæ: dente postic acuto.* Petioli *brevissimi: inferiores terminati se subulata, brevissima; superiores in cirrhum filifo mem elongati.* Foliola *bina, lanceolata, subtus stri ta,*

ta, acuminata. Calyx *minimus & stipulis brevior ex alis petiolorum, pedunculo vix manifesto insidens.* Corolla *tam parva ut vix calyce longior, pallida.* Legumen *longitudine ferme foliorum, sed latius, glabrum, strictum.*

LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus. *Allion. nicaeens.* 143. — setifolius.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis: foliolis linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv. monsp.* 193.

Lathyrus foliis angustis, floribus singularibus coccineis. *Segu. ver.* 2. *p.* 82.

Lathyrus baldi. *Riv. tetr.*

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Bauh. hist.* 2. *p.* 308.

Lathyrus sylvestris major, angustissimo folio. *Bauh. pin.* 344.

Lathyrus angustissimo s. capillaceo folio. *Bauh. prodr.* 148.

Habitat Monspelii, in Baldo, Italia.

LATHYRUS pedunculis unifloris aristatis, cirrhis diphyllis: foliolis linearibus. — angulatus.

Lathyrus pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis linearibus, seminibus angulatis. *Dalib. paris.* 217.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis capillaceis. *Sauv. monsp.* 193.

Lathyrus foliis binatis gramineis, petiolis unifloris, siliqua nuda. *Hall. helv.* 594.

Lathyrus angustissimo folio, semine anguloso. *Tournef. inst.* 395.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Buxb. cent.* 3. *p.* 23. *t.* 42. *f.* 2.

Lathyrus angustifolius leptolobus, semine hexaëdro, flore cæruleo. *Moris. blæs.* 279.

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente. ☉

LATHYRUS pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. ups.* 217. * *Roy. lugdb.* 363. — articulatus.

Lathyrus, angustissimo folio, americanus variegatus. *Bauh. pin.* 344.

Clymenum hispanicum, flore vario, siliqua articulata. *Tournef. inst.* 396. *Mill. dict. t.* 96.

Lathyrus angustifolius humilior. *Bauh. pin.* 344.

Habitat in Bætica, Monſpelii. ⊙

Folia *ſæpius tetraphylla ; inferiores petioli lanceol aphylli.* Stipulæ *utrinque mucronatæ.* Florum *cari Piſi, lateribus undulatis, nec obliqua Lathyri. Vex lum purpureum alis & carina albis.*

* * *Pedunculis bifloris.*

odoratus. 10. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyll foliis ovato-oblongis, leguminibus hirſutis. *Ho cliff.* 368. *Hort. upſ.* 216. *Roy. lugdb.* 363.

ſiculus. α. Lathyrus ſiculus. *Rupp. jen.* 210.

Lathyrus diſtoplatyphyllos hirſutus mollis, magn peramœno flore odoro. *Comm. hort.* 2. *p.* 219. *t.* 1

zeylanicus. β. Lathyrus zeylanicus, odorato flore amœno ex al & rubro vario. *Burm. zeyl.* 138.

Habitat α *in* Sicilia, β *in* Zeylona. ⊙

Foliola involuta.

annuus. 11. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyll foliolis enſiformibus, leguminibus glabris, ſtipu bipartitis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 417.

Lathyrus hiſpanicus, flore luteo. *Herm. lugdb.* 35

Lathyrus luteus latifolius. *Magn. monſp.* 150.

Lathyri ſpecies lutea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 304.

Habitat in Hiſpania, Monſpelii. ⊙

hirſutus. 12. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyll foliolis lineari-lanceolatis, leguminibus hirſuti ſeminibus ſcabris. *Roy. lugdb.* 363. *Dalib. pa* 216. *Sauv. monſp.* 113.

Lathyrus anguſtifolius, ſiliqua hirſuta. *Bauh. pin.* 34

Lathyrus ſiliqua hirſuta. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 305.

Habitat inter Angliæ, Galliæ *ſegetes.*

tingitanus. 13. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyll foliolis alternis lanceolatis glabris, ſtipulis lunat *Roy. lugdb.* 263.

Lathyrus tingitanus, ſiliquis orobi, flore amplo r berrimo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 55.

Habitat in Mauritania. ⊙

Clymenum. 14. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis pol phyllis, ſtipulis dentatis. *Hort. cliff.* 368. *Ho upſ.* 217. *Roy. lugdb.* 364.

Lathyrus vicioides, vexillo rubro, labialibus peta roſtrum ambientibus cæruleis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 4 *Pluk. phyt.* 114. *f.* 6.

Cly-

ymenum hispanicum, flore vario, siliqua plana.
Tournef. inst. 395.
itat in Mauritania, Oriente. ☉

* * * *Pedunculis multifloris.*

tuberosus. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. parif.* 217. *Sauv. monsp.* 194. *Gort. gelr.* 421.
thyrus arvensis repens tuberosus. *Bauh. pin.* 344.
ios. *Fuchs. hist.* 131.
itat inter Belgii, Genevæ, Tatariæ *segetes.* ♃
ola involuta. Corolla tota rubra.

pratensis. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 367. *Fl. svec.* 599; 647. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. parif.* 217.
thyrus sylvestris luteus, foliis viciæ. *Bauh. pin.* 344.
thyrus luteus sylvestris dumetorum. *Bauh. hist.* 2. p. 304. *t.* 304.
thyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso. *Hall. helv.* 597.
itat in Europæ *pratis.* ♃
rhi quidem interdum trifidi sunt, at sæpius simplicissimi. Foliola *convoluto-involuta.*

sylvestris. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Hort. cliff.* 367. *Fl. svec.* 598; 644. *Dalib. parif.* 216.
thyrus sylvestris major. *Bauh. pin.* 433.
thyrus sylvestris. *Clus. hist.* 2. *p.* 229. *Dod. pempt.* 523.
itat in Europæ *pratis montosis.* ♃

latifolius. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 217. *Fl. svec.* 1139; 645. *It. scan.* 251. *
thyrus latifolius. *Bauh. pin.* 344. *Garid. prov.* 271. 271.
yrus major latifolius, flore purpureo, speciosior. *uh. hist.* 2. *p.* 303.
tat in Europæ *sepibus.* ♃
la involuta.

heterophyllus. 19. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis di[…] lis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis, inter[…] membranaceis. *It. w-goth.* 75. *Fl. svec.* 2. […]
Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: […] lis gramineis trinerviis, internodiis membran[…] *Sauv. monsp.* 193.
Lathyrus major narbonensis angustifolius. *Bauh.* […] 2. *p.* 304.
Habitat ad radices montium Europæ. ♃

palustris. 20. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis […] phyllis, stipulis lanceolatis. *Hort. cliff.* 368. *Fl.* […] 600, 648. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. parif.* 21[…]
Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *Fl.* […] 221.
Lathyrus palustris, flore orobi nemorensis verni. […] *jen.* 210. *t.* 1.
Lathyrus peregrinus, foliis viciæ, flore subcærule[…] lideve purpurascente flore. *Bauh. pin.* 344.
Vicia lathyroides f. Lathyrus viciæformis. *Pluk.* […] 387. *t.* 71. *f.* 2.
Habitat in Europæ *borealis pascuis paludosis.* ♃

pisiformis. 21. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis […] phyllis, stipulis ovatis: basi acutis. *Hort. up[…]*
Vicia pedunculis multifloris, foliis ovatis, stipul[…] ximis. *Hall. gœtt.* 295.
Habitat in Sibiria. ♃
Planta *ut Pisum crescens.* Caules *acute angulati.* […] li *cirrhosi, sæpe hexaphylli: foliolis ovato-obl[…] acutis.* Stipulæ *foliis latiores, ovatæ, basi acum[…] vix angulatæ. Pedunculi longitudine foliorum, […] tiflori* Flores *vexillo & alis albidi venis pur[…] Vexillum parvum, carina Pisi, nec obliqua. S[…] supra longitudinaliter barbatus. Foliola convolu[…] in Piso maritimo & Ochro, nec involuta ut i[…] risque Lathyris; minus conduplicata ut in Pis[…] tivo.*

V I C I A.

* *Pedunculis elongatis.*

pisiformis. 1. VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis[…] liolis ovatis: infimis sessilibus. *Hort. cliff.* 369. […] *lugdb.* 363.

Pisu[…]

m sylvestre perenne. *Bauh. pin.* 343.
m sylvestre. *Clus. hist.* 2. *p.* 129.
ca flore ochroleuco. *Riv. tetr.*
tat in Pannoniæ *sylvis.* ♃
la petiolorum infima sunt cauli approximata, sessilia, pulas minimas occultantia.

IA pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis ucronatis, stipulis subdentatis. **dumetorum.**
a pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirssis: foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *Fl.* . 604; 649. *Dalib. paris.* 219. *Sauv. monsp.* 234.
maxima dumetorum. *Bauh. pin.* 345.
a sylvatica maxima piso similis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 5.
ca sylvatica. *Riv. tetr.* 50.
at in Thuringia, Gallia. ♃
rt a præcedente Corollis *non flavis*, **Foliolis** *lonribus, nec infimis cauli approximatis.*

IA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stilis denticulatis. **sylvatica.**
a pedunculis multifloris, stipulis crenatis. *Fl. lapp.* *Fl. svec.* 603; 650. *Roy. lugdb.* 365. *Sauv. sp.* 234.
multiflora maxima perennis, tetro odore, floris albentibus: lineis cæruleis notatis. *Pluk. alm.* 7. *t.* 71. *f.* 1.
at in Sueciæ, Germaniæ, Galliæ *sylvis.* ♃

IA pedunculis subsexfloris, foliolis denis ovatis tis, stipulis integris. *Fl. svec.* 2. *n.* 653. **cassubica.**
pedunculis multifloris, caule fruticoso. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 364.
multiflora cassubica frutescens, siliqua lentis. *k. alm.* 387. *t.* 72. *f.* 2.
tat in Germania.

IA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, folis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. **Cracca.**
a pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis inris. *Hort. cliff.* 368. *Fl. svec* 605; 652. *Roy. lugdb.* *Dalib. paris.* 220. *Sauv. monsp.* 234.
ylvestris spicata. *Bauh. pin.* 345.
multiflora. *Bauh. pin.* 343.
ca. *Riv. tetr.* 49.

Habi-

Habitat in Europæ *pratis, agris.* ♃
Foliola involuta.

onobrychioides. 6. VICIA pedunculis multifloris, floribus dis[...] foliolis linearibus, ſtipulis inferne denticula[...]
Vicia pedunculis multifloris, ſtipulis crenatis, [...]lis linearibus. *Sauv. monſp.* 235.
Vicia onobrychidis flore. *Bauh. pin.* 345. *pro*[...]
Habitat in Gallia. *D. Sauvages.*
Statura *Viciæ Craccæ.* Folia *pinnata, cirrhoſa:* [...] *ſæpius* 14, *linearibus, anguſtiſſimis: oppoſition*[...] *ſtantibus.* Pedunculi *axillares, foliis triplo lo*[...] *ſtriati.* Floribus 10. *ſ.* 12, *ſubſeſſilibus, rem*[...] *Craccæ triplo majoribus, purpureis.*

[...]nifoliana. 7. VICIA pedunculis multifloris, foliolis oblon[...]pulis integris, leguminibus villoſis ovato-ob[...]
Vicia leguminibus ſeſſilibus binis ternisve ſub[...] nutantibus, ſtipulis nullis. *Roy. lugdb.* 14?
Vicia orientalis, flore ſuave rubente, ſiliqu[...] villiſimis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 44?
Habitat in Oriente.
Caulis *ſulcatus.* Cirrhi *foliolis* 6 *paribus, oblongi*[...] *retuſis, acumine terminatis, ſubvilloſis.* Stipul[...]*ceolatæ, anguſtiſſimæ.* Pedunculi *floribus* 5 *ſ.* 6 [...]*nimis, atropurpureis.* Legumina *nutantia, com*[...] *ovato-oblonga, villoſa, pentaſperma.*

biennis. 8. Vicia pedunculis multifloris, petiolis ſulcatis [...] decaphyllis: foliolis lanceolatis glabris.
Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyph[...] foliolis lanceolatis glabris. *Hort. upſ.* 219. *
Vicia perennis multiflora, flore cæruleo ex albo [...]to. *Magn. monſp.* 306? *ſec. Sauv. monſp.* 234.
Habitat in Sibiria. ♂
Foliola involuta.

benghalensis. 9. VICIA pedunculis ſubquinquefloris, foliolis in[...]rimis, ſtipulis integris, leguminibus erectiuſcu[...]
Vicia pedunculis ſubquinquefloris longitudine fo[...]rum. *Hort. cliff.* 368. *Hort. upſ.* 219. *Roy. lugdb.* [...]
Vicia benghalenſis hirſuta & incana, ſiliquis [...] *Herm. lugdb.* 623. *t.* 625.
Habitat in Stœchadibus. ⊙
Corollæ intenſiſſime puniceæ, carinæ apice nigro.

** Flo-

* * *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

A leguminibus sessilibus subbinatis ere[illegible] fo etusis, stipulis notatis. — sativa.

.eguminibus erectis, petiolis polyphyllis: fo- i acumine emarginatis, stipulis denticulatis.

, *cliff.* 368. *Hort. upf.* 218. *Fl. svec.* 601, 654. *lugdb.* 365. *Dalib. parif.* 218.

ativa vulgaris, semine nigro. *Bauh. pin.* 344.

ativa alba. *Bauh. pin.* 344.

semine rotundo nigro. *Bauh. pin.* 345. — nigra.

vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro. *L. pin.* 345.

olio angustiore, flore rubro. *Dill. app.* 47.

angustifolia. *Riv. tetr.* - - - -

t *inter* Europæ *segetes hodie.* ☉

subtus macula quasi inusta notatæ.

us β foliis angustioribus sublinearibus.

LA leguminibus sessilibus solitariis erectis gla- , foliolis senis: inferioribus obcordatis. — Lathyroides.

athyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm.* 242. *t.* 242.

montana minima, flosculo purpureo. *Amæn.* 1. *p.* 167. *Oed. dan. t.* 58.

t *in* Scotia, Lusatia, Norvegia. ♃

LA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solita- pentaspermis, corollæ vexillis glabris. — lutea.

foliis subsessilibus obverse ovatis apice emargi- s, leguminibus solitariis villosis. *Dalib. parif.* 219.

leguminibus solitariis deorsum fixis hirsutis. *t. monsp.* 235.

sylvestris lutea, siliqua hirsuta. *Bauh. pin.* 345.

flore luteo pallido, siliquis hirsutis crassis brevi- propendentibus. *Moris. hist.* 2. *p.* 62. *s.* 2. *t.* 21. *f.* 5.

t in Gallia, Hispania, Italia, Oriente. ☉

foliis lanceolatis & retusis, Leguminibus *hirsu- subglabris.* Stipulæ *alternatim integerrimæ & tatæ.*

IA leguminibus sessilibus reflexis pilosis pen- nis, corollæ vexillis villosis. — hybrida.

Monspelii, Massiliæ. ☉

V. luteæ. Foliola *obovata, retusa, par- pilis adspersa.* Stipulæ *non ad caulem fuscæ, sed*

otæ virides. Flores *flavi, supra subgri*
Cætera V. luteæ.

peregrina. 14. VICIA leguminibus subsessilibus pendulis glab
traspermis, foliolis linearibus emarginatis.
Vicia peregrina angustissimis foliis, siliqua lata
Pluk. alm. 386. *t.* 233. *f.* 6.
Vicia angustifolia purpureo-violacea, siliqua la
bra. *Magn. monsp.* 276.
Habitat in Gallia. *D. Sauvages.* ⊙

sepium. 15. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis
foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decr
bus.
Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis poly
foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. cli*
Fl. svec. 602, 651. *Roy. lugdb.* 365. *Dalib*
219. *Sauv. monsp.* 234.
Vicia sepium, folio rotundiore acuto. *Bauh. p*
Vicia sepium. *Riv. tetr.* 56.
Habitat in Europæ *sepibus.* ♃
Folia conduplicata.

bithynica. 16. VICIA leguminibus pedunculatis solitariis ere
liolis quaternis ovali-lanceolatis, stipulis de
Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyl
pulis dentatis. *Roy. lugdb.* 363.
Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyl
pulis setaceis, caule ancipiti. *Amæn. acad.* 1.
Clymenum bithynicum, siliqua singulari, flore
Bærh. lugdb. 2. *p.* 43.
Habitat in Italiæ, Bavariæ *arvis.* ♃
Caules *angulati.* Cirrhi *foliis bijugis, lato-lanc*
Stipulæ *valde dentatæ.* Flores *axillares, solita*
lyce longitudine pedunculi; Corolla vexillo vi
alis albidis. Legumen *compressum, ovato-obl*
villosum. Semina circiter 6. Viciam esse Stig
tus barbatum & Stipulæ subtus poro glandulos
cunt.

narbonensis. 17. VICIA leguminibus subsessilibus subternatis
foliolis senis subovatis, stipulisque denticulatis
upf. 218. *Sauv. monsp.* 234.
Vicia petiolis inferioribus tetraphyllis: superiorib
lyphyllis, foliolis ovatis cirrhiferis. *Roy. lugd*
V

petiolis tetraphyllis cirrhosis. *Hort. cliff.* 369.
narbonensis. *Riv. tetr.*
sylvestris, fructu rotundo atro. *Bauh. pin.* 338.
sylvestris. *Dod. pempt.* 516.
at in Gallia, Anglia. ⊙
conduplicata ut in V. sepium, nec involuta ut in
isque viciis. Pedunculi *uniflori in macris, triflo-*
in fertilibus. Corollæ *atropurpureæ.*

CIA caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort.* Faba.
369. *Hort. upf.* 218. *Mat. med.* 353. *Roy. lugdb.*
Dalib. parif. 220.
Bauh. pin. 338.
Phaseolus. *Dod. pempt.* 513.
minor s. equina. *Baub. pin.* 338.
at in Ægypto. ⊙
arum alæ in medio Macula atra holosericea. Fo-
la convoluta.

E R V U M.

VUM pedunculis subbifloris, seminibus compres- Lens.
convexis.
pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis
visis. *Hort. upf.* 224. *Mat. med.* 360. *Sauv.*
mfp. 233.
pedunculis bifloris, seminibus compressis. *Hort.*
f. 370. *Dalib. parif.* 346.
vulgaris. *Bauh. pin.* 346.
Dod. pempt. 526.
tat inter Galliæ *segetes.* ⊙

VUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis tetrasper-
alternis. *Fl. svec.* 606, 655. *Dalib. parif.* 227. mum.
segetum, singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin.*
5.
minor segetum, cum siliquis paucis glabris. *Mo-*
hist. 2. *p.* 64. *s.* 2. *t.* 4. *f.* 16.
tat inter Europæ *segetes.* ⊙
is subtetragonus, anceps. Folia *foliolis sæpius* 10.
umque alternis. Pedunculus *fere capillaris tenui-*
, uniflorus s. biflorus. Flos *minutus, sæpe san-*
us, alias violaceus. Legumen *ovali-oblongum,*

UM pedunculis multifloris, seminibus globosis hirsutum.
mis.

Cicer pedunculis multifloris, feminibus globosis
cliff. 370. *Fl. svec.* 607; 556. *Roy. lugdb.* 389.
parif. 228. *Sauv. monsp.* 233.
Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Ba*
345.
Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.
Habitat in Europæ *agris*, Oriente. ☉

soloniense. 4. ERVUM pedunculis subbifloris aristatis, petioli
minatis, foliolis obtusis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 3
Vicia pedunculis uni-biflorisve, petiolis di
brevissime cirrhosis. *Guett. stamp.* 1. *p.* 235.
Vicia præcox verna minima soloniensis, semine
edro. *Moris. blæs.* 321. *hist.* 2. *p.* 63. *Raj. hist.*
Vicia minima præcox parisiensium. *Tournef. in*
Habitat in Anglia, Parisiis, Monspelii.

monanthos. 5. ERVUM pedunculis unifloris.
Vicia pedunculis unifloris, foliolis integerrim
pulis alternis dentatis. *Hort. upf.* 219. *
Lens monanthos. *Herm. lugdb.* 360.
Habitat in Asia ruthenica. ☉
Foliola convoluta.

Ervilia. 6. ERVUM germinibus undato-plicatis, foliis i
pinnatis. *Hort. upf.* 224. *Mat. med.* 361.
monsp. 237.
Ervum leguminibus pendulis. *Hort. cliff.* 370.
Ervum. *Cam. epit.* 215.
Orobus siliquis articulatis, flore majore. *Bau*
346.
Habitat in Gallia, Italia, Oriente. ☉
Folia *cirrhis destituta.* Pedunculi *subbiflori.*

CICER.

arietinum. 1. CICER foliolis serratis. *Hort. cliff.* 370. *Ho*
224. *Mat. med.* 359.
Cicer sativum. *Bauh. pin.* 347.
Cicer arietinum. *Dod. pempt.* 525.
Habitat inter Hispaniæ, Italiæ, Orientis *segetes.*
Folia pinnata cum impari. Pedunculus uniflorus,
vatus.

ARACHIS.

hypogæa. 1. ARACHIS. *Hort. cliff.* 353. *Hort. upf.* 228.
lugdb. 390.

rachidna quadrifolia villosa flore luteo. *Plum. gen.* 49. *Ehret. pict. t.* 5. *f.* 3.
nna tetraphylla f. Absi congener hirsuta maderaspatensis, folliculos sub terra condens. *Pluk. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 2.
hamæbalanus japonica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 426. *t.* 156.
undubi. *Marcgr. bras.* 37.
rachidnoides americana. *Niss. act.* 1723. *p.* 387. *t.* 19.
abitat Surinami, *in* Brasilia, Peru. ⊙

CYTISUS.

YTISUS racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Hort. upf.* 210. *Roy. lugdb.* 369. *Hall. helv.* 591. — Laburnum.
nagyris non fœtida major alpina. *Bauh. pin.* 391.
nagyris non fœtens minor. *Bauh. pin.* 391.
aburnum arbor trifolia anagyridi similis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 361.
abitat in Helvetia, Sabaudia. ♄

YTISUS racemis simplicibus erectis, foliolis ovato oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 369. *Sauv. monsp.* 190. *Mill. dict. t.* 107. *f.* 1. — nigricans.
ytisus glaber nigricans. *Bauh. pin.* 390.
ytisus IV. *Clus. hist.* 1. *p.* 95.
abitat in Austria, Pannonia, Bohemia, Italia. ♄

YTISUS racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus. — sessilifolius.
ytisus foliis sæpius sessilibus, calycibus squamula triplici auctis. *Vir. cliff.* 71. *Hort. cliff.* 355. * *Roy. lugdb.* 369. *Sauv. monsp.* 191.
ytisus g abris foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *Bauh. pin.* 390.
ytisus glaber, siliqua lata. *Bauh. hist.* 1. *p.* 373.
abitat in Italia, Galloprovincia. ♄

CYTISUS racemis axillaribus erectis, foliolis sublanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato. *Fl. zeyl.* 354. * *Hort. upf.* 211. — Cajan.
ytisus foliolis ovato-lanceolatis: intermedio petiolato, pedunculo ex alis multifloro. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 369.
tisus folio molli incano, siliquis orobi contortis & cutis. *Burm. zeyl.* 86. *t.* 37.

Cyti-

Cytisus frutescens. *Plum. spec.* 19. *ic.* 114. *f.* 2.
Laburnum humilius, siliqua inter grana & gran[illegible]
cta, semine esculento. *Sloan. jam.* 139. *hist.* 2. [illegible]
Phaseolus erectus incanus, siliquis torosis. *Pluk.*
293. *t.* 213. *f.* 3.
Habitat in India.

hirsutus. 5. CYTISUS pedunculis simplicibus lateralibus, [illegible]
cibus hirsutis trifidis ventricoso-oblongis.
upf. 211. *
Cytisus calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis [illegible]
plicibus brevissimis. *Hort. cliff.* 355. *Roy.* [illegible]
370. *Sauv. monsp.* 190.
Cytisus incanus, siliqua longiore. *Bauh. pin.* 39[illegible]
Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis. *Bauh. pin.*
Cytisus *Clus. hist.* 1. *p.* 94.
Habitat in Hispania, Sibiria, Austria, Italia. ♄
Rami decumbentes, ut in sequenti.

supinus. 6. CYTISUS floribus umbellatis terminalibus, [illegible]
decumbentibus, foliolis ovatis. *Roy. lugdb.*
Hort. upf. 211.
Cytisus supinus, foliis infra & siliquis molli lan[illegible]
pubescentibus. *Bauh. pin.* 390.
Cytisus VII. species altera. *Clus. hist.* 1. *p.* 96.
β. Cytisus supinus, foliis incana lanugine infern[illegible]
bescentibus. *Bauh. pin.* 390.
Cytisus VII. species altera. *Clus. hist.* 1. *p.* 96.
Habitat in Sibiria, Italia, Sicilia, Galloprovinci[illegible]
*Structura floris indicat summam cum C. hirsuto a[illegible]
tem.*

austriacus 7. CYTISUS floribus umbellatis terminalibus, [illegible]
bus erectis, foliolis lanceolatis.
Cytisus floribus capitatis, foliolis ovato-oblo[illegible]
caule fruticoso. *Mill. dict. t.* 107. *f.* 2.
Cytisus incanus, folio oblongo, austriacus. *Bauh.*
390.
Cytisus V. *Clus. hist.* 1. *p.* 195.
Habitat in Sibiria, Austria, Italia. ♄
*Similis C. supino, sed Caules erecti, ramosissimi, [illegible]
lati. Foliola lanceolata, nec ovata.*

æthiopicus. 8. CYTISUS racemis lateralibus strictis, ramis ang[illegible]
tis, foliolis cuneiformibus.

Cy[illegible]

lus æthiopicus, subrotundis incanis minoribus fo- ,floribus parvis luteis. *Pluk. alm.* 128. *t.* 278. *f.* 3. *an?* *at in* Æthiopia. ♄

·ISUS spicis pubescentibus, ramis angulatis, fo- lanceolatis, caule suffruticoso. *Amœn. acad.* 6. . 33. * psoraloides

a. *Pluk. phyt.* 320. *f.* 3.
at ad Cap. b. Spei. ♄

TISUS foliis simplicibus lanceolato-linearibus, lis angulatis. graecus.
jovis, linariæ folio, flore luteo parvo. *Tour- cor.* 44?
at in Archipelagi *insulis.* ♄

TISUS floribus subsessilibus, foliis tomentosis, libus herbaceis, stipulis minutis. argenteus.
us acaulis, floribus solitariis: foliolis sericeis ceolatis. *Sauv. monsp.* 191.
fruticosus incanus siliquosus. *Bauh. pin.* 332.
asperior fruticosa narbonensis incana. *Lob. ic.* 41.
lum argenteum, floribus luteis. *Bauh. hist.* 2. *p.*

at in G. Narbonensi. ♄
versus radicem frutcantes, superne herbacei. Flo- *subsessiles, solitarii, duo vel tres, ex alis & api- s ramorum.* Legumina *hirsuta.*

GEOFFRÆA.

FFRÆA. *Jacq. amer.* 28. † spinosa.
Marcgr. bras. 121. *Raj. hist.* 1518.
t in Brasilia. ♄
spinosa, Foliis pinnatis. Fructibus drupaceis; ciformibus.

ROBINIA.

INIA racemis pedicellis unifloris, foliis impari- atis, stipulis spinosis. *Hort. ups.* 212. Pseud-Acacia.
a aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 354. *Gron. virg.* *Roy. lugdb.* 372.
americana, siliquis glabris. *Raj. hist.* 1719. *Seb.* 1. *t.* 15. *f.* 1.

Acaciæ affinis virginiana ſpinoſa, ſiliqua membra[n]
plana. *Pluk. alm.* 9. *p.* 73. *t.* 4.
Habitat in Virginia. ♄
Conf. Pſeudo-Acacia hiſpida, floribus roſeis. C[atesb.]
car. 3. *p.* 20. *t.* 20.

violacea. 2. ROBINIA racemis pedicellis bifloris, foliis im[pari-]
pinnatis. *Jacq. amer.* 28. †
Habitat in America *calidiore.* ♄

mitis. 3. ROBINIA racemis pedicelli ternis, foliis impari[pin-]
natis, caule inermi.
Cytiſus foliis pinnatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 741.
Habitat in India. ♄
Rami *inermes, teretes.* Folia *pinnata: foliolis* 5,
tis, glabris, integerrimis. Racemi *ad ſingulum*
tem affigunt flores 3, *propriis pedicellis.*

Caragana. 4. ROBINIA pedunculis ſimplicibus, foliis abrupt[e pin-]
natis. *Hort. upſ.* 212.
Aſpalathus arboreſcens, pinnis foliorum crebri[oribus]
oblongis. *Amm. ruth.* 285.
Caragana ſibirica. *Roy. lugdb.* 537.
Habitat in Sibiria. ♄
Folia *quinque vel ſexjuga.* Stipulæ & *petioli ape[x]*
ſpineſcentes, ut in ſequentibus. Flores *ſex, a[d gem-]*
mam præteriti anni, propriis pedunculis.

frutescens. 5. ROBINIA pedunculis ſimpliciſſimis, foliis qua[terna-]
tis ſubpetiolatis. *Hort. upſ.* 212.
Aſpalathus fruteſcens major latifolius, cortice
Amm. ruth. 283.
Habitat in Sibiria, Tataria. ♄
Folia *quaternata, ſed inter intima petioli apex ſp[inoſus]*
uti ſtipulæ. Pedunculi *ad gemmam prioris an[ni]*
tum duo.

pygmæa. 6. ROBINIA pedunculis ſimpliciſſimis, foliis qua[terna-]
tis ſeſſilibus. *Hort. upſ.* 212.
Aſpalathus fruteſcens minor anguſtifolius, corti[ce]
reo. *Amm. ruth.* 282. *t.* 35.
Habitat in Sibiria. ♄
Simillima priori, ſed pygmæa, magis ſpinoſa; Fol[iis cu-]
neiformibus obtuſiſſimis duriuſculis.

COL

COLUTEA.

OLUTEA arborea, foliolis obcordatis. *Hort. cliff.* 365. *Hort. upſ.* 228. *Roy. lugdb.* 374. **arboreſcens.**
olutea veſicaria. *Bauh. pin.* 396.
olutea. *Dod. pempt.* 784.
olutea africana, ſennæ foliis, flore ſanguineo. *Comm. rar.* 11. *t.* 11.
olutea foliolis ovatis integerrimis, caule fruticoſo. *Mill. dict. t.* 100.
bitat in Anglia, G. Narbonenſi, Italia: *copioſe ad* Veſuvium. ♄
rbor foliolis fere obovatis, floribus luteis.

OLUTEA fruticoſa, foliolis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 366. *Hort. upſ.* 228. **fruteſcens.**
olutea æthiopica, flore purpureo. *Breyn. cent.* 70. *t.* 29. *Mill. ic.* 99.
bitat in Æthiopia. ♂
utex incanus, foliolis tomentoſis ſupra glabris, Floribus rubris: Vexillis carina brevioribus; alis minutiſſimis, ut fere nullis. Legumina inflata, dorſalis ſuturæ baſi hiantia.

OLUTEA herbacea, foliolis linearibus. *Hort. upſ.* 266. *Roy. lugdb.* 374. **herbacea.**
olutea africana annua, foliolis parvis mucronatis, veſiculis compreſſis. *Comm. hort.* 2. *p.* 87. *t.* 44.
olutea africana, veſiculis compreſſis, floſculis atro-rubentibus. *Volk. norib.* 118. *t.* 118.
bitat in Æthiopia. ☉. ♂
nua, rarius caule perennans, glabra. Flores atro-ſanguinei vexillo ſtriato, longitudine alarum & carinæ. Legumina compreſſa.

ULEX.

ULEX foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. **europæus.**
lex folio ſub ſingulis ſpinis ſubulato plano acuto. *Hort. cliff.* 356. *Hort. upſ.* 212. *Roy. lugdb.* 372.
eniſta ſpinoſa major, longioribus aculeis. *Bauh. pin.* 394.
niſta ſpinoſa. *Dod. pempt.* 659.
niſta ſpinoſa major, brevioribus aculeis. *Bauh. pin.* 394.
bitat in Anglia, Gallia, Brabantia. ♄

capensis. 2. ULEX foliis solitariis obtusis, spinis simplicibus t minalibus. *Roy. lugdb.* 372.
Genista spartium bacciferum, ericæ foliis, africana *Pluk. alm.* 166. *t.* 185. *f.* 6. *mal. Pet. gaz.* 9. *t.* 83. *f.* 9.
Habitat in Æthiopia. ♄

GLYCYRRHIZA.

echinata. 1. GLYCYRRHIZA leguminibus echinatis, foliis pulatis. *Roy lugdb.* 386. *Hort. upf.* 230.
Glycyrrhiza capite echinato. *Bauh. pin.* 352.
Dulcis radix. *Cam. epit.* 423.
Habitat in Gargano Apuliæ, *in deserto Nagico* Ta riæ. ♃
Petiolus *communis marginatus margine distincto medi te nervo.* Foliola *lanceolato-ovata: impari se* Stipulæ *ensiformes.* Spica *subrotundo-capitata.*

glabra. 2. GLYCYRRHIZA leguminibus glabris, stipulis lis. *Hort. cliff.* 490. *Mat. med.* 362. *Roy. lug* 386. *Sauv. monsp.* 232.
Glycyrrhiza siliquosa & germanica. *Bauh. pin.* 352.
Glycyrrhiza vulgaris. *Dod. pempt.* 341.
Habitat in Franconia, Gallia, Hispania, Italia ♃.
Petiolus *communis ultra ultimum foliorum par elon tus.* Foliola *ovata: impari petiolato.* Stipulæ *læ.* Spicæ *oblongæ floribus distantibus.*

hirsuta. 3. GLYCYRRHIZA leguminibus hirsutis, foliolo i pari petiolato. *Roy. lugdb.* 386.
Glycyrrhiza orientalis, siliquis hirsutissimis. *Tour cor.* 26.
Habitat in Oriente.

CORONILLA.

Emerus. 1. CORONILLA fruticosa, pedunculis subtrifloris, c rollarum ungvibus calyce triplo longioribus caul angulato. *Roy. lugdb.* 387. *Hort. cliff.* 363. *F svec.* 590. 636. *It. gotl.* 229.
Colutea siliquosa s. scorpioides major. *Bauh. pin.* 397.
Colutea scorpioides. *Cam. epit.* 541.
β. Colutea siliquosa minor. *Bauh. pin.* 397.
Habitat Genevæ, Monspelii, Salerni, Viennæ. ♄

2. CO-

CORONILLA fruticosa, foliis quinatis ternatisque lineari-lanceolatis subcarnosis obtusis. juncea.
Dorychnium luteum hispanicum carnosius. *Barr. ic.* 133.
Colutea caule genistæ fungoso. *Bauh. hist.* 1. *p.* 383.
Polygala major massiliotica. *Bauh. pin.* 349.
Habitat Massiliæ, Monspelii. ♄
Caules Spartii. Folia parva, subcarnosa.

CORONILLA fruticosa, foliis subnovenis stipulis suborbiculatis. valentina.
Coronilla fruticosa, leguminibus teretibus, pedunculis multifloris, caule fruticoso. *Hort. upf.* 234. *Roy. lugdb.* 386. *Sauv. monsp.* 235. *Mill. dict. t.* 107.
Coronilla leguminibus teretibus, ungvibus corollæ brevibus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 363.
Coronilla leguminibus teretibus, ungvibus corollæ brevibus, pinnis ad summum enneaphyllis, foliolis ovatis. *Guett. stamp.* 1. *p.* 231.
Polygala altera. *Bauh. pin.* 349.
Polygala valentina. *Clus. hist.* 1. *p.* 98.
Habitat in Hispania, Italia. ♄
Odor florum graveolens, noctu magis. Umbellæ *vexilla connivent in capitulum flavum, quæ instar radii cingunt fulvæ Carinæ cum alis.* Folia *colore Rutæ: Foliola mucrone reflexo, unde retusa apparent.* Florens *stipulas dejicit.*

CORONILLA fruticosa, foliis septenis, stipulis lanceolatis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 285. * glauca
Coronilla maritima, glauco folio. *Tournef. inst.* 650.
Colutea scorpioides maritima, glauco folio. *Bauh. pin.* 397. *prodr.* 157.
Habitat in Gallia Narbonensi. ♄
Flores noctu inodori, die suavissime fragrantes.

CORONILLA fruticosa, foliis novenis obovatis: foliolis intimis caule approximatis, stipulis oppositifoliis bipartitis coronata
Colutea scorpioides minor coronata. *Bauh. pin.* 397.
Colutea scorpioides II. *Clus. hist.* 1. *p.* 98.
Habitat in Europa australi. ♄
Foliola obovata, distantia: infimo petiolorum pari arcte cauli approximato, ut in Vicia pisiformi, tamen stipulæ non sunt hæc foliola.

rgentea. 6. CORONILLA fruticosa, foliolis undenis sericeis timo majore.
Colutea scorpioides odorata. *Alp. exot.* 17.
Habitat in Creta. ♄

inima. 7. CORONILLA procumbens, foliolis novenis lan latis, stipulis oppositifoliis emarginatis, legumin angulatis nodosis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 327. *
Ferrum equinum, siliquis in summitate. *Bauh.* 349.
Lotus enneaphyllos. *Dalech. hist.* 510.
Habitat in Gallia *australi*, Hispania, Italia. ♃

curidaca. 8. CORONILLA herbacea, leguminibus falcato-gl atis, foliolis plurimis. *Hort. cliff.* 363. *Hort. upf.* 2 *Roy. lugdb.* 386. *Sauv. monsp.* 235.
Securidaca lutea major. *Bauh. pin.* 398.
Hedysarum primum. *Dod. pempt.* 546.
Habitat inter Hispaniæ *segetes.* ☉

ria. 9. CORONILLA herbacea, leguminibus erectis ter bus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *H cliff.* 363. *Hort. upf.* 235. *Roy. lugdb.* 386. *D parif.* 232. *Sauv. monsp.* 235.
Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis ticulatis. *Bauh. pin.* 349.
Securidaca 2. altera species. *Clus. hist.* 2. *p.* 237.
Habitat in Lusatia, Bohemia, Dania, Gallia. ☉

tica. 10. CORONILLA herbacea leguminibus quinis ere teretibus articulatis, foliolis undenis. *Roy. lugdb.* 3
Coronilla cretica herbacea, flore parvo purpurascei *Tournef. cor.* 44.
Habitat in Creta. ☉
Habet multa communia cum C. varia, *at differt ab præcipue umbellis ex quinque floribus, raro pluril cum illa communiter viginti gerat.*

ndens. 11. CORONILLA caule scandente flaccido. *Roy. lug* 387.
Coronilla scandens pentaphylla. *Plum. spec.* 19. *ic.* 1 *f.* 3.
Habitat in America *calidiore.*

ORNI-

ORNITHOPUS.

ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Hort. upf.* 234. *Sauv. monsp.* 236. — perpusillus.
Ornithopus foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis lævibus. *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383. *Dalib. parif.* 232. *Gort. gelr.* 438.
Ornithopodium minus. *Bauh. pin.* 350.
Ornithopodium perpusillum. *Dalech. hist.* 487.
Ornithopodium majus. *Bauh. pin.* 350.
Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Bauh. pin.* 250.
Habitat in Angliæ, Belgii, Galliæ, Hispaniæ *arenosis.* ☉

ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis. *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383. *Sauv. monsp.* 236. — compressus.
Ornithopodio affinis hirsuta scorpiodes. *Bauh. pin.* 350.
Scorpioides leguminosa. *Dalech. hist.* 493.
Habitat in Italia, Sicilia. ☉

ORNITHOPHUS foliis ternatis subsessilibus: impari maximo. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 234. *Roy. lugdb.* 383. — scorpioides.
Telephium dioscoridis s. Scorpioides. *Bauh. pin.* 287.
Scorpioides portulacæ folio. *Bauh. pin.* 287.
Scorpioides matthioli. *Dod. pempt.* 71.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia *inter segetes.* ☉
Folia ternata s. potius simplicia, petiolata, stipulis subrotundis.

ORNITHOPUS foliis quaternatis, floribus solitariis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 402. * — tetraphyllus
Quadrifolium erectum, flore luteo. *Sloan. jam.* 74. *hist.* 1. *p.* 186. *t.* 116. *f.* 3.
Habitat in Jamaica.
Siccam plantam a congeneribus, & siccam ad aptius genus referre aut novum construere non licuit.

HIPPOCREPIS.

HIPPOCREPIS leguminibus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 233. *Roy. lugdb.* 384. *Sauv. monsp.* 236. *Gron. orient.* 229. — unisiliquosa
Ferrum equinum siliqua singulari. *Bauh. pin.* 349.
Ferrum equinum vulgare. *Col. ecphr.* 1. *p.* 302. *t.* 300.
Habitat in Italia. ☉

multifiliquosa. 2. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis co margine altero lobatis. *Hort. cliff.* 364. *H* 233. *Roy. lugdb.* 384 *Sauv. monsp.* 239.
Ferrum equinum siliqua multiplici. *Bauh. pin.*
Ferrum equinum alterum polyceraton. *Col. e* *t.* 300.
Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ, Italiæ *c*

comosa. 3. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis co margine exteriore repandis. *Roy. lugdb.* 384. *parij.* 232.
Hippocrepis leguminibus pedunculatis conferti gine exteriori lobatis. *Hort. cliff.* 364.
Ferrum equinum germanicum, siliquis in sum *Bauh. pin.* 346.
Ferrum equinum comosum, s. capitatum. *Col* 1. *p.* 302. *t.* 301.
Habitat in Germania, Italia, Gallia, Angliæ *c*

SCORPIURUS.

vermiculata. 1. SCORPIURUS pedunculis unifloris, legun tectis undique squamis obtusis.
Scorpioides siliqua crassa boelii. *Tourneſ. inst.*
Scorpioides bupleuri folio, corniculis crassior magis spongiosis instar litui contortis & in volutis. *Moris. hist.* 2. *p.* 127. *s.* 2. *t.* 11. *f.* 1
Habitat in Europa *australi.* ⊙

muricata. 2. SCORPIURUS pedunculis bifloris, leguminib trorsum obtuse aculeatis.
Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis & s. rigidis, striatis s. sulcatis litui instar contort se convolutis. *Moris. hist.* 2. *p.* 127. *s.* 2. *t.* 11. *f*
Habitat in Europa *australi.* ⊙

sulcata. 3. SCORPIURUS pedunculis subtrifloris, legun extrorsum spinis distinctis acutis.
Scorpiurus. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upſ.* 233. *lugdb.* 383.
Scorpioides bupleuri folio. *Bauh. pin.* 287.
Scorpioides prius. *Dod. pempt.* 71.
Habitat in Europa *australi.* ⊙

subvillosa. 4. SCORPIURUS pedunculis subquadrifloris, l nibus extrorsum spinis confertis acutis.

S

orpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis & convolutis. *Morif. hist.* 2 *p.* 127. *f.* 2. *t.* 11. *f. II.*
bitat in Europa *australi.* ⊙
ecies *hasce omnes olim ex una specie ortas esse dubium non est, nec sufficit locus harum generationi, qui tum mutatus easdem redderet; quæ itaque mixtura harum roduxerit constantes plantas? Qui hæs omnes aut conjungat aut distingvat, videtur argumentis inniti.*

HEDYSARUM.

* *Foliis simplicibus.*

Alhagi. EDYSARUM foliis simplicibus lanceolatis obtusis, caule fruticoso spinoso. *Gron. orient.* 228.
aista spartium spinosum, foliis polygoni. *Bauh. pin.* 394.
aista-spinosa flore rubro. *Wheel. itin.*
ul. *Kauv. itin.* 74. *t.* 74.
bitat in Tataria, Persia, Syria, Mesopotamia. ♄

bupleurifolium. EDYSARUM foliis simplicibus lanceolatis acutis, caule inermi.
ithopodium maderaspatanum, bupleuri folio. *Pet. gaz.* 18. *t.* 11. *f.* 12.
orpioides maderasp. graminis leucanthemi foliis, siliquis nodosis. *Pluk. amalth.* 189. *t.* 443. *f.* 4.
bitat in India.
ulæ paleaceæ longitudine petiolorum.

nummularifolium. EDYSARUM foliis simplicibus cuneiformibus. *Fl. zeyl.* 288. *
obrychis maderaspat. nummulariæ folio, ornithopodii siliquis. *Pet. gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 4.
bitat in India.

reniforme. EDYSARUM foliis simplicibus reniformibus.
bitat in India.
ules *filiformes.* Folia *figura Asari, sed parva, sæpe retusa, nuda, longius petiolata.* Stipulæ *minutæ.* Racemus *terminalis floribus geminis, v. l Flos* 1. *f.* 2. *in summis alis.*

maculatum. EDYSARUM foliis simplicibus ovatis obtusis. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 233. *Fl. zeyl.* 290. *Roy. lugdb.* 385.

Hedy-

Hedysarum humile, capparidis folio maculato. *elth.* 170. *t.* 141. *f.* 161.
Habitat in India.

tyracifolium. 6. HEDYSARUM foliis simplicibus cordato-orbicu retusis supra glabris.
Habitat in Asia. ♄
Caulis *fruticosus*, *ut tota planta villosus.* Stipul ceolatæ.

caftaphyllum. 7. HEDYSARUM foliis simplicibus ovatis subtus riceis, petiolis muticis. *Amœn. acad.* 5. *p.* 40
Ecastaphyllum frutescens reclinatum, foliis ovatis minatis integris. *Brown. jam.* 299.
Spartium scandens, citri foliis, floribus albis ad dos confertim nascentibus. *Plum. spec.* 19. *ic.* 246.
Habitat in America *meridionali.* ♄

angeticum. 8. HEDYSARUM foliis simplicibus ovatis acutis stipulatis.
Hedysarum monophyllum latifolium, siliculis p mis spica longa digestis. *Burm. zeyl.* 113. *t.* *f.* 2.
Onobrychis gangetica monophyllos, siliculis singu bus lævibus: foliatim per internodia discrimin *Pluk. alm.* 270. *t.* 50. *f.* 3.
Onobrychis zeylanica, folio singulari oblongo rotu *Raj. suppl.* 453.
Phaseolus montanus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 146. *t.*
Habitat in India.

vaginale. 9. HEDYSARUM foliis simplicibus cordato-oblongi petiolis simplicibus, stipulis vaginalibus. *Fl. zeyl.* 2
Genista articulata repens, foliis crassiusculis planis ac tis. *Burm. zeyl.* 104. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in India. ⊙

triquetrum. 10. HEDYSARUM foliis simplicibus cordato-oblongi petiolis alatis, ramis triquetris. *Fl. zeyl.* 286.
Onobrychis zeylanica monophyllos, caule triangulo, p tiolis foliorum alatis. *Burm. zeyl.* 176. *t.* 81.
Onobrychis zeylanica, aurantii folio. *Pet. sicc.* 24 *Raj. suppl.* 247.
Phaseolus montanus. 7. *Rumph. amb.* 6. *p.* 146.
Habitat in India.

11. HEDY-

.DYSARUM foliis simplicibus, bracteis strobilo- strobiliferum.
m cordatis obtusis. *Fl. zeyl.* 287. *t.* 3. *
brychis indiae orientalis, fagi foliis alternis, filiculis
ica longa dispositis. *Raj. suppl.* 234.
itat in India.

* * *Foliis conjugatis.*

DYSARUM foliis binatis petiolatis: floralibus diphyllum.
silibus. *Fl. zeyl.* 291. *
ysarum herbaceum procumbens, foliis geminatis,
icis foliatis terminalibus. *Brown. jam.* 301.
ysarum minus diphyllum. *Sloan. jam.* 73. *hist.* 1. *p.*
15. *Raj. suppl.* 450.
brychis maderaspatana diphyllos, filiculis clypeatis
rsutis, minor. *Pluk. alm.* 270. *t.* 246. *f.* 2. & *t.*
. *f.* 1.
m-mari. *Rheed. mal.* 9. *p.* 161. *t.* 82. *Raj. suppl.*
14.
ysarum bifolium: foliolis ovatis, filiculis asperis ge-
nis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. *t.* 50. *f.* 1.
itat in Indiis. ⊙

* * * *Foliis ternatis.*

DYSARUM foliis ternatis: bracteis strobilorum pulchellum.
biculatis conjugatis. *Fl. zeyl.* 292. *
ysarum trifoliatum frutescens, flore & fructu inter
o foliola absconditis. *Burm. zeyl.* 116. *f.* 52.
brychis maderasp. triphylla, filiculis eleganter foli-
eis. *Raj. suppl.* 234.
brychis indica triphyllos, foliis amplis mucronatis,
iquis parvis in spicam longam ex alis inter bina fo-
a circinata arcte conniventia reconditis. *Pluk.*
alth. 161. *t.* 433. *f.* 7.
itat in India. ♄

DYSARUM foliis ternatis lanceolatis, legumi junceum.
bus uniarticulatis rhombeis, pedunculis lateralibus
bumbellatis. *Linn. dec.* 1. *t.* 4. *
itat in India. ♃

DYSARUM foliis ternatis, pedunculis umbelli- umbellatum.
is, caule fruticoso. *Fl. zeyl.* 293. *
ysarum trifoliatum arborescens, floribus ex alis fo-
rum, siliquis copiosis glabris. *Burm. zeyl.* 115. *t.* 51.
orum crocodili. *Rumph. amb.* 4. *p.* 112. *t.* 52.
itat in India. ♄

16. HE-

biarticulatum.

16. HEDYSARUM foliis ternatis, caule suffruti leguminibus biaiticulatis. *Fl. zeyl.* 296. *
Hedysarum triphyllum, siliculis glabris peltatis g nis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. *t.* 50. *f.* 2.
Onobrychis zeylanica trifolia minor perennis. *suppl.* 457.
Habitat in India. ♄

heterocarpon.

17. HEDYSARUM foliis ternatis, floribus spicatis guminibus articulatis: infimo monospermo, lis setaceis. *Fl. zeyl.* 298. *
Hedysarum trifoliatum, siliculis inferioribus foli superioribus articulatis. *Burm. zeyl.* 117. *t.* 53.
Habitat in India.

viscidum.

18. HEDYSARUM foliis ternatis, leguminibus branaceis lævibus integris, caule ramisque his *Fl. zeyl.* 295.
Habitat in India. ♄
Legumina neutra sutura sinuata, sed omnino integ

lineatum.

19. HEDYSARUM foliis ternatis ovalibus line racemis axillaribus: floribus pendulis.
Habitat in Zeylona. *Burmannus.*
Caulis *rectus.* Folia *supra lineis secundum nervos rata.* Racemi *subindivisi, longitudine foliorum: ribus pendulis ex laxis pedicellis.* Legumina *r bea, uniarticulata.*

canadense.

20. HEDYSARUM foliis simplicibus ternatisque, ribus racemosis. *Hort. ups.* 232.
Hedysarum foliis radicalibus simplicibus, caulinis natis, floribus laxe spicatis, leguminibus undul *Hort. cliff.* 365. *Roy. lugdb.* 385.
Hedysarum triphyllum canadense. *Corn. canad.* 44. *t.*
Onobrychis major perennis canadensis triphylla, culis articulatis asperis triangularibus. *Moris.* 2. *p.* 130. *s.* 2. *t.* 11. *f.* 9.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

canescens.

21. HEDYSARUM foliis ternatis subtus scabris, c hispido, floribus racemosis conjugatis. *Hort. ups.*
Hedysarum foliis ternis solitariisque, caule hi fruticoso. *Hort. cliff.* 365. *Gron. virg.* 108. *lugdb.* 385.

[He]dyfarum triphyllum maximum fcandens, caule trigono hirto uncinis, fpicis amplis terminalibus. *Brown. jam.* 301.
[H]edyfarum triphyllum fruticofum (fupinum), flore purpureo. *Sloan. jam.* 73. *hift.* 1. *p.* 185. *t.* 118. *f.* 2. *Raj. fuppl.* 458.
[On]obrychis americana, floribus fpicatis, foliis ternatis canefcentibus, filiculis afperis. *Pluk. alm.* 270. *t.* 308. *f.* 5
[H]abitat in Virginia, Jamaica. ♃

HEDYSARUM foliis ternatis, floribus cernuis racemofis, calycibus pilofis, leguminibus biarticulatis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 403. * — barbatum.
[H]abitat in Jamaica.

HEDYSARUM foliis ternatis: foliolis fubrotundis, caule frutefcente ramofiffimo, leguminibus articulatis lævibus. *Gron. virg.* 109. — marilandicum.
[He]dyfarum trifoliatum, filiqua breviore. *Dill. elth.* 174. *t.* 144. *f.* 171.
[H]edyfarum triphyllum marilandicum minus, filiquis compreffis articulatis afperis brevioribus. *Raj. fuppl.* 455.
[H]abitat in Carolina, Virginia.

HEDYSARUM foliis ternatis fubovatis fubtus villofis, caule frutefcente. *Gron. virg.* 109. — frutefcens.
[He]dyfarum foliis ternatis ovato-lanceolatis fubtus villofis, caule frutefcente villofo. *Mill. dict. n.* 16.
[H]abitat in Virginia. ♄

HEDYSARUM foliis ternatis acutiufculis, caule erecto, racemis longiffimis erectis. *Gron. virg.* 109. — viridiflorum
[H]abitat in Virginia.

HEDYSARUM foliis ternatis ovalibus, caule fruticofo, racemis ovatis, calycibus fructibusque hirfutis monofpermis. *Gron. virg.* 108. — hirtum.
[Tr]ifolium fruticofum hirfutum, fpicis oblongis pedunculatis. *Gron. virg.* 1. *p.* 173. *
[Habi]tat in Virginia. ♄
[Spic]e *oblongæ.* Legumina *uniarticulata, ovata, acuta.*

HEDYSARUM foliis ternatis ovatis, floribus geminatis, *leguminibus nudis venofis* monofpermis. — violaceum.

Hedy-

Hedysarum foliis ternatis lanceolatis, leguminibus m-
nospermis. *Gron. virg.* 108.
Habitat in Virginia.
Flores *violacei, gemini, propriis pedicellis plerum-
annexi, in aliis glomerati ex foliorum alis, in
vero filiformibus pedunculis hinc inde affixi.* L-
mina *calyce triplo longiora, ovata, compressa,*
glabra, reticulata, monosperma.

paniculatum. 28. HEDYSARUM foliis ternatis lineari-lanceol-
floribus paniculatis. *Gron. virg.* 108.
Onobrychis mariana triphylla, passifloræ pentaph-
angustiore folio & facie, siliquis dentatis asp-
Pluk. mant. 140. *t.* 432. *f.* 6.
Habitat in Virginia.

nudiflorum. 29. HEDYSARUM foliis ternatis, scapo florifero n-
caule folioso angulato. *Gron. virg.* 107.
Hedysarum caule nudo: longissimo foliofero, flo-
ro angulato. *Gron. virg.* 1. *p.* 86.
Habitat in Virginia.

repens. 30. HEDYSARUM foliis ternatis obcordatis, caul-
procumbentibus, racemis lateralibus.
Hedysarum caulibus procumbentibus, racemis late-
bus solitariis, petiolis pedunculo longioribus. G-
virg. 1. *p.* 86.
Trifolium procumbens, trifolii fragiferi folio.
elth. 172. *t.* 142. *f.* 169.
Habitat in Virginia.

hamatum. 31. HEDYSARUM foliis ternatis nervosis nudis,
cis sessilibus, leguminibus dispermibus obtectis a-
mine uncinatis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 403. *
Trifolium procumbens zeylanicum hirsutum, loti
cie. *Burm. zeyl.* 226. *t.* 106. *f.* 2.
Trifolium procumbens, foliis ciliatis nervosis,
culis monospermibus acuminatis quinquestriat-
Brown. jam. 298.
Anonis non spinosa minor glabra procumbens, flo-
luteo. *Sloan. jam.* 75. *hist.* 1. *p.* 187. *t.* 119. *f.*
β. Trifolium suberectum subhirsutum, siliculis minorib-
singularibus. *Brown. jam.* 299.
Loto pentaphyllo siliquoso similis, Anonis non sp-
nosa, foliis cisti instar glutinosis & odoratis. Sl-
jam. 74. *hist.* 1. *p.* 186. *t.* 119. *f.* 1.
Habitat in Jamaica, Zeylona.

32. HE-

HEDYSARUM foliis ternatis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis. *Fl. zeyl.* 297. * — triflorum.
dysarum trifoliatum repens, acetosellæ folio glabro, aule hirsuto. *Burm. zeyl.* 119. *t.* 54. *f.* 2.
dysarum trifoliatum repens, folio ovali glabro, aule hirsuto, siliqua plana articulata. *Burm. zeyl.* 118. *t.* 54. *f.* 1.
bitat in India. ⊙

HEDYSARUM foliis ternatis ovatis obtusis, spicis hirsutis, — lagopodioides.
itat in China. *Osbeck.*
lola *ovata, obtusa, nuda, terminata seta minima.* Spicæ *ovatæ, densæ, hirsutæ. Flores int rstincti Bracteis ovatis, subulato-acuminatis, longitudine florum.* Pedicelli *hirsuti.* Calyces *brevissimi, terminati setis ribus hirsutis.* Corollæ *parvæ.* Legumina *monosperma.*

HEDYSARUM foliis ternatis ovato-oblongis, caule volubili. *Hort. cliff.* 499. *Roy. lugdb.* 385. — volubile.
dysarum trifolium scandens, folio longiore splendente. *Dill. elth.* 173. *t.* 143. *f.* 170.
itat in America *septentrionali.*

* * * * *Foliis pinnatis.*

HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto. *Hort. upsf.* 32. *Jacq. vind* 266. * — alpinum.
dysarum saxatile, siliqua lævi, floribus purpureis, odorum. *Amm. ruth.* 116 *n.* 152 153.
obrychis semine clypeato lævi. *Bauh. pin.* 359. *udr.* 149.
itat α in Sibiria, *β in* Helvetia. ♃
ta β differt caule humiliore, floribus maioribus paucioribus, calyce pubescente, at attributa specifica tot communia, ut vix sufficienter distinguatur.

HEDYSARUM foliis pinnatis, stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus racemosis pendulis. — obscurum.
galus caulescens erectus, stipulis vaginalibus. *pl.* 1. *p.* 756.
alus caule erecto ramoso, spica purpurea nie terminato. *Hall. helv.* 567. *t.* 14.
t in Sibiria, *Helvetia.* ♃

coronarium. 37. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso. *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 231. *Roy. lugdb.* 385.
Onobrychis, femine clypeato afpero, major. *Bauh. pin.* 350.
Onobrychis altera. *Dod. pempt.* 549.
Habitat in Italiæ *pratis.* ♃

spinosissimum. 38. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis tomentosis, caule diffuso. *Hort. upf.* 231. *
Hedysarum hispanicum supinum annuum angustifolium floribus parvis ex albo purpurascentibus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 51.
Onobrychis minor, foliolis cordatis, siliquis magis asperis compressis. *Pluk. phyt.* 50. *f.* 2.
Habitat in Hispania. ⊙

flexuosum. 39. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis flexuosis, caule diffuso.
Onobrychis major annua, siliculis articulatis asperis clypeatis undulatim junctis, flore purpureo-rubente. *Moris. hist.* 2. *p.* 130. *Raj. hist.* 929.
Habitat in Asia. ⊙

humile. 40. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollæ alis obsoletis, spicis hirsutis, caulibus depressis.
Hedysarum clypeatum minus, flore purpureo. *Raj. hist.* 929.
Onobrychis femine clypeato aspero, minor. *Bauh. pin.* 350. *prodr.* 149.
Polygalo gesneri affine Caput gallinaceum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 336.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania. ⊙
Folia *pinnata: foliolis obovato-oblongis, subtus villosis.* Caules *semipedales folio ramoque sæpius unico.* Spica *ovata.* Corollæ *similes H. coronario, sed minores, alarum solis rudimentis.* Legumina *sæpius biarticulata.*

virginicum. 41. HEDYSARUM foliis pinnatis, caule fruticoso, leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis. *Gron. virg.* 174.
Habitat in Virginia.

HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. Onobrychis.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus subrotundis aculeatis. *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 231. *Roy. lugdb.* 385. *Sauv. monsp.* 233.

Onobrychis folio viciæ, fructu echinato, major. *Bauh. pin.* 350.

Caput gallinaceum belgarum. *Lob. ic.* 2. *p.* 81.

Onobrychis incana, foliis longioribus. *C. B. Burser.* XIX: 138.

Habitat in Sibiriæ, Galliæ, Angliæ, Bohemiæ *apricis, cretaceis.* ♃

HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis corollarum alis brevissimis, scapis subradicalibus. saxatile.

Onobrychis saxatilis, foliis viciæ angustioribus & longioribus aquisextiensis. *Tournef. inst.* 390. *Garid. aix. Allion. nicæens.* 124

Habitat in Galloprovincia & *in agro* Nicæensi. ♃

Caules sub terra lignosi. Caulis *brevissimus, ut fere nullus*; Scapi *itaque fere radicati.* Spica *onobrychidis, sed albida.*

HEDYSARUM foliis pinnatis, caule suffruticoso corollarum vexillis carina, alisque vexillo brevioribus, leguminibus monospermis. pumilum.

Habitat in Hispania. ♄

Caulus palmaris. Folia *pinnata, longitudine caulis: foliolis ovali-oblongis.* Spica *glabra.* Florum *vexillum carina dimidio brevius.* Carina *maxima, latissima, obtusissima.*

HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis cristatis aculeatis, petalis æqualibus, caule diffuso. Caput galli.

Onobrychis, fructu echinato, minor. *Bauh. pin.* 350. *Garidr.* 149. *Burs.* XIX: 135.

Onobrychis s. Caput Galli minus, fructu maximo insigniter echinato. *Triumf. obs.* 65.

Habitat in Galloprovinciæ *litoribus maris.* ☉

Alæ petala longitudine æqualia, calyce vix longiora. Fructus maximi valde cristati & spinosi. Spicæ *breves.* Corollæ *vix calyce longiores.*

cornutum. 46. HEDYSARUM foliis pinnatis linearibus, c fruticoso pedunculis persistentibus spinescenti leguminibus monospermibus lævibus.

Onobrychis orientalis frutescens spinosa, tragaca facie. *Tournef. cor.* 26. *it.* 2. *p.* 108. *t.* 108.

Habitat in Oriente. *D. Gerard.* ♄

Caulis *fruticosus, humilis, durus.* Stipulæ *memb ceæ, parvæ, acuminatæ.* Folia *pinnata: foliolis* 9, *lanceolato-linearibus.* Pedunculi *axillares, j rii, simplices, mucronati, persistentes in spinas tes longitudine foliorum, a ramo divaricatas.* F 3 *l.* 4, *alterni, pedicellati, infra apicem ped siti.*

ÆSCHYNOMENE.

grandiflora. 1. ÆSCHYNOMENE caule arboreo, floribus ma leguminibus filiformibus.

Robinia pedunculis subdivisis, foliis pinnatis, flo folio majoribus. *Sp. pl.* 1. *p.* 722.

Sesban affinis arbor indiæ orientalis. *Breyn. pro p.* 47. *Comm. mal.* 244.

Galegæ affinis malabarica arborescens, siliquis ribus umbellatis. *Raj. hist.* 1734.

Turia. *Rumph. amb.* 1. *p.* 188. *t.* 76.

Agaty. *Rheed. mal.* 1. *p.* 95. *t.* 51.

Habitat in India. ♄

Foliola *obtusa.* Flores *inter omnes Papilionace ximi, magnitudine ovi gallinacei, reliquis p plantæ majores.* Vexillum *ovatum, patens. ovato-oblongæ, versus apicem sursum falcatæ.* na *alis conformis.* Stamina *diadelpha, sursum xa.* Stigma *obtusum.*

arborea. 2. ÆSCHYNOMENE caule arboreo lævi, legur articulis semicordatis glabris. *Roy. lugdb.* 384.

Habitat in India. ♄

aspera. 3. ÆSCHYNOMENE caule herbaceo scabro, minum articulis medio scabris.

Æschynomene caule scabro, folio infimo quadri *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 233. *Fl. zeyl. Roy. lugdb.* 384.

Mimosa non spinosa major zeylanica. *Breyn.* re *t.* 52. *Raj. hist.* 982.

Habitat in India. ☉

4. ÆSCH

ÆSCHYNOMENE caule herbaceo hispido, foliolis acuminatis, leguminum articulis semicordatis, bracteis ciliatis. americana.
Hedysarum caule hirsuto, mimosæ foliis alatis: pinnis acutis minime gramineis. *Sloan. jam.* 74. *hist.* 1. *p.* 186. *t.* 118. *f.* 3.
Habitat in Jamaica.
Stipulæ utrinque lanceolatæ.

ÆSCHYNOMENE caule herbaceo lævi, foliolis obtusis, leguminibus lævibus: hinc torosis obtusis. *Roy. lugdb.* 385. indica.
Cajatus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 64. *t.* 24.
Neli tali. *Rheed. mal.* 9. *p.* 31. *t.* 18.
Habitat in India.

ÆSCHYNOMENE caule herbaceo lævi, foliolis obtusis, leguminibus cylindricis æqualibus. Sesban.
Galega ægyptiaca, siliquis articulatis. *Bauh. pin.* 352.
Sesban. *Alp. ægyt.* 81. *t.* 82.
Habitat in Ægypti *sepibus. Hasselquist.*
Legumina *teretia, æqualia.* Calyces *campanulati, æquales, quinquedentati, patuli.*

ÆSCHYNOMENE caule herbaceo lævi, foliolis acuminatis, leguminibus hinc serratis medio scabris. pumila.
Hedysarum annuum minus zeylanicum, mimosæ foliis. *T. Fl. zeyl.* 551.
Niti-todda-valli. *Rheed. mal.* 9. *t.* 20.
Habitat in India. ☉
Planta *semipedalis, inferne ramosa.* Folia *pinnata, lanceolata: foliolis confertis, linearibus, acuminatis,* Leguminum *sutura serrata: articulis medio scabris.*

INDIGOFERA.

INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. *Amæn. acad.* 1. *p.* 408. *Hort. ups.* 208. *Mat. med.* 348. *Mill. ic.* *t.* 34. tinctoria.
Indigofera foliis nudis. *Hort. cliff.* 487.
Isatis indica, foliis rosmarini, glasti affinis *Bauh. pin.* 113.
Indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 220. *t.* 80.
Anil. s. Nil inodorum color. *Bauh. hist.* 2. *p.* 945.

Ameri. *Rheed. mal.* 1. *p.* 101. *t.* 54.
Habitat in India. ♄

hirsuta. 2. INDIGOFERA leguminibus pendulis lanatis te gonis. *Fl. zeyl.* 272. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 408.
Astragalus spicatus, siliquis pendulis hirsutis, fo sericeis. *Burm. zeyl.* 37. *t.* 14.
Kattu-tagera. *Rheed. mal.* 1. *p.* 55 *t.* 30.
Habitat in India.

glabra. 3. INDIGOFERA leguminibus horizontalibus te bus, foliis pinnatis ternatisque. *Fl. zeyl.* 274. *Am acad.* 1. *p.* 408.
Colutea siliquosa glabra, ternis quinisve foliis, derapatana, semine rubello. *Pluk. alm.* 113. *t.* *f.* 1.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 9. *t.* 67. *Raj. suppl.* 470.
Habitat in India. ☉

racemosa. 4. INDIGOFERA leguminibus cernuis, racemis el gatis, foliis ternatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 37. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

trifoliata. 5. INDIGOFERA leguminibus subsessilibus compre pendulis, foliis ternatis lanceolatis. *Amœn. acad p.* 327. *
Habitat in India.

GALEGA.

officinalis. 1. GALEGA leguminibus strictis erectis, foliolis l ceolatis strictis nudis.
Galega. *Hort. cliff.* 362. *Hort. upf.* 208. *Mat. n* 349.
Galega vulgaris. *Bauh. pin.* 352. *Morif. hist.* 2. *p.* *f.* 2. *t.* 7. *f.* 9.
Habitat in Hispania, Italia, Africa *ad versuras.* ♃

cinerea. 2. GALEGA leguminibus strictis patentibus pedun latis, racemis oppositifoliis, foliolis mucron subtus villosis. *Amœn. acad.* 5. *p.* 403. *
Galega herbacea subcinerea villosa, foliis oblongis p natis, spicis laxioribus ad alas. *Brown. jam.* 289
Habitat in Jamaica.

virginiana 3. GALEGA leguminibus retrofalcatis compressis v losis

losis spicatis, calycibus lanatis, foliolis ovali oblongis acuminatis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 18.
Clitoria foliis pinnatis, caule decumbente. *Hort. cliff.* 498. * *Gron. virg.* 111.
Terebinthus. *Mich. gen.* 210.
Orobus virginianus, foliis fulva lanugine incanis, foliorum nervo in spinam abeunte. *Pluk. mant.* 142.
Cicer astragaloides virginianus hirsutie pubescens, floribus amplis subrubentibus. *Pluk. alm.* 103. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada.
Caulis *in loco natali erectus est.*

villosa. GALEGA leguminibus retrofalcatis villosis pendulis racemosis lateralibus, foliolis glabris lanceolatis. *Fl. zeyl.* 299. * *Amæn. acad.* 3. *p.* 19.
Securidaca maderaspatensis, siliquis falcatis fulvis & villosis plurimis circum ramulos stellatim positis. *Pluk. alm.* 399. *t.* 59. *f.* 6.
Coronilla zeylanica siliquis fuscis hirsutis pilosis, flore albo. *Burm. zeyl.* 78. *t.* 33.
Habitat in India.

maxima. GALEGA leguminibus strictis adscendentibus glabris, stipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris striatis. *Fl. zeyl.* 300. * *Amæn. acad.* 3. *p.* 19.
Habitat in Zeylona.

purpurea. GALEGA leguminibus strictis adscendentibus glabris racemosis terminalibus, stipulis subulatis, foliis oblongis glabris. *Fl. zeyl.* 301. * *Amæn. acad.* 3. *p.* 19.
Coronilla zeylanica herbacea, flore purpurascente. *Burm. zeyl.* 77. *t.* 32.
Habitat in Zeylona.

tinctoria. GALEGA spicis lateralibus pedunculatis, leguminibus strictis pendulis, foliolis emarginatis subtus villosis. *Fl. zeyl.* 302. * *Amæn acad.* 3. *p.* 19.
Habitat in Zeylona.

sericea. GALEGA leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis subtus sericeis, caule fruticoso. *Fl. zeyl.* 303. *Amæn. acad.* 3. *p.* 19.
Habitat in Zeylona. ♄

PHACA.

bætica. 1. PHACA caulescens erecta pilosa, leguminibus ti-cymbiformibus.
Phaca leguminibus rectis. *Roy. lugdb.* 390.
Astragalus bæticus lanuginosus, radice amplissi *bauh pin.* 351.
Astragalus bæticus. *Cuf. hist.* 2. *p.* 234.
Habitat in Hispania, Lusitania.

alpina. 2. PHACA caulescens erecta glabra, leguminibus longis inflatis subpilosis.
Phaca frigida. *Fl. svec* 2. *n.* 657. *Jacq. vind.* 265.
Astragaloides alpina supina glabra, foliis acutiori *Till. pi.* 19 *t.* 14. *f* 1, 2.
Astragaloides elatior erecta, viciæ foliis, floribus teis, siliquis pendulis. *Amm. ruth* 148.
Habitat in Alpinis Italiæ, Sibiriæ, Lapponiæ *umbros* Lapponicæ *Legumen compressum, sed cylindrico-tum, adspersum pilis raris fuscis.* Italicæ & S ricæ *vero semi-ovatum, compressum, simili Coluteæ herbaceæ, attamen varietates esse ex allatis se minibus constitit.*

sibirica. 3. PHACA acaulis, foliis pinnatis: pinnis digitatis
Astragaloides incana non ramosa floribus can *Amm. ruth.* 150. *t.* 19. *f.* 2.
Astragaloides hirsuta minor, non ramosa, flori purpurascentibus. *Amm. ruth.* 249. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in Alpibus Sibiricis.

ASTRAGALUS.

* *Caulibus foliosis erectis, nec prostratis.*

alopecuroides. 1. ASTRAGALUS caulescens, spicis cylindricis sessilibus, calycibus leguminibusque lanatis.
Astragalus capitulis oblongis sessilibus, calycibu leguminibus lanatis. *Hort. cliff.* 361. * *Amæn. a* 2. *p.* 359. * *Roy. lugdb.* 391.
Astragalus alpinus procerior alopecuroides. *Tou inst.* 416. *Mill. dict. t.* 58.
Habitat in Sibiria, Hispania.

christianus 2. ASTRAGALUS caulescens erectus, floribus merentis subsessilibus ex omnibus axillis foliace
Astragalus orientalis maximus incanus erectus, ca

a

ab imo ad summum florido. *Tournef. cor.* 29. *itin.* 2. *p.* 254. *t.* 254.
[A]stragalus diosc. vulgo Christiana radix. *Dalech. app.* 26?
[Ha]bitat in Oriente.
[Fl]ores *fere totum caulem cooperiunt.*

[A]STRAGALUS caulescens, capitulis globosis: pedunculis longissimis, foliolis emarginatis. *Hort. cliff.* 360. *Roy. lugdb.* 391. **capitatus.**
[Ast]ragalus orientalis villosissimus, capitulis rotundioribus, floribus purpureis. *Tournef. cor.* 29?
[Ha]bitat in Oriente.

[A]STRAGALUS caulescens erectus pilosus, floribus spicatis, leguminibus subulatis pilosis. **pilosus.**
[Ast]ragalus caulescens erectus, leguminibus erectiusculis pilosis subulatis: acumine erecto. *Hort. ups.* 226.
[Ast]ragalus villosus erectus spicatus, floribus flavescentibus. *Amm. ruth.* 166
[Cic]er montanum lanuginosum erectum. *Bauh. pin.* 347. *prodr.* 148.
[Ha]bitat in Sibiria, Thuringia.

[A]STRAGALUS caulescens erectus, caule glabro sulcato, foliis lanceolatis, leguminibus subtriquetris. **sulcatus.**
[Ph]aca caulescens erecta glabra sulcata, pedunculis folio longioribus, leguminibus erectis subtriquetris. *Linn. gœtt.* 142.
[Ha]bitat in Sibiria. ♃
[Pl]anta *alta, stricta, glaberrima, Caule sulcato.* Folia *ex oppositionibus* 8. *s.* 9. *cum impari pinnata: foliolis glabris, angusto-lanceolatis.* Pedunculi *erecti, stricti, foliis triplo longiores.* Flores *in spicam laxam sparsi, violacei, parvi, calyce brevissimo.* Legumina *oblonga, erecta.* Legumen *uniloculare ut in Phacis, ad quas forte accedit.*

[A]STRAGALUS caulescens erectus glaber, foliis linearibus, pedunculis elongatis triquetris. **tenuifolius**
[Ast]ragalus caulibus ramosis, foliolis linearibus rigi[di]s, spicis glomeratis, siliquis ovatis utrinque acu[ti]s. *Gmel.*
[Hab]itat in Sibiria. ♃

Caules *breviores.* Folia *foliolis* 11 - 13, *lineari angustissimis.* Pedunculi *longi, recti, subtriq* Flores *spicati.*

galegiformis. 7. ASTRAGALUS caulescens strictus glaber, flo racemosis pendulis, leguminibus triquetris que mucronatis.

Astragalus caule erecto paniculato, pendulis longioribus, floribus sparsis. *Hort. cliff.* 362. *lugdb.* 391.

Astragalus orientalis altissimus, galegæ foliis an oribus, flore e viridi flavescente. *Tournef. co*

Astragalus sylvaticus montanus procerior, albo siliqua brevi glabra, semine luteo. *Amm. ruth.*

Habitat in Sibiria.

Caulis *bipedalis, strictissimus, glaber.* Folia *ex 25 ad 31 foliolis: petiolo basi tumido.* Fl *racemosi, penduli, flavo-albicantes.* Legumina *bra, brevia, triquetra, acuta, intra calycem p lata.* Semina *utrinque* 2.

chinensis. 8. ASTRAGALUS caulescens strictus glaber, flo racemosis pendulis, leguminibus ovatis inflatis que mucronatis. *Filii. decad.* 1. *t.* 3. *

Habitat in China. ♃

uliginosus. 9. ASTRAGALUS caulescens erectiusculus, flo spicatis, leguminibus erectiusculis nudis; tu tereti depressis: mucrone reflexo. *Hort. upf.*

Habitat in Sibiriæ *pratis subhumidis. D. Gmelin.* ♃

Carinæ floris apex violaceus.

carolinianus. 10. ASTRAGALUS caulescens erectus lævis, pe culis spicatis, leguminibus ovato-cylindricis lo acuminatis.

Astragalus floribus racemosis, pedunculis longitu foliorum, caule erecto, calycibus glabris. *Roy. l* 391.

Astragalus procerior non repens, flore viridi-fla scente. *Dill. elth.* 45. *t.* 39. *f.* 45.

Habitat in Carolina. ♃

* * *Caulibus foliosis, diffusis.*

canadensis. 11. ASTRAGALUS caulescens diffusus, legumini subcylindricis mucronatis, foliolis subtus subvil sus. *Gron. virg.* 107.

Astra-

[Ast]ragalus canadensis, flore viridi flavescente. *Tournef. inst.* 416. *conf. Dill. elth.* 46 *t.* 39. *f.* 45.
[Ha]*bitat in* Virginia, Canada. ♃
[Fo]liola *subtus tenuissime tomentosa sunt.*

[A]STRAGALUS caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Hort. upſ.* 226. — Cicer.
[Ast]ragalus leguminibus subglobosis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.
[Ci]cer sylvestre, foliis oblongis hispidis, majus. *Bauh. pin.* 247.
[Ci]cer sylvestre. *Cam. epit.* 205.
[Ha]*bitat in* Austria, Helvetia, Italia. ♃
[F]oliola *oblonga, sublanceolata sunt.*

[A]STRAGALUS caulescens erecto-patulus: foliolis ovalibus, calycibus tumidiusculis, leguminibus subrotundis. — microphyllus.
[Ci]cer, foliis oblongis hispidis, minus. *Bauh. pin.* 347.
[Ha]*bitat in* Sibiria, Harcynia, Thuringia. ♃
[Ha]bitus *A. Ciceris dicti, at quadruplo minor.* Caulis *erectus, flexuosus, pedalis, non glaber.* Rami *patentes, breviores.* Folia *pinnata: foliolis* 13. *s.* 15, *ovalibus, obtusis, interdum emarginatis.* Stipulæ *subulatæ, minimæ.* Pedunculi *solitarii, foliis longiores, superne floribus horizontalibus instructi.* Calyces *glabri, subrotundi, parum ventricosi, pilis raris vix conspicui, adsperſi.* Corollæ *flavæ, calyce duplo longiores.* Legumina *subrotunda, inflata, villosa.*

[A]STRAGALUS caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. — glycyphyllos.
[Ast]ragalus leguminibus lunatis biventricosis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff.* 362. *Fl. svec.* 591; 658. *Roy. lugdb.* 392.
[As]tragalus luteus perennis procumbens vulgaris. *Moris. hist.* 2. *p.* 107.
[Gl]ycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus. *Bauh. pin.* 352.
[Ha]*bitat in* Europæ *nemoribus.* ♃

[A]STRAGALUS caulescens procumbens, leguminibus subulatis recurvatis glabris. *Hort. upſ.* 226. *Sauv. monsp.* 237. *Gron. orient.* 223. — hamosus.

Astra-

Aſtragalus leguminibus pendulis recurvis fal
Hort cliff. 362 *Roy. lugdb.* 392.
Aſtragalus monſpeliacus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 234.
Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *Bau*
349.
Habitat Meſſanæ, Monſpelii. ⊙

contortupli- catus. 16. ASTRAGALUS caulefcens procumbens, le
nibus contortuplicatis canaliculatis villoſis.
Aſtragalus acaulis, ſcapo foliis breviore, legumi
ſubulatis canaliculatis retortis hirſutis. *Hort. up*
Aſtragalus repens, ſiliquis undulatis. *Buxb. cent.*
22. *t.* 39.
Aſtragalus ſiliquis recurvis depreſſis hirſutis. *Act*
2. *p.* 339. *t.* 11.
Aſtragalus hirſutus procumbens, viciæ foliis c
tis. ſiliquis incurvis. *Amm. ruth.* 164.
Habitat in Sibiria. ⊙
Mire variat ex ſolo quoad magnitudinem & ſta

bæticus. 17. ASTRAGALUS caulefcens procumbens, ſpic
dunculatis, leguminibus priſmaticis rectis triq
apice uncinatis. *Hort. upſ.* 225.
Aſtragalus caule erecto, floribus ſpicatis, legumi
oblongis acinaciformibus: apice recurvo. *Roy.*
391.
Aſtragalus annuus, foliis & ſiliquis longioribu
bris ad foliorum ortum communi pediculo ir
Pluk. alm. 60.
Aſtragalus luteus annuus bæticus maritimus rec
ter. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 108. *ſ.* 2. *t.* 9. *f.* 11.
Securidaca ſicula, ſiliquis foliaceis. *Boc. ſic.* -
Raj. hiſt. 935.
Habitat in Sicilia, Luſitania, Hiſpania. ⊙

ſeſameus. 18. ASTRAGALUS caulefcens diffuſus, capitul
ſeſſilibus lateralibus, leguminibus erectis ſul
acumine reflexis. *Hort. cliff.* 361.
Aſtragalus annuus anguſtifolius, floſculis ſubcæ
Garid. aix. 50. *t.* 12.
Aſtragalus annuus, foliis & ſiliquis hirſutis: pl
in foliorum alis ſeſſilibus. *Pluk. alm.* 60. *t.* 79. *f*
Ornithopodio affinis hirſuta, fructu ſtellato. *Ba*
350.
Vicia ſeſamea apula. *Col. ecphr.* 1. *p.* 303. *t.* 301.
H

abitat in G. Narbonenſi, Italia.
res huic cærulei, quamvis ei luteos adſcribant Columna & Moriſonus. Bœrh. lugdb. 2. *p.* 54.

ASTRAGALUS caulefcens procumbens, legumi- nibus capitatis cordatis acutis hirſutis complicatis. **Epiglottis.**
ragalus ſiliquis cordatis acutis pendulis: lateribus conniventibus. *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.
ragalus hiſpanicus, ſiliqua epiglottidi ſimilis, flore purpureo, major. *Herm. lugdb.* 74. *t.* 75.
ragaloides incana, flore purpureo lentis ſiliqua. *Barr. ic.* 537. *f.* 1.
bitat in Hiſpania, Galloprovincia, Oriente. ☉

ASTRAGALUS caulefcens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentoſis ovato-oblongis. **ſyriacus.**
ragalus ſyriacus hirſutus. *Bauh. pin.* 351?
ragalus ſyriacus. *Lob. ic.* 79?
ragalus ſyriacus hirſutus, magno flore. *Moriſ. hiſt.* . *p.* 96. *t.* 8. *f.* 2?
itat in Sibiria. ♃
nta *refert figuram authorum, ſed altior eſt; facie proprie accedit ad A. arenarium, a quo differt Planta triplo majore, minus incana; Floribus numeroſis capitato-ſpicatis, nec racemoſis; Floribus triplo majoribus magis reflexis. Sunt etiam* Folia *lineari-lanceolata.* Legumina *oblonga, piloſa, erecta.*

ASTRAGALUS ſubcaulefcens procumbens, floribus ſubracemoſis erectis, foliis tomentoſis. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 659. **arenarius**
ragalus pedunculis folia villoſa æquantibus, floribus erectis, caulibus procumbentibus. *It. ſcan.* 108.*
ragalus incanus parvus noſtras. *Pluk. alm.* 59. *Raj. angl.* 3. *p.* 326. *t.* 12. *f.* 3. *mala.*
aux montana purpurea noſtras. *Raj. hiſt.* 939.
abitat in Angliæ, Scaniæ *arena mobili.* ♃

ASTRAGALUS caulefcens diffuſus, capitulis pedunculatis imbricatis ovatis, floribus erectis, leguminibus ovatis calloſis. **Glaux.**
ri ſylveſtri minori affinis. *Bauh. pin.* 347.
ux dioſcoridis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 240. *t.* 241.
itat in Hiſpania.

Radix

Radix *lignosa*. Caules *spithamæi*, *plurimi*, *superne subvillosi*. Folia *pinnata*: *foliolis* 21 *s.* 23, *mini ovali-oblongis*, *subtus pilis albis adspersis*. Pedu li *ex summis foliorum alis*, *foliis sæpius breviores losi*. Capitulum *Trifolii facie*, *ovatum*, *calycib te & post florescentiam apicibus nigris*. Corollæ *ctæ*, *acuminatæ*, *vexillo fere duplo longiores*.

onobrychis. 23. ASTRAGALUS caulescens diffusus, pedunc spicatis, vexillis flore duplo longioribus.
Onobrychis spicata, flore purpureo. *Bauh. pin.*
Onobrychis 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 238.
Habitat in Austria. ♃

austriacus. 24. ASTRAGALUS caulescens procumbens, flor racemosis, leguminibus utrinque acutis pilosis, liolis linearibus emarginatis. *Jacq. vind.* 263. *
Onobrychis floribus viciæ dilute cæruleis. *Bauh.* 351.
Onobrychis. 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 239.
Habitat in Moravia & Viennæ. *Jacquin.* ♃
Affinis A. alpino, *sed* Caules *triplo longiores*. *non ovali oblonga*, *sed linearia emarginata*. Ra *longi*, *laxi*. Flores *triplo minores & valde* Fructus *fere A. alpini*.

alpinus. 25. ASTRAGALUS caulescens procumbens, flor pendulis racemosis, leguminibus utrinque ac pilosis.
Astragalus pedunculis folio longioribus, floribus spicatis pendulis. *Hort. cliff.* 362. *Fl. svec.* 592; *Roy. lugdb.* 392.
Astragalus alpinus minimus. *Fl. lapp.* 267. *t.* 9. *f.*
Astragalus alpinus, foliis viciæ, ramosus & proc bens. *Oed. dan. t.* 51.
Astragalus alpinus, folio viciæ. *Scheuch. alp.* 509. *f.*
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis. ♃

* * *Scapo nudo*, *absque caule folioso*.

montanus. 26. ASTRAGALUS subacaulos, scapis folio longio bus, floribus laxe spicatis erectis, leguminibus o tis acumine inflexo. *Roy. lugdb.* 392. *Jacq. vi* 264. *
Astragalus quidam montanus vel Onobrychis aliis. *Ba hist.* 2. *p.* 240.

Ono-

nobrychis floribus viciæ majoribus cæruleo-purpurascentibus f. foliis tragacanthæ. *Bauh. pin.* 351.
obrychis IV. *Cluf. hift.* 2. *p.* 240.
bitat in Helvetia, Vallesia. ♃
fert ab A. alpino *quod* caulis *vix ... ne vix bafi ramofus: quodque* flores *rubicundi, erecti: nec penduli.*

ASTRAGALUS acaulos, fcapis folio longioribus laxe fpicatis, calycibus leguminibusque inflatis hirfutis. — veficarius.
tragalus alpinus, tragacanthæ folio, veficarius. *Tournef. inft.* 417. *Magn. hort.* 27. *t.* 27. *Raj. fuppl.* 454.
bitat in Delphinatu. ♃

ASTRAGALUS acaulis, fcapis folia æquantibus, leguminibus inflatis fubglobofis nudis. — phyfodes.
tragalus acaulos, leguminibus inflatis fubglobofis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 359. *
bitat in Sibiria.
...teæ *villofæ;* Fructus *Coluteæ, fed magis globofus.*

ASTRAGALUS acaulis, fcapo erecto, foliolis ciliatis, leguminibus ovatis tumidis villofis. † — caprinus.
tragalus africanus, flore luteo odorato. *Breyn. cent.* 2. *Raj. hift.* 396. *Magn. monfp.* 26. *Raj. hift.* 836.
tragalus perennis, floribus hirfutis, caule recto ...phyllo, flore ochroleuco odoratiffimo. *Morif. hift.* ... *p.* 203. *f.* 2. *t.* 24. *f.* 3. *Raj. hift.* 940.
bitat in Barbaria. ♃

ASTRAGALUS acaulis, fcapo erecto foliis longiore, leguminibus fubulatis inflatis villofis erectis. — uralenfis.
Hort. upf. 226. *
tragalus non ramofus villofus & incanus fpicatus, floribus purpureo-violaceis. *Amm. ruth.* 167.
tragalus alpinus totus fericeus, foliis acuminatis. *Hall. it.* 83. *t.* 2. *f.* 2.
tragalus foliis ovato-lanceolatis fericeis fplendentibus. *Hall. helv.* 506. *t.* 5.
...ca pedunculis radicatis hirfutiffimis, foliolis ex ovato acutis fæpe imbricatis. *Zinn. gœtt.* 343.
bitat in Sibiria. ♃

ASTRAGALUS acaulis hirfutus, fcapis erectis fpica... foliolis ovatis obtufis villofis. — grandiflorus.
...agalus, tragacanthæ folio, non ramofus, floribus ...teis. *Amm. ruth.* 168?

Habi-

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃
Folia *spithamæa: foliolis* 17, *valibus, obtusis, hir*
præsertim subtus. Scapi *crassi, pilosi, terminati.*
ca *crassiuscula.* Calyces *hirsuti.* Corollæ *ma*
flavæ.

campestris. 32. ASTRAGALUS acaulis. calycibus legumini
que villosis, foliolis lanceolatis acutis, scapo
cumbente. *It. al.* 50. 662 * *Fl svec.* 593.
Astragalus acaulos. foliis peracutis, calyce & fru
villoso. *Hall. helv.* 567. *t.* 13.
Astragalus perennis supinus, foliis & siliquis hisp
flore luteo. *Bux. Hall.* 32.
Habitat in Oelandia, Germania, Helvetia. ♃
Corollæ flavæ Carina acuminata basi purpurascente.

monspessulanus. 33. ASTRAGALUS acaulis, scapis declinatis, lo
tudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus
arcuatis glabris. *Hort. upf.* 227. *Sauv. monsp.*
Astragalus monspessulanus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 338.
Astragalus purpureus perennis monspeliensis. *M*
hist. 2. *p.* 106.
Habitat Monspelii. ♃

incanus 34. ASTRAGALUS acaulis, scapis declinatis foli
mentosis, leguminibus subulatis subarcuatis su
mentosis apice reflexo. *Gerard.*
Astragalus incanus, siliqua incurva. *Magn. monsp.*
Allion. nicæens. 158.
Onobrychis incana. *Bauh. prodr.* 149. foliis longi
bus. *Bauh. pin.* 350. *Raj. hist.* 928, 938.
Habitat in Galloprovincia. ♃
Foliola *subrotunda, incana, tomentosa.* Legumina
pe recta, reflexo rigido apice tantisper incurva. Ca
inflatus.

uncatus. 35. ASTRAGALUS acaulis exscapus, leguminibus s
bulatis hamatis folio longioribus, foliolis obc
datis.
Habitat in Aleppo. *Russel.* ♃
Folia *foliolis* 19, *obcordatis cum setula, viridia.* Sc
nulli. Flores *ad ipsam radicem, pauci, mini*
albi. Legumina *valida, folio toto longiora, mucr*
nata, arcuato-hamata. Affinis nimium A. trimestri

36. ASTRA-

ASTRAGALUS subacaulis, scapis subbifloris, leguminibus hamatis subulatis bicarinatis. *trimestris.*
Biaca leguminibus arcuatis. *Roy. lugdb.* 390.
Habitat in Ægypto. ☉
Planta tenera. Caules *breves.* Scapi *e radice f. Pedunculi e caule, pauciflori f. subbiflori.* Flores *flavi.* Legumen *biloculare, subulatum, in hamum flexum, compressum, externe duobus angulis compressis carinatum.*

ASTRAGALUS acaulis, scapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis subemarginatis nudis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 327. * *depressus.*
Astragalus supinus minor, flosculis albis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 54.
Habitat in alpinis Europæ. ♃

* * * * *Caule lignoso.*

ASTRAGALUS subacaulis, floribus radicalibus numerosis subsessilibus. *tragacanthoides.*
Astragalus orientalis acaulos, flore luteo. *Tournef. cor.* 28. *Buxb. cent.* 3. *p.* 21. *t.* 38. *f.* 2.
Astragalus repens, barbæ jovis foliis, acaulos ferme polyanthos. *Amm. ruth.* 170.
Habitat in Sibiria, Armenia. ♃
Caulis *aut* Scapus *nullus, sed radicis rami supra terram diffusi & depressi, vestiti* Foliis *pinnatis, parvis, villosis.* Flores *aggregati ad radicem, sessiles.* Calyces *hirsuti dentibus nigricantibus.* Corollæ *flavæ.* Legumina *subrotunda, lævia.*

ASTRAGALUS caudice arborescente, petiolis spinescentibus. *Tragacantha.*
Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. *Pluk. alm.* 60.
Tragacantha. *Bauh. pin.* 388. *Cam. epit.* 446. *Hort. cliff.* 361. *Mat. med.* 343.
Tragacanthæ affinis lanuginosa, f. Poterium. *Bauh. pin.* 388. *Gron. orient.* 226.
Tragacantha altera, Poterium forte. *Clus. hist.* 108.
Habitat in littore Massiliensi, Ætna, Olympo. ♄

BISERRULA.

BISERRULA. *Hort. cliff.* 361. *Pelecinus.*

Aſtragalus purpureus annuus peregrinus, ſiliquis que ſerræ ſimilibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 107. *ſ.* 2 *f.* 6.
Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis. *Baul* 349.
Securidaca peregrina. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 238.
Habitat in Sicilia, Hiſpania, Galloprovincia. ☉

PSORALEA.

pinnata. 1. PSORALEA foliis pinnatis linearibus, floribus laribus. *Hort. upſ.* 225. *
Pſoralea foliis pinnatis: foliolis linearibus acumi *Roy. lugdb.* 373.
Dorycbnium caule fruticoſo, foliis pinnatis: foliol nearibus. *Hort. cliff.* 370.
Spartium africanum. *Riv. tetr.* 5.
Geniſtæ affinis arbor africana monoſpermos, flor ruleo, foliis pinnatis. *Herm. lugdb.* 272. *t.* 27;
Habitat in Æthiopia. ♄
Pedunculi *axillares, ſolitarii, eglumes, hirſuti.*

aculeata. 2. PSORALEA foliis ternatis, foliolis cuneiformibu curvo-mucronatis, capitulis terminalibus.
Pſoralea foliis ternis: foliolis cuneiformibus triqu aculeatis. *Roy. lugdb.* 373.
Cytiſi facie lato ſubrotundo glabro & punctato *Pluk. amalth.* 70. *t.* 387. *f.* 6.
Geniſta Spartium africanum trifolium, floribus cær foliis minimis in ſpinulam deſinentibus. *Raj.* 104.
Habitat in Æthiopia. ♄
Rami non hirſuti.

hirta. 3. PSORALEA foliis ternatis, foliolis obovatis re vato-mucronatis, floribus ternis ſeſſilibus. *A acad.* 6. *afr.* 35. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

tenuifolia. 4. PSORALEA foliis inferioribus ternatis; ſuperio ſimplicibus lanceolato-ſubulatis.
Habitat in Æthiopia. †
Pedunculi *axillares, ſolitarii, glumoſi.*

aphylla. 5. PSORALEA foliis nullis, ſtipullis ovatis ſeſſi adpreſſis acutis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 34. *

Ge

enista Spartium cæruleum cap. b. spei. *Breyn. cent.* *t.* 25.
abitat ad Cap. b. Spei. ♄

ORALEA foliis omnibus ternatis: pedunculis capitatis. *Hort. upf.* 225. — bituminosa
ifolium capitulis subrotundis, calycibus ventricosis, caule arborescente. *Hort. cliff.* 373.
ifolium bitumen redolens. *Bauh. pin.* 327.
ifolium bituminosum. *Dod. pempt.* 566.
rifolium bitumen redolens angustifolium. *Bœrh. lugdb.* 2. *p.* 32.
folium bituminosum inodorum. *Besl. eyst. æst. t.* 11. *f.* 2.
bitat in Siciliæ, Italiæ, Narbonæ *collibus maritimis.* ♄
riat foliolis lanceolatis & ovatis. Spicæ subrotundæ.

ORALEA foliis omnibus ternatis: foliolis ovato-lanceolatis, spicis pedunculatis. — glandulosa.
ralea foliis omnibus ternatis, caule erecto arborescente, pedunculis spicatis, bracteis minimis ciliatis. *Arduin. spec.* 24. *t.* 8.
ba jovis triphylla, flore ex albo & cæruleo. *Feuill. per.* 7. *t.* 3.
bitat in Peru. ♄
ilis sequenti: sed Spicæ elongatæ fere racemosæ. bracteis minutis, nec calycum longitudine.

ORALEA foliis ternatis: foliolis subrotundis angulatis, spicis pedunculatis. — americana.
olium americanum. *Lob. ic.* 2. *p.* 31. *Dod. pempt.* 57. *Bauh. pin.* 327.
itat in America?
les diffusi, herbacei, punctis glandulosis adspersi. olia ternata: intermedio majore, petiolato, subrotun-, obtusissima, obsolete dentata aut angulata, adspersa punctis glandulosis, ut in congeneribus. Spicæ *axillares, oblongæ, pedunculis longitudine foliorum. Lob. & Dod. figuræ bonæ sunt. Hoc ævo mihi non visa in Hortis Europæis.*

RALEA foliis simplicibus ovatis. *Hort. upf.* 225. — Corylifolia.
lea folio integro subrotundo. *Juss. act.* 1744. *p.*

hnlum foliis *simplicibus ovatis. Roy. lugdb.* 389.

Loto affinis coryli folio. *Dodart. act.* 4. *p.* 289.
Pluk. alm. 227. *t.* 96. *f.* 5.
Habitat in India. ⊙

cytisoides. 10. PSORALEA foliis quinato-pinnatis ternati racemis axillaribus.
Lotus africana frutescens, flore spicato rubi
Comm. hort. 2. *p.* 167. *t.* 84.
Genista capensis spinosa, ligustri folio, pentaph floribus spicatis rubris. *Pluk. phyt.* 185. *f.* 5.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Frutex *ramis angulatis.* Folia *infima ternata; j ra quinato-pinnata: foliolis oblongis, incanis, natis, subæqualibus.* Stipulæ *subulatæ.* Setul *foliorum exortum.* Racemi *axillares, foliis lon bracteis ovatis, mucronatis, deciduis.* Calyx *paulo brevior.* Stamina *diadelpha.* Vexillu *ctum.* Legumen *subcylindricum, isthmis semina guentibus.*

pentaphylla 11. PSORALEA foliis digitato-quinatis: foliol qualibus. *Hort. upf.* 225.
Psoralea pentaphylla, radice crassa. *B. Juss. act. p.* 381. *t.* 17.
Habitat in Mexico *vel* Malabaria. ♄

prostrata. 12. PSORALEA foliis supradecompositis digitati ribus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 36. *
Habitat ad Cap. b. Spei.

enneaphylla. 13. PSORALEA foliis pinnatis, spicis axillaribu *amer.* 27.
Colutea enneaphyllos lotoides, siliquis congl tis. *Pluk. alm.* 113. *t.* 166. *f.* 2.
Habitat in Indiis.
Folia pinnata: foliolis novenis obovatis.

Dalea. 14. PSORALEA foliis pinnatis, spicis termin *Mill. dict.*
Dalea. *Hort. cliff.* 363. *t.* 22. *
Habitat in America: Vera Cruce. ⊙
Foliola *subtus punctis glandulosis adspersa.* Spic *ut in Plantagine, cærulea.*

EBENUS.

cretica. 1. EBENUS.
Ebenus cretica. *Alp. exot.* 279. *t.* 278. *Pon. it*

Trifolium spicis ovatis villosis, caule fruticoso. *Roy. lugdb.* 380.
Anthyllis fruticosa, foliolis ternatis ac quinatis lanceolatis tomentosis. *Sauv. meth.* 237.
Cytisus incanus creticus. *Bauh. pin.* 390.
Barba jovis cytisi folio, flore rubello. *Barr. rar.* 1389. *t.* 377. & 913.
Loto affinis alata, folio & facie pentaphylloidis fruticosi, floribus in spicam longiorem positis. *Pluk. alm.* 227. *t.* 67. *f.* 5.
Habitat in Creta.
Bracteæ inter flores in spica distinguunt genus abunde a Trifoliis.

TRIFOLIUM.

* Meliloti *leguminibus nudis polyspermis.*

TRIFOLIUM spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb* 381. — M. cærulea.
Lotus hortensis odorata. *Bauh. pin.* 331.
Lotus sylvestris. *Cam. epit.* 724.
Habitat in Bohemia, Lybia.

TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis monospermis, caule erecto. *Hort. upsf.* 223. — M. indica.
Trifolium erectum, caule teretiusculo, pedunculis compresso-angulatis, pericarpiis racemosis rotundis rugosis nudiusculis monospermis. *Fl. zeyl.* 552. *
Melilotus lutea indiæ orientalis erecta, folliculis rotundis parvis. *Pluk. alm.* 246. *t.* 45. *f.* 4.
Melilotus humilis erecta, floribus exiguis odoratis albis. *Pluk. alm.* 247. *t.* 45. *f.* 5.
Melilotus vulgari nostrati affinis, folio minore & angustiore. *Bauh. hist.* 2. *p.* 371.
Melilotus angustifolia repens, folliculis rotundis. *Bauh. pin.* 331. *prodr.* 144.
Melilotus lutea minor, floribus & siliculis minoribus spicatim & dense dispositis. *Moris. hist.* 2. *p.* 161.
Melilotus nova Berardi f. erecta, folliculis rotundis minor. *Raj. hist.* 951.
Habitat in India, Africa. ☉
Varietates datas vix notæ sufficientes distinguunt.

M polonica. 3. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disp lanceolatis, caule erecto.
Habitat in Polonia. ☉
Differt a T. Meliloto officinali Caule *omnino* Foliis *minoribus*, *acuminatis*, *superne acute se* Racemo *floribus remotis longiusque pedicellatis.* dunculis *teretibus*, *nec sulcatis.* Florum *vexil plicatis*, *nec alis extrorsum marginibus longitudin conniventibus*, *sed oblique divaricatis.* Legumi *dispermis*, *parum rugosis*, *lanceolato-acuminatis*, *gioribus.* Statura & Odor *conveniunt.* Flores *dissime flavescentes.*

M. officinalis. 4. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis d .mis rugosis acutis, caule erecto. *Hort. cliff.* *Hort. upf.* 223. *Fl. svec.* 619, 663. *Mat. med.* *Roy. lugdb.* 223. *Dalib. parif.* 225.
Trifolium odoratum f. Melilotus. *Dod. pempt.* 56
Melilotus officinarum germaniæ. *Bauh. pin.* 331.
β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *To inst.* 407.
Lotus sylvestris, flore albo. *Tabern. hist.* 893.
γ. Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore al luteo. T. *Raj. suppl.* 407.
Habitat in Europæ *campestribus.* ☉. ♂
Varietas *frutescens* γ. *radice bienni*, *caule altiori ribus minoribus*, *vexillo lateribus deflexo.*

M. italica. 5. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis di mis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis int
Melilotus italica, folliculis rotundis. *Bauh. pin.*
Melilotus italica. *Cam. hort.* 99. *t.* 29.
Habitat in Italia. ☉

M. cretica. 6. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disp membranaceis ovalibus, caule erectiusculo.
Trifolium peltatum creticum. *Bauh. pin.* 339. p 142. *t.* 142.
Habitat in Creta. ☉
Habitus Meliloti italicæ, *foliis crassis*, *vix sem carnosis*, *inodoris*, *obtusis.*

M. ornithopodioides. 7. TRIFOLIUM leguminibus nudis octospermis ternis calyce duplo longioribus, caulibus decli
Medicago leguminibus ternatis erectis recurvis de dentibus, pedunculo communi. *Hort. cliff.* 37

Tri

Trifolium siliquosum, loto affine, siliquis ornithopodii. *Pluk. alm.* 375. *t.* 68. *f.* 1.
Foenum græcum humile repens, ornithopodii siliquis brevibus erectis. *Raj. angl.* 3. *p.* 331. *t.* 14. *f.* 1.
Habitat in Anglia, Gallia. ☉

* * Lotoidea *leguminibus tectis polyspermis.*

TRIFOLIUM capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis. *Hort. upf.* 223. Lupinaster.
Lupinaster. *Buxb. act.* 2. *p.* 345. *t.* 20.
Lupinaster floribus purpureis & albis, siliquis minoribus. *Amm. ruth.* 143; 144.
Habitat in Sibiria. ♃

TRIFOLIUM capitulis fructiferis reflexis, leguminibus trispermis. *Gron. virg.* 2. *n.* 110. reflexum.
Trifolium leguminibus polyspermis, foliolis obverse ovatis denticulatis: floribus tetrapetalis, capitulis fructiferis. *Gron. virg.* 1. *p.* 84.
Trifolium montano simile virginianum, floribus amoene purpureis amplioribus & magis patulis summo caule glomeratis per maturitatem reflexis. *Pluk. mant.* 285.
Habitat in Virginia.

TRIFOLIUM capitulis subrotundis, leguminibus dispermis, caule patulo, foliis serrulatis, stipulis rhombeis. † strictum.
Trifolium pratense annuum minimum, foliis longis angustis venosis tenuissime serratis, floribus albis congestis, siliquis minoribus dispermis. *Mich. gen.* 29. *t.* 25. *f.* 7.
Habitat in Italiæ, Hispaniæ *pratis, pascuis.* ☉
Caulis *inferne ramosus, patulus, lævis.* Folia *longe petiolata, ternata, glabra, denticulata, striata, inferiora obovata, superiora elliptica, demum lanceolata.* Stipulæ *latissimæ, rhombeæ, acumine subulato.* Pedunculi *sulcati, axillares, pedunculo breviores.* Spicæ *rachi oblonga s. subglobosa.* Calyx *nudus dentibus subulatis: 2 superioribus corolla longioribus, post anthesin reflexis dentibus patulis.* Corolla *valde parva.* Bracteæ *inter flores, lineares, acuminatæ, vix corollæ longitudine.*

TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, legumini- hybridum

bus tetraſpermis, caule adſcendente. *Fl. ſvec.* 664. *
Trifoliaſtrum pratenſe corymbiferum. *Mich. gen. t.* 25. *f.* 2. 6.
β. Trifolium caule fiſtuloſo erecto, capitulis ſubglo-ſis, foliolis obverſe ovatis ſerratis. *Dalib. pariſ.*
Trifolium orientale altiſſimum, caule fiſtuloſo, albo. *Vaill. pariſ.* 195. *t.* 22. *f.* 5.
Trifolium flore albo. *Riv. tetr.*
Habitat in Europæ *Cultis.*

repens. 12. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, legumini-bus tetraſpermis, caule repente. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 665.
Trifolium capitulis ſubrotundis, floſculis pedunculatis, leguminibus tetraſpermis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 375. *Fl. ſvec.* 612. *Mat. med.* 354. *Roy. lugdb.* 378. *Gron. virg.* 85. *Dalib. pariſ.* 224.
Trifolium pratenſe album. *Bauh. pin.* 327.
Trifolium repens. *Riv. tetr.* 17. *Fl. lapp.* 274.
Habitat in Europæ *paſcuis.* ♃

comoſum. 13. TRIFOLIUM capitulis umbellato-globoſis imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis. *Roy. lugdb.* 379.
Lagopus americanus, floribus majoribus comoſis. *muſ.* 214.
Habitat in America.

alpinum. 14. TRIFOLIUM ſcapo nudo, leguminibus diſpermis pendulis, foliis lineari-lanceolatis.
Trifolium ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 499. *Sauv. monſp.* 185.
Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci. *Bauh. pin.* 328. *prodr.* 143.
Trifolium anguſtifolium alpinum. *Pon. bald.* 340. 340.
Anonis acaulis, floribus longiſſimis, foliis non ſerratis. *Hall. helv.* 588.
Habitat in Alpibus Italicis, Helveticis, Pyrenæis, Baldo. ♃

* * * Lagopoda *calycibus villoſis.*

ſubterra-neum. 15. TRIFOLIUM capitulis villoſis quinquefloris, involucro centrali reflexo rigido fructum obvolvente. *Hort. cliff.* 374. * *Hort. upſ.* 222. *Roy. lugdb.* 379. *Dalib. pariſ.* 224.

Tri-

rifolium subterraneum. *Riv. tetr.*
rifolium pumilum supinum, flosculis longis albis. *Raj. angl.* 3. *p.* 327. & 478. *t.* 3. *f.* 2.
rifolium blesense. *Dodart. mem.* 4. *p.* 313.
rifolium album tricoccum subterraneum gastonium reticulatum. *Moris. hist.* 2. *p.* 138. *f.* 2. *t.* 14. *f.* 5.
rifolium pratense supinum cathobleps. *Barr. ic.* 881.
bitat in Gallia, Italia. ⊙

TRIFOLIUM capitulis villosis globosis, calycibus superioribus flosculo destitutis. *Hort. cliff.* 374.* *Roy. lugdb.* 379. — globosum.
rifolium orientale, capitulo lanuginoso. *Tournef. cor.* 27.
bitat in Arabia, Syria. ⊙
ules *filiformes, pedales, decumbentes.* Capitula *lateralia, globosa, villosa, pedunculata.* Flosculi *tantum inferiores corollati & fertiles; reliqui, mutilati in lanam extabescentes, replent capitulum & fertiles calyces reflectunt ad latera atque occultant.*

TRIFOLIUM capitulis villosis hemisphæricis terminalibus bractea subcalyculatis calycibus omnibus fertilibus. *Amœn. acad.* 4. *p.* 286.* — cherleri.
rifolium capitulis villosis globosis, calycibus omnibus fertilibus tomento connexis. *Roy. lugdb.* 379.
rifolium capitulis villosis globosis terminalibus bractea orbiculata terminatis. *Sauv. monsp.* 184.
rifolium globosum repens. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143.
rifolium glomerulis personatæ cherleri. *Bauh. hist.* 2. *p.* 377.
gopus minor supinus, molli & compresso capite. *Barr. ic.* 859.
bitat Monspelii. ⊙

TRIFOLIUM spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis serrulatis. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 380. *Sauv. monsp.* 184. — rubens.
rifolium montanum, spica longissima rubente. *Bauh. pin.* 328.
opus major alter. *Dod. pempt.* 578.
folium spica oblonga rubra. *Bauh. pin.* 328.
itat in Italia, G. Narbonensi, Helvetia. ⊙
x nudus dentibus pilosis.

pratense. 19. TRIFOLIUM spicis subvillosis, cinctis stipuli[s op]positis membranaceis, corollis monopetalis.

Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis int[ege]rimis. *Hort. cliff.* 375. *Fl. svec.* 615, 666. *Roy.* [lugdb.] 580. *Dalib. paris.* 222.

Trifolium pratense, flore monopetalo. *T. Fl. lapp.*

Trifolium pratense purpureum. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium pratense *Cam. epit.* 582.

Habitat in Europæ *graminosis.* ♃

Spica *sessilis inter Folia duo, opposita, sessilia,* q[uorum] stipulæ *membranaceæ, dilatatæ, calycem quasi* [com]*munem constituunt.*

squarrosum. 20. TRIFOLIUM spicis subpilosis, calycum infimo [den]te longissimo reflexo, caule herbaceo.

Trifolium purpureum lagopoides hirsutum annuu[m ro]tundifolium, spica dilute rubente. *Moris. hist.* [2. p.] 140. *s.* 2. *t.* 13. *f.* 1.

Trifolium hispanicum angustifolium, spica dilut[e ru]bente. *Bauh. pin.* 328.

Habitat in Hispania. ☉

Habitus Trifolii pratensis. Folia *suprema opposita, pilosa, lanceolata aut ovalia, emarginata.* Spic[æ ter]*minales, ovatæ; Calyces parum villosi, 5-dentati:* [den]*tibus nudis, setaceis: 4 erectis; 5to seu infimo* [reli]*quis triplo majore, reflexo, unde Spica squarros[a]* *uncinata valde existit.*

alpestre. 21. TRIFOLIUM spicis subglobosis villosis term[inali]bus sessilibus, caule erecto, foliis lanceolatis [ser]latis.

Trifolium spicis villosis subovatis, caule erecto, f[oliis] ovato-oblongis integerrimis. *Roy. lugdb.* 380.

Trifolium montanum purpureum majus. *Bauh.* [pin.] 328.

Trifolium majus. 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 245. non alb[um] sed rubrum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 375.

Habitat in Europa, *etiam in* Svecia. ♃

Simillimum T. pratensi floribus, at T. montano fo[liis] *sed ramis copiosissimis luxurians in satis.*

lappaceum. 22. TRIFOLIUM spicis globosis subsessilibus term[ina]libus, calycibus setis rigidis terminatis, caule ere[cto].

Trifolium globosum s. capitulo lagopi rotundio[re]. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143.

Trifo-

...ifolium capitulo glomerato rigido. *Bauh. hist.* 2. *p.* 377.
...bitat Monspelii.
...ulis *divaricatus.* Calyces *dentibus aristiformibus*, *...equalibus*, *hispidis.* Corollæ *monopetalæ*, *pallidæ f. albæ.*

TRIFOLIUM spicis villosis oblongis obtusis aphyllis, foliolis subrotundis. *Roy. lugdb.* 380. *Hort. upf.* 222. *Dalib. parif.* 225. — incarnatum.
...ifolium spica rotunda rubra *Bauh. pin.* 328.
...ifolium album incarnatum spicatum f. Lagopus maximus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 376.
...gopum maximum, folio & facie trifolii pratensis. *Lob. ic.* 39.
...ifolium alopecurum latifolium, spica longa. *Barr. ic.* 697.
...bitat *in* Italia. ☉
...ica *maturo fructu ad latus inflexa. Calyces corolla breviores.*

TRIFOLIUM spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 375. *Hort. upf.* 222. *Roy. lugdb.* 379. — angustifolium.
...ifolium montanum angustifolium spicatum. *Bauh. pin.* 328.
...ifolium alopecurum angustifolium elatius. *Barr. ic.* 698.
...bitat *in* G. Narbonensi, Italia. ☉
...yces *corolla longiores.*

TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus. *Hort. cliff.* 375. *Fl. svec.* 616; 668. *Roy. lugdb.* 379. *Dalib. parif.* 225. — arvense.
...ifolium arvense humile spicatum f. Lagopus. *Bauh. pin.* 328.
...gopus. *Fuchs. hist.* 494. *Cam. epit.* 724.
...bitat *in* Europa, America *septentrionali.* ☉

TRIFOLIUM spicis pilosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. — stellatum.
...olium spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis ...ceolatis patulis. *Hort. cliff.* 375. * *Roy. lugdb.* ...8. *Sauv. monsp.* 184.
...olium stellatum. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143.
Lago-

Lagopus minor erectus, capite globoso stellato. *ic.* 860. & 755.
Habitat in Sicilia, Italia, G. Narbonensi. ☉

clipeatum. 27. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus patuli cinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *cliff.* 373. * *Roy. lugdb.* 377.
Trifolium clipeatum argenteum. *Alp. exot.* 3 306.
Habitat in Oriente. ☉

scabrum. 28. TRIFOLIUM capitulis sessilibus lateralibus o calycibus inæqualibus rigidis persistentibus.
Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis sc *Hort. cliff.* 373. * *Roy. lugdb.* 377. *Hall. helv.* *Dalib. paris.* 225. *Sauv. monsp.* 183.
Trifolium capitulo oblongo aspero. *Bauh. pin.* *prodr.* 140.
Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulo longos proferunt. *Bauh. hist.* 2. *p.* 378.
Trifolium minus, capite subrotundo parvo albo nato. *Barr. ic.* 870.
Trifolium dilute purpureum, glomerulis florum longis sine pediculis caulibus adnatis. *Raj.* 168.
Trifolium flosculis albis in glomerulis asperis cau lis adnatis. *Vaill. paris.* 196. *t.* 33. *f.* 1.
Habitat in Anglia, Gallia, Italia. ☉
Caules *minus ramosi.* Foliola *ovalia*, *crassiu margine quasi crenata.* Capitula *axillaria*, *o sessilia*, *dura*, *rigida*, *persistentia.* Calycis *l exteriores longiores*, *validiores.* Corollæ *al angustæ*, *longitudine calycis.*

glomeratum 29. TRIFOLIUM capitulis æqualibus rigidis sessi calycibus striatis patulis æqualibus.
Trifolium capitulis sessilibus lateralibus subglo *Hort. cliff.* 363. * *Roy. lugdb.* 577. *Sauv. meth*
Trifolium cum glomerulis ad caulium nodos rotu *Raj. angl.* 3. *p.* 329. *Pluk. phyt.* 113. *f.* 5.
Trifolium arvense supinum verticillatum. *Barr. ic*
Habitat in Anglia, Hispania.
Caules *decumbentes.* Capitula *hemisphærica:* Ca bus *pulchro ordine digestis: laciniis rigidis p bus interstitia reliquorum occupantibus.*

TRIFOLIUM capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundatis. — striatum.
Trifolium capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calycibus subrotundis villosis striatis. *Fl. svec.* 614; 659. *Dalib. paris.* 225.
Trifolium parvum hirsutum, flore parvo dilute purpureo in glomerulis mollioribus oblongis, semine magno. *Vaill. paris.* 196. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat in Germania, Gallia, Hispania.

TRIFOLIUM capitulis oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppositis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 286. * — alexandrinum.
Habitat in Ægypto.

TRIFOLIUM spicis subvillosis: lacinia calycum infima maxima, caule fruticoso, foliis subsessilibus. — fruticans.
Trifolium spicis subrotundis: lacinia calycum infima maxima, foliis fere sessilibus. *Hort. cliff.* 373. * *Roy. lugdb.* 378.
Trifolium africanum fruticans, flore purpurascente. *Comm. hort.* 2. *p.* 211. *t.* 106.
Habitat in Æthiopia. ♄

TRIFOLIUM pedunculis trifidis trifloris que stipula brevioribus. *Amæn. acad.* 4. *p* 285. * — uniflorum.
Trifolium acaule, pedunculis unifloris, floribus foliisque commixtis. *Sp. pl.* 1. *p.* 771.
Trifolium vernum repens purpureum. *Buxb. cent.* 3. *p.* 17. *t.* 31. *f.* 1.
Trifolium vernum repens, flore albo exiguo. *Buxb. cent.* 3. *p.* 17. *t.* 31. *f.* 2.
Trifolotus cretica humillima humifusa, flore albo magno. *Tournef. cor.* 28?
Lotea trifolia. *Alp. exot.* 169. *t.* 168?
Habitat in Syria, Arabia, Judæa, *copiose* Constantinopoli, Creta.

* * * * Vesicaria *calycibus inflatis ventricosis.*

TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis. *Hort. cliff.* 373. * *Roy. lugdb.* 378. — spumosum.
Trifolium capitulo spumoso lævi. *Bauh. pin.* 329. *prodr.*
Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. *Bauh. hist.* 2. *p.* 379.

Ha-

Habitat in Gallia, Italia, Apulia.

Legumina *calyce longiora, apice subulata, calyc plentia, tetrasperma.* Calyces *apice setis 5 nati.*

resupinatum. 35. TRIFOLIUM spicis subovatis, corollis res tis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus p tis. *Hort. cliff.* 373. * *Roy. lugdb.* 378. *Gort* 429.

Trifolium pratense folliculatum. *Bauh. pin.* 32

Trifolium pratense folliculatum, flore inverso. *rar.* 824. *t.* 872.

Trifolium folliculatum f. vesicarium minus pu um. *Bauh. hist.* 2. *p.* 379.

Habitat in Anglia, Belgio.

Corollæ *resupinatæ in hoc sunt, ut vexillum at peripheriam, carina centrum.* Calyces *ovato-oblongi, apice terminati setis 2 cum inte brevissima, inferiore latere longitudinaliter* Legumina *disperma, subrotunda, minima, in fundo*

tomentosum 36. TRIFOLIUM capitulis sessilibus globosis t tosis, calycibus inflatis obtusis. *Sauv. monsp. Gron. orient.* 96.

Trifolium fragiferum tomentosum. *Magn. mons t.* 264.

Trifolium glomerulis tomentosis per caulium lo dinem. *Bauh. hist.* 2. *p.* 379.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania, ritania. *D. Sauvages. Læfling.* ♃

Caules *undique decumbentes, non repentes.* Fo *ovata, denticulata, obtusa, glabra, stipulis acum* Pedunculi *axillares, brevissimi.* Capitula Calycis *dentes 3 superiores elongati, inferi parvi.* Calyx *crassissimo tomento involutus, minime conspiciantur. Accedit propius T. foll. quam fragifero.* Involucrum *universale dode lum.* Corollæ *fere resupinatæ.*

fragiferum. 37. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycib flatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *cliff.* 373. * *Fl. svec.* 613; 670. *Roy. lugdb. Dalib. paris.* 224. *Gort gelr.* 428.

Trifolium fragiferum frisicum. *Bauh. pin.* 329. *cur. app.* 38. *t.* 39.

T

lium capitulo ſpumoſo aſpero minus. *Bauh. pin.*
). *prodr.* 140. *ſec. Hallerum.*
lium tragiferum. *Vaill. pariſ.* 195. *t.* 22. *f.* 2.
lium caule nudo, glomerulis glabris. *Bauh. hiſt.* 2.
379. *fig. majore.*
at in Suecia, Gallia, Anglia. ♃
aculi *in hoc foliis longiores, & Caules radices agunt.*
lyces *parum pubeſcentes.* Corollæ *albæ, aut ru-*
ndæ uti apud exteros. Calyces *ſubgloboſi, villoſi,*
ntati, baſi inferiore tridentata.

* * * * * Lupulina *vexillis corollæ inflexis.*

IFOLIUM ſpicis ſubimbricatis ſubtribus, vexil- montanum.
ſubulatis emarceſcentibus, calycibus nudis, caule
ecto.
lium capitulis terminalibus, corollarum vexillis
ulatis, caule erecto. foliolis lanceolatis ſerrulatis.
ſvec. 611; 667. *Dalib. pariſ.* 223.
lium montanum album. *Bauh. pin.* 328.
lium pratenſe album. *Fuchſ. hiſt.* 818.
at in Europæ *pratis ſiccis.* ♃
la fructus obovata & quaſi truncata.

IFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis de- agrarium
tis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto.
ſvec. 617; 671. *Hort. cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 378.
lib. pariſ. 226.
lium pratenſe luteum, capitulo lupuli ſ. agrarium.
uh. pin. 328. *Vaill. pariſ.* 196. *t.* 22. *f.* 3.
lium agrarium. *Dod. pempt.* 576.
at in Europæ *pratis.* ☉
ante floreſcentiam vix manifeſte villoſus ſ. uno
rove pilo ad apices inſtructus. Corollæ *flavæ nec*
iceæ.

IFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis de- ſpadiceum
tis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto.
ſvec. 2. *n.* 672. * *Gort. ingr.* 116.
lium montanum lupulinum. *Bauh. pin.* 328. *prodr.*

lium pratenſe, flore rufeſcente. *Vaill. pariſ.* 196.
ium montanum, capitulis ſpadiceis. *Rupp. jen.* 207.
ontanus aureus, amplo lupuli capitulo, annuus.
ic. 1024.
at in Europæ *pratis ſiccis.* ☉

Differt

Differt a *praecedenti Vexillis d.floratis ferruginei lycibus praecipue ante florescentiam manifeste p mis.* Calycis *dentes* 2 *superiores in hac obsol priore vero longitudine reliquarum.*

procumbens 41. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, v deflexis persistentibus, caulibus procumbe *Fl. svec.* 618; 673. *It. gotl.* 257.

Trifolium pratense luteo-croceum. *Vaill. pari*

Trifolium lupulinum alterum minus. *Raj. angl* 330. *t.* 14. *f.* 3. *Hall. opusc.* 193.

Habitat in Europae *campestribus.* ♃

Similis sequenti, sed major floribus saepe 10. *f.* 12 *non striata.*

filiforme. 42. TRIFOLIUM spicis subimbricatis, vexillis xis persistentibus, calycibus pedicellatis, ca procumbentibus. *Fl. svec.* 764. *

Trifolium lupulinum minimum. *Moris. hist.* 2. *Raj. angl.* 3. *p.* 331. *t.* 14. *f.* 4. *Hall. opusc.* 8

Habitat in Anglia. ☉

Caules *filiformes, procumbentes.* Pedunculi *fili foliis longiores, sustinentes* Flores 3 *ad* 5, *saepe* 12. *ad* 15, *deflexos:* Calycibus *fructum tibus insidentibus manifestis & distinctis pedicelli* liola *emarginata, striata.*

biflorum. 43. TRIFOLIUM spicis bifloris sessilibus, inv hispidis infundibuliformibus, foliis lanc *Gron. virg.* 109.

Trifolium caule piloso, foliolis subserratis, fl lateralibus subsolitariis, leguminibus ovatis. *virg.* 1. *p.* 84.

Anonis mariana lutea, foliis angustioribus. *Pet.*

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis *erectiusculus.* Folia *ternata, lanceolata:* li *breves: Stipulis vaginalibus, dentibus duob minatis longitudine vaginae.* Capitula *axillari fundibuliformia, sessilia, foliolis pluribus obvol viter trifidis: lacinia media longiore.* Flores *alternatim prodeuntes.*

OPPOSITIFOLIA *T. cherleri, rubens, prate pestre, squarrosum, lappaceum, incarnatum, an lium, clypeatum, alexandricum, biflorum.*

R

mosa: *cærulea*, *indica*, *polonica*, *officinalis*, *ita-*
, *cretica*, *montanum*, *agrarium*, *spadiceum*, *pro-*
ibens, *filiforme.*
ugata, *biflorum*, *subterraneum*, *globosum.*
ata: *lappaceum*, *cherleri*, *clypeatum*, *scabrum*, *glo-*
atum, *striatum*, *spinosum*, *resupinatum*, *tomento-*
, *fragiferum*, *alexandricum.*
ta: *rubens*, *pratense*, *alpestre*, *squarrosum*, *incar-*
um, *angustifolium*, *arvense*, *stellatum.*

LOTUS.

uminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.

TUS leguminibus solitariis membranaceo-qua- ngulatis, foliis glabris bracteis lanceolatis. *It. æl.* 5.* *Fl. svec.* 610; 676.* *Sauv. monsp.* 188. *Leys.* . 672. — maritimus.
s tetragonolobus maritimus, flore luteo. *Barth.* . 2. *p.* 346.
s filiquosa lutea, filiquis pinnatis strictioribus & igioribus. *Raj. hist.* 967.
at in Europæ *maritimis.* ♃
s nimium L. siliquoso, ut forte varietas.

TUS leguminibus solitariis membranaceo-quadran- lis, caulibus procumbentibus, foliis subtus pube- ntibus. — siliquosus.
s pratensis filiquosus luteus. *Bauh. pin.* 332. ma- & durior. *Tournef. inst.* 403. *Segu. ver.* 2. *p.* 90.
s tetragonolobus. *Riv. tetr.* 79.
at in Europæ *australioris pratis subhumidis.* ♃
s humifusi, pedales. Folia & calyces hirsuta.

TUS leguminibus solitariis membranaceo-quadran- latis, bracteis ovatis. *Hort. upf.* 220. — tetragonolobus.
is leguminibus subsolitariis: angulis quatuor mem- inaceis. *Hort cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388.
s ruber, filiqua angulosa. *Bauh. pin.* 332.
s pulcherrima tetragonolobus *Com. hort.* 91. *t.* 26.
tat in Siciliæ *collibus.* ☉ *anno* 1579 *Cusio.*

TUS leguminibus conjugatis membranaceo-qua- gulis, bracteis oblongo-ovatis. — conjugatus.
luteus, filiqua angulosa. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 37.
at Monspelii. ☉

Convenit cum 3 habitu, ætate, foliis, hirsutie, l nibus; differt vero Corollis duplo minoribus, L nibus duobus, Alis integris minus crispis, fo basi caulem non amplexante, sed ab opposito dehiscente.

prostratus. 5. LOTUS leguminibus subsolitariis tomentosis, fc acuminatis, stipulis minutis, caulibus filiforn
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Caules *numerosi, spithamæi, filiformes, debiles, pr ti, herbacei.* Folia *petiolata, ternata, lance utrinque mucronata, glabra, subtus pubescentia.* pulæ *minutissimæ, acuminatæ.* Pedunculi *filifc longi, uniflori, infra apicem geniculati.* Caly gnitudine foliorum. Legumen *subtomentosum, natum, horizontale, calyce duplo longius.*

edulis. 6. LOTUS leguminibus subsolitariis gibbis inc *Hort. cliff.* 370. *Roy. lugdb.* 388.
Lotus pentaphyllos, siliqua cornuta. *Bauh. pi*
Lotus edulis cretica. *Raj. hist.* 967.
Lotus oligoceratos cretica lutea, siliquis binis propendentibus. *Moris. hist.* 2. *p.* 176. *s.* 2. *t.* 1
Habitat in Italia, Sicilia, Creta.
Planta fere L. tetragonolobi. Caulis *subvillosus. glabra.* Stipulæ *ovatæ.* Pedunculi *longi: bract ovatis, longitudine floris.* Legumina *Crotalari to-oblonga, gibba, sed sutura dorsali recta.*

peregrinus. 7. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus co sis nutantibus. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdl Sauv. monsp.* 188.
Lotus, siliquis geminis, peregrina. *Bœrh. lugdb.* 2
Habitat in Europa *australi.*

angustissimus. 8. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus stri ctis, caule erecto, pedunculis alternis.
Lotus leguminibus sæpius ternatis linearibus erectis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388. *monsp.* 188.
Lotus pentaphyllos minor hirsutus, siliqua ang ma. *Bauh. pin.* 332.
Lotus corniculata, siliquis singularibus f. binis, t *Bauh. hist.* 2. *p.* 356.
Habitat in G. Narbonensi.

9. I

OTUS leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulibus diffusis. *Hort. cliff.* 372. *Hort. upf.* 220. *Roy. lugdb.* 388. *Sauv. monsp.* 188. — ornithopodioides.

tus siliquis ornithopodii. *Bauh. pin.* 332.

tus peculiaris siliquosa. *Cam. hort.* 91. *t.* 25.

bitat in Sicilia. ⊙

Nu dormit Bracteis flores occultantibus. Amæn. acad. p. 340.

iles læves, erecto-diffusi. Folia *glabra, obovata s. rhombea.* Legumina 3 *ad* 5, *linearia, refalcata, compressa, nodosa.*

OTUS leguminibus subternatis, caule herbaceo recto, foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388. *Mill. dict. t.* 168. — jacobæus.

us angustifolia, flore luteo purpurascente, insulæ jacobi. *Comm. hort.* 2. *p.* 165. *t.* 83.

itat in Insula S. Iacobi. ⊙. ♃

ola *lanceolato-linearia.* Flores *terni s. quini, colo.. non odore, tristes.*

OTUS leguminibus racemosis, foliolis obovatis illosis, caule fruticoso erecto. — mauritanicus.

tat ad Cap. b. Spei. ♄

iculus Ramis *filiformibus, rigidulis.* Folia *petiola-.. obovata, mucronata, utrinque pilis albidis adsper-..* Stipulæ *magnitudine foliorum, lanceolato-ovatæ.* edunculi *axillares, longi, racemosi.* Legumina *gla-.., foliis sesquilongiora.*

OTUS leguminibus subternatis, caule suffrutico-.., foliis sericeis nitidis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387. — creticus.

us argentea cretica. *Pluk. alm.* 226. *t.* 43. *f.* 1.

us polyceratos fruticosa cretica argentea, siliquis ngissimis propendentibus rectis. *Moris. hist.* 2. *p.* 7.

itat in Syria, Creta, Hispania. ♄

ta suffruticosa, debilis, tota sericea pilis adpressis. lores sæpius terni, lutei. Legumina *oblonga, cylin-.. ica, cernua.*

* * *Pedunculis multifloris in capitulum.*

OTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Hort. upf.* 220. *Sauv. monsp.* 188. — hirsutus.

Lotus caule fruticoso, florum capitulis depressis, c cibus lanigeris. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 38
Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. *Bauh. pin.*
Lotus polyceratos frutescens incana alba, siliquis er crassioribus & brevioribus rectis. *Moris. hist.* 177. *f.* 2. *t.* 18. *f.* 14.
Habitat in G.. Narbonensi, Italia, Oriente. ♃
Capitula floribus infra 10, *foliolo majoribus.*

ctus. 14. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto, leg nibus rectis glabris. *Hort. upf.* 221.
Lotus caule fruticoso, florum capitulis globosis. *l cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387. *Sauv. monsp.* 188.
Lotus siliquosus glaber, flore rotundo. *Bauh. pin.*
Lotus polyceratos frutescens hirsuta alba major Ita lia, siliquis tenuibus curtis rectis. *Moris. hist.* 177. *f.* 2. *t.* 18. *f.* 13.
Habitat in G. Narbonensi, Sicilia, Calabria. ♃
Capitula floribus ultra 20, *foliolis multoties minori*

orniculatus 15. LOTUS capitulis depressis, caulibus decumbent leguminibus cylindricis patentibus.
Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso minibus decumbentibus teretibus. *Hort. cliff. Fl. svec.* 609; 675. *Roy. lugdb.* 388. *Dalib. paris.*
Lotus f. Melilotus pentaphyllos minor glabra. *pin.* 332.
Trifolium corniculatum. *Dod. pempt.* 573.
β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splend *Bauh. pin.* 332.
enuifolius. γ. Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glab liis. *Bauh. pin.* 332.
Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis *Bauh. prodr.* 144. *Burs. XVIII.* 73.
Habitat in Europa. ♃
Hujus forte varietas etiam γ *est*, *cujus* Caules *longiores & angustiores*, Folia *linearia*, *&* Le na *angustiora. Videtur in umbra nata*; *Burser Bauhino hanc attulit.*

ytisoides. 16. LOTUS capitulis dimidiatis, caule diffuso ram mo, foliis tomentosis. *Roy. lugdb.* 387.
Lotus siliquosa maritima lutea, cytisi facie. *rar.* 71. *t.* 1031.
Habitat in maritimis Europæ *australis.*

17. L

LOTUS capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis. Dorycniu
Dorycnium foliis digitatis sessilibus. *Hort. cliff.* 371. * *Roy. lugdb.* 389. *Sauv. monsp.* 214.
Dorycnium monspeliensium. *Lob. ic.* 51.
Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis. *Bauh. pin.* 329.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Austria. ♃

TRIGONELLA.

TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis pendulis linearibus rectis, foliolis sublanceolatis. ruthenica.
Trigonella leguminibus pedunculatis. *Vir. cliff.* 76. *Hort. cliff.* 378. * *Roy. lugdb.* 382.
Melilotus supina angustifolia, medicæ facie, siliqua compressa. *Amm. ruth.* 159.
Lotus montana humilior trifolia ad caulem alata lutea, siliqua modo recta, modo medicaginis instar falcata nigra. *Amm. ruth.* 119.
Habitat in Sibiria.
Foliola *lanceolata, obtusissima, superne acute serrata, dentata.* Stipulæ *integerrimæ.* Legumina *linearia.*

TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus compressis, caule diffuso, foliolis subrotundis. *Hort. upf.* 229. platycarpc
Melilotus supina latifolia, siliqua lata membranacea compressa. *Amm. ruth.* 158. *act. goett.* 1. *p.* 213. *t.* 13.
Melilotus siliqua membranacea compressa. *Act. petrop.* 8. *p.* 209. *t.* 12.
Habitat in Sibiria. ♂
Foliola *subovata, longitudinaliter acute serrata.* Stipulæ *sæpius dentatæ.* Legumina *ovalia.*

TRIGONELLA leguminibus subsessilibus congestis erectis subrectis longis linearibus, pedunculis communibus muticis. polycerata.
Medicago leguminibus confertis sessilibus erectis. *Roy. lugdb.* 382. *Sauv. monsp.* 187.
Medicago leguminibus confertis longis rectis parallelis, pedunculo communi. *Hort. cliff.* 376. *
[illegible]um græcum sylvestre alterum polyceration. *Bauh.* [illegible] 348.
[illegible]um græcum sylvestre alterum. *Dod. pempt.* 547.
[Hab]itat in Hispania, Italia, Monspelii. ☉

...iculata. 4. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis con declinatis subfalcatis, pedunculis communibus gis subspinosis, caule erecto.

Trifolium floribus spicatis, leguminibus nudis mi natis falcatis declinatis. *Hort. cliff.* 376. * *lugdb.* 381. *Gort. gelr.* 435. *Gron. orient.* 96.

Melilotus, corniculis reflexis, major. *Bauh. pin.*

Melilotus lutea major, corniculis reflexis ex ea centro ortis. *Moris. hist.* 2. *p.* 162. *s.* 2. *t.* 16. *f.*

Trifolium corniculatum 2. *Dod. pempt.* 573.

Habitat in Europa *australi.* ☉

Caulis *huic erectus.* Stipulæ *simplices*, *subden* Pedunculus *tetragonus*, *folio longior*, *apice m sculo-spinoso*, *sub quo Legumina* 10--12, *fal pedunculo breviora.* Calyces *ante explicationem scuriores.*

...inosa. 5. TRIGONELLA leguminibus subpedunculatis gestis declinatis subfalcatis compressis, pedun communibus spinosis brevissimis.

Medicago leguminibus sæpius ternatis sessilibus a tis declinatis, spina ex alis. *Hort. cliff.* 377.

Fœnum græcum sylvestre polyceration creticum jus. *Breyn. cent.* 79. *t.* 33. *f.* 1.

Habitat in Creta. ☉

Stipulæ *dentatæ.* Pedunculus *fit spina rigida* *jus basin sæpe* Legumina 5, *venosa*, *glabra.*

...mosa. 6. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis rac sis declinatis hamosis teretibus, pedunculis munibus spinosis folio longioribus.

Fœnum græcum, corniculis reflexis, minus & pens. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 33.

Melilotus, corniculis reflexis, minor s. repens. *pin.* 331.

Melilotus ægyptius Achimelech vocatus. *Alp.* 41. *t.* 124. *Bauh. hist.* 2. *p.* 357.

Habitat in Ægypto. *Hasselquist.* ☉

Caules *decumbentes*, *adscendentes.* Folia *ternata ovata*, *cuneiformia*, *dentata*, *venosa*, *pubescentia* dunculus *folio longior*, *spina terminatus*, Flore *cemosi*, *quorum vexillum alis s. carina dimidio vius.* Legumina *ad* 10, *filiformia*, *hamosa*, *d dentia*, *apice adscendentia versus calycem.*

7. TR

RIGONELLA leguminibus sessilibus congestis ar-cuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculis molliter mucronatis. monspeliaca

edicago leguminibus confertis sessilibus arcuatis in-clinatis. *Hort. cliff.* 377. *Roy. lugdb.* 382. *Dalib. paris.* 231. *Sauv. monsp.* 187.
enum græcum polyceraton. *Riv. tetr.*
enum græcum sylvestre polyceratium minus mon-speliacum. *Breyn. cent.* 80. *t.* 33. *f.* 2.
edysarum minimum. *Dalech. hist.* 446.
bitat Monspelii. ⊙

gumina 10 *ad* 12, *declinata.* Pedunculus *brevis-simus, molle mucronatus, folio non longior.* Caules *prostrati, terræ adpressi.*

RIGONELLA leguminibus pedunculatis subum-bellaris ellipticis, foliolis cuneiformibus dentatis, stipulis laciniatis. laciniata.

bitat in Ægypto. Burmannus.
milis *Medicagini polymorphæ laciniatæ.* Caules *fi-liformes, læves.* Foliola *lævia, retusa, argute den-tata.* Stipulæ *laciniato-dentatæ.* Pedunculi *axilla-res, vix longitudine foliorum, spinula molli termina-ti, ferentes* Flores *aliquot fere umbellatos, luteos.* Legumina *fere Meliloti, ovalia, utrinque acuta, ca-lyce duplo longiora.*

RIGONELLA leguminibus sessilibus strictis ere-ctiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upf.* 229. *Mat. med.* 356. Fœnum græcum.

rigonella leguminibus sessilibus. *Vir. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 383. *Dalib. paris.* 228. *Sauv. monsp.* 187.
Medicago leguminibus subsolitariis sessilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. *Hort. cliff.* 376.
Fœnum græcum sativum. *Bauh. pin.* 348.
Fœnum græcum. *Fuchs. hist.* 798. *Cam. epit.* 199.
Fœnum græcum sylvestre. *Bauh. pin.* 348.
Habitat Monspelii. ⊙

ylvestre *β. differt Stolonibus ad radicem longis, præ-ter erectum caulem, terræ adpressis.* *Foliolis obova-tis, nec obtuse lanceolatis. Geniculis foliorum purpu-rascentibus. Leguminibus magis hirsutis.*

RIGONELLA leguminibus sessilibus subsolitariis subfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuso. *Fl. zeyl.* 285. * indica.

 Lo-

Lotus maderaſpatanus villoſus, ornithopodii ſiliqu gulari. *Pluk. alm.* 226. *t.* 200. *f.* 7.
Habitat in India.

MEDICAGO.

arborea. 1. MEDICAGO leguminibus lunatis margine integ mis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 376. *Hort. upſ.* *Roy. lugdb.* 382. *Mill. dict.* 175.
Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis. *Bauh. pin.* 389.
Cytiſus marante. *Lob. ic.* 2. *p.* 46.
Habitat in Rhodo, Neapoli. ♄

virginica. 2. MEDICAGO caule erecto ramoſiſſimo, floribus ſ culatis terminalibus. *Gron. virg.* 86.
Loto affinis trifoliata fruteſcens glabra. *Pluk. mant.*
Habitat in Virginia.

radiata. 3. MEDICAGO leguminibus reniformibus margine tatis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 377. * *Hort.* 230. *Roy. lugdb.* 381. *Berg. viadr.* 95. *Gron. or* 231.
Medicago annua, ſiliqua falcata ſtriata. *Moriſ. hi* *p.* 158. *ſ.* 2. *t.* 16. *f.* 3.
Trifolium ſiliqua falcata. *Bauh. pin.* 330.
Lunaria radiata italorum. *Lob. ic.* 2. *p.* 38.
Habitat in Italia. ⊙

circinnata. 4. MEDICAGO leguminibus reniformibus margine tatis, foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 377. * *Hort.* 230. *Roy. lugdb.* 382.
Loto affinis ſiliquis hirſutis circinnatis. *Bauh. pin.*
Habitat in Hiſpania, Italia. ⊙

ſativa. 5 MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus tortis, caule erecto glabro. *Hort. cliff.* 377. *lugdb.* 281.
Medica legitima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 242.
Medica ſativa. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 150 *ſ.* 2. *t.* 16.
Fœnum burgundicum. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.
Habitat in Hiſpaniæ, Galliæ *apricis.* ♃

falcata. 6. MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibu natis, caule proſtrato. *Fl. ſvec.* 620; 677. *Dalil riſ.* 229.
Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta. *pin.* 330.

Med

a flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 243.
t in Europæ *pratis apricis*, *ſiccis.* ♃

ICAGO ſpicis ovalibus, leguminibus renifor- **lupulina.**
is monoſpermis, caule procumbente. *Fl. ſvec.*
; 678. *Dalib. pariſ.* 281.
ium leguminibus ſpicatis reniformibus nudis mo-
ermis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 375. *Roy.*
b. 380. *Gron. virg.* 110.
ium pratenſe luteum, capitulo breviore. *Bauh.*
328.
ium pratenſe luteum. *Fuchſ. hiſt.* 819.
t in Europæ *pratis.* ♂
ina ſtriato rugoſa, pilis rigidis ſubhiſpida.

DICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus **marina.**
hleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo.
t. cliff. 378. * *Roy. lugdb.* 381. *Sauv. monſp.*
. *Gron. orient.* 230.
ium cochleatum maritimum tomentoſum. *Bauh.*
329.
a marina. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 243.
t in maris Mediterranei *litoribus.* ♃

ICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis denta- **polymorpha**
caule diffuſo. *Hort. cliff.* 378. *Hort. upſ.* 230.
. lugdb. 381. *Dalib. pariſ.* 230.
lium cochleatum, fructu nigro hiſpido. *Bauh.*
329.
cago leguminibus ſolitariis cochleatis compreſſis *orbicularis.*
nis, ſtipulis ciliatis, caule diffuſo. *Sauv. monſp.*
5.
ca major dicarpos, capſula compreſſa orbiculata
ra plana oris criſpis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 152. *ſ.* 2. *t.*
f. 1.
ca orbiculata. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 384. *Raj. hiſt.* 961.
lium cochleatum ſ. ſcutellatum, folio latiore,
ctu minuto obtuſo. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 140.
us ſolitarius, lentiformis, anfractibus inermibus pla-
Pedunculi ariſtati. Stipulæ ciliatæ.
ca cochleata major dicarpos, capſula rotunda *ſcutellata.*
boſa ſcutellata. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 152. *ſ.* 2. *t.* 15.
f.
ca ſcutellata. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 384.
lium cochleatum, fructu latiore. *Bauh. pin.* 329.

Fructus solitarius, hemisphæricus: anfractibus in[...] concavis. Pedunculi aristati. Stipulæ dentatæ.

tornata. γ. Medica tornata major & minor lenis. *Park.* [...] 1116. *Morif. hist.* 2. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

Fructus plures, subcylindrici: anfractibus inermibus [...]nis. Stipulæ dentatæ.

turbinata. δ. Medicago fructu turbinato. *Sauv. monsp.* 187.

Medica dicarpos, fructus capsula turbinata [...] *Morif. hist.* 2. *p.* 153.

Medica magna turbinata. *Bauh. hist.* 2. *p.* 385.

Trifolium cochleatum turbinatum, fructu comp[...] oblongo. *Bauh. pin.* 329.

intertexta. ε. Medica cochleata spinosa major dicarpos, caps[...] spinis longioribus sursum & deorsum tenden[...] *Morif. hist.* 1. *p.* 153. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 8. 9. 7.

Medica echinata spinosa, echinis magnis utrinqu[...] binatis cum spinulis reflexis. *Raj. hist.* 962.

Fructus 2. *f.* 4, *ovati: anfractibus spinis setaceis re[...] Stipulæ dentatæ.*

muricata. ζ. Medica cochleata dicarpos, capsula spinosa ro[...] minore. *Morif. hist.* 2. *p.* 153. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 1[...]

arabica. η. Medica cochleata minor polycarpos annua, ca[...] majore alba, folio cordato macula fusca. *M[...] hist.* 2. *p.* 144. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 17.

Medica arabica. *Cam. hort.* 97. *t.* 27.

Trifolium cochleatum, folio maculato cordato. *B[...] pin.* 329.

Fructus bini, subtus plani, supra angustiores: anf[...]bus planis: spinis bifloris exstantibus apice curv[...] Stipulæ ciliatæ.

coronata. θ. Medicago fructu minimo, coronulam utrinque de[...]tam referente. *Sauv. monsp.* 187.

Medicago cochleata polycarpos annua, capsula mi[...]ma coronata. *Morif. hist.* 2. *p.* 155. *f.* 25. *t.* 15. *f.* [...]

Medica coronata cherleri parva. *Bauh. hist.* 2. *p.* 3[...]

Trifolium folio obtuso, folliculis cordatis. *Bauh. p[...]* 329. *prodr.* 141. *n.* 13.

rigidula. ι. MEDICAGO triphylla, leguminibus spinosis, foli[...]lis interioribus cuneiformibus retusis, superiorib[...] subrotundis. *Dalib. parif.* 231.

Medicago hirsuta, echinis rigidioribus. *Bauh. hist.* [...] *p.* 385.

Trifolium fructu compresso spinis horrido. *Bauh. p[...]* 329.

κ. Me[...]

licago leguminibus congestis globosis hispidis, *ciliaris.*
pulis ciliatis. *Sauv. monsp.* 186.
ica annua, fructu ciliari. *Tournef. inst.* 410.
olium fructu cochleato ciliari. *Magn. monsp.* 269.
lus plures ovales: anfractibus spinis rectiusculis vil-fis. Stipulæ ciliatæ.

licago leguminibus solitariis globosis brevissime *hirsuta.*
chinatis, stipulis serratis. *Sauv. monsp.* 186.
ica echinata hirsuta. *Bauh. hist.* 2. *p.* 386.
olium echinatum arvense. *Bauh. pin.* 329.

licago leguminibus cochleatis aculeis uncinatis *minima.*
ternis externe donatis, stipulis integris. *Guett.*
mp. 249. *Dalib. paris.* 230.
ica echinata minima. *Bauh. hist.* 2. *p.* 386.
olium echinatum, fructu minore. *Bauh. pin.* 330.
lus plures, vix semine Orobi majores: anfractibus pidis: spinis lateraliter recurvatis. Stipulæ integræ.

licago leguminibus cochleatis spinosis, stipulis *laciniata.*
ntortis, foliis oblongis duplicato-serratis. *Gron.*
ient. 95.
licago fructu echinato, foliis linearibus dentatis.
uv. monsp. 187. *Gouan. monsp.* 400. *
olium fructu echinato, foliis eleganter dissectis.
agn. monsp. 271. *t.* 270.
olium cochleatum spinosum syriacum, foliis la-
niatis. *Breyn. cent.* 81. *t.* 34.
linearia, laciniata. Stipulæ ciliatæ.
tat in Europa *australi.* ☉
etates hujus numerosæ vix limites admittunt. In Coch-r hic provocavit polymorpha Natura Floram in cer-men cum Fauna.

Class-

Classis XVIII.

POLYADELPH

PENTANDRIA.

THEOBROMA.

Cacao. 1. THEOBROMA foliis integerrimis. *Hort.* *cl* *Mat. med.* 364.
Cacao. *Clus. exot.* 55. *Sloan. jam.* 134. *hist.* 2. 160. *Mer. surin.* 26. *t.* 26. & 63. *Geoffr.* *Catesb. car.* 3. *p.* 6. *t.* 6.
Arbor cacavifera americana. *Pluk. alm.* 40. *f.* 3.
Amygdalis similis guatimalensis. *Bauh. pin.* 4
Habitat in America *meridionali*, Antillis. ♄

Guazuma. 2. THEOBROMA foliis serratis. *Hort. cliff.* 37 *lugdb.* 47.
Guazuma arbor ulmifolia, fructu ex purpur *Plum. gen.* 36. *ic.* 144.
Cenchramedia jamaicensis ulmifolia, fructu o tegro verrucoso. *Pluk. alm.* 92. *t.* 77. *f.* 2.
Alni fructu morifolia arbor, flore pentapetal *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. *p.* 18. *Raj. dendr.* 11.
Habitat in Jamaicæ *campestribus.* ♄

ICOSANDRIA.

CITRUS.

1. CITRUS petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upf.* 236. *Mat. med.* 366. *Roy. lugdb.* 266.
Malus Medica. *Bauh. pin.* 435.
β. Limon vulgaris. *Ferr. hesp.* 193.
Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.
Habitat in Asia, Media, Assyria, Persia. ♄
Varietates hujus hodie numerosissimæ una cum mixtæ, de quibus Hesperides consulendæ.

Aurantium. 2. CITRUS petiolis alatis. *Hort. cliff.* 379. *H* 236. *Fl. zeyl.* 304. *Mat. med.* 367. *Roy. lug*
Malus Aurantia major. *Bauh. pin.* 436.
Aurantia mala. *Cam. epit.* 150.

β.

s aurantia, cortice eduli. *Bauh. pin.* 436. *sinensis.*
s aurantia fructu rotundo maximo pallescente ca- *decumana.*
humanum excedente. *Sloan. jam.* 212. *hist.* 1. *p.*
t. 12. *f.* 2. 3.
elmus. *Meist. itin.* 84.
t in India. ♄

US foliis ternatis. † trifoliata.
Karatas. *Kæmpf. amæn.* 801. *t.* 802.
t in Japonia. ♄
ternata, serrata, petiolo membranaceo. Spinæ
lares. Flores *axillares, solitarii.* Fructus *te-*
pulpa glutinosa.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

* *Pentagyna.*

ERICUM floribus pentagynis, caule fruticoso, balearicum.
is ramisque cicatrisatis. *Mill. dict. t.* 54.
icum floribus pentagynis, folio & ramis verru-
s. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 473.
icum s. Ascyrum frutescens, magno flore.
gn. char. 260.
o-Cistus pennæi. *Clus. hist.* 1. *p.* 68.
t in Majorca. ♄
s *tetragoni, punctis racemoso-glandulosis adspersi.*
ia *flexuosa, margine glandulis verrucosis.* Flores
arii, terminales.

ERICUM floribus pentagynis, caule fruticoso, kalmianum.
is lineari-lanceolatis.
icum floribus pentagynis, calycibus obtusis, sta-
ibus corollam æquantibus, caule erecto herba-
Mill. dict. n. 10.
t in Virginia. *Kalm.* ♄
r. Rami *tetragoni.* Folia *Rosmarini aut Lavan-*
s, glabra. Flores *in Corymbo dichotomo, termi-*
, ex tribus aut septem floribus. Capsula *ovata,*
itudine calycis. Calyx *lanceolatus, obtusiusculus.*
a 5, *tenuissimi.*

ERICUM floribus pentagynis, foliis lanceola- Lasianthus.
erratis. *Hort. cliff.* 380.

Hype-

Hypericum foliis lanceolatis rigidis denticulatis ... ribus alaribus, pedunculis longissimis, ca... lignosis. *Mill. dict.*

Alcea floridana quinquecapsularis, laurinis foli... viter crenatis, seminibus coniferarum instar... *Pluk. amalth. 7. t. 352. f. 3. Catesb. car. 1. p. 44. Amm. act. 7. t. 352. f. 3.*

Habitat in Carolina, Surinamo. *J. Bartsch.* ♄

Calyx tomentosus, margine villosus. Stamina vix ... longiora.

Ascyron. 4. HYPERICUM floribus pentagynis, caule tetr... herbaceo erecto simplici, foliis lævibus inte... mis. *Hort. upsf. 236.*

Hypericum floribus pentagynis, foliis ovato-ob... glabris integerrimis. *Hort. cliff. 380. Roy. lugd...*

Androsæmum flore & theca quinquecapsulari ... um maximis. *Morif. hist. 2. p. 472.*

Ascyrum magno flore. *Bauh. pin. 280. prodr... Burs. XVI. 25.*

Habitat in Sibiria, Canada, Pyrenæis. ♃

* * *Trigyna.*

Androsæmum. 5. HYPERICUM floribus trigynis, pericarpiis bacc... caule fruticoso ancipiti. *Hort. upsf. 237.*

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, ... ovatis pedunculo longioribus. *Hort. cliff. 380. ... lugdb. 374. Dalib. parif. 235.*

Androsæmum maximum frutescens. *Bauh. pin. ...*

Androsæmum. *Dod. pempt. 78.*

Habitat in Angliæ, G. Narbonensis, Italiæ *hu... bus.* ♄

Olympicum 6. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ac... staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. ... *cliff. 380. Roy. lugdb. 374. Mill. dict. t. 151*

Hypericum montis olympi. *Wheel. itin. 222. Dil... 182. t. 151. f. 183.*

Hypericum orientale, flore magno. *Tournef. co...*

Habitat in Pyrenæis, Olympo. ♄

petiolatum. 7. HYPERICUM floribus trigynis, foliis ovatis ... latis integerrimis subtus tomentosis, caule fr... so tetragono compresso.

Habitat in Brasilia. ♄

Sti...

ra & *Stamina H. Lasianthi.* Caulis *tetragonus*, *tusus.* Stipulæ *nullæ.* Folia *Citri*, *petiolata*, *a-ta*, *subtus obsolete tomentosa.* Corymbus *brachia-*. Staminum *phalanges oblongæ*, *maxime specta-les.*

PERICUM floribus trigynis, calycibus obtusis, canariense. minibus corolla longioribus, caule fruticoso. *ort. cliff.* 381. *Roy. lugdb.* 374.
ericum frutescens canariense multiflorum. *Comm. rt.* 2. *p.* 135. *t.* 68.
ericum f. Androsæmum magnum canariense ra-sum, copiosis floribus, fruticosum. *Pluk. alm.* *p. t.* 302. *f.* 1.
at in Canariis. ♄

ERICUM floribus trigynis, staminibus corolla hircinum. ngioribus, caule fruticoso ancipiti. *Hort. cliff.* 1. *Hort. upsf.* 237. *Roy. lugdb.* 374.
ericum fœtidum frutescens minus. *Dill. elth.* 182.
rosæmum fœtidum, capitulis longissimis filamen-donatis. *Bauh. pin.* 280.
num. *Clus. hist.* 2. *p.* 205.
at in Sicilia, Calabria, Creta *ad rivos.* ♄

PERICUM floribus trigynis, nectariis petalo- ægypticum. lanceolatis, caulibus suffruticosis compressis.
at in Ægypto *B. Jussiæus.* ♄
ex spithamæus, *ramosissimus*, *brachiatus*: *ramulis pressis.* Folia (*Polygoni*) *ovata*, *minima*, *acumi-ta*, *avenia*, *sessilia*, *articulis ramorum longiora.* Flo-*sæpius bini in ramulis.* Squamula *nectarifera ob-ga*, *intra ungues cujusvis petali.* Facies *plantæ -enariæ.*

PERICUM floribus trigynis, stipulis reflexis, orientale. lis oblongis denticulato-crenatis.
ericum orientale, ptarmicæ foliis. *Tournef. cor. itin.* 2. *p.* 97. *t.* 97.
at in Oriente.

PERICUM floribus trigynis, caule tereti re- repens. -, foliis lanceolato-linearibus obtusis. *Amæn.* 4. *p.* 287. *
ricum orientale, polygoni folio. *Tournef. cor.* 19.
tat in Oriente. ♃. ♄

13. HY-

scabrum. 13. HYPERICUM floribus trigynis, caule tereti fucoso muricato, foliis oblongis. *Amæn. aca* 287. *
Hypericum orientale, caule aspero purpureo. *T cor.* 19.
Habitat in Arabia, Mauritania. ♄

ericoides. 14. HYPERICUM floribus trigynis, foliis line imbricatis.
Hypericum ericoides minimum, foliis cinereis. *alm.* 189. *t.* 93. *f.* 5.
Hypericum tomentosum lusitanicum minimum. *T inst.* 256.
Habitat in Lusitania, Hispania.

virginicum. 15. HYPERICUM floribus trigynis, petalis caly longioribus, foliis oblongis amplexicaulibus caule tereti.
Habitat in Pensylvania. ♃
Caulis *erectus*, *herbaceus*, *teres*, *rufescens*, *lævi* mis *axillaribus serioribus.* Folia *semiamplexi ovali-oblonga*, *glabra*, *patentia.* Flores *ter pauciores.* Calyx *acutus*, *integerrimus.* Petal *tiusculа*, *calyce sesquilongiora.* Stamina *long calycis.*

canadense. 16. HYPERICUM floribus trigynis, foliis linea ceolatis, caule quadrangulo, pericarpiis col
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caules *herbacei*, *teretes*, *ramosi*, *glabri.* Folia *ria s. sublanceolata*, *integerrima*, *glabra.* Pa *dichotoma*, *Floribus pedicellatis.* Flores *parvi dum*, *magnitudine Spergulæ.* Pericarpium *cal plo longius*, *conicum*, *rubrum.*

quadrangulum. 17. HYPERICUM floribus trigynis caule qu herbaceo. *Hort. cliff.* 380. *Fl. svec.*, 624; 679. *lugdb.* 473. *Dalib. paris.* 234.
Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo *hist.* 3. *p.* 382.
Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo non perforatis. *Bauh. pin.* 279.
Ascyron. *Dod. pempt.* 78.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃

18. HY

PERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, **perforatum**
is obtusis pellucido-punctatis. *Hort. cliff.* 380.
svec. 625; 680. *Mat. med.* 368. *Roy. lugdb.* 474.
I. helv. 630. *Dalib. parif.* 233.
ricum vulgare. *Bauh. pin.* 279.
ricum. *Dod. pempt.* 76.
t in Europae *pratis.* ♃

PERICUM floribus trigynis axillaribus solitariis, **humifusum**
libus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis gla-
. *Fl. svec.* 2. *n.* 681.
ricum foliis ovatis, caulibus supinis. *Guett. stamp.*
. 174. *Dalib. parif.* 234.
icum humifusum foliis perforatis punctis in mar-
nigris. *Hall. helv.* 360.
ricum minus supinum s. supinum glabrum. *Bauh.*
279.
icum supinum III. minimum. *Clus. hist.* 2. *p.*

t in Europa *australiore.* ♃
nimium antecedenti, sed flores axillares, solitarii.
a absque punctis pellucidis.

ERICUM floribus trigynis, calycibus serratu- **montanum.**
glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis
is. *Fl. svec.* 2. *n.* 683.
icum elegantissimum non ramosum, folio lato.
. *hist.* 3. *p.* 383.
icum caule simplici elegans latifolium. *Hill. plant.*
t. 14.
emum campoclarense *Col. ecphr.* 1. *p.* 73. *t.* 74.
n s. Hypericum bifolium glabrum non perfora-
Bauh. pin. 280. *It. w-goth.* 213. *
m. *Fuchs. hist.* 74.
t in Europae *montibus.* ♃
e etiam in summo caule glanduloso-ciliatae, & par-
quod non in H. hirsuto.

ERICUM floribus trigynis, calycibus serrato- **hirsutum.**
ulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpu-
ntibus.
cum foliis lanceolatis, calycinis laciniis lineari-
. *Guett. stamp.* 176.
cum floribus trigynis, calycum serraturis capita-
ule tereti. *Hort. cliff.* 380. *Fl. svec.* 626; 682.
lugdb. 474. *Dalib. parif.* 234.

 β. Hype-

β. Hypericum foliis ovato-oblongis brevi pediculo do[illegible] calycinis laciniis oblongo-acutis. *Guett. stamp.* [illegible]
Androsæmum Ascyron dictum, caule rotundo hir[illegible] *Moris. hist.* 2. *p.* 171. *s.* 5. *t.* 6. *f.* 11.
Androsæmum hirsutum. *Bauh pin.* 280. *caute.*
Habitat in Europæ *collibus & montibus.* ♃
Flores noctu clauduntur, quod non in Hyp. perf[illegible]

tomentosum 22. HYPERICUM floribus trigynis: calycibus se[illegible] glandulosis, foliis semiamplexicaulibus flexuos[illegible] mentosis, caulibus prostratis. *Gouan. monsp.* 4[illegible]
Hypericum supinum tomentosum minus & mons[illegible] cum. *Bauh. pin.* 279. *Sauv. monsp.* 149.
Hypericum supinum tomentosum alterum. *Clu*[illegible] 2. *p.* 181.
β. Hypericum supinum tomentosum majus & hispan[illegible] *Baub. pin.* 279.
Hypericum supinum tomentosum hispanicum. *Clus.* 2. *p.* 181.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania. ♃
Racemi terminales bifidi; Folia sessilia. Caulis tere[illegible]

[illegible]lodes. 23. HYPERICUM floribus trigynis, caule tereti [illegible] te foliisque villosis subrotundis.
Ascyrum supinum villosum palustre. *Bauh. pin.*
Ascyrum supinum e'odes. *Clus. hist. app. alt.*
Caryophyllus palustris, foliis subrotundis incanis ribus aureis. *Mentz. pug. t.* 7. *f.* 3. *an?*
Habitat in Angliæ, Galliæ *paludosis.* ♃
Affine nimium H. tomentoso.

pulchrum. 24. HYPERICUM floribus trigynis: calycibus ser[illegible] glandulosis, caule tereti, foliis perfoliatis cordatis bris.
Hypericum foliis cordatis connatis, laciniis caly[illegible] ovatis obtusis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 175.
Hypericum calyce serrato, foliis connatis. *Hall.* 116.
Hypericum minus erectum. *Bauh. pin.* 279.
Hypericum minus glabrum erectum pulchrum. *M*[illegible] *hist.* 2. *p.* 470.
Hypericum pulchrum tragi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 383.
Habitat in Europa *australiori.* ♃

nummularium. 25. HYPERICUM floribus trigynis: calycibus ser[illegible] glandulosis, foliis cordato-orbiculatis glabris.

Hyp[illegible]

Hypericum nummulariæ folio. *Bauh. pin.* 279. *prodr.* 130.
Hypericum fere orbiculato folio, floribus amplis pallide luteis, petalis in ambitu crenatis. *Pluk. alm.* 188. *t.* 93. *f.* 4.
Androsæmum supinum saxatile, nummulariæ folio aversa parte rubente. *Bocc. muf.* 2. *p.* 134. *t.* 91.
Habitat in Pyrenæis. ♃

HYPERICUM floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis subverticillatis. *Gron. orient.* 240. — Coris.
Hypericum f. Coris legitima ericæ similis. *Moris. hist.* 2. *p.* 468. *f.* 5. *t.* 6. *f.* 4.
Hypericoides Coris quorundam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 384.
Coris lutea. *Bauh. pin.* 280.
Habitat in Europæ *australis collibus siccis, & in* Oriente.
Stipulæ *utrinque solitariæ f. ad singulum folium duæ, magnitudine & figura foliorum, hinc, quum folia sint opposita, quasi sena articulos cingunt, quorum quatuor sunt stipulæ.*

* * * *Digyna.*

HYPERICUM floribus digynis, foliis ovatis sessilibus. *Gron. virg.* 112. — mutilum.
Habitat in Virginia, Canada.

HYPERICUM floribus digynis, foliis linearibus. *Gron. virg.* 88. — setosum.
Hypericum virginianum parvum fruticosum, ramulis equiseti. *Pluk. alm.* 189.
Habitat in Virginia.

* * * * *Monogyna.*

HYPERICUM floribus monogynis staminibus corolla longioribus, calycibus coloratis, caule fruticoso. *Mill. dict. t.* 151. *f.* 2. † — monogynum.
Habitat in China. ♄

ASCYRUM.

ASCYRUM foliis ovatis, caule tereti, panicula dichotoma. — Crux andreæ.
Ascyrum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 494. *Gron. virg.* 113.
Hypericoides ex terra mariana, floribus exiguis luteis. *Pluk. mant.* 104. *Ray. suppl.* 496.
Habitat in Virginia.

ypericoi-des. 2. ASCYRUM foliis oblongis, ramis ancipitibus.
Ascyrum fruticosum minus supradecompositum, ra lis gracilibus marginatis, foliis linearibus sessil basi biglandulis. *Brown. jam.* 309.
Hypericoides frutescens erecta, flore luteo. *Plum.* 51. *t.* 152. *f.* 1.
Hypericum pumilum sempervirens, caule comp ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrape *Pluk. mant.* 104. *Raj. suppl.* 495.
Habitat in Virginia, Jamaica. ♄
Glandula utrinque infra basin foliorum.

llosum. 3. ASCYRUM foliis hirsutis, caule stricto.
Hypericum virginianum frutescens pilosissimum. *P alm.* 189. *t.* 245. *f.* 6.
Habitat in Virginia. ♄

Clas

Classis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *SEMIFLOSCULOSI.*

GEROPOGON.

GEROPOGON foliis glabris. **glabrum.**
Tragopogon, gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato. *Raj. suppl.* 149.
Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, feminibus lævibus: disci plumosis; radiis setaceis. *Hort. upf.* 243. *
Habitat in Italia. ⊙

GEROPOGON foliis pilosis. **hirsutum.**
Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Bauh. pin.* 275.
Tragopogon gramineo folio, suave rubente flore. *Col. ecphr.* 1. *p.* 232. *t.* 231.
Habitat in Italia. ⊙

TRAGOPOGON.

* *Caulescentia.*

TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. **pratense.**
Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.* 382. *Fl. svec.* 648; 684. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.* 119. *Dalib. parif.* 242.
Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.
Tragopogon. *Fuchs. hist.* 827.
Habitat in Europæ *pratis apricis.* ♂

TRAGOPOGON calycibus corollæ radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *Hort. upf.* 243. **orientale.**
Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.
Herba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura.*
Habitat in Oriente. ♂
Differt a *T. pratensi Flore majore, Calyce ubi reflecti-*

 tur

tur quasi fracto; Radio Corollæ subtus luteo, ne striato; Antheris luteis, nec fuscis.

porrifolium. 3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio sesq gioribus, foliis integris strictis, pedunculis supe crassatis. *Hort. upf.* 243.

Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, qu tesi vulgo. *Bauh. pin.* 274. *Moris. hist.* 3. *p.* 8. 9. *f.* 5.

Tragopogon alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist.*

Barba hirci altera. *Cam. epit.* 313.

β. Tragopogon folio oblongo sinuato. *Bauh. pin.*

Habitat - - - - ♂

villosum. 4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio sesq gioribus, caule foliisque villosis.

Habitat in Hispania. ♂

Magnitudo T. porrifolii, sed tota planta villis al bescens, imprimis caulis, & folia subtus magis Pedunculi *cylindrici.* Calyx *enneaphyllus, fere sesquilongior, non imbricatus.* Corolla *m liquis pallide flava radiis* 18. Antheræ *fusc Planta ex omnibus foliorum alis secundum tota tudinem ramos demum emittit floridos, unde cor evadit.* Flos *expansus subnutans est.*

crocifolium. 5. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio lo bus, foliis integris, radicalibus pedunculisque villosis. *Gouan. monsp.* 405.

Tragopogon purpureo-cæruleum crocifolium, *pin.* 275.

Tragopogon croci folio montanum, flore nigro-p reo. *Col. ecphr.* 1. *p.* 229. *t.* 230.

Habitat in Italia, Monspelii. ♂

Calyces corolla longiores, pentaphylli.

dalechampii. 6. TRAGOPOGON calycibus monophyllis co brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Hor* 224. *Hort. cliff.* 382. * *Sauv. monsp.* 295. *G monsp.* 404.

Hieracium asperum, flore magno dentis leonis. *pin* 127.

Hieracium magnum. *Dalech. hist.* 569.

Hieracium sulphureum, incisis foliis, montanum. *rar.* 1043. *t.* 209.

Hed

Hedypnois monspessulana. *Bauh. hist. 2. p.* 1036.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♃
Caulis brevissimus. Folia *tomentoso-scabra, integerrima nec denticulata.* Corolla *subtus purpurea: flosculis luteis apice f. dentibus purpurascentibus.*

TRAGOPOGON calycibus monophyllis corolla brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis. *Hort. cliff.* 382. *Gouan. monsp.* 405. — picroides.
Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inermibus hastato-sinuatis. *Hort. upf.* 241. *Sauv. monsp.* 295.
Sonchus asper laciniatus creticus. *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 60.
Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo. *Bauh. pin.* 127.
Chondrillæ creticæ nomine missa, semine crispo. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1022.
Habitat in Creta, Monspelii. ☉

TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris: caulinis oblongis. *Sauv. monsp.* 82. *Gouan. monsp.* 405. * — asperum.
Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 60.
Habitat Monspelii.

* * *Acaulia scapis radicalibus.*

TRAGOPOGON foliis ensiformibus integris lævibus, scapis radicalibus. — Dandelion.
Leontodon foliis ensiformibus integris, calyce erecto simplici. *Gron. virg.* 114. *
Habitat in Virginia.
Folia *ensiformia, longa, glabra, integerrima. Scapi uniflori, omnino aphylli apice pubescentes.*

TRAGOPOGON foliis ensiformibus undatis villosis, scapis radicalibus. — lanatum.
Leontodon foliis ensiformibus integris hirsutis, calyce erecto simplici. *Amæn. acad.* 4. *p.* 287. *
Habitat in Oriente, Palæstina.
Scapi habent in medio foliolum, sed vix manifestum, & florem unicum gerunt. Figura Rauw. it. 217. *potius hanc plantam refert, quam Erigeron tuberosum.*

TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis. *Gron. virg.* 113. — virginicum.

Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexic dentatis, caule ramoso. *Gron. virg.* 1. *p.* 91.
Habitat in Virginia, Canada. *Kalm.*
Folia *radicalia plurima, lyrata: lobis rotundatis bris. Caules subnudi, erecti, stricti: Folio uno ve lanceolato, integro amplexicauli; Ramis Rami terminantur* Pedunculis *tribus, ad quoru ortum folia* 2, *lanceolata, opposita: altero minore* lyx *in* 12 *folia ad basin divisus, æqualia, coroll viora.* Flores *saturate lutei. Habitus Arnicæ riæ.* Pappus *plumosus non est, nec stipitatus, se plex.* Statura *Hyoseridis*; Calyx *Tragopogonis,* na *Hieracii.*

SCORZONERA.

humilis. 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis lanceolatis nervosis planis. *Hort. cliff.* 382. *Fl.* 647; 685. *Mat. med.* 371.
Scorzonera humilis latifolia nervosa. *Bauh. pin.*
Scorzonera humilis latifolia pannonica. *Clus. hist.* 138.
Habitat in Europæ *septentrionalioris pratis apricis.*

hispanica. 2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplex libus integris serrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort.* 242. *Gmel. sib.* 2. *p.* 6. *Gron. orient.* 244.
Scorzonera latifolia sinuata. *Bauh. pin.* 275.
Scorzonera major hispanica. 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 137
Habitat in Hispania, Sibiria. ♃

tomentosa. 3. SCORZONERA foliis ovatis nervosis tomen integerrimis sessilibus.
Scorzonera orientalis latifolia nervosa candidissim tomentosa. *Tournef. cor.* 36.
Habitat in Oriente. *Burmannus.*
Caulis *rectus, simplex, tomentosus.* Folia *alte sessilia, vix semiamplexicaulia, acutiuscula.* R *floriferi, axillares, solitarii, uniflori s. biflori, folio longiores*: Bracteæ *una alterave lanceolata.*

graminifolia. 4. SCORZONERA foliis lineari-ensiformibus inte carinatis.
Scorzonera lusitanica, gramineo folio, flore pal luteo. T. *Buxb. cent.* 2. *p.* 26. *t.* 21.

Scor

rzonera caule ramoso, foliis linearibus acuminatis carinatis, calycibus acutis. *Gmel. sibir.* 2. *p.* 4.
bitat in Lusitania, Sibiria.

CORZONERA foliis lineari-subulatis integris pla-is, pedunculis cylindricis. **purpurea.**
rzonera caule ramoso tereti, foliis linearibus acuminatis, calycibus obtusiusculis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 7. *t.* 2.
orzonera angustifolia subcærulea. *Bauh. pin.* 275.
rzonera sylvestris, foliis angustis, flore cæruleo. *Mentz. pug. t.* 1. *f.* 1.
bitat in Marchia Brandeburgica, Austria, Sibiria.
lia *alterna, plana, remota.* Pedunculi *filiformes.*

CORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule simplicissimo basi villoso. *Jacq. vind.* 140. *Gouan. monsp.* 406. **angustifolia.**
orzonera angustifolia prima. *Bauh. pin.* 275.
orzonera humilis angustifolia pannonica III. *Clus. hist.* 2. *p.* 137. *t.* 138.
agopogon pinifolium hispanicum. *Barr. ic.* 496.
bitat in Hispaniæ, Monspelii, Austriæ *collibus arosis.*
ulis *vix spithamæus, basi ramosus, villosus.* Folia *conferta, linearia, subulata, longitudine fere caulis.* Pedunculi *terminales, versus florem crassiores ipso caule.* Flos *magnus.* Corolla *lutea subtus purpurascens, longitudine calycis.*

CORZONERA foliis sinuatis denticulatis acutis, caulibus subunifloris. **orientalis.**
bitat in Oriente. *Hasselquist.*
lia *profunde dentata, fere Leontodontis, margine denticulata, glabra.* Caules *breves, foliosi, subuniflori.* Calyx *squamis imbricatis: inferioribus, imprimis lateribus, margine late membranaceis:* Corolla *lutea, magnitudine S. humilis.*

CORZONERA foliis obtuse dentatis, caule prostrato, calycum apicibus tomentosis. **resedifolia.**
orzonera, laciniatis foliis, supina. *Barr. rar.* 1050. *t.* 800.
itat in Hispania.
lis *divaricatus.* Folia *Resedæ f. Coronopi dentibus obtusis.*

laciniata. 9. SCORZONERA foliis linearibus dentatis ac caule erecto: squamis calycinis patulo-mucro *Roy. lugdb.* 120. *Hort. upf.* 242. *Dalib. paris.* *Gouan. monsp.* 406.

Scorzonera foliis laciniatis. *Tournef. inst.* 477. *monsp.* 692.

Tragopogon laciniatum luteum. *Bauh. pin.* 274. *hist.* 251.

Habitat in Germania, Gallia. ♂

Caulis erectus. Calycis squamæ infra apicem mucro

tingitana. 10. SCORZONERA foliis omnibus runcinatis amp caulibus.

Scorzonera foliis omnibus extrorsum dentatis amp caulibus, squamis calycinis margine membran *Hort. upf.* 242.

Sonchus floribus solitariis, foliorum laciniis extro flexis. *Hort. cliff.* 385.

Sonchus tingitanus papaveris folio. *T. Raj. suppl*

Chondrilla tingitana, floribus luteis papaveris hor folio. *Herm. lugdb.* 657. *t.* 659.

Habitat in Tingide. ⊙

Picroides. 11. SCORZONERA foliis superioribus amplexicau integerrimis, inferioribus runcinatis, pedunculis matis. *Gouan. monsp.* 406.

Crepis foliis radicalibus ovato-oblongis denticu caulinis lanceolatis amplexicaulibus, pedun unifloris squamosis. *Roy. lugdb.* 127.

Sonchus subrotundo folio nostras. *Pluk. phyt.* 61.

Sonchus lævis angustifolius. *Bauh. pin.* 124 ?

Crepis dalechampii. *Dalech. hist.* 562. *

Habitat Monspelii. ⊙

Semina *incurva crenulata: Pappo simplici sessili; media inter Scorzoneram & Sonchum.*

PICRIS.

Echioides. 1. PICRIS perianthiis exterioribus pentaphyllis interi aristato majoribus.

Picris calycibus simplicibus perianthio maximo ob latis. *Hort. cliff.* 387. *Hort. upf.* 241. *Roy. lugdb.* *Dalib. parif.* 240. *Gouan. monsp.* 406.

Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. *Ba pin.* 128.

Buglos

[G]lossum echioides luteum hieracio cognatum. *Lob.* [ic.] 577.
[Hi]eracium capitulis cardui benedicti. *Herm. par.* 185. [t.] 185.
[Ha]bitat *in* Angliæ, Galliæ, Italiæ *sylvis cæduis, agge-* [ri]*bus.* ☉
[Fo]lia *indivisa, amplexicaulia.* Calyx *Exterior florum* [p]*entaphyllus, interiore major: foliolis subcordatis, spi-* [n]*osis. Interior octangulatus: foliolis totidem carinatis,* [i]*nfra apicem aristatis; his exterius incumbunt foliola* [t]*otidem minuta, lævia.*

[P]ICRIS perianthiis laxis, foliis integris. *Hort. cliff.* [3]87. *Fl. svec.* 641; 686. *Roy lugdb.* 128. *Dalib. pa-* *rif.* 240. *Gmel. sibir.* 2. *p.* 39. *Gouan. monsp.* 406. — Hieracioides.
[Ci]chorium pratense luteum hirsutie asperum. *Bauh.* *pin.* 126.
[Hi]eracium asperum, majore flore, in agrorum limi-[t]ibus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1029.
[Ha]bitat *in* Germaniæ, Angliæ, Belgii, Galliæ *versu-* [r]*is agrorum.* ♃
[Fo]lia *indivisa, sagittato-amplexicaulia; axillæ purpureæ.* Calyx *florum Exterior circiter foliolis* 12, *laxis,* [l]*inearibus, interiore dimidio brevioribus. Interior fo-* *liolis totidem, etiam hispidis.*

[P]ICRIS perianthiis laxis, caule piloso, foliis denta-to-sinuatis. — pyrenaica.
[Hi]eracium pyrenaicum, blattariæ folio, minus pilosum. *Herm. parad.* 184. *t.* 184.
[Ha]bitat *in* Pyrenæis. ♃

[P]ICRIS foliis pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. † — asplenioides.
[H]elmointhotheca hispidosa asplenioides, succo sulphu-reo. *Vaill. act.* 1721. *p.* 206.
Habitat in Ægypto.

SONCHUS.

[S]ONCHUS pedunculis hispidis, floribus racemosis, foliis runcinatis. *Gron. virg.* 115. — canadensis.
[Ch]ondrilla foliis pinnato-hastatis denticulatis. *Gron.* *virg.* 1. *p.* 89.
[Ha]b[i]tat *in* Canada. *Kalm.*
[Fo]lia S. *floridani, dentata, subtus glauca.* Peduncu-li

li *longi*, *terminales*, *pilis adspersi glutiniferis*
mi *breves*. Flores *magnitudine sequentis*, *c*

paluſtris. 2. SONCHUS pedunculis calycibusque hiſpidi
bellatis, foliis runcinatis baſi ſagittatis.
Sonchus pedunculis calycibusque hiſpidis, flo
ſtanti-corymboſis *Hort. upſ.* 244.
Sonchus caule erecto, foliis pinnato-haſtatis
haſtatis floribus congeſtis villoſis, *Hort.*
Roy. lugdb. 129. *Dalib. pariſ.* 244.
Sonchus aſper arboreſcens. *Bauh. pin.* 124.
Sonchus lævior auſtriacus 5. altiſſimus *Cluſ.*
147.
Habitat in Belgii, Angliæ, Galliæ, Hungari
paludoſis. ♃
Facies *a S. arvenſi diverſiſſima*; Structura
eadem, *ac ſi S. paluſtris ex S. arvenſi o*
fuiſſet.

arvenſis. 3. SONCHUS pedunculis calycibusque hiſpi
umbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis.
Sonchus pedunculis calycibusque hiſpidis,
congeſtis. *Fl. ſvec.* 642; 687. *Dalib. pariſ.*
Sonchus foliis lanceolato-oblongis dentatis,
congeſtis hiſpidis. *Hort. cliff.* 384.
Hieracium majus, folio ſonchi, ſ. Hieracium ſ
Bauh. pin. 126.
Hieracium majus. *Fuchſ. hiſt.* 319.
Habitat in Europæ *agris argilloſis.* ♃

maritimus. 4. SONCHUS pedunculo nudo, foliis lanceol
plexicaulibus indiviſis retrorſum argute
Sonchus anguſtifolius maritimus. *Bauh. pin.* 12
61. *Pluk. alm.* 354. *t.* 62. *f.* 5. *All. nicæen*
Chondrilla paluſtris longifolia ſinuata lævite
Raj. ſuppl. 137.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

oleraceus. 5. SONCHUS pedunculis tomentoſis, calyci
bris. *Fl. ſvec.* 643; 688. *Dalib. pariſ.* 243.
Sonchus annuus ramoſus diffuſus, foliis lacin
lapp. 289. *Hort. cliff.* 384.
Sonchus caule ramoſiſſimo diffuſo; foliis ſun
plexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *R*
129.

a

s lævis laciniatus latifolius. *Bauh. pin.* 124. *lævis.*
s lævis. *Cam. epit.* 279.
s lævis minor, paucioribus laciniis. *Bauh. pin.*

s lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
s asper laciniatus & non laciniatus. *Bauh. pin.* *asper.*

s asper laciniatus latifolius & angustifolius. *Lœs.*
257. *t.* 77. 78.
s asper non laciniatus. *Tournef. inst.* 474.
s aspera. *Fuchs. hist.* 674.
in Europæ *cultis.* ⊙
compresso-amplexicaulia. Pedunculi *ætate gla-*
unt.
HUS pedunculis tomentosis, calycibus pilosis. tenerrimus.
. monsp. 407.
s lævis in plurimas & tenuissimas lacinias di-
, *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 61.
um foliis in tenues lacinias profunde sectis,
luteo. *Pluk. phyt.* 93. *f.*
lla lutea. *Bauh. hist.* 2. *p.* 120.
Monspelii, Florentiæ. ⊙
ramosissimus: pilis sparsis, glutiniferis. Pedi-
albo tomento vestiti. Calyces *cylindrici: pilis*
ibus adspersi. Folia *glabra, tenera, pinnatifida,*
ia.
HUS pedunculis squamosis, floribus racemo- alpinus.
oliis runcinatis. *Fl. svec.* 644; 689. *Gouan.*
. 408.
s caule erecto, foliis pinnato-hastatis: apice
ato-triangulis, floribus racemosis. *Hort. cliff.*

s lapponum altissimus, floribus cæruleis. *Fl.*
290.
s lævis laciniatus cæruleus f. Sonchus alpinus
leus. *Bauh. pin.* 124.
s cæruleus. *Cam. epit.* 284.
ad latera Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Au-
⊙
HUS pedunculis nudis, floribus paniculatis, plumieri.
runcinatis.
alpina glabra, acanthi folio, flore magno cæ-
. *Vaill. act.* 1721. *p.* 200. *Monnier. obs.* 157.
Habi-

Habitat in Pyrenæis : *Monte Aureo prope* (
majorem. Monnier. ♃

Simillimus S. alpino, *sed Corolla unico flosc*
dine s. flosculis dimidio paucioribus, at quad
ioribus. Caulis *altitudinis humanæ.* Folia
Taraxaci runcinata, supra lævia, subtus ven
Caulina angustiora, acutiora. Panicula *t*
pedunculis nudis. Corolla *Cichorii.* Caly
guttulas resinosas, minimas, sparsas.

floridanus. 9. SONCHUS pedunculis subsquamosis, foli
hastatis.

Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentati
libus latissimis obtusis, floribus racemosis. *R*
129.

Sonchus annuus canadensis altissimus lacini
cærulescente. *Vaill. act.* 1721. *p.* 198.

Lactuca altissima, folio sonchi laciniato, flo
cæruleo. *Bærh. lugdb* 1. *p.* 81.

Habitat in Virginia, Canada.

sibiricus. 10. SONCHUS pedunculis squamatis, foliis la
indivisis sessilibus. *Hort. ups.* 244. *Fl. svec.*
Gort. ingr. 119.

Sonchus foliis lanceolatis sessilibus plerumque
latis, floribus corymbosis, caulibus glabri
sibir. 2. *p.* 11. *t.* 3.

Lactuca salicis folio, flore cæruleo. *Amm.*
212.

Habitat in Sibiria, Suecia *septentrionali*, Finl
Pappus simplex, sessilis.

LACTUCA.

quercina. 1. LACTUCA foliis runcinatis denticulatis ac
tus lævibus, caule glabro. *It. gotl.* 289.
646; 691. *

Lactuca foliis quernis. *Raj. hist.* 221.

Habitat in Insula Carolina *Baltici.* ♃

sativa. 2. LACTUCA foliis rotundatis, caule corymb

Lactuca sativa. *Bauh. pin.* 122. *Hort. cliff.* 38
upf. 242. *Mat. med.* 370.

capitata. *β.* Lactuca capitata. *Bauh. pin.* 123. *Morif. hist.*
s. 7. *t.* 2. *f.* 2.

crispa. *γ.* Lactuca crispa. *Bauh. pin.* 123. *Dod. pempt.*

- - - - - ⊙
mangonio forte producta ex proximis.

'UCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis nibus. canadensis.
a canadensis altissima angustifolia, flore pallide
. *Tournef. inst.* 474.
s sylvestris, folio laciniato glauco: costa non
sa. *Raj. suppl.* 137.
in Canada. *Kalm.*
a L. Caule *sativa altiore;* Foliis *quadruplo lon-*
bus angustioribusque; Racemo *terminali longo,*
osito, nec corymboso.

'UCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Amœn.* 4. *p.* 328. * Scariola.
a sylvestris costa spinosa. *Bauh. pin.* 123.
ca sylvestris laciniata. *Moris. hist.* 3. *p.* 58. *s.* 7. *f.* 17.
a sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis ma-
adspersa. *Herm. parad.* 191. *t.* 191.
:a sylvestris annua, costa spinosa, folio integro
re cæsio. *Moris. hist.* 3. *p.* 58.
in Europa *australi.* ⊙.
adicalia sinuata. Raj.

'UCA foliis horizontalibus carina aculeatis den- virosa.
. *Gouan. monsp.* 408.
:a caule foliisque aculeatis. *Hort. cliff.* 384. *
. *lugdb.* 121. *Dalib. paris.* 236. *Sauv. monsp.* 295.
:a sylvestris, odore viroso. *Bauh. pin.* 123. *Moris.*
3. *p.* 58. *s.* 7. *t.* 2. *f.* 16.
in Europæ *australioris aggeribus, sepibus.*
prima s. radicalia integra. Raj. angl. 3. *p.* 161

'UCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina saligna.
leatis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 150. *Gouan. monsp.* 408.
:a foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis.
. *lugdb.* 121.
:a foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus
hastatis, dorso serratis. *Sauv. monsp.* 692.
ca foliis radicalibus linearibus dentato-pinnatis:
nis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis,
libus linearibus sessilibus. *Guett. stamp.* 374.
ib. paris. 236.

Lactuca

Lactuca ſylveſtris altiſſima, foliis inferioribus de superioribus acuminatis integris. *Raj. ſuppl.* 1
Lactuca ſylveſtris altera, anguſto ſaligno folio: albicante. *Rupp. jen.* 167. *Hall. jen.* 207. *t.* 4.
Lactuca ſylveſtris, anguſto laciniato folio. *Magn.* 298. *
Chondrilla viſcoſa humilis. *Bauh. pin.* 130. *pro Vaill.*
Endivia minor lactucina ſpinoſa. *Barr. ic.* 136.
Habitat in Gallia, Lipſiæ.
Folia plano-verticalia, fere ut in L. ſcariola.

erennis. 7. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis: la ſurſum dentatis. *Hort. cliff.* 384. *Roy. lugdb. Dalib. pariſ.* 236. *Mill. dict. t.* 157. *Gouan.* 409.
Chondrilla cærulea altera, cichorii ſylveſtris folio. *pin.* 130.
Chondrilla cærulea latifolia laciniata. *Bauh. pin.*
Chondrilla. *Dod. pempt.* 637.
Apate. *Dalech. hiſt.* 561.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. ♃

CHONDRILLA.

ncea. 1. CHONDRILLA. † *Hort. cliff.* 383. *Roy. lugdb. Hall. helv.* 755. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 8. *Gron.* 241. *Gouan. monſp.* 409.
Chondrilla foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis ceolato-linearibus. *Wach. ultr.* 223. *Bæhm. lip*
Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis. *Bauh. pin.* 13
Chondrilla juncea. *Tabern. hiſt.* 487.
Chondrilla viminea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1021. *
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia *ad agr margines inque locis glareoſis.*

PRENANTHES.

nuifolia. 1. PRENANTHES foliis linearibus integerrimis.
Prenanthes anguſtifolius, flore purpureo. *Vaill.* 1721. *p.* 193.
Chondrilla anguſtiſſimo longiſſimo integroque fo *Juſſ. act.* 1709.
Habitat in Alpibus Europæ *auſtralis.*

minea. 2. PRENANTHES foliorum ramentis cauli adna *Gouan. monſp.* 409.

Pre-

enanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramenti foliaceis cau i ramisqu adnitis. *Vir. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 120. *Sauv monsp.* 692.
ondrilla viminea viscosa monspeliaca. *Bauh. pin.* 131. *Prodr.* 68.
ondrilla viscosa, caule foliis obducto. *Bauh. pin.* 130.
bitat in Gallia, Lusitania.

RENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *Hort. cliff.* 383 *Gouan. monsp.* 409. purpurea.
ctuca montana purpuro-cærulea minor. *Bauh. pin.* 123.
nchus lævior pannonicus 4, purpureo flore. *Clus. hist.* 2. *p* 147.
ctuca montana, purpuro cærulea, major. *Bauh. pin.* 123.
nchus montanus purpureus tetrapy los. *Col. ecphr.* 1. *p.* 245.
bitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ *nemoribus montanis.*
lia inferiora amplexicaulia. Pappus sessilis.

RENANTHES flosculis quinis, foliis runcinatis. *Hort. cliff.* 383. *Fl. svec.* 645; 692. *Roy. lugdb.* 120. *Hall. helv.* 755. *Dalib. paris.* 235. muralis.
nchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Bauh. pin.* 124.
nchus lævis vulgatior. 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 136.
bitat in Europæ *nemoribus umbrosis.*
ppus simplex, stipitatus.

RENANTHES flosculis quinis, foliis trilobis, caule erecto. altissima.
enanthes canadensis altissima, foliis variis, flore luteo. *Vaill. act.* 1721. *p.* 194.
onchus elatus s. dendroides virginianus, ari in modum articulatis foliis, ramosissimus, floribus luteis parvis pentapetalis. *Pluk. alm.* 355. *t.* 317. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada.

RENANTHES flosculis plurimis, floribus nutantibus subumbellatis, foliis hastato-angulatis. *Hort. cliff.* 383. *Gron. virg.* 113. alba
nanthes nov. anglicanus, chenopodii foliis, radice bulbo-

bulbosa, sanguineo caule, floribus racemosis ca
d.ssimis. *Pluk. amalth.* 195.

β. Prenanthes autumnalis, flore dilute purpureo deci
nutante spicatim ad caulem dispofito, foliis sci
incisis, caule singulari. *Gron. virg.* 1. *p.* 89.

Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania.

repens. 7. PRENANTHES repens, foliis trilobis. *Amœn.*
2. *p.* 360. *f.* 23. *

Habitat in Sibiria.

LEONTODON.

Taraxacum 1. LEONTODON calyce inferne reflexo, foliis r
natis denticulatis lævibus. *Fl. lapp.* 280. *Fl.*
627; 693. *Mat. med.* 368. *Hort. cliff.* 386. *Gron.*
176. *Roy. lugdb.* 122. *Dalib. parif.* 240. *Gmel.*
2. *p.* 14.

Dens leonis, latiore folio. *Bauh. pin.* 126.

Hedypnois. *Fuchs. hist.* 680.

β. Dens leonis angustiore folio. *Bauh. pin.* 126.
ver. 2. *p.* 188.

γ. Dens leonis latiore & rotundiore folio. *Tournef.*
410.

Habitat in Europæ *pascuis.* ♃

aureum. 2. LEONTODON foliis runcinatis, scapo subunifl
calyce hispido. *Jacq. vind.* 268. *

Taraxacum foliorum dentibus triangularibus fine
rotundo. *Hall. helv.* 740. *t.* 24. *opusc.* 276.

Dens leonis foliis extremo subrotundis, floribus a
Raj. eur. 399. *Segu. ver.* 3. *p.* 265.

Hieracium alterum minus IV. *Col. ecphr.* 2. *p.* 31.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Baldi, Italiæ. *Seguier.*

Folia *Taraxaci, sed minora, obtusiora.* Scapus
striatus, in medio foliolo lineari notatus. Caly
scus, erectus, basi hirtus foliorum carinis ciliatis.
rolla *fulva, subtus rubra.*

bulbosum. 3. LEONTODON foliis oblongo-ovatis subde
glabris, calyce lævi, scapo superne hirto. (
monsp. 410.

Taraxacum calyce toto erecto subhirsuto, radic
bosa. *Sauv. monsp.* 297.

Chondrilla bulbosa. *Bauh. pin.* 130.

Chondrilla altera dioscoridis. *Col. phyt.* 11. *t.* 4.

Cl

Chondrilla-pusilla marina lutea bulbosa. *Lob. ic.* 230.
Habitat Monspelii, *inque* Italia.

LEONTODON caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Fl. svec.* 629; 695. *Mesc. frisl* 329. — autumnal.
Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato nudo. *Hort. cliff.* 386.
Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice succisa, majus & minus. *Bauh. pin* 127.
Hieracium minus. *Fuchs. hist* 320.
Habitat in Europæ *pratis, pascuis, autumno.* ♃
Pappus substipitatus plumosus.

LEONTODON scapo calyceque lævi, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. — hastile.
Dens leonis glaber, angustiore & longiore folio, flore minore. *Moris. hist.* 3. *p.* 75.
Taraxaconoides chondrillæ glabro virenti folio. *Vaill. act.* 170.
Habitat in Europa *australi.* ☉
Folia *longa, pedalia dentibus alternis, latis, brevibus; glabra, vix costa hirta.* Scapus *indivisus, lævis, nudus absque squamis.* Calyx *glaber, sulcatus, basi tantum squamis aliquot minutis auctus, ante anthesin nutans.*

LEONTODON foliis runcinatis scabris, calyce hirto. *Gouan. monsp* 411. — tuberosum
Taraxaconoides chondrillæ folio hirsuto, asphodeli radice. *Vaill. act.* 1721. p. 170.
Dens Leonis asphodeli bulbulis. *Bauh. pin.* 126.
Chondrilla altera dioscoridis monspeliensium. *Lob. ic.* 232.
Habitat in Hetruriæ, Galloprovinciæ, Narbonæ *pratis.* ♃
Folia *runcinata; obtusiuscula: laciniis lateralibus integris, nec denticulatis, sed curvatis versus basin.* Scapus *uniflorus, parum,* Calyx *vero magis hirtus.*

LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis: pilis simplicissimis. — hirtum
Crepis foliis lanceolatis dentato sinuatis hispidis, setis subulatis, scapo unifloro. *Sp. pl.* 1. *p.* 799.
Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum magis laciniatum. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium, dentis leonis folio, hirſutie aſperum ... nus laciniatum. *Bauh. pin.* 127. *prodr.* 63.
Hieracium parvum hirtum, caule aphyllo, criſp... ubi ſiccatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1038.
Habitat in Helvetia, G. Narbonenſi, Hiſpania. ♃
Simillimum L. hiſpido, *ſed diverſum: Pedunculi &* ... *lyces minus hiſpidi & fere glabri.* Folia *pilis* ... *indiviſis & diſco, dum ſicca, valde flexuoſo.* Ra... *corollæ ſubtus etiam luteus, nec vireſcens.* Calyx ... *floreſcentiam nutans, maturo fructu canaliculatus.* P... pus *plumoſus eſt.*

hiſpidum. 8. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dent... integerrimis hiſpidis: pilis furcatis. *Hort. cliff.* ... *Fl. ſvec.* 628; 694. *Gort. ingr.* 120. *Jacq.* ... 269. *

Picris calyce erecto, foliis hiſpidis dentatis: dent... integerrimis. *Sauv. monſp.* 388.

β. Hieracium foliis integris ſubdenticulatis lanceol... ſcabris, ſcapo unifloro. *Sp. pl.* 1. *p.* 799.
Hieracium montanum anguſtifolium nonnihil incan... *Bauh. pin.* 129.
Hieracium VI montanum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 141. *B...* *hiſt.* 3. *p.* 1038.

γ. Hieracium foliis dentatis viſcidis hirſutis ſubaſpe... ſcapo nudo unifloro, calyce hirto. *Sauv. monſp.* ... *Gouan. monſp.* 412.
Hieracium montanum, dentis leonis folio, f. laci... tum, lanuginoſo folio. *Bauh. pin.* 128.
Hieracium folio Hedypnoidis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 142.
Habitat in Europæ borealioris *pratis.* ♃
Has β. γ. *cum prima conjungit omnium, in loco na...* *autoptes Cl. Jacquin: Leont. hirtum vero omnino d...* *ctum eſt.*

HIERACIUM.

* *Scapo nudo unifloro.*

alpinum. 1. HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, ſ... ſubnudo unifloro, calyce piloſo. *Gouan. monſp.*
Hieracium caule unifloro, calyce villoſo. *Fl. lapp.* ... *Fl. ſvec.* 632; 696.
Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoſo. ... *pin.* 129.
Hieracium villoſum alpinum, flore magno ſing... *Raj. angl.* 3. *p.* 169. *t.* 6. *f.* 2.* Pi...

Pilosella monoclonos non repens alpina minor lanuginosa, amplo flore. *Moris. hist.* 3. *p.* 78. *s.* 7. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Britannicis, Austriacis. ♃

HIERACIUM foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo unifloro, calyce hirsuto. **Taraxaci.**
Habitat in Alpibus Pithoënsi-Lapponicis, *lectum* 1753. *a D. C. Solandro.*
Hybrida *an planta vel nova, ne pereat, proponitur.* Folia *omnino Leontod. autumnalis*; Scapus & Flos *absolute Hier. alpini, ut si scapus & Flos hujus adponatur illius foliis, habeat quivis specimen plantæ.* Folia *lanceolata, glabra, dentata: dentibus aliis brevioribus, aliis oblongis, sæpius antrorsum flexis.* Scapus *foliorum rudimentis minutis aliquot, pilosus, versus florem crassior & apice uti calyx tumidus, fusco-pilosus.* Differt *a Leontod. aureo omnino,* Calyx *enim est valde imbricatus, quod vix in L. aureo, aut autumnali.*

HIERACIUM foliis cuneiformibus hirtis, scapo nudo crassissimo erecto. *Gron. virg.* 114. **venosum.**
Hieracium species 2. *Cold. noveb.* 175.
Hieracium marianum perelegans, lapathi venis sanguineis inscriptis foliis, flore parvo flavescente. *Pluk. mant.* 102.
Hieracium fruticosum latifolium, foliis punctis & venis sangvineis notatis. *Banist. virg.* 1926.
Habitat in Virginia.

HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro. *Hort. cliff.* 388. *Fl. svec.* 633; 697. *Mat. med.* 369. *Roy. lugdb.* 122. *Hall. helv.* 742. *Dalib. paris.* 238. **Pilosella.**
Pilosella major repens hirsuta. *Bauh. pin.* 262.
Pilosella major. *Cam. epit.* 709. *Fuchs. hist.* 605.
Habitat in Europæ *pascuis aridis.* ♃

* *Scapo nudo multifloro.*

HIERACIUM foliis integris ovato oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Fl. svec.* 634; 698. *Dalib. paris.* 237. *Sauv. monsp.* 14. *Gouan. monsp.* 412. **dubium.**
[Pil]osella major repens minus hirsuta. *Bauh. pin.* 262.
[Hab]itat *in* Suecia. ♃

Auricula. 6. HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, nudo multifloro, stolonibus reptantibus. *Fl.* 282. *Fl. svec.* 635; 699. *
Hieracium foliis integerrimis, caule repente, nudo multifloro. *Hort. cliff.* 388. *
Pilosella major erecta altera. *Bauh. pin.* 262.
Pilosella repens minor, caule pedali, polyan foliis angustis oblongis. *Raj. suppl.* 147.
Habitat in Europæ *pratis aridis, juxta agros.* ♃

cymosum. 7. HIERACIUM foliis lanceolatis integris pi scapo subnudo basi piloso, floribus subumbell
Hieracium pilosellоides majus longifolium, flo luteis fere umbellatis. *Vaill. act.* 706.
Hieracium murorum angustifolium non sinuatum. *pin.* 129. *prodr.* 67. *t.* 67.
Pilosella montana hispida, parvo flore. *Bauh. pi*
Pilosella, minori flore, hirsutior & elatior non rep *Bauh. hist.* 2. *p.* 1040.
Habitat in Russia, Dania, Germania, Helvetia.
Radix *præmorsa.* Folia *lanceolata, longiuscula, ta, integerrima, erecta, utrinque pilis rigidis da.* Scapus *pedalis, adspersus pilis rarioribus, confertioribus, supra basin instructus foliolo* Flores *fere umbellati, pedicellis tamen ramosis, bus notis ab H. præmorso differt; ab H. A vero differt foliis non supra glabris.*

[illegible]orsum 8. HIERACIUM foliis ovatis subdentatis, scapo racemoso, floribus superioribus primoribus. *Fl.* 6 6; 700. *
Hieracium foliis ovatis tomentosis, caule nudo bus spicatis luteolis terminato. *Hall. helv.* *Gmel. sib.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 2.
Hieracium pratense latifolium non sinuatum m *Bauh. pin.* 129.
Hieracium latifolium, præmorsa radice, caule fi lari, pilosellæ majori affine. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1
Pilosella major erecta *Bauh. pin.* 262. *Raj. hist.* 2
Intybus aphyllocaulis major. *Thal. harc.* 66.
Habitat in Helvetia, Harcynia, Uplandia. ♃

aurantiacum. 9. HIERACIUM foliis integris, caule subnudo plicissimo piloso corymbifero. *Hort. cliff.* 388. *H upf.* 238.

Hieracium hortense, floribus atro-purpurascentibus. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65.
Hieracium alpinum non laciniatum, flore fusco. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65.
Hieracium germanicum. 1. *Col. ecphr.* 2. *p.* 28. *t.* 30.
Pilosella polyclonos repens major syriaca, flore amplo aurantiaco. *Moris. hist* 3. *p.* 78. *s.* 7. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in Syriæ, Helvetiæ, Austriæ *sylvis.* ♃

HIERACIUM caule paniculato subnudo, foliis radicalibus obovatis integerrimis pilosis. *Gron. virg.* 114. — Gronovii.
Hieracium foliis radicalibus obverse ovatis pubescentibus: caulinis ovatis amplexicaulibus, floribus paniculatis, caule erecto. *Gron. virg.* 1. *p.* 90.
Hieracium marianum, pulmonariæ gallicæ subrotundo folio *Pluk. mant.* 102. *t.* 420. *f.* 2?
Habitat in Virginia, Pensylvania. ♃
Radix præmorsa. Folia *radicalia obovata, obtusa, integerrima, tenuitate membranacea, supra pilis raris adspersa, subtus subviolacea.* Caulis *pedalis, filiformis uno alterove folio lanceolato, paniculatus, panicula inæquali.*

HIERACIUM caule nudo multifloro, pedunculis inferioribus altioribus, foliis oblongis dentatis scabris. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 45. * — capense.
Habitat ad Cap. b Spei.

HIERACIUM scapo nudo multifloro, foliis lyratis obtusis dentatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 328. * — sanctum.
Habitat in Palæstina. ♃

HIERACIUM caule nudo, paniculato foliis radicalibus ovatis serratis glabris. — Gmelini.
Hieracium foliis ex sinuato dentatis, caulibus supra ramosis subnudis, pedunculis hirsutis unifloris. *Gmel. sib.* 2. *p.* 23. *t.* 8. *f.* 2.
Habitat in Sibiria ♃

* *Caule folioso.*

HIERACIUM caule erecto, foliis alternis lanceolatis nudis dentatis, panicula capillari. — paniculatum.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis pedalis, erectus, teres, inferne albo-lanatus, su-

perne glaber. Folia *lanceolata, latiuscula, b*
tenuata, acuminata, remote dentata. tenera, g
inferiora subtus, præsertim ad carinam, pilosa.
cula terminalis, varie ramosa: Pedunculis *tenui*
fere capillaribus, divaricatis. Bracteæ *ad ra*
tiones brevissimæ, setaceæ. Flores *parvi.*

ondrilloides. 15. HIERACIUM foliis caulinis elongato-dentat
bris: radicalibus lanceolatis integris, caule
so. *Jacq. vind.* 273. *t.* 7. *
Hieracium alpinum pumilum, chondrillæ folio.
pin. 129. *prodr.* 64. *curs. VI.* 87.
Habitat in Schneeberg Austriæ *inferioris.*
Caulis *spithamæus, lævis.* Folia *radicalia lance*
petiolata, integra, glabra; Caulina 5 *ad* 6,
na, glabra, longa: dentibus longis, recurvati
cie Leontod. autumnalis. Pedunculi *ex alis su*
ribus foliorum, altitudine caulis, solitarii, sul
uniflori: Bractea una aut altera, setacea, apic
villosa. Calyces *nigro hispidi, erecti, imbric*
liolis linearibus. Corolla *flava.*

rrifolium. 16. HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis
ceolato-linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.*
Jacq. vind. 275. *t.* 6. *
Hieracium phalangii foliis. *Vaill. act.* 1721. *p.* 1
Hieracium montanum, asphodeli foliis acumi
Bocc. mus. 147. *t.* 106. *Raj. suppl.* 142.
Habitat in Alpibus Austriæ, Italiæ, Valesiæ. ♃
Folia *radicalia subulata, fere Statices.* Caulis *p*
Ramis longis, raris, parum subdivisis Folia *i*
le minora & tantum ad exortum ramorum.
Variat *Foliis Radicalibus lanceolato-linearibus, si*
tatis; Caule simpliciori, sæpe nudo.

murorum. 17. HIERACIUM caule ramoso, foliis radicalibus
tis dentatis; caulino minori. *Hort. cliff.* 38
svec. 637; 701. * *Roy. lugdb.* 123. *Dalib.*
237. *Gmel. sibir.* 2. *p.* 25.
Hieracium caule ramoso, foliis ovatis dentatis. *Fl*
284.

losissimum. α. Hieracium murorum, folio pilosissimo. *Bauh. pin*
Corchorus. *Dalech. hist.* 565.

sylvaticum. β. Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.
pin. 129. *It. w.goth.* 257.

lmonaria gallica femina. *Tabern. hist.* 504.
racium macrocaulon hirsutum, folio longiore. *Raj. angl.* 3. *p.* 169.
bitat in Europæ *apricis duris.*

IERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Fl. lapp.* 15. *Fl. svec.* 638; 702. *Gort. ingr.* 123. — paludosum.
racium cichorei folio. *It. w.goth.* 32.
racium montanum latifolium glabrum minus. *Bauh. pin.* 129. *Moris. hist.* 3. *p.* 69. *s.* 7. *t.* 5. *f.* 47.
bitat in Europæ *borealioris nemoribus paludosis.*
lyces *pilis nigris exstantibus hirti sunt.* Varietas *rte sola antecedentis, quamvis ex loco evasit facie diversissima.*

IERACIUM caule multifloro, foliis lyratis glabris, calycibus pedunculisque hispidis. — lyratum.
racium caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus neris oblongis plerumque petiolatis: petiolis inferiorum dentatis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 24. *t.* 9.
bitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
maxime H. paludoso. Caulis *lævis.* Calyces *pubescentes,* &, *quod in præcedenti non obtinet,* *Pedunculi etiam pubescentes.* Folia *magis lyrata, petiolata,* *angulis obtusioribus.*

IERACIUM foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis semiamplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 124. *Hort. upf.* 238. — cerinthoides.
racium pyrenaicum, foliis cerinthes, latifolium. *Tournef. inst.* 472.
bitat in Pyrenæis. ♃
β. Hieracium caule ramoso folioso, foliis & calyce longo villo barbatis. *Hall. helv.* 744.

IERACIUM foliis amplexicaulibus cordatis subdentatis, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramoso. *Hort. cliff.* 387. * *Roy. lugdb.* 123. — amplexicaule.
racium pyrenaicum longifolium amplexicaule. *Tournef. inst.* 472.
racium pyrenaicum rotundifolium amplexicaule *Tournef. inst.* 472.
bitat in Pyrenæis.

IERACIUM foliis lanceolatis amplexicaulibus der- — Blattarioides.

dentatis, floribus solitariis, calycibus laxis. *cliff.* 387.* *Roy. lugdb.* 123. *Amœn. acad.* 1. *p.*
Hieracium pyrenaicum, blattariæ folio, minu sutum. *Tournef. inst.* 472.
Habitat in Pyrenæis.

villosum. 23. HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis radicalibus lanceolato-ovatis dentatis: caulin plexicaulibus cordatis. *Jacq. vind.* 271.*
Hieracium alpinum latifolium villosum, magno *Bauh. pin.* 128.
Hieracium alpinum, latiore folio, pilosum, flo jore. *Pluk. alm.* 184. *t.* 194. *f.* 2.
Hieracium alpinum V. villosum. *Clus. hist.* 2. *p.* *Hall. opusc.* 146.
Habitat in Alpibus Bohemicis, Helveticis, Monspe
Caulis *striatus*, *subpilosus*: *Ramis altitudine caulis* lia Radicalia *lanceolata*, *latiuscula*, *subpilosa*, *bus inermibus*; Caulina *cordata*, *amplexicaulia* *sursum conniventia.* Pedunculi *uniflori*, *bractea* *cina remotiore.* Calyx *patulus*, *minus imb* *foliolis longitudine subæqualibus*, *adspersus pilis* *gris: apice* (*ut tota planta*) *glandula flava.* *nigra: Pappo sessili*, *multiplici*, *piloso.*

glutinosum. 24. HIERACIUM foliis lanceolatis runcinatis sc sculis, floribus umbellatis.
Hieracium dentis leonis folio, floribus parvis. *pin.* 127. *prodr.* 63.
Habitat in G. Narbonensi. ⊙
Habitus *Crepis tectorum.* Folia *mollia*, *glutinosa* *ma lanceolata*, *integerrima.* Caulis *striatus.*

kalmii. 25. HIERACIUM caule erecto multifloro, foli ceolatis dentatis, pedunculis tomentosis.
Habitat in Pensylvania. *Kalm.*
Caulis *erectus*, *H. sabaudo angustior*, *lævis.* Fo *ceolata*, *alterna*, *subsessilia*, *acuminata*, *parva*, *argutius extrorsum dentata*, *quam ulla alia hujus* *ris.* Pedunculi *ad apicem caulis alterni*, *sæpi* *plices & uniflori*, *tomentoso-albidi: Bracteis* *ribus*, *linearibus.* Flores *parvi*, *terminales*, *er*

sprengeria-num. 26. HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis amplexicaulibus oblongis repandis hispidis. *lugdb.* 123.

Hiei

racium pulchrum ramoſum ſprengerianum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1026. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 65. *ſ.* 7. *t.* 5. *f.* 17.
itat in Luſitania.

IERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 14. *Hort. upſ.* 238. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 703. — ſabaudum.
racium fruticoſum latifolium hirſutum. *Bauh. pin.* 129.
racii ſabaudi varietas. 1. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1030.
itat in Germania. ♃

IERACIUM foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, ribus ſubumbellatis. *Fl. lapp.* 287. *Fl. ſvec.* 639; 94. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123. *Dalib. pariſ.* 37. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 25. — umbellatum
racium fruticoſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 129.
racium ſabaudum. *Dalech. hiſt.* 570.
itat in Europæ *paſcuis ſiccis.* ♃

CREPIS.

EPIS foliis ovatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente. † — pygmæa.
racium alpinum incanum ſaxatile, brunellæ foliis integris. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 33. *t.* 24. *Raj. ſuppl.* 142.
itat in Alpibus Italiæ *ad Nurſiam prope lacum pi*...

EPIS foliis pinnatifidis crenatis, ſcapo nudo pauciſloro. — burſifolia.
racium ſiculum, burſæ paſtoris folio. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 147. *t.* 106. & 112. *Raj. ſuppl.* 142.
racium minus panormitanum, cichorei folio. *Cup. cath.* 95. *ſuppl.* 3
itat in Sicilia. ♃

EPIS involucris calyce longioribus: ſquamis ſetaceis ſparſis. *Hort. upſ.* 239. *Gouan. monſp.* 414. — barbata.
racium calycibus ſetis longiſſimis diſtantibus patentibus obvallatis. *Hort. cliff.* 387. *Sauv. monſp.* 83.
racium proliferum falcatum. *Bauh. pin.* 128.
racium calyce barbato. *Col. ecphr.* 2. *p.* 28. *t.* 27.
itat in Monſpelii, Veſuvii, Siciliæ, Meſſanæ *are*-*is maritimis.* ☉

Folia

Folia *lanceolata*, *glabra*, *subdentata*. *Ramuli ba*
fliores, *quasi unus ex altero prognatus*. *Flore*
ad basin purpurascentes, *at in disco flosculi atr*
rascentes fere toti. *Semina teretia*, *coronata*
ciliari minutissimo & *setis* 2 *simplicibus longis*.

aspera. 4. CREPIS foliis dentatis: inferioribus ovatis
latis: superioribus sagittatis, caule setis rigidis
Hieracioides sicula, cichorii folio, flore parv
scente. *Vaill. act.* 714.
Habitat in Oriente, Sicilia, Palæstinâ.
Caulis *nudus ramosus*, *asper*: *setis subulatis*,
sparsis, *patentibus*. Flores *fere cymosi pedic*
gidis, *subsessiles*, *alterni*, *excepto ultimo*. Caly
vus, *ovatus*, *torulosus*, *hispidus*: *exterior bre*
liolis ovatis, *membranaceis*, *deciduis*.

vesicaria. 5. CREPIS involucris ovatis concavis obtusis
tibus.
Hieracium montanum rapifolium. *Bauh. pin.* 12
749. *Raj. hist.* 237. *Moris. hist.* 3. *p.* 65.
Burs. VI. 70.
β. Cichorium pratense hirsutum vesicarium. *B*
126.
Cichorium sylvestre vesicarium pratense. *Co*
1. *p.* 238. *t.* 237.
Habitat in Helvetia, β *in* Apulia.
Plantæ α *Radix crassa*. Folia *lyrata*, *angula*
tata, *scabra*. Caulis *brevis*. Rami *longi*, *n*
fidi s. trifidi, *uniflori*, *pedunculorum* Bracteæ
solitariæ, *concavæ*, *integræ pallidæ*. Flor
Calyces *singuli cincti Involucro longitudine*
ex Foliolis 5. *s.* 6, *patentibus*, *ovatis*, *obtus*
cavis, *membranaceis*, *pallidis*. Planta β.
priori manifeste differt, *flores vero conjungunt*

6. CREPIS foliis amplexicaulibus lyrato-ru
Vir. cliff. 79. *Hort. upf.* 239. *Sauv. monsp.* 295
monsp. 414.
Hieracium foliis caulinis sinuatis, calycibus
rescentiam nutantibus. *Hort. cliff.* 388.
Hieracium apulum, flore suaverubente. *Col.*
p. 244.
Hieracium intybaceum, floribus ex purpura
bus. *Bauh. pin.* 128. *Raj. hist.* 231.

:acium dentis leoni s folio, flore fvave rubente. *Bauh.* p. 127.
ndrilla purpurafcens fœtida. *Bauh. pin.* 130. *prodr.* t. 68.
tat in Apulia. ☉
us ftipitatus ut in C. alpina, & veficaria. Calyx florefcentiam nutat.

PIS foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis ntatis. *Roy. lugdb.* 126. *Gouan. monfp.* 415. — fœtida.
acium luteum, cichorii fylveftris folio amygdalas aras olens. *Morif. hift.* 3. *p.* 63. *f.* 7. *t.* 4. *f.* 4.
acium foliis cichorii fylveftris villofis, odore ca- li. *Magn. monfp.* 129. *t.* 128.
cium caftorii odore monfpelienfium. *Raj. hift.*
acium orientale altiffimum, folio cichorii fylve- s, odore caftorii, flore magno. *Tournef. cor.* 35.
acium maximum, erucæ folio. *Tournef. inft.* 469.
brum. *Raj. fuppl.* 146.
æa fylvatica tomentofa, cichorii fylveftris folio. *rif. hift.* 3. *p.* 109.
cio hirfutus. *Bauh. pin.* 131.
ron tertium. *Dod. pempt.* 641.
tat in Galliæ, Auftriæ *verfuris.* ☉
s ante anthefin nutant. Folia *odore amygdali amari.*

PIS foliis radicalibus runcinatis, caulinis haftatis, ycibus fubtomentofis. — diofcoridis.
cloides vulgaris annua, cichorii folio, flore lu- fubtus purpurafcente. *Vaill. act.* 715. *parif* 102.
cium majus erectum anguftifolium, caule lævi. *h. pin.* 127.
cium 1. *Tabern. hift.* 491.
tat in Gallia. ☉
is pedalis, fubangulatus, leviufculus: Ramis rariori-s, teretibus, patentibus. Folia Radicalia *lyrato- tata, nuda, glabra, denticulata, vix ciliata;* Cau- a *amplexicaulia, haftata, lineari-lanceolata, difco eriore litura purpurafcente, bafi auriculis valde den- is;* Ramea *linearia, bafi uno dente.* Pedunculi *i, nudi, adfcendentes, uniflori, vix apice incraf-* Calyces *farinofi, ante florefcentiam non nutan- calyculo lineari.* Corolla *flava, ante explicatio- f. fubtus purpurafcens.*

9. CRE-

virens. 9. CREPIS foliis runcinatis glabris amplexicau calycibus subtomentosis.
Lapsana capillaris. *Sp. pl.* 1. *p.* 812. *Gouan. monsp.*
Hieracium minus glabrum, foliis eleganter vire *Bauh. pin.* 127. *prodr.* 63.
Hieracium dentis leonis folio hirsutum, flore extus purpurascente *Tournef. paris.* 99.
Habitat in Helvetiæ, Italiæ *agris.*
Folia Radicalia *lanceolata*, *obtusa*, *glabra*, *tata*; Caulina *lanceolata*, *hastata*, *subamplexi integerrima*, *acuta*, *parva*. Caules *spithamæi*, *filiformes*, *subdichotomi.* Flores *parvi*, *lutei* lyces *soli tomentosi.* *An præcedentis sola vari*

alpina. 10. CREPIS foliis amplexicaulibus oblongis acu inferioribus superne; summis inferne denti *Hort. upsf.* 238.
Hieracioides annua, endiviæ folio, capite magno *act.* 1721. *p.* 246.
Hieracium alpinum, scorzoneræ folio. *Tourn* 472.
Leontodon calyce toto erecto: inferiore squami foliis amplexicaulibus. *Gmel. sibir.* 2. *p.* 16.
Habitat in Alpibus Italiæ. ⊙
Calyx pilosus cinctus foliolis calycinis ovatis, *aridis.*

pulchra. 11. CREPIS foliis sagittatis dentatis, caule pani calycibus pyramidatis glabris. *Gouan. monsp.*
Crepis foliis sagittatis dentatis, pedunculis turbinato-inflatis. *Guett. stamp.* 378. *Dalib. par* *n.* 1.
Chondrilla, hieracii folio, annua. *Tournef. inst.*
Hieracium pulchrum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1025.
Hieracium montanum hirsutum minus. *C. B. R* 234.
Hieracioides annua glutinosa, floribus parvis. *Va* 1721.
β. Lapsana chondrilloides calycibus pyramidatis, nibus papposis, foliis oblongis subdentatis *Hort. upsf.* 245. *
Hieracium montanum alterum leptomacrocaulo *ecphr* 1. *p.* 248 *t.* 249 *Raj. hist.* 234.
Hieracium annuum montanum, caule canalic *Moris. hist.* 3. *p.* 63. *s.* 7. *t.* 5. *f.* 37.

Hi

t in Gallia, Italia. ⊙
lævis, angustus, angulatus, auctus squamis minu-
tis, viridibus.

:PIS foliis oblongis amplexicaulibus dentatis, sibirica.
e hirto, calycibus carina ciliatis.
foliis ovatis denticulatis, petiolis alatis ample-
ulibus dentatis. *Hort. upf.* 239. *
ium caule ramoso, foliis infirmis: infimis pe-
tis, reliquis ex ovato lanceolatis: omnibus
ofis, petiolorum instar dentatis. *Gmel. sib.* 2. *p.*
t. 10.
t in Sibiriæ alpinis. ♃
s *sessilis ut in C. bienni & C. tectorum. Folia in-*
ra basi angustata in petiolos alatos dentatos.
. β. Hieracium *pyrenaicum* foliis lanceolatis
lexicaulibus dentatis, floribus solitariis, ca-
bus laxis. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
ium pyrenaicum, blattariæ folio, minus hirsu-
. *Herm. par.* 184. *t.* 184.
ium magnum hispanicum. *Pluk. alm.* 184. *t.*
f. 1.
cium foliis amplexicaulibus minute serratis hir-
. *Hall. helv.* 749.
ium alpinum asperum, conyzæ facie. *Bauh. pin.*

cium britannicum IV. *Clus. hist.* 2. *p.* 151.
1 β. *videtur tantum loco natali differre? inquirant*
Calyx *certe laxe imbricatus foliolis carina nigro-*
ta.

EPIS foliis lanceolato-runcinatis sessilibus læ- tectorum.
us; inferioribus dentatis, caule glabro. *Fl. svec.*
; 705. *Dalib. parif.* 238. *Gmel. sib.* 2. *p.* 28.
cium foliis radicalibus pinnato dentatis, caulinis
ceolatis subdenticulatis. *Fl. lapp.* 286. *Hort. cliff.*
.
cium luteum glabrum f. minus hirsutum. *J. B.*
. *angl.* 3. *p.* 165
cium, chondrillæ folio hirsutum. *Bauh. pin.* 127.
Tabern.
cium, chondrillæ folio, glabrum. *Bauh. pin.* 127.
II. *Tabern. hist.* 491. *bene.*
es vulgatissima pæne glabra annua, folio lon-
ato. *Vaill. act.* 1718.

Cicho-

Cichorium pratense luteum lævius. *Bauh. pin.*
Habitat in Europæ *aridis, tectis.* ☉
Planta *vulgatissima, cinerascenti-virens.* Caulis *to-sulcatus: Ramis longitudine caulis.* Folia l calia *Taraxaci;* Caulina *Leont. autumnalis: baseos erectis longioribus;* Ramea *integra, l subsagittata marginibus revolutis.* Flores *nunq tant, facie Lapsanæ.* Styli *antheris egressi si singulari nota. Planta cæterum polymorpha. calyculatus, sulcatus, adspersus longitudinalit glutiniferis.*

biennis. 14. CREPIS foliis runcinato-pinnatifidis scabri superne dentatis, calycibus muricatis. *Fl. n.* 706. *Gort. ingr.* 125.
Crepis scanensis. *It. scan.* 171.
Hieracium maximum, chondrillæ folio, asperum *pin.* 127. *prodr.* 64. *Raj. angl.* 3. *p.* 166.
Hieracium, erucæ folio, hirsutum. *Bauh. hi* 1025. *bene.*
Hieracioides altissima annua, chondrillæ folio utrinque luteo. *Vaill. act.* 1718.
Hieracioides foliis variis subasperis, caule altiss liosо unifloro. *Hall. helv.* 751.
Habitat in Scaniæ & Europæ *australioris pratis.*
Calyx *calyculatus, sulcatus muricatus longitu aculeis mollibus.* Folia *omnia lyrato-pinnata hispida.* Caulis *angulatus, scaber, altitudine mana vel quadrupedalis, fragilis.*

ANDRYALA.

integrifolia. 1. ANDRYALA foliis integris ovato-oblongis tosis. *Guett. stamp* 2. *p.* 384 *Hort. upf.* 24 *monsp.* 38. *Gouan. monsp.* 415.
Sonchus villosus luteus major. *Bauh. pin.* 124
Sonchus lanatus. *Dalech. hist.* 1116.
Hieracium villosum. *Raj. hist.* 231.
Habitat in Gallia, Sicilia. ☉

ragusina. 2. ANDRYALA foliis lanceolatis indivisis de tis acutis tomentosis, floribus solitariis.
Hieracium incanum lanuginosum ragusinum, p flore. *Herm. lugdb.* 672. *t.* 673. *Mill. ic.* 146. *f.* 2.

Habitat in insulis Archipelagi. ♃
Folia strictiora, acutiora, acutius dentata quam in reliquis.

ANDRYALA foliis runcinatis. sinuata.
Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris. *Hort. cliff.* 387. *Sauv. monsp.* 692. *Gouan. monsp.* 415.
Eriophorus foliis inferioribus ad costam usque laciniatis. *Vaill. act.* 1721. *p.* 212.
Sonchus villosus luteus minor. *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 61.
Habitat Monspelii, *inque* Sicilia.

ANDRYALA foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 288. * lanata.
Hieracium montanum tomentosum. *Dill. elth.* 181. *t.* 150. *f.* 180. *Mill. ic.* 97. *t.* 146. *f.* 1.
Habitat in Europa *australi.* ♃

HYOSERIS.

** Caule nudo.*

HYOSERIS scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Gouan. monsp.* 415. fœtida.
Taxaconastrum, dentis leonis folio, radice fœtida. *Vaill.* 1721. *p.* 180.
Leontodontoides alpinus glaber, erysimi folio, radice crassa fœtida. *Mich. gen.* 31. *t.* 28.
Dens Leonis tenuissimo folio. *Bauh. pin.* 126. *prodr.* 62.
Hieracium fœtidum III. *Col. ecphr.* 2. *p.* 29. *t.* 31.
Habitat in Alpibus Italiæ, Austriæ *superioris.* ♃
Folia pinnatifida, glabra, lobis latere postico subdentatis. Scapi *simplices, nudi.* Calyx *simplex, basi auctus.* Semina *nuda.*

HYOSERIS scapis unifloris nudis, foliis glabris runcinatis: angulis dentatis. *Gouan. monsp.* 415. radiata.
Hyoseris foliis glabris hastato-pinnatis. *Roy. lugdb.* 127. *Sauv. monsp.* 300.
Taxaconastrum dentis leonis folio ad summitatem radiato. *Vaill. act.* 703.
Dens leonis minor, foliis radiatis. *Bauh. pin.* 129. *Pluk. alm.* 130. *t.* 37. *f.* 2.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♃

Pedunculus & *rachis foliorum farinacea.* Lobi *j rum imbricatim reflexi, utrinque dentati, læves.* mina *membranacea: Pappo simplici, sessili.*

ıbra. 3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis bris, seminibus papposis. *Hort. cliff.* 386. *Roy. l* 197.

Taraxaconastrum, erysimi folio, flore minimo. *l act.* 1721. *p.* 235.

Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis seg tis a flore delapso erectis & semina complexis. *suppl.* 147.

Hieracium minimum supinum, tragopogoni capi *Bocc. mus.* 2. *p.* 146. *t.* 106.

Habitat in Sicilia.

rginica. 4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis ly glabris. *Gron. virg.* 60. *

Habitat in Virginia.

Folia *radicalia prima ovata, tum lanceolata, d lyrata, acuta, glabra.* Scapi *nudi, uniflori,* . *triplo longiores.* Calyces *simplicissimi, nec imbr ex decem foliolis lanceolatis.* Corolla *saturate l* Semina *tetragona, coronata margine membranace tegro & insuper setis* 3. *s.* 4. *longis.*

inima. 5. HYOSERIS caule diviso nudo, pedunculis incras *Hort. cliff.* 386. *Fl. svec.* 630; 707. *Roy. lugdb. Sauv. monsp.* 14.

Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180.

Hieracium minus, folio subrotundo. *Bauh. pin.*

Hieracium minimum. *Clus. hist.* 2. *p.* 142.

Habitat in Europæ *arvis apricis.*

** *Caule folioso.*

edypnois. 6. HYOSERIS fructibus ovatis glabris, caule ran *Gouan. monsp.* 416.

Lapsana fructibus subglobosis glabris, seminibus calyculato-papposis. *Hort. ups.* 246. * *Sauv. monsp*

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus dunculis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort.* 387. *Roy. lugdb.* 131.

Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vail* 1721. *p.* 202.

Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. *pin.* 128.

H

um facie hedypnois. *Lob. ic.* 239.
nois annua. *Tournef. inst.* 478.
in Europa *austral.* ⊙

ERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadioloides.
ı fructibus globosis pilosis, seminibus disci caly-
o-papposis. *Hort upf.* 246. *
in Europa *australi.* ⊙

ERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. creticа.
ı fructibus ovatis scabris, seminibus disci caly.
o-papposis. *Hort. upf.* 246. *
in Creta.

SERIOLA.

LA læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata.
phorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
. *Vaill. act.* 1721. *p.* 278.
um ramosum, floribus amplis, calycibus valde
tis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
ualibus incisis. *Raj. suppl.* 144.
in Creta. ⊙

L A hispida, foliis obovatis subdentatis. æthnensis.
hæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*
* *Hort. upf.* 240. *
phorus hirsutus, bellidis obtuso folio. *Vaill.*
739.
um multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.
in Italia. ⊙

LA hirta, foliis runcinatis cretensis.
phorus hirsutus, dentis leonis folio læviter
ito. *Vaill. act.* 740.
in Creta.

LA urens, caule ramoso, foliis dentatis. urens
hæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-
us hispidis. *Sp. pl.* 1. *p.* 810.
hæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
1721. *p.* 215.
um alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*
Raj. suppl. 140.
in Sicilia.
squamæ asperæ spinulis pungentibus.

HYPOCHÆRIS.

ontana. 1. HYPOCHÆRIS caule simplici folioso unifloro liis lanceolatis dentatis.

Hypochæris non ramosa, endiviæ folio prælc monanthos. *Vaill. act.* 1721. *p.* 215.

Hieracium latifolium pontanum præaltum glab endiviæ folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 148. *t.* 113. *suppl.* 142.

Habitat in Sabaudiæ *montibus.*

aculata. 2. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. clif* *Fl. svec.* 631; 708. *Roy. lugdb.* 125. *Dalib. paris*

Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *act.* 1721. *p.* 385. *Fl. lapp.* 288.

Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, magno. *Bauh. pin.* 128.

Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 139.

Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *pin.* 128. *prodr.* 65. *Hall. helv.* 760. *t.* 24.

Dens leonis foliis integris, caule raris foliis ve monanthes fere. *Raj. hist.* 244.

Habitat in Europæ *frigidioris pratis asperis.* ♃

labra. 3. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis i catis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sin *Hort. cliff.* 386. *n.* 4. *Hort. ups.* 240. * *Roy.* 126. *Dalib. paris.* 239. *Sauv. monsp.* 300. *G monsp.* 417.

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. *Vai* 1721. *p.* 214.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo gl *Bauh. pin.* 127.

Habitat in Dania, Germania, Belgio. ☉

Semina marginalia Pappo sessili; disci vero sti Planta tota lævis. Pedunculi superne incrassati.

adicata. 4. HYPOCHÆRIS foliis runcinatis obtusis sca caule ramoso nudo lævi, pedunculis squa *Hort. cliff.* 386. *Fl. svec.* 2. *n.* 709. *It. scan.* 2 *Sauv. monsp.* 299. *Gouan. monsp.* 417.

Hieracium dentis leonis folio obtuso, majus. *pin.* 127. *Moris. hist.* 3. *p.* 66. *s.* 7. *t.* 4. *f.* 27.

Hieracium minus, dentis leonis folio subaspero. *pin.* 127. (Vaill.) Hie

cium, dentis leonis folio, bulbosum. *Bauh. pin.*
r. *prodr.* 63.
cium longius radicatum. *Lob. ic.* 238. *Raj. hist.*
).
cium tertium. *Dod. pempt.* 639.
cium VII. *Tabern. hist* 492.
at in Europæ *cultioris pascuis.* ♃
culi superne incrassati.

L A P S A N A.

SANA calycibus fructus angulatis, pedunculis ramosissimis. *Hort. cliff.* 384. *Fl. svec.* 649;). *Roy. lugdb.* 130. *Hort. upf.* 246. *Dalib. paris.* . *Gmel. sib.* 2. *p.* 40. **communis.**
sana. *Dod. pempt.* 675.
io affinis Lapsana domestica. *Bauh. pin.* 124.
at in Europæ *cultis.*

SANA calycibus fructus torulosis depressis obs sessilibus. *Gouan. monsp.* 417. **Zacintha.**
ana calycibus fructus subrotundis angulatis, peculis incrassatis, floribus erectis. *Roy. lugdb.* . *Hort. cliff.* 390.
drilla verrucaria, foliis cichorei viridibus. *Bauh.* , 130.
tium verrucatum, zacintha. *Clus. hist.* 2. *p.* 144.
at in Italia, Oriente. ☉
Radicala lyrata, acuta; Caulina sagittata, amplexaulia, dentata. Caulis *subdichotomus, striatus, riulus.* Flores *sessiles, impuberes penduli.* Corollæ *us fulvæ, supra flavæ.* Calycis *exterior ordo eres, interior basi gibbus, rufescens.* Pedunculi *incras-*
.

SANA calycibus fructus undique patentibus: ra- ; subulatis, foliis caulinis lanceolatis indivisis. *rt. upf.* 245. * *Sauv. monsp.* 82. *Gouan. monsp.* 417. **stellata.**
cium siliqua falcata. *Bauh. pin.* 128.
cium stellatum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1014.
at Monspelii, Bononiæ. ☉

SANA calycibus fructus [illegible]ique patentibus: [illegible] subulatis, foliis lyratis. *[illegible]ort. upf.* 245. * **Rhagadiolus.**
cium falcatum alterum. *Raj. hist.* 256.

Rhagadiolus lapsanæ foliis. *Tournef. cor.* 36.
Rhagadiolus edulis hieraciis affinis. *Bauh. hist.* 1014.
Habitat in Oriente.

CATANANCHE.

cærulea. 1. CATANANCHE squamis calycinis inferioribus ...tis. *Hort. cliff.* 390. *Roy. lugdb.* 122. *Sauv.* 308. *Gouan. monsp.* 418.
Catananche cærulea, semiflosculorum ordine si... *Vaill. act.* 1721 *p.* 215.
Chondrilla cærulea, cyani capitulo. *Bauh. pin.*
Chondrillæ species tertia. *Dod. pempt.* 638.
Habitat in G. Narbonensis *collibus saxosis.* ♃

lutea. 2. CATANANCHE squamis calycinis inferioribus ...ceolatis. *Hort. cliff.* 390. *Hort. upsf.* 247. *Roy.* 122. *Sauv. monsp.* 308. *Gouan. monsp.* 418.
Catananche lutea, longo nervoso dentatoque ... *Vaill. act.* 1721. *p.* 216.
Chondrilla cyanoides lutea, coronopi folio no...so. *Bocc. mus.* 2. *p.* 21. *t.* 7. *Barr. ic.* 1135.
Stoebe plantaginis folio. *Alp. exot.* 287. *t.* 28
Habitat in Creta. ☉

græca. 3. CATANANCHE foliis incisis.
Catananche lutea, foliis varie incisis. *Vaill. act.* *p.* 216.
Scorzonera græca saxatilis & maritima, folii laciniatis. *Tournef. cor.* 3... *itin.* 1. *p.* 223. ...
Habitat in Græciæ *maritimis.*

CICHORIUM.

Intybus. 1. CICHORIUM floribus geminis sessilibus, fol... cinatis. *Fl. svec.* 650; 711. *Dalib. parisf.* 244 *med.* 373.
Cichorium caule simplici. *Hort. cliff.* 389.
Cichorium sylvestre s. officinarum. *Bauh. pin.*
Intybus sylvestris. *Cam. epit.* 285. *Fuchs. hist.*
Habitat in Europa *ad margines agrorum* ...*que.* ♃

Endivia. 2. CICHORIUM [illegible]ribus solitariis pedunculatis integris crenatis. *Hort. cliff.* 389. *Hort. u...* *Mat. med.* 374. Ci

Cichorium latifolium ſ. Endivia vulgaris. *Bauh. pin.* 125.
Intybum ſativum. *Dod. pempt.* 634.
Endivia criſpa. *Bauh. pin.* 125.
Habitat - - - - ⊙

CICHORIUM caule dichotomo ſpinoſo, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 388. ſpinoſu[m]
Cichorium ſpinoſum. *Bauh. pin.* 126. *prodr.* 62. *t.* 62.
Chondrillæ genus elegans, cæruleo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 145.
Habitat in Cretæ, Siciliæ *collibus arenoſis maritimis.* ♂

SCOLYMUS.

SCOLYMUS foliis margine attenuatis. *Gouan. monſp.* 419. maculat[us]
Scolymus annuus. *Hort. upſ.* 244.
Scolymus. *Hort. cliff.* 388.
Scolymus Chryſanthemus annuus. *Dodart. mem.* 4. *p.* 303.
Scolymus theophraſti narbonenſis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 153.
Habitat in G. Narbonenſi, Italia. ⊙

SCOLYMUS foliis margine incraſſatis. *Mill. dict. t.* 229. *Gouan. monſp.* 419. hiſpani[cus]
Scolymus vivax. *Sauv. monſp.* 294.
Scolymus Chryſanthemos. *Bauh. pin.* 384.
Scolymus theophraſti hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 153.
Carduus Chryſanthemos. *Dod. pempt.* 725.
Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonenſi. ♃

*** CAPITATI.*

ARCTIUM.

ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. Lappa.
Arctium. *Hort. cliff.* 391. *Fl. ſvec.* 651; 712. *Mat. med.* 375. *Roy. lugdb.* 144. *Dalib. pariſ.* 245.
Lappa major ſ. Arctium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
Bardana ſ. Lappa major. *Dod. pempt.* 58.
Perſonata. *Cam. epit.* 887.
Lappa major montana, capitulis tomentoſis. *Bauh. pin.* 198.
Habitat in Europæ *cultis ruderatis.* ♂

ſonata. 2. ARCTIUM foliis decurrentibus ciliato-ſpinoſis: ſuperioribus pinnatis: caulinis oblongo-ov... *Jacq. vind.* 274. *

Carduus mollis, foliis imis laciniatis, ſuperioribus integris, ſquamis calycinis reflexis. *Hall. helv.* 6... *t.* 19 *opuſc.* 232.

Carduus mollis latifolius, lappæ capitulis. *Bauh.* p... 377. *prodr* 155. *burſ.* XXI. 13.

Carduus capitulis in vertice congeſtis lanigeris: ſquamis reflexis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 62. *t.* 24.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genevæ, Taurero A... ſtriæ ♂

Folia *caulina ovato-oblonga, ſubtus tomentoſa, ſerrata: ſerraturis ſpinuloſis, nec non ſpinulis minimis ...terjectis. Folia hæc, baſi quamvis attenuata, decurrunt per caulem tenuiſſimis marginibus ſpinoſis.* Pedunculi *tomentoſi* & *marginibus ſpinuloſis arm...* Habitus *antecedentis elucet in textura foliorum, paniculа, calycis figura, magnitudine.*

SERRATULA.

ctoria. 1. SERRATULA foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus. *Hort. cliff.* 391. *Hort upſ.* 249. *Fl. ſvec.* 660; 713. *Roy. lugdb.* 143. *Dalib. pariſ.* 246.

Serratula. *Bauh. pin.* 235. *Dod. pempt.* 24.

Habitat in Europæ *borealioris pratis.* ♃

ponata. 2. SERRATULA foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis radii femineis longioribus.

Serratula præalta centauroides montana. *Bocc. muſ.* 2. *p* 45. *t.* 37.

Carduus inermis, foliis glabris pinnatis: lacinia extima maxima, capitulis ſqualidis. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 49. *t.* 20.

Habitat in Sibiria, Italia. ♃

Similima *S. tinctoriæ, ut vix diſtinguatur, niſi Magnitudine tripla;* Caule *ſulcato; Floſculis duplo pluribus; Foliolo declinato ſub calyce; ſed imprimis. Radio floſculis tubuloſis, anguſtioribus, femineis, fertilibus.*

Genus *ambiguum: Radius femineus indicat* Centaureæ *genus, ſed floſculi radii, æque ac diſci, feminiferi, una cum habitu hoc negant. Si plures ſimiles* inno-

ſcant, novum expoſcant genus, quod ob hanc uni-
vix meretur.

ATULA calycibus ſubhirſutis ovatis, foliis alpina.
ſis.

a foliis petiolatis: radicalibus ovato-oblongis
tis; caulinis integerrimis. *Fl. ſvec.* 661; 714.
a foliis ovato-lanceolatis: radicalibus ſerratis,
thyrſifloro. *Fl. lapp.* 291. *Hort. upſ.* 391.
inerme, foliis ex ovato lanceolatis denticu-
nfra lanugine candidis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 67. *t.* 26.
Cirſium minus britannicum, floribus conge-
Pluk. alm. 83. *t.* 154. *f.* 3.
humile montanum, cynogloſſi folio, polyan- *cynogloſſifo-*
m. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 148. *Dill. elth.* 82. *t.* 70. *lia.*
vide Gmel. ſib. 2. *p.* 76. *t.* 32.
polyanthemum, molli haſtato folio. *Moriſ.* *lapathifolia.*
p. 148. *ſ.* 7. *t.* 29. *f.* 1. *t.* 22.
foliis triangularibus lunate dentatis. *Hall.*
583.
mollis, lapathi foliis. *Bauh. pin.* 377.
mollior 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 151.
inerme, foliis linearibus utrinque viridibus, *anguſtifolia.*
ibus hirſutis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 78. *t.* 33.
in Alpibus Lapponiæ, Auſtriæ, Helvetiæ,
niæ, Sibiriæ. ♃
floribus cæruleis diſtinctiſſima, foliorum figura
ſſima; ſed quæ cauſſa produxerit has conſtantes
ates? certe locus non ſuffecerit.

ATULA foliis lineari-lanceolatis alternis ſub- ſalicifolia.
canis ſeſſilibus integerrimis.
inerme erectum, foliis ex lineari lanceolatis:
candidis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 69. *t.* 27.
in Sibiriæ *apricis, ſiccis.*
angulatus, ſuperne ramoſus, ut in congeneribus.
ſalicina, integerrima, ſubtus albida, baſi vix
vix decurrentia. Flores *rubri;* Calyces *facie*
inæ, tres vel quatuor in ſingulo ramo.

ATULA foliis lanceolatis ſubtus villoſis ſub- multiflora.
rentibus integerrimis, caule corymboſo, ca-
s cylindricis.
a elatior, floribus umbellatis parvis. *Gerb.*
94.

Cirsium inerme, caulibus adscendentibus, foliis l bus infra cinereis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 71. *t.* 28.? *f* *res majores.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Caulis *angulatus, eorymbosus, ramis itidem cor ut terminetur densissima sylva florum, fere in* Folia *saligna, subtus albo villo vestita.* Caly *lindrici Squamis glabris, acutis, purpurascenti milis præcedenti, sed folia basi parum decurre tus villosa,* & Calyces *copiosiores, argutiores magis* & *lætius colorati.*

noveboracensis. 6. SERRATULA foliis lanceolato-oblongis serrat dulis. *Hort. cliff.* 392. *Roy. lugdb.* 143.
Serratula noveboracensis maxima, foliis longis *Dill. elth.* 255. *t.* 263. *f.* 342.
Serratula noveboracensis altissima, foliis dorie bus subincanis. *Moris. hist.* 3. *p.* 133. *Raj. sup*
Centaurium medium noveboracense luteum, nis folio integro tenuiter crenato. *Pluk. alm.* 109. *f.* 3.
Habitat in Noveboraco, Virginia, Carolina, C Kamtschatca. ♃

præalta. 7. SERRATULA foliis lanceolato-oblongis ser tentibus subtus hirsutis. *Mill. dict. t.* 234.
Serratula virginiana, persiæ folio subtus incan *elth.* 356. *t.* 264. *f.* 343.
Serratula præalta, angusto plantaginis aut persic *Bocc. mus.* 2. *p.* 45. *t.* 32.
Eupatoria virginiana, serratulæ noveboracensis bus foliis. *Pluk. alm.* 141. *t.* 280. *f.* 6.
Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania.
Receptaculum nudum, nec villosum. Tozzet. app.

glauca. 8. SERRATULA foliis ovato-oblongis acumina ratis, floribus corymbosis, calycibus subrot *Gron. virg.* 116.
Serratula marilandica, foliis glaucis cirsii instar culatis. *Dill. elth.* 354. *t.* 262. *f.* 341.
Centaurium medium marianum, folio integro ci stratis more spinulis fimbriato. *Pluk. mant.* 4
Habitat in Marilandia, Virginia, Carolina. ♃

squarrosa. 9. SERRATULA foliis linearibus, calycibus sq

lis subsessilibus lateralibus acuminatis. *Hort. cliff.* 392.*
Gron. virg. 116. *Roy. lugdb.* 143.
Cirsium tuberosum, capitulis squarrosis. *Dill. elth.* 83. *t.* 71. *f.* 82.
Jacobe virginiana tuberosa latifolia, capitulis sessilibus: squamis foliaceis acutis donatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 137. *f.* 7. *t.* 27. *f.* 10. *bona.*
Habitat in Virginia. ♃
Flosculi recurvati, Stylis longissimis bipartitis.

SERRATULA foliis lanceolatis integerrimis, calycibus squarrosis pedunculatis obtusis lateralibus. *Gron. virg.* 2. *p.* 116. — scariosa.
Cirsium non ramosum, foliis lateralibus, flores ferens pauciores majores. *Gron. virg.* 1. *p.* 92.
Jacea altera non ramosa, tuberosa radice, foliis latioribus, flores ferens pauciores majores. *Banist. virg.* 1929. *Pluk. mant.* 105.
Eupatorio affinis americana bulbosa, floribus scariosis capitulis contextis. *Pluk. alm.* 142. *t.* 177. *f.* 4.
Habitat in Virginia.
Diversissima a præcedente. Calycibus *squarrosis, obtusis.* Pedunculis *lateralibus, elongatis, unifloris, foliolis aliquot instructis.* Foliis *lato-lanceolatis, minime nervosis, sessilibus, nec decurrentibus.*

SERRATULA foliis linearibus basi ciliatis, floribus spicatis sessilibus lateralibus, caule simplici. *Gron. virg.* 116. — spicata.
Cirsium tuberosum, lactucæ capitulis spicatis. *Dill. elth.* 85. *t.* 72. *f.* 83.
Jacea non ramosa, tuberosa radice, floribus plurimum rigidis peranguftis. *Banist. virg.* 1927.
Jacea angustifolia, tuberosa radice, virginiana. *Pluk. alm.* 190. *t.* 424. *f.* 6.
Jacobe virginiana tuberosa angustifolia, capitulis sessilibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 137. *f.* 7. *t.* 27. *f.* 10.
Habitat in America *septentrionali.* ♃

SERRATULA foliis linearibus sparsis revolutis, caule fruticoso. — Chamæpeuce.
Centaurea calycibus inermibus: squamis lanceolatis, foliis linearibus confertis integerrimis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 138.
Jacea fruticans, pini folio. *Bauh. pin.* 271. *Pluk. alm.* 190. *t.* 94. *f.* 3.

Cha-

Chamæpeuce. *Alp. exot. 77. t. 76.*
Stœbe capitata, chamæpinus fruticosa cretica. *ital.* 75.
Stœbe cretica fruticans, pineæ angustis foliis. *hist.* 3 *p.* 133. *f.* 7. *t.* 26. *f.* 8.
Habitat in Creta. ♄.

mata. 13. SERRATULA foliis lanceolatis, squamis c nis apice scariosis obtusis patulis coloratis, bus terminalibus.
Cirsium inerme, foliis scabris: inferioribus ex si dentatis, squamis calycum subrotundis mem ceis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 72. *t.* 29.
Habitat in Sibiria.
Habitus *S. alpinæ.* Folia *lanceolata nonnihil dec tia, superiora integerrima, margine præsertim* Caules *angulati.* Rami *erecti, singuli, termina dunculis floribusque sæpius tribus.* Flores *mag ne Cyani rubri, Pappus albus;* Calyces *scariosi mis membranaceis, mollibus ut Centaureæ nonn coloratis; pedunculi duo s. tres ramos terminant.*

ntauroides. 14. SERRATULA foliis pinnatifidis acutis glabris mibus, squamis calycinis mucronatis: interio membranaceis.
Carduus caule ramoso, foliis pinnatifidis: fo dentatis, squamis ex lanceolato spinosis. *Gm* 2. *p.* 44. *t.* 17.
Habitat in Sibiria. ♃
Herba *pedalis.* Rami *alterni (incultæ), stricti, glabri, uniflori.* Folia *utrinque glabra, venosa, ta, inermia, lanceolata: dentibus lanceolatis;* I *verticalia s. paginam superiorem, non cœlo, se teri obvertunt ut in Lactuca scariola.* Calyx *o oblongus, imbricatus squamis mucrone inermi; rum flosculis propiores majores exaridæ.* Co *purpurea absque flosculis marginalibus.* Stylus *sculis duplo longior, ideoque longissimus dicendus.* bitus *Centaureæ moschatæ, sed caret flosculis ne*

bylonica. 15. SERRATULA foliis tomentosis decurrentibus integerrimis concavis canaliculatis: radicalibu ratis, floribus thyrsoideo-spicatis. *Gouan. n* 421. *

Rapc

...nthicoides lutea altissima, helenii folio, alato ...le. *Vaill. act.* 182. *n.* 27.
...latissima, laciniato folio. *Bauh. pin.* 235.
...maxima. *Alp. exot. t.* 282.
...babylonica. *Bauh. prodr.* 235.
...*it in* Oriente. ♃
Radicalia amplissima, nervosa, apice rotundata. ...lis *6-pedalis, tomentosus, a medio ad apicem fic-...s.* Flores *sessiles.* Calycis *squamæ membrana-..., inermes, squamula reflexa interdum terminatæ.* Ca... *ceterum ventricosus.* Flores *lutei. D. Gerard.*

...RATULA foliis dentatis spinosis. *Fl. svec.* ...; 715. *Dalib. parif.* 246. — arvensis.
...us radice repente, foliis lanceolatis dentatis mar... aculeatis. *Fl. lapp.* 293. *Roy. lugdb.* 133.
...us vinearum repens, sonchi folio. *Bauh. pin.* ..., *prodr.* 156.
...us in avena proveniens. *Bauh. pin.* 377.
...thus theophrasti. *Col. ecphr.* 1. *p.* 45. *t.* 45.
...*it in* Europæ *cultis agris.* ♃
...*s Cardui est.*

CARDUUS.

* *Foliis decurrentibus.*

...DUUS foliis decurrentibus dentatis spinosis, ...unculis nudis longissimis unifloris, calycibus ...osis inclinatis. — leucographus.
...us foliis sinuatis aculeatis, caule crispo, pe-...culis unifloris. *Roy. lugdb.* 134.
...m maculis argenteis notatum. *Tournef. inst.* 448.
...us leucographus f. mariæ hirsutus, capitulo mi-...e. *Moris. blef.* 244.
...*it in* Campania.

...DUUS foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: ...nils divaricatis, calycibus ovatis spinosis vil-...s, caule piloso. — lanceolatus.
...us foliis lanceolatis decurrentibus: denticulis ...erficieque spinosis. *Hort. cliff.* 392. *Fl. svec.* ...716. *Roy. lugdb.* 132. *Dalib. parif.* 247.
...us lanceolatus latifolius. *Bauh. pin.* 385.
...us lanceolatus f. sylvestris dodonæi. *Bauh. hist.* ... 58.

Habi-

Habitat in Europæ *cultis ruderatis.* ♂
Calycis *intimæ squamæ inermes, setaceæ, exar*

nutans. 3. CARDUUS foliis semidecurrentibus spinosi ribus cernuis: squamis calycinis superne pat *Fl. svec.* 655; 717. *Guett. stamp.* 2. *p.* 321. *paris.* 248. *Gmel. sib.* 2. *p.* 42.
Carduus foliis sinuatis decurrentibus margine floribus solitariis nutantibus. *Hort. cliff.* 393
Carduus nutans. *Bauh. hist.* 3. *p.* 56. *It. gotl.* 2
Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus ris. *Bauh. pin.* 385.
Habitat in Europa *ad pagos.* ♂
Styli reflexi versus latera.

acanthoides. 4. CARDUUS foliis decurrentibus sinuatis spinosis, calycibus pedunculatis solitariis ere losis. *Fl. svec.* 2. *n.* 718.
Carduus foliis laciniatis: subtus tomentosis e ne spinosis, capitulis sessilibus congestis a *Hall. helv.* 677. *Dalib. paris.* 248.
Carduus acanthoides. *Bauh. hist.* 3. *p.* 59. 297. *
Carduus spinosissimus, capitulis minoribus. R 3. *p.* 194.
Carduus polyacanthos, capitulis longioribus & ribus, foliis albicantibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 1
Habitat in Europæ *ruderatis.* ☉
Differt a Carduo nutante *calycibus erectis, a* spo *calycibus solitariis villosis.* Calycis *sq teriores patentes.* Corollulæ *semiquinquefidæ, ma lacinia fere ad basin separata, ut fere bila bio superiore 4fido; inferiore simplici, quo Sp.* 3, 5. Styli *flosculis duplo longiores.*

crispus 5. CARDUUS foliis decurrentibus sinuatis spinosis. floribus aggregatis terminalibus in *Hort. cliff.* 393. *Fl. svec.* 658; 719. *Roy.* l *Dalib. paris.* 248.
Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris *pruss.* 43. *t.* 5.
Carduus caule crispo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 9.
Habitat in Europæ *septentrionalioris agris, cul*
Folia *subtus ex albido tomentosa venis viridibus Calycum squamæ recurvæ, sed non pungentes, tecedentis.*

6. C

JUS foliis decurrentibus dentatis: margine is, floribus racemosis erectis, pedunculis ibus. palustris.

foliis linearibus dentatis spinosissimis, caule spinoso, floribus erectis. *Roy. lugdb.* 134. *Fl.* 559; 720. *Dalib. paris.* 249.
palustris. *Bauh. pin.* 377. *prodr.* 156.
spinosissimus erectus angustifolius palustris. *hist.* 3. *p.* 153. *s.* 7. *t.* 32. *f.* 13.
polycephalus angustifolius. *Dalech. hist.* 1743.
in Europæ *pratis subpaludosis.* ♃
arcte imbricatus, lævis, mucronibus vix con-

JUS foliis decurrentibus pinnatifido sinuatis centibus spinosis, pedunculis nudis tomentosis, ibus deciduis. pycnocephalus.

nemorosus italicus. *Barr. obs.* 925. *t.* 417.
pycnocephalus sylvestris. *Triumph. obs.* 100.

in Europa *australi.* ♃
quasi media inter C. crispum & Onopordon. s pedalis s. altior, albido-pilosus, Crispus, totaliter m marginibus utrinque decurrentibus, alternatim is spinosisque. Folia *Radicalia sublanceolata, ata; Caulina oblonga, semipinnatifida, dentata, ue pubescentia, subtus albidiora, tomentosa s. na.* Pedunculi *breves, tomentoso-albi.* Caly- *agnitudine avellanæ, oblongi, imbricati squamis is, erectis, patulis, subspinosis.* Corolla *pur- limbo erecto, magnitudine Serratulæ tinctoriæ. t a C. acanthoide pedunculis nudis nec alatis. es maturi toti decidunt.*

JUS foliis decurrentibus lanceolatis, denticu- rmibus, calyce spinoso. *Hort. cliff.* 392.* *paris.* 249. dissectus.
anglicum. *Lob. ic.* 583. *Dalech. hist.* 584.
tenus.
majus, singulari capitulo magno, s. incanum dissectum. *Bauh. pin.* 377.
Anglia, Gallia. ♃
rent omnino aculeis, diversus itaque a C. hetero- & helenioide.

9. CAR-

cyanoides. 9. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifid ribus integerrimis inermibus petiolatis su mentofis.

monoclonos. Carduus caule fimplici, foliis pinnatifidis rar culatis: infra candidis, fquamis calycum tis adfcendentibus. *Gmel. fib.* 2. *p.* 42. *t.* 1

polyclonos. *β.* Carduus inermis, caule ramofiffimo, foliis bus pinnatis; fuperioribus linearibus inte infra candidis, fquamis calycum lanceolati dentibus. *Gmel. fib.* 2. *p.* 44. *t.* 16.

Habitat in Tataria.

Folia *fubtus albo tomento, absque ferraturis α fere Sorbi; β. anguftiffima & linearia. fquamæ lineares, acuminatæ, fubvillofæ: in tudine Scabiofæ, in β. Cyani.* Habitus *fchatæ J. B.* 3. *p.* 34.

monfpeffulanus. 10. CARDUUS foliis decurrentibus lanceolat pandis glabris inæqualiter ciliatis, pedur ternis, calycibus inermibus. *Gouan. mon*

Carduus foliis lanceolatis glabris integris ci currentibus, calycibus inermibus. *Sauv.* 1

Carduus Cirfium monfpelianum, folio long *Bauh. hift.* 3. *p.* 44.

Cirfium foliis non hirfutis, floribus compacti *pin.* 377.

Cirfion. *Dod. pempt.* 377.

Habitat Monfpelii.

Habitus C. *Serratuloides.* Folia *lanceolata, glabra, glauca, integra: radicalia vero repa gine fpinis fetaceis, inæqualibus ciliata. nonnulla in fummitate caulis* pedunculis *brev*

defloratus. 11. CARDUUS foliis decurrentibus lanceolati fubfpinofo-ciliatis nudis, pedunculis long nuginofis unifloris. *Jacq. vind.* 177. *

Carduus foliis rigidis molliter fpinofis, fca paucifloro. *Hall. helv.* 677. *t.* 18. *f.* 2. *opu*

Cirfium f. Carduus anguftifolius. *Bauh. pin.* 3 155.

Cirfium fingularibus capitulis parvis. *Bauh.*

Cirfium 3. montanum 1. *Cluf. hift.* 2. *p.* 149

Habitat in Helvetiæ, Auftriæ, Monfpelii *fub*

Similis C. ferratuloidi, fed Calyces anguftiore decurrentia.

* *Foliis sessilibus.*

RDUUS foliis sessilibus lanceolatis integerrimis casabonæ.
tus tomentosis: margine spinis ternatis. *Hort.*
f. 393.
na major, caule non folioso. *Bauh. pin.* 379.
na theophrasti angvillariæ. *Lob. ic.* 486. *f.* 1. *Dalech.*
: 1484.
canthus casabonæ, Acarnæ similis. *Bauh. hist.* 3.
92.
at in Europa *australi.* ♂

RDUUS foliis integris subtus tomentosis: spinis stellatus.
iosis lateralibus. *Roy. lugdb.* 133.
ius humilis aculeatus, ptarmicæ austriacæ foliis.
urnf. *obs.* 96. *t.* 96.
ius stellatus leucoji lutei foliis. *Dodart. mem.* 4.
261.
at - - - - ⊙

DUUS foliis amplexicaulibus hastato-pinnati- marianus.
s spinosis, calycibus aphyllis: spinis canalicula-
duplicato-spinosis. *Gouan. monsp.* 422.
us squamis calycinis margine apiceque spinosis.
rt. *cliff.* 393. * *Hort. upf.* 250. *Roy. lugdb.* 133.
ib. *parif.* 247. *Mat. med.* 316. *Sauv. monsp.* 291.
us albis maculis notatus vulgaris. *Bauh. pin.* 281.
us mariæ. *Dalech. hist.* 1475.
t in Angliæ, Galliæ, Italiæ *aggeribus ruderatis.* ⊙

DUUS foliis amplexicaulibus angulato-spino- syriacus.
floribus solitariis subsessilibus obvallatis foliolis
uinis. *Hort. cliff.* 393. * *Hort. upf.* 250. * *Gron.*
t. 252.
us albis maculis notatus exoticus. *Bauh. pin.* 381.
us latifolius echinos obsoletæ purpuræ ferens.
. pin. 380.
us luteus syriacus. *Cam. hort.* 35. *t.* 10.
t in Syria, Creta, Hispania. ⊙

DUUS foliis sessilibus bifariam pinnatifidis: la- eriophorus.
s alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Hort.*
349. * *Sauv. monsp.* 290. *Gouan. monsp.* 423.
s foliis sinuatis decurrentibus: denticulis super-
ius spinosis, calycibus lanigeris. *Roy. lugdb.* 133.
. parif. 247.

Carduus capite rotundo tomentoso. *Bauh. pin.* 38
Carduus tomentosus corona fratrum herbariorum. *D*
ic. 2. p. 9.

spurius. β. Carduus foliis semidecurrentibus duplicato-pinna-
dis: laciniis alternis erectis, calycibus ovatis. *H*
upf. 249. not.
Carduus tomentosus pyrenaicus, floribus purpu
glomeratis. *Tournef. inst.* 441?
Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, Lusitania. ♂

altissimus. 17. CARDUUS foliis sessilibus pinnatifidis sinuatis
ratis inermibus, caule ramosissimo, calycibus
losis subserratis.
Cirsium altissimum, laciniato folio subtus toment
Dill. elth. 81. *t.* 69. *f.* 80.
Habitat in Carolina. ♃

virginianus. 18. CARDUUS caule folioso unifloro, foliis lance
tis spinulosis: subtus tomentosis, caule ine
Gron. virg. 117.
Cirsium minus virginianum, singulari capitulo, c
folioso. *Morif. hist.* 3. *p.* 150. *Raj. suppl.* 197.
Habitat in Virginia.

tuberosus. 19. CARDUUS foliis petiolatis subdecurrentibus
pinnatifidis spinosis, caule inermi, floribus solit
Jacq. vind. 280. * *Gouan. monsp.* 423.
Carduus foliis semipinnatis: pinnis semibilobis, c
tulis inermibus singularibus. *Sauv. monsp.* 292.
Carduus pratensis, asphodeli radice, latifolius. *B*
pin. 377. *Morif. hist.* 3. *f.* 7. *t.* 29. *f.* 27. 28.
Carduus bulbosus monspeliensium. *Lob. ic.* 10.
β. Carduus pratensis, asphodeli radice, foliis tenu
incisis. *Bauh. pin.* 377.
Jacea aculeata s. tuberosa. *Tabern. ic.* 154.
Habitat Monspelii, Lipsiæ, *inque* Bohemiæ, Austr
Helvetiæ *inundatis.*

heterophyllus. 20. CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis c
tis integris laciniatisque, caule subunifloro, cal
inermi. *Hort. cliff.* 392. * *Fl. svec.* 657; 721. * *I*
lugdb. 134. *Gmel. sib.* 2. *p.* 51. *Mees. frisl.* 339. *G*
ingr. 128.
Carduus calyce inermi, foliis lanceolatis margine
liatis. *Fl. lapp.* 192.

Ci

Cirſium maximum, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 377.
Habitat in Europæ *frigidioris pratis depreſſis.* ♃
Caulis *ſeſquipedalis ſ. brevior:* Foliis 5 *ad* 10; *non dentatis, ciliatis.* Radix *repens, nodoſa ſ. tuberoſa.*

CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis: ſpinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 392. *Hort. upſ.* 250. * — **helenioides.**
Cirſium foliis longe lanceolatis ſerratis: ſubtus tomentoſis. *Hall. helv.* 683. *t.* 21.
Cirſium ſingulari capitulo ſquamato, vel incanum alterum. *Bauh. pin.* 377. *Mill. dict. t.* 94.
Circium anglicum, radice hellebori nigri modo fibroſa, folio longo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 45?
Carduus mollis, foliis helenii. *Bauh. pin.* 377. *videtur.*
Habitat in Anglia, Sibiria. ♃
Antecedenti *ſimillimus, ſed duplo ſ. homine altior.* Radix *vix repens, foliis omnibus indiviſis, ſubtus albis, at non ut illi niveis.* Caulis *ſulcatus, totus folioſus:* Foliis 40 *ad* 50, *ſemiamplexicaulibus (auriculis rotundis, reflexis, adnatis), dentatis, ciliatis ſpinis inermibus; Floralibus ſubulatis.*

CARDUUS foliis ſubamplexicaulibus: lanceolatis integris: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, pedunculis unifloris. *Hort. upſ.* 248. (*ſub Serratula*) * *Sauv. monſp.* 79. *Jacq. vind.* 281. * — **ſerratuloides.**
Carduus calycibus inermibus acutis, foliis utrinque viridibus firmis integerrimis inæqualiter ciliatis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 52. *t.* 22. & 23. *f.* 1.
Cirſium anguſtifolium non laciniatum. *Bauh. pin.* 377.
Cirſium pannonicum 1. pratenſe. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 148.
Habitat in Sibiria, Helvetia, Monſpelii. ♃
Differt *a præcedenti ſimillimo: Caule dimidio minore, vix ſulcato; Foliis anguſtioribus, floralibus lanceolatis, nec ſubulatis.*

CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, floribus triphyllis. — **tataricus.**
Habitat in Sibiria. ♃
Habitus & *altitudo C. Serratuloidis, ut facile pro varietate ſumeretur, a quo differt* Foliis *duplo latioribus, magis dentatis: vix ac ne vix ſubtus tomentoſis;* Capitulis *foliolis* 3, *rarius duobus obvallatis, nec unico, ut ille.* Foliis *baſi pungentibus.* Floribus *caly-*

ce cylindrico, nec globoso. Colore *florum albo* [illegible] *purpureo, at Pappo plumoso convenit, imprimis* [illegible] *Foliis radicalibus pinnatifidis. Convenit vero cum C*[illegible] *co oleraceo his foliis; calycum squamis carina alba. Florum disco fastigiato, nec convexo; sed folia su*[illegible] *riora indivisa; flores solitarii, longe pedunculati. Fo*[illegible] *lia floralia parva, nec lata concava s. pallida.*

flavescens. 24. CARDUUS foliis lanceolatis integris inermibus de[illegible] tatis glabris, floribus aphyllis inermi-spinosis.
Habitat in Hispania. *Læfling.*
Caulis *lævis.* Folia *lanceolata, basi attenuata, argu*[illegible] *dentata, inermia.* Calyces *cylindrico-ovati, termin*[illegible] *ti squamis aciformibus, mitibus, patulis.* Corolla *al*[illegible] *bo-flavescens.*

mollis. 25. CARDUUS foliis pinnatifidis linearibus subtus tomentosis, caule inermi unifloro. *Amœn. acad.* 4. [illegible] 328. * *Jacq. vind.* 276. *
Carduus mollis, laciniato folio. *Bauh. pin.* 377.
Carduus mollior. 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 151.
Habitat in alpinis Austriæ.

acaulis. 26. CARDUUS acaulis, calyce glabro. *It. gotl.* 297. *Fl. svec.* 656; 722. *Dalib. parif.* 248.
Carlina acaulis, minore purpureo flore. *Bauh. pin.* 380
Chamæleon exiguus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 62.
Habitat in Europæ *pascuis apricis depressis.* ♃

CNICUS.

oleraceus. 1. CNICUS foliis pinnatifidis carinatis nudis bracteis subcoloratis integris concavis. *Hort. cliff.* 394. *Fl. svec.* 711; 723.
Carduus pratensis latifolius. *Bauh. pin.* 376.
Carduus pratensis. *Lob. ic.* 2. *p.* 11.
β. Cirsium latissimum. *Bauh. pin.* 177.
Habitat in Europæ *septentrionalioris pratis subnemorosis.* ♃
Calyces *laterales sessiles, sæpius bini, intermedio subpedunculato. Lineola alba secundum carinam squamarum calycis.*

pygmæus. 2. CNICUS caule unifloro, foliis sublinearibus sessilibus confertissimis, calyce inermi. *Jacq. vind.* 282. *t.* 8. *
Carduus mollis, folio oblongo, cirsii capitulo. *Bauh. pin.* 377.

Car-

Carduus mollior humilis angustifolius. *Clus. hist.* 2. *p.* 151.
Habitat in Schneeberg *Austriæ.* ♃

CNICUS foliis amplexicaulibus sinuato-pinnatis spinosis, caule simplici, floribus sessilibus. **spinosissimus,**
Carlina polycephalos alba. *Bauh. pin.* 380.
Cirsium alpinum spinosissimum, floribus ochroleucis inter flavescentia folia congestis. *Hall. helv.* 679. *t.* 20.
Cirsium spinosum capitulis in vertice inter foliorum valla congestis nudis inermibus. *Gmel. sib.* 2. *p.* 64. *t.* 25.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Tatariæ.
Confer. Carduus pygmæus. *Jacq. vind.* 282. *t.* 8. *sed monoclonos.*

CNICUS foliis amplexicaulibus pinnatifidis hirsutis, calycibus nutantibus glutinosis. **Erisithales**
Carduus foliis amplexicaulibus pinnatifidis: laciniis lanceolatis spinuloso-ciliatis, calycibus glutinosis nutantibus. *Jacq. vind.* 279. *
Carduus pratensis, foliis tenuibus laciniatis. *Bauh. pin.* 377.
Carduo-Cirsium maximum profunde laciniatum in foliorum ambitu spinis mollibus hirtum. *Pluk. phyt.* 154. *f.* 2. (*sed flore purpureo*)
Cirsium acanthoides montanum, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 448.
Erisithales. *Dalech. hist.* 1094.
Habitat in Austriæ, Galliæ *pratis subalpinis.* ♃

CNICUS foliis pinnatifidis, squamis calycinis membranaceis. **Centauroides.**
Carduus inermis, foliis pinnatifidis serratis inermibus, squamis calycinis membranaceis acuminato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 392.
Centaurium majus, foliis cinaræ cornuti. *Moris. hist.* 3. *p.* 131. *f.* 7. *t.* 25. *f.* 2.
Habitat in Pyrenæis. ♃

CNICUS foliis cordatis, petiolis crispis spinosis amplexicaulibus, floribus cernuis. *Hort. ups.* 251. * **cernuus.**
Carduus foliis ex cordato lanceolatis margine serratis & spinosis, squamis calycum membranaceis laceris

 spino-

ſpinoſis, capitulis nutantibus. *Gmel. ſibir.* 2. *p.*
t. 19.
Habitat in Sibiria. ♃

arna. 7. CNICUS foliis decurrentibus lanceolatis indivi calycibus pinnato-ſpinoſis. *Gouan. monſp.* 423.
Carduus Acarna. *Sp. pl.* 1. *p.* 820.
Carduus caule alato ſpinoſo, foliis ſpinoſis ſpinis plicibus. *Roy. lugdb.* 133.
Acarna major, caule folioſo. *Bauh. pin.* 379.
Chamæleon ſalmanticenſis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 155.
β. Acarna humilis, caule folioſo. *Bauh. pin.* 379.
Picnomon cretæ ſolonenſis. *Dalech. hiſt.* 1456.
Habitat in Hiſpaniæ *arvis.*
Habitus *Carlinæ. Facies Carthami.* Caulis *ſimplex,* *perne corymboſus.* Folia *adnata, caneſcentia, cili* *ſpinis geminis tranſverſis flavis.* Flores *terminal* *demum axillares, ſeſſiles.* Calyces *oblongi, imbric* *ſquamis apice Spinis innocuis, pinnatis ex ſpinulis* *patentibus.* Corollæ *parvæ, purpuraſcentes.*

ONOPORDUM.

anthium. 1. ONOPORDUM calycibus ſquarroſis: ſpinis ſub latis, foliis ovato-oblongis ſinuatis.
Onopordum foliis decurrentibus margine ſpinoſis. *Ho cliff.* 393. *Fl. ſvec.* 653; 724. *Roy. lugdb.* 1 *Dalib. pariſ.* 246.
Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris. *Bauh. p* 382. *Læſ. pruſſ.* 261. *t.* 82.
Acanthium. *Dod. pempt.* 721.
Habitat in Europæ *ruderatis, cultis.* ♂

yricum. 2. ONOPORDUM calycibus ſquarroſis: ſpinis lance latis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Gouan. monſ* 424.
Onopordum foliis decurrentibus ligulatis pinnatifidis *Sauv. monſp.* 290.
Spina tomentoſa altera ſpinoſior. *Bauh. pin.* 382.
Carduus, quibusdam dictus Acanthium illyricum *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 55.
Acanthium illyricum. *Lob. ic.* 1. *Barr. ic.* 501.
Habitat in Europa *auſtrali.*
Folia *vix caule latiora. Sauv.* Calycis *ſquamæ latio* *res apice purpuraſcentes.*

3. ONO-

ONOPORDUM calycibus imbricatis. *Hort. upf.* 249. — arabicum.
Carduus tomentofus, acanthi folio, altiffimus lufitanicus. *Tournef. inft.* 441.
Carduus tomentofus Acanthium dictus, arabicus. *Pluk. alm.* 85. *t.* 154. *f.* 5.
Carduus tomentofus, acanthi folio, altiffimus lufitanicus. *Barr. ic.* 501.
Acanthium altiffimum lufitanicum. *Morif. hift.* 3. *p.* 153.
Habitat in Lufitania, G. Narbonenfi. ♂

ONOPORDUM fubacaule. † — acaulon.
Onopordon acaulon ferme, flore albicante. *Juff. Vaill. act.* 153. *Hall. gœt.* 357.
Habitat - - - - - -

CYNARA.

CYNARA foliis fubfpinofis pinnatis indivifisque, calycinis fquamis ovatis. *Gouan. monfp.* 425. — Scolymus.
Cynara foliis pinnatis: laciniis ferratis. *Hort. cliff.* 394. *Hort. upf.* 251. *Roy. lugdb.* 135.
Cinara fylveftris latifolia. *Bauh. pin.* 384.
Cinara hortenfis aculeata. *Bauh. pin.* 383.
Scolymus diofcoridis. *Cluf. hift.* 2. *p.* 153.
Cynara hortenfis, foliis non aculeatis. *Bauh. pin.* 383.
Habitat in G. Narbonenfis, Italiæ, Siciliæ *agris.* ♃

CYNARA foliis fpinofis: omnibus pinnatifidis, calycinis fquamis ovatis. — Cardunculus.
Cinara foliis pinnatis: foliolis oblongis indivifis, caule fpinofo. *Sauv. meth.* 239.
Cinara fpinofa, cujus pediculi efitantur. *Bauh. pin.* 383.
Scolymus aculeatus. *Tabern. hift.* 1075.
Habitat in Creta. ♃
Hybridam *f. natam ex præcedentis femine afferverat* J. B. Flos *faturate cæruleus corollis & piftillis, at ftamina grifea.*

CYNARA foliis fpinofis pinnatifidis fubtus tomentofis, calycibus fquamis fubulatis. — humilis.
Cinara fylveftris bætica. *Cluf. cur.* 35.
Carduus tingitanus, flore magno cæruleo, folio atra-

ctylidis divisura subtus incano, spinis durio[...] horrido. *Pluk. alm.* 85. *t.* 81. *f.* 2.

Carduus humilis tingitanus cæruleus, magno strob[...] tenuius laciniatus. *Moris. hist.* 3. *p.* 158.

Habitat in agro Tingitano, *in* Bætica. ♃

Conf. Carduus andalusiacus. *Pluk. alm.* 85. *t.* [...] *Moris. hist.* 3. *p.* 158.

Semina *in hac specie minore, reliquis longe majora* [...] *singularia.* Caulis *longitudine vix foliorum.* Ca[...] *ovato-oblongis squamis patentibus.*

[...]aulis. 4. CYNARA acaulos, foliis pinnatis inermibus [...] glabris.

Cinara acaulos tunetana Tafga dicta, magno flore [...] viter olente. *Till. pis.* 41. *t.* 20.

Habitat in Barbaria. ♃

CARLINA.

[...]aulis. 1. CARLINA caule unifloro flore breviore. *Hort.* [...] 395. *Hort. upsf.* 252. *Mat. med.* 378. *Roy. lugdb.* [...] *Sauv. monsp.* 293. *Gouan. monsp.* 426.

Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.

Chamæleon albus. *Clus. hist.* 2. *p.* 155. *Cam.* [...] 428.

Habitat in Italiæ, Germaniæ *montibus apricis.* ♃

[...]nata. 2. CARLINA caule submultifloro lanato: calyci[...] radio purpureis.

Carlina caule trifloro dichotomo: intermedio sess[...] *Sauv. monsp.* 293. *Gouan. monsp.* 426.

Carlina flore purpureo rubente patulo. T. *Garid. aix.* 86. *t.* 21.

Acarna atractylidis folio, amplo flore. *Barr. ic.* 483.

Acarna flore purpureo rubente patulo. *Bauh. pin.* 379.

Acanthoides parva apula. *Col. ecphr.* 1. *p.* 29. *t.* 27. *f.* 2.

Habitat in Italia, G. Narbonensi. ☉

Calyx *squamis lateralibus inermibus; interioribus pur-pureis, cæterum triplo major quam C. vulgaris.* Ra-mi *simplices interdum ex alis proveniunt.* Planta *de-florata exuit lanam. Succo scatet sanguineo.*

[...]rymbosa. 3. CARLINA caule multifloro subdiviso, floribus sessi-libus, calycibus radio flavis. *Roy. lugdb.* 135.

Acarna capitulis parvis luteis in umbella. *Bauh. pin.* 379.

Acarna

ıa apula umbellata. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 27.
na ſylveſtris multicaulis, flore flavo, radice pe-
ni. *Raj. extr.* 86.
ıa ſylveſtris, flore aureo, perennis. *Tournef. inſt.*
l.
ıa patula, atractylis folio & facie. *Tournef. inſt.*
).
at in Italiæ *verſuris, a mari non remotis.* ♃

LINA caule multifloro corymboſo, floribus ter- ıalibus, calycibus radio albis. *Hort. cliff.* 395. *Fl.* '. 652; 725. *Roy. lugdb.* 135. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 82. — vulgaris.
ıa ſylveſtris vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 155.
ıs ſylveſtris ſpinoſior. *Bauh. pin.* 378.
ɫylis mitior. *Fuchſ. hiſt.* 121.
at in Europæ *montoſis, aridis, ſabuloſis.* ♂
obſervent Botanici auſtrales, qui queant 2, 3, 4,
uo colore, rite diſtingui.

LINA floribus ſeſſilibus lateralibus pauciſſimis. — racemoſa.
v. meth. 293. *Gouan. monſp.* 426. *
ıa ſylveſtris minor hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 157.
ıa flore luteo patulo. *Bauh. pin.* 379.
at in Hiſpaniæ *deſertis.* ⊙

LINA caule multifloro, foliis decurrentibus. — pyrenaica.
ıus tomentoſus pyrenaicus ſpinoſiſſimus, flore
). *Burſ. XXI.* 43.
at in Pyrenæis *verſus Hiſpaniam copioſe.*
us *Onopordi, magnitudo antecedentis. Tota plan-*
villis lanata. Folia *pinnata, lobis rotundatis,*
isque validis armatis, decurrentia per caulem tota-
r ſpinis æque validis. Calyces *copioſi in ſum-*
caule: ſquamis lanceolatis, longitudine floris, mu-
natis: interioribus longioribus, membranaceis, lan-
latis, albis.

ILINA caule ramoſo, calycibus ſpinis ciliatis. — atractyloides.
ıæn. acad. 6. *afr.* 46.*
na polycephalos, polyacanthæ vulgari ſimilis,
ılopica. *Pluk. alm.* 86. *t.* 273. *f.* 4. *mala.*
tat ad Cap. b. Spei.

ATRACTYLIS.

ACTYLIS flore acauli. — gummifera.

Cnicus, carlinæ folio, acaulos gummifer acul
Tournef. cor. 33.
Carlina acaulos gummifera. *Bauh. pin.* 380.
Carduus pinea theophrasti. *Alp. exot.* 126. *t.* 124
Chameleon albus dioscoridis. *Colum. ecphr.* 1. *p.* 1
Habitat in Creta, Italia.

humilis. 2. ATRACTYLIS foliis dentato-sinuatis, flore
to: obvallato involucro patente, caule herb
Atractylis rediata squamis calycinis truncatis c
nula setacea. *Loefl. it.* 161. *
Cnicus aculeatus purpureus humilior. *Tournef. inf*
Crocodiloides atractylidis folio, flore purpureo
nato. *Vaill. act.* 1718. *p.* 172.
β. Carlina minima caulodes hispanica. *Barr. rar.*
t. 592.
Habitat Madriti *in collibus.* ♂
Habitus *A. cancellatæ*, *sed* folia *sinuata.* Flos ra
Calycis *squamæ mucronatæ.* Involucrum *ex*
veris patentibus.
Varietas β differt Calycis squamis ovatis nec retusis, s
spinula terminatis.

cancellata. 3. ATRACTYLIS involucris cancellatis vent
linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribu
sculosis.
Atractylis foliis linearibus dentatis, calycibus c
ventibus. *Hort. cliff.* 395. *Roy. lugdb.* 137.
Atractylis flore radiato nudo, calyce inermi in
cro connivente obtecto. *Loefl. it.* 162. *
Acarna capitulis globosis. *Bauh. pin.* 379.
Eryngium parvum palmare, foliis serratis. *Mori*
3. *p.* 166. *f.* 7. *t.* 36. *f.* 16.
Carduus parvus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 93. *Raj. hist.* 3
Carduus minimus. *Alp. exot.* 254.
Habitat in Hispaniæ, Siciliæ, Cretæ *agris.* ⊙
Receptaculum *tectum paleis coalitis.* Pappus *plu*
basi quasi monophyllos sub florescentia, corolluli
gior. Læfling.

CARTHAMUS.

tinctorius. 1. CARTHAMUS foliis ovatis integris serrato-ac
tis. *Hort. cliff.* 394. *Hort. upf.* 251. *Mat. med.*
Hasselq. it. 483.

Cnic

ativus f. Carthamus officinarum. *Bauh. pin.*
Rumph. amb. 5. *p. t.* 79.
ulgaris. *Cluf. hift.* 2. *p.* 152.
n Ægypto. ⊙

HAMUS caule pilofo: fuperne lanato, foliis **lanatus.**
oribus pinnatifidis, fummis amplexicaulibus
is. *Hort. upf.* 251. *Sauv. monfp.* 292. *Gouan.*
427.
us foliis amplexicaulibus acuminato-dentatis.
cliff. 394. *Dalib. parif.* 250.
is lutea. *Bauh. pin.* 379.
lis theophrafti & diofcoridis fucco fanguineo.
phr. 1. *p.* 19. *t.* 23.
is. *Dod. pempt.* 736.
in Gallia, Italia, Creta. ⊙

HAMUS caule læviufculo, calycibus fubla- **creticus.**
flofculis fubnovenis, foliis inferioribus lyra-
ummis femiamplexicaulibus dentatis.
lis flore leucophæo. *Vaill. act.* 172. *Hall. goett.*

creticus, atractylidis folio & facie, flore leu-
eo f. candidiffimo. *Tournef. cor.* 33.
in Creta.
C. lanati, fed magis lævis. Folia *nitidiora den-*
paucioribus. Calyces *enneaphyllis flofculis cir-*
). at in altero longe numerofiores. Semina *pap-*
radii nuda. H.

HAMUS foliis radicalibus pinnatis, caulinis **tingitanus.**
tifidis, caule unifloro.
cæruleus erectus, cnici foliis diffectioribus.
f. hift. 3. *p.* 159. *f.* 7. *t.* 34. *f.* 19.
in Agro tingitano, Algiriæ. ♃
Radicalia omnino pinnata, Caulina pinnatifida,
us fpinofis. Caulis *vix ramofus.* Affinis *nimium*
ruleo.

HAMUS foliis lanceolatis fpinofo-dentatis, **cæruleus.**
fubunifloro. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 136.
cæruleus afperior. *Bauh. pin.* 378.
alter clufii, cæruleo flore. *Cluf. hift.* 2. *p.* 152.
in Hifpania *inter fegetes.* ♃
fimpliciffimi, fæpe procumbentes, pilofi, uniflori.

Folia

Folia *ſupra glabra.* Calyx *folioſus.* Flos
antheris nigris. Semina pappo piloſo.

mitiſſimus. 6. CARTHAMUS foliis inermibus: radicalibus
tis, caulinis pinnatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 330.
pariſ. 250.
Carthamoides cærulea humilis & mitior. *Vaill. ac*
772.
Carduncellus montis lupi minor ſpecies. *Mo*
3. *p.* 159.
Habitat circa Pariſios.
Semina pappo piloſo. V.

Carduncellus. 7. CARTHAMUS foliis caulinis linearibus pinn
gitudine plantæ. *Gouan. monſp.* 427.
Carthamus foliis caule longioribus ligulatis p
dis. *Sauv. monſp.* 292. *
Carthamus foliis radicalibus ſuperne ſerratis,
dentatis; caulinis dentato-pinnatis. *Roy. lug*
Cnicus cæruleus humilis montis lupi. *Hen*
164.
Carduncellus montis lupi. *Lob. ic.* 2. *p.* 20.
Eryngium montanum minimum, capitulo
Bauh. pin. 386.
Habitat Monſpelii.
Semina pappo piloſo. V.

corymboſus 8. CARTHAMUS floribus corymboſis numero
Echinops floribus faſciculatis, calycibus mu
Hort. cliff. 391. *Gron. orient.* 250.
Chamæleon niger. *Dalech. hiſt.* 1454. *Dod*
727.
Chameleon niger umbellatus, flore cæruleo
thino. *Bauh. pin.* 380.
Carduus Chamæleon dictus, capitulis pluribu
ribus cæruleis corymbatim diſpoſitis. *Mori*
p. 159. *ſ.* 7. *t.* 33. *f.* 17.
Habitat in Apuliæ, Helleſponti, Lemni,
campis. ♃
Habitus Echinopſis. Fructificatio Carthami.

arboreſcens. 9. CARTHAMUS foliis enſiformibus ſinuato-
Roy. lugdb. 138.
Carthamoides lutea altiſſima & fœtidiſſima. *V*
1718. *p.* 772.
Cnicus hiſpanicus arboreſcens fœtidiſſimus.
inſt. 451.

at in Hiſpania. ♄
a pappo piloſo. V.

BIDENS.

* *Diſcoideæ.*

ENS foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſemini- erectis. tripartita.
s corona ſeminum retrorſum aculeata, ſeminibus ctis. *Hort. cliff.* 399. *Fl. ſvec.* 663; 726. *Roy.* b. 157. *Gron. orient.* 255.
s foliis tripartito-diviſis. *Tournef. inſt.* 462. *Fl.* 294.
ina aquatica folio tripartitim diviſo. *Bauh. pin.*

orium aquatile. *Dod. pempt.* 595.
t *in* Europæ *inundatis.* ⊙

ENS foliis lanceolatis ſeſſilibus floribus ſemini- que erectis. *Hudſ. angl.* 310. minima.
ina minima. *Dill. giſſ.* 167. *app.* 66. *Raj. angl.* 188. *t.* 7. *f.* 2.
t *in* Europæ *ſeptentrionalioris paludoſis.* ⊙

ENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus nis, ſeminibus erectis. *Fl. ſvec.* 664, 727. cernua.
bina aquatica, folio non diviſo. *Bauh. pin.* 321.
orium cannabinum chryſanthemum. *Tabern. ic.*

t *in* Europa *ad fontes & foſſas.* ⊙
tur Coreopſis bidentis *ejusque affinitas.*

ENS foliis oblongis integerrimis unidentatis, cau- chotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. nodiflora
s nodiflora, brunellæ folio. *Dill. elth.* 52. *t.* 44.

t *in* Benghala.
dodrantalis, *teretiuſculus*, *hirtus pilis albis baſi pureis.* Rami *brachiati*, *patuli.* Folia *petiolata*, *(hortenſi)*, *angulato-dentata*, *obtuſiuſcula*, *ſupra* , *ſubtus ſecundum venas piloſa*, *petiolis latiuſcu-* Pedunculi *terminales*, *cauli ſimiles*, *longitudine rum.* Calyx *cylindricus*, *cinctus foliis oblongis*, caly-

calyce longioribus, patentibus. Flosculi *rari, fidi, nonnulli quinquefidi, lutei.*

tenella. 5. BIDENS foliis linearibus, pedunculis capil calycibus subtetraphyllis, seminibus erecti *Amæn. acad. 6. afr. 47.* *
Habitat ad Cap. b. Spei. ⊙

frondosa. 6. BIDENS foliis pinnatis serratis lineatis gla minibus erectis, calycibus foliosis, caule
Bidens canadensis latifolia, flore luteo. *Tour* 362.
Chrysanthemum cannabinum bidens virginian le erecto firmo subrubente. *Moris. hist.* 3. 6. *t.* 5. *f.* 21.
Habitat in America *septentrionali.* ⊙
Folia *ternata aut ex 5. pinnata, supra glabra, serrata.* Calyces *frondosi,* Flos *flosculosus nico.* Semina *non divergentia, dimidio tant stiora quam longa: Aristis duabus, divaricati* lis *lævis, pedunculis folio longioribus.*

pilosa. 7. BIDENS foliis pinnatis subpilosis, caulis barbatis, calycibus involucro simplici, se divergentibus.
Bidens corona seminum retrorsum aculeata, se undique patentibus. *Hort. cliff.* 399. * *Hort.*
Bidens latifolia hirsutior, semine angustiore *Dill. elth.* 51. *t.* 43. *f.* 51.
Habitat in America. ⊙
Caulis *genicula barbata.* Folia *pinnata: foliolis mis coadunatis.* Florum *discus conicus:* Sem *intermediis longioribus; maturescentibus diverge*

bipinnata. 8. BIDENS foliis bipinnatis incisis, calycibus lucratis, corollis semiradiatis, seminibus di tibus.
Chrysanthemum aquaticum foliis multifidis cicuta nihil similibus, virginianum. *Herm. lugdb.* 416
Chrysanthemum americanum, coridis indi folio. *par.* 123. *t.* 123.
Chrysanthemum cannabinum bidens virginianum cutariæ foliis, flosculis conniventibus. *Moris.* 3. *p.* 17. *f.* 6. *t.* 7. *f.* 23.
Habitat in Virginia. ⊙

Consi

Chryſanthemum chinenſe, foliis plurifariam is halicacabi peregrini æmulis. *Pluk. phyt.* 22.

nthemum curaſſavicum, foliis multifidis latiori- ſeminibus longiſſimis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 17. *interdum carent radio, interdum floſculo uno al- e radiante & ſterili inſtructi ſunt.* Semina *diver- t Ariſtis* 3. *intermedia longiſſima.*

NS foliis ſimplicibus ſubhaſtatis ſerratis petiola- floribus globoſis, pedunculis elongatis, ſemi- s lævibus. — nivea.
foliis cordatis ſerratis petiolatis, floribus glo- , pedunculis filiformibus. *Roy. lugdb.* 158.
:ephalus foliis cordatis ſ. triangularibus, flore *Vaill. act.* 1720. *p.* 327. *vide Dill. elth. t.* 47. . *n.* 3.
ſcabra, flore niveo, folio trilobato. *Dill. elth.* . 47. *f.* 55.
; ſcabra, flore niveo, folio panduræformi. *elth.* 54. *t.* 46. *f.* 54.
in Carolina. ♃
ſubimbricati. Semina 2. *ariſtis.*

:NS foliis oblongis integris: inferne alternis, ſu- e oppoſitis, floribus verticillatis. *Hort. cliff.* — verticillata.
americana procumbens, polygoni folio ſubtus io. *Houſt. mſſ.*
in Vera Cruce.

:NS foliis oppoſitis ovatis acuminatis integer- s, caule ſcandente fruticoſo, floribus oppoſitis :ulatis. *Hort. cliff.* 399. * — ſcandens.
: *in* Vera Cruce.
:NS foliis ovatis ſerratis: inferioribus oppo- ſuperioribus ternatis: intermedio majore. — bullata.
in America. ☉
erectus, bipedalis. Folia *ſubovata, ſerrata, craſ- illoſa, fere bullata: inferiora ſimplicia; ſuperiora nata, ſubſeſſilia: foliolis lateralibus minimis.* Flo- *axillares & terminales, ſolitarii, ſubſeſſiles, lutei: ces baſi cincti foliolis ovato-oblongis, quinis, tibus. Semina Ariſtis* 2, *retro ciliatis.*

13. BI-

atriplicifolia. 13. BIDENS foliis alternis deltoidibus dentatis p stipulatis, caule paniculato. *Amœn. acad.* 4.
Habitat in America *meridionali. Miller.*
Semina mutica & Receptaculum conicum sunt; *set proprio sub genere tradi.*

CACALIA.

* *Frutescentes.*

papillaris. 1. CACALIA caule fruticoso obvallato spinis ribus truncatis.
Kleinia caule carnoso, petiolis truncatis obvalla *cliff.* 395.
Cacalianthemum caudice papillari. *Dill. elth.* 6 *f.* 63.
Habitat in Æthiopia. ♄

Anteuphorbium. 2. CACALIA caule fruticoso, foliis ovato-oblon tiolis basi linea triplici deductis.
Kleinia foliis carnosis planis ovato-oblongis. *H* 395.
Ante Euphorbium. *Bauh. pin.* 387. *Dod. pem* *Moris. hist.* 3. *p.* 345. *s.* 7. *t.* 37. *f.* 10. *Dill.* *t.* 55. *f.* 2. 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

Kleinia. 3. CACALIA caule fruticoso composito, foliis latis planis, petiolorum cicatricibus obsolet
Kleinia foliis lanceolatis planis, caule lævi ver *Hort. cliff.* 395.
Cacalianthemum folio nerii glauco. *Dill. elth.* 6 *f.* 2.
Frutex indiæ orientalis, lavendulæ folio. *B.* 401.
Nec Cacalia, nec Cacaliastrum, an Tithymaloi tescens nerii folio. *Klein. monogr.*
Habitat in Canariis, *forte etiam in* India. ♄

Ficoides. 4. CACALIA caule fruticoso, foliis compressis sis.
Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, c reti. *Hort. cliff.* 395.
Senecio africanus arborescens, ficoidis folio *Comm. rar.* 40. *t.* 40. *Bradl. succ.* 5 *p.* 11. *t.* 4
Habitat in Æthiopia. ♄

**

* * *Herbaceæ.*

ↃALIA caule herbaceo indiviſo, foliis ellipticis Porphyllum
ↄcrenatis.
phyllum foliis ellipticis. *Hort. cliff.* 494. *
tes foliis integris perforatis. *Plum. ſpec.* 10.
cio indicus, atriplicis folio glabro. *Moriſ. hiſt.* 3.
106. *ſ.* 7. *t.* 17. *f.* 7.
ſanthemum americanum fruteſcens, balſaminæ
iis nigris maculis punctatis. *Pluk. alm.* 100. *t.* 161.
1.
tat in America. ☉

CALIA caule herbaceo, foliis lyratis amplexi- ſonchifolia.
ulibus dentatis.
ia caule herbaceo, foliis lyratis. *Fl. zeyl.* 305. *
cio maderaſpatanus, ſinapios folio, floribus par-
s luteis. *Pluk. amalth.* 192. *t.* 444. *f.* 1.
drilla zeylanica minor marina, folio ſinapios.
rm. zeyl. 61.
hus amboinenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 297. *t.* 103.
1.
lina luzonum, flore purpureo. *Pet. gaz. t.* 80.
13. *Camell. luz.* 3 *n.* 8.
at in Zeylona, China. ☉

ↃALIA caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis. incana.
at in India.
ta *Verbeſinæ alatæ.* Caulis *erectus, altus.* Folia
*- lanceolata, vix petiolata, craſſiuſcula, ſerrato-
tata.* Pedunculi *terminales, ramoſi, longi, nudi,
ulo uno alterove minimo.*

ALIA caule herbaceo, foliis lanceolatis ſerratis ſaracenica.
urrentibus. †
ago foliis lanceolatis ſerratis decurrentibus, cau-
ngulato. *Monier. obſ.* 163 *Sauv. monſp.* 84. *Gouan.
ſp.* 444.
cio perennis, ſolidaginis folio. *Vaill. act.* 366.
aurea maxima, radice repente, ſ. Doria major
ens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 123.
aurea ſ. Solidago ſaracenica latifolia ſerrata.
h. hiſt. 2 *p.* 1063.
za montana, foliis longioribus ſerratis, flore e
hureo albicante. *Chom. act. par.* 1705. *p.* 394.
t in Gallia *auſtrali.* ♃

hastata. 9. CACALIA caule herbaceo, foliis trilobis acumi[natis] serratis.
Senecio foliis ex dentato trilobis acuminatis [ser...] *Gmel. sib. 2. p. 136. t. 66.*
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Caulis *erectus, altus, purpureus.* Folia *petiolata* [tri]*loba, lobis acuminatis: intermedio duplo majore* [ser]*rata inter lobos, basi rotundata, subtus parum* [...]*sa.* Flores *in panicula parva, pedunculis incanis tomentosis, absque bracteis setaceis, præterquam* [ad] *divisiones.* Facies *accedit ad C. suaveolentem.*

suaveolens. 10. CACALIA caule herbaceo, foliis hastato-sag[ittatis] denticulatis: petiolis superne dilatatis. *Hort. ups.*
Habitat in Virginia, Canada. ♃
Planta *humanæ altitudinis.* Folia *sagittato-tri*[angularia] *deltato-hastata, margine serrata; pedunculi, e*[t su]*pra ramificationes, bracteis setaceis adspersi,* [...] *nec incani.*

triplicifolia. 11. CACALIA caule herbaceo, foliis subcordat[is den]tato-sinuatis, calycibus quinquefloris. *Gron. vir*[g.]
Cacalia virginiana glabra, foliis deltoidibus sinua[tis] tus glaucis. *Moris. hist. 3. p. 94. s. 7. t. 15 f. 7.*
Porophyllum foliis deltoidibus angulatis. *Gron.* [virg.] *1. p. 94.*
Nardus americana procerior, foliis cæsiis. *Plu*[k. alm.] *251. t. 101. f. 2.*
Habitat in Virginia, Canada. ♃
Magnitudo & statura antecedentis. Folia *inferiora* [cor]*data, superiora latiora quam longa, sinuata,* [...] *glauca, lævia. Differt a præcedente non modo* [figura] *foliorum & glauco colore, sed & floribus* [...] *minoribus, tantum ex quinque flosculis compositis,* [...] *antecedentes gaudeant pluribus.*

alpina. 12. CACALIA foliis reniformibus acutis denticu[latis,] calycibus subtrifloris. *Gouan. monsp. 429.*
Cacalia. *Hall. helv. 705.*
Tussilago caule ramoso. *Roy. lugdb. 159. Sauv.* [...] 113.
α. Cacalia foliis crassis hirsutis. *Bauh. pin. 197.* [...] *hist. 3. p. 94. s. 7. t. 12. f. 1. Monnier. obs. 47.* [...] *opusc. 207.*
Cacalia incano folio. *Clus. hist. 2. p. 115.*

β. Ca[...]

[Ca]calia foliis cutaneis acutioribus & glabris. *Bauh. pin.* 198. *Morif. hift.* 3. *p.* 94. *f.* 7. *t.* 12. *f.* 6.
[Ca]calia glabro folio. *Cluf. hift.* 2. *p.* 115.
[Ca]calia. *Lob. ic.* 592.
[Hab]itat *in Alpibus* Helvetiæ, Auftriæ. ♃
[Ha]nc *fpeciem genere cum antecedentibus convenire docuit* [Ar]topfia, *hinc genere conjungendæ* Cacaliæ *cum* Kleiniis.
[Ca]lyx *hujus fpeciei flofculis* 3. *f.* 4. *tantum.*

ETHULIA.

[ET]HULIA floribus paniculatis. *Linn.* (*fil.*) *dec.* 1. [*p.*] 1. *t.* 1. — conyzoides.
[Hab]itat *in* India. ⊙
[Ang]ularis *flofculis diftantibus.*

[ET]HULIA floribus feffilibus lateralibus. † — Sparganophora.
[Spar]ganophoros virgæ aureæ folio, floribus e folio[r]um alis, absque pediculis. *Vaill. act.* 368.
[Ba]chium. *Brown. jam.* 312. *t.* 34. *f.* 2?
[Hab]itat *in* India.
[Hanc] *tam mihi ignotam ex charactere Vaillantii addidi.*

EUPATORIUM.

* *Calycibus quadrifloris.*

[EU]PATORIUM foliis lanceolatis venofis obfolete [se]rratis glabris, calycibus quadrifloris, caule fruticofo. — Dalea.
[Dale]a fruticofa, foliis oppofitis oblongis anguftis lub[se]rratis utrinque productis, racemis terminalibus.
[B]rown. *jam.* 314. *t.* 34. *f.* 1.
[Hab]itat *in* Jamaica. ♄

[EU]PATORIUM foliis lanceolato-linearibus triner[vi]is fubintegerrimis. — hyffopifolium.
[Eup]atorium virginianum, folio angufto, floribus albis. [D]ill. *elth.* 141. *t.* 115 *f.* 140.
[Eu]patorium virginianum, flore albo, hyffopi foliorum [æ]mulum. *Morif. hift.* 3. *p.* 98.
[Eu]patoria hirfuta, hyffopi foliorum æmula, virginiana. [Pl]uk. *alm.* 141. *t.* 88. *f.* 2. *Raj. fuppl.* 189.
[Hab]itat *in* Virginia. ♃

[EUP]ATORIUM caule volubili, foliis cordatis den[tat]is acutis. *Hort. cliff.* 396. *Hort. upf.* 253. *Roy.* [lug]db. 156. *Gron. virg.* 120. *Cold. noveb.* 182. — fcandens.

 Conyza

Conyza scandens, solani folio anguloso. *Plum.*
Clematitis novum genus, cucumeris folio, virgini
Pluk. alm. 109. *t.* 163. *f.* 3.
Habitat in aquosis Virginiæ. ♃

houstonis. 4. EUPATORIUM caule volubili, foliis ovatis gerrimis. *Hort. cliff.* 396. *
Eupatorium foliis cordatis acuminatis, caule vo floribus spicatis racemosis. *Mill. dict.* 16.
Conyza americana scandens, foliis subrotundis natis, floribus spicatis: singulis quatuor flo constantibus. *Amm. herb.* 451.
Habitat in Vera Cruce.

* * *Calycibus quinquefloris.*

hastatum. 5. EUPATORIUM caule volubili, foliis cordato-tis subdentatis nudis, floribus spicatis. *Amæn.* 405.
Kleinia scandens, foliis triangularibus angulis *Brown. jam.* 316. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in Jamaica.

zeylanicum. 6. EUPATORIUM foliis ovato-hastatis peti dentatis. *Fl. zeyl.* 306. *
Eupatorium zeylanicum, foliis dentatis ad ped breves auriculatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 99.
Cacalia foliis auriculatis serratis supra nigrican infra lanugine alba obductis. *Burm. zeyl.* 52.
Jacobea, senecionis flore, zeylanica odorata. *Raj* 188.
Habitat in Zeylona.

sessilifolium 7. EUPATORIUM foliis sessilibus amplexicaulit stinctis lanceolatis. *Hort. upf.* 254.* *Gron. virg.*
Eupatorium virginianum, flore albo, foliis ment gustioribus sessilibus minutim dentatis. *Morif. p.* 98. *Raj. suppl.* 188.
Habitat in Virginia. ♃

chinense. 8. EUPATORIUM foliis ovatis petiolatis serrat
Habitat in China. *Osbeck.*
Caulis *teres, brachiatus, nudiusculus.* Folia *op ovata, acuminata, grosse serrata, petiolata,* *subtus pallidiora.* Corymbi *terminales, flosculis*

9. EU

EUPATORIUM foliis sessilibus distinctis subrotundo-cordatis. rotundifolium.
Eupatoria valerianoides virginiensis, trissaginis folio absque pediculis. *Pluk. alm.* 141. *t.* 88. *f.* 4. *Raj. suppl.* 189.
Scalia foliis rotundioribus ad caulem sessilibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 94.
Habitat in Virginia, Canada.

EUPATORIUM foliis lanceolatis nervosis: inferioribus extimo subserratis, caule suffruticoso. *Hort. upf.* 253. *Gron. virg.* 118. altissimum
Eupatorium virginianum, longissimis & angustissimis foliis. *Morif. hist.* 3. *p.* 97. *Raj. suppl.* 187.
Habitat in Pensylvania. ♃

EUPATORIUM foliis ternis. *Gron. virg.* 119. trifoliatum
Eupatorium caule erecto, foliis ovato-lanceolatis serratis petiolatis ternatis. *Gron. virg.* 1. *p.* 178.
Eupatorium cannabinum, foliis in caule ad genicula ternis, marilandicum. *Raj. suppl.* 189.
Habitat in Virginia.

EUPATORIUM foliis digitatis. *Hort. cliff.* 396. *Fl. svec.* 665; 728. *Mat. med.* 380. *Roy. lugdb.* 155. cannabinum.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.
Eupatorium adulterinum. *Fuchs. hist.* 265.
Habitat in Europa *ad aquas.* ♃

* * * *Calycibus octofloris.*

EUPATORIUM foliis quaternis scabris lanceolato-ovatis inæqualiter serratis rugosis petiolatis. purpureum
Eupatorium foliis verticillatis. *Cold. noveb.* 180.
Eupatorium foliis ovato-lanceolatis obtuse serratis in petiolos desinentibus. *Gron. virg.* 119.
Eupatorium enulæ folio. *Corn. canad.* 72. *t.* 72.
Eupatorium canadense elatius, longioribus foliis rugosis integris & caulibus ferrugineis. *Morif. hist.* 3. *p.* 97. *f.* 7. *t.* 13. *f.* 4.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Caulis *teres, erectus, viridis, ad exortum petiolorum purpurascens.* Folia *quina, lanceolato-ovata, serrata, rugosa, scabriuscula, petiolata, utrinque viridia.* Corymbus *terminalis.* Calyces *florum incarnati.* Flosculi *octo, Corollis albidis, Antheris purpureis, Stylis longissimis.*

aculatum. 14. EUPATORIUM foliis quinis subtomentosis ceolatis æqualiter serratis venosis petiolatis. *A acad.* 4. *p.* 288. *

Eupatorium foliis lanceolato-ovatis serratis petio caule erecto. *Hort. Cliff.* 396. *Roy. lugdb.* 155.

Eupatorium novæ angliæ, urticæ foliis, floribus purascentibus, caule maculato. *Herm. par.* 1 153. *Morif. hist.* 3. *p.* 97. *f.* 7. *t.* 18. *f.* 3. *Raj.* 187.

Habitat in America *septentrionali.* ♃.

Caulis lineis purpureis punctatus.

* * * * *Calycibus quindecim flosculis.*

erfoliatum 15. EUPATORIUM foliis connato-perfoliatis to tosis. *Hort. cliff.* 396. *Hort. upf.* 253. *Roy. lugdb Gron. virg.* 119. *Cold. noveb.* 181.

Eupatorium virginianum, salviæ foliis longissimis minatis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 140. *t.* 87. *f.* 6 *Raj. suppl.* 189.

Eupatorium virginianum, mucronatis rugosis & gissimis foliis, perfoliatum. *Morif. hist.* 3. *p.*

Habitat in Virginiæ *aquosis.* ♃

odoratum. 16. EUPATORIUM foliis deltoidibus inferne den subtus tomentosis, calycibus multifloris. *acad.* 5. *p.* 405. *

Eupatorium odoratum hirsutum, foliis ovatis minatis basin versus crenatis, floribus comosis. *B jam.* 313.

Eupatoria conyzoides, folio molli & incano, ca lis magnis, americana. *Pluk. phyt.* 177. *f.* 3.

Habitat in America.

Ivæfolium. 17. EUPATORIUM foliis angusto-lanceolatis t viis subserratis, calycibus squamosis multifl *Amœn. acad.* 5. *p.* 405. *

Habitat in Jamaica.

cæleſtinum. 18. EUPATORIUM foliis cordato-ovatis obtuse tis petiolatis, calycibus multifloris. *Gron. virg.*

Eupatorium foliis cordatis serratis petiolatis. *Gron.* 1. *p.* 94.

Eupatorium scorodoniæ folio, flore cæruleo. *Dil* 140 *t.* 114. *f.* 139.

Eupatorium marianum, scrophulariæ foliis, cap glob

globosis colore cœlestino. *Pluk. mant.* 71. *t.* 394. *f.* 4

Habitat in Carolina, Virginia.

* * * * * *Calycibus multifloris: viginti circiter flosculis.*

EUPATORIUM foliis ovatis obtuse serratis petiolatis triuerviis, calycibus simplicibus. *Gron. virg.* 120. | aromaticum

Eupatorium caule erecto ramoso, foliis ovatis obtuse serratis petiolatis. *Gron. virg.* 1. *p.* 177.

Eupatoria valerianoides, flore niveo, teucrii foliis cum pediculis, virginiana. *Pluk. alm.* 141. *t.* 88. *f.* 3. *Moris. hist.* 3. *p.* 98.

Habitat in Virginia. ♃

Caulis *teres, quadripedalis, strictus, ramis brachiatus, facie Scutellariæ.* Folia *ovato-oblonga, obtuse serrata, trinervia, subrugosa, petiolata.* Racemi *terminales.* Flores *calyce duplo longiores, toti nivei flosculis 18 ad 28, stylis vix flosculo longioribus. Differt a reliquis imprimis calycibus non imbricatis, sed ferme æqualibus & stylis non flore longioribus, uti Ageratum; sed huic pappus seminum verus. Affinis Agerati altissimi.*

* * * * * * *Obscuriora.*

EUPATORIUM foliis cordatis trinervatis serratis. † | macrophyllum.

Eupatorium pet sitidis folio. *Plum. spec.* 10. *ic.* 129.

Habitat in America.

EUPATORIUM foliis bipinnatifidis. † | sophiæfolium.

Eupatorium sophiæ folio, flore purpureo. *Plum. spec.* 9. *ic.* 128. *f.* 2.

Habitat in America.

AGERATUM.

AGERATUM foliis ovatis, caule piloso. | Conyzoides.

Ageratum. *Hort. cliff.* 396. *Hort. upf.* 253.

Eupatorium humile africanum, senecionis facie, folio lamii. *Herm. par.* 161. *t.* 161. *Pluk. phyt.* 88. *f.* 1.

Habitat in America. ⊙

AGERATUM foliis ovatis crenatis obtusis, caule glabro. | ciliare.

Centaurium ciliare minus bisnagaricum, origani foliis amplio-

amplioribus, floribus in umbellis. *Pluk. alm.* 9
81. *f.* 4.
Habitat in Bisnagaria.

ltissimum. 3. AGERATUM foliis ovato-cordatis rugosis: flo
bus alternis, caule glabro. *Gron. virg.* 120.
Eupatorium foliis ovatis serratis petiolatis, caule
bro. *Hort. upsf.* 254.
Eupatorium caule erecto, foliis cordatis serratis. *H*
clif. 396.
Eupatorium scrophulariæ foliis glabris, flore albo. *I*
ris. hist. 3. *p.* 98. *f.* 7. *t.* 18. *f.* 11.
Valeriana urticæ folio, flore albo. *Corn. canad.* 20. *t.*
Habitat in Canada, Virginia. ♃

PTERONIA.

mphorata. 1. PTERONIA. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 48.*
Pterophorus camphoratæ foliis ad margines pilo
Vaill. act. 375.
Conyza aromatica frutescens mauritanica, camph
tæ foliis ad margines pilosis, flore magno aureo
flosculis fistularibus composito. *Pluk. mant.* 56
345. *f.* 56. 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

STÆHELINA.

naphaloides. 1. STÆHELINA foliis tomentosis, squamis calyc
lanceolatis apice membranaceis reflexis.
Gnaphalium foliis linearibus, floribus terminalibus,
lycibus cylindriacis: squamis reflexis. *Roy. lugdb.* 1
Jacea æthiopica, stœchados citrinæ majoribus tom
tosis foliis, capitulorum spinis & squamulis ex au
colore nitentibus. *Pluk. alm.* 193. *t.* 302. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia.

dubia. 2. STHÆHELINA foliis linearibus denticulatis, squa
calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo l
giore. *Allion. nicæens.* 73.* *Gouan. monsp.* 430.*
Gnaphalium caule fruticoso, foliis linearibus denti
latis, capitulis oblongis. *Roy. lugdb.* 151.
Stœchas odorata purpurea. *Lob. illustr. Magn. mo*
247. 297.
Stœchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus. *B*
hist. 3. *p.* 156.

Elichry

hryſum ſylveſtre, flore oblongo. *Bauh. pin.* 265.
amæ-Chryſocome prælongis purpureisque jaceæ ca-
itulis. *Barr. ic.* 406.
a capitata, roſmarini folio. *Tournef. inſt.* 444.
itat in Hiſpania, G. Narbonenſi. ♄
*ularis planta quaſi media inter Serratulas, Gnapha-
a & Stæhelinas.* Pappus *ſimplex ut in S. gnapha-
ide, nec plumoſus.*

CHRYSOCOMA.

* *Fruteſcentes.*

RYSOCOMA fruticoſa, foliis oppoſitis obovatis, oppoſitifolia
oribus faſciculatis pedunculatis. *Amæn. acad, 6. afr.*
. *
nus arboreſcens minor, foliis majoranæ. *Breyn.*
t. 17. f. 2.
itat ad Cap. b. Spei. ♄

RYSOCOMA fruticoſa, foliis linearibus rectis Coma aurea.
abris. *Hort. cliff.* 397. *Hort. upſ.* 252. *Roy. lugdb.*
46.
yza æthiopica, flore bullato aureo, pinaſtri brevio-
bus foliis læte viridibus. *Pluk. alm.* 400. *t.* 327. *f.* 2.
chryſum africanum multiflorum tenuifolium fru-
ſcens. *Volk. norib.* 143. *t.* 148.
itat in Æthiopia. ♄

RYSOCOMA ſuffruticoſa, foliis linearibus re- cernua.
rvis ſubſcabris, floribus ante floreſcentiam cernuis.
rt. cliff. 397. * *Roy. lugdb.* 146.
a aurea africana fruticans, foliis linariæ anguſtis,
ajor. *Comm. hort.* 2. *p.* 89. *t.* 45.
itat in Æthiopia. ♄

RYSOCOMA ſuffruticoſa, foliis linearibus rectis ciliata.
liatis, ramis pubeſcentibus.
a africana fruticans, ericæ folio. *Comm. hort.* 2.
95. *t.* 48.
itat in Æthiopia. ♄

YSOCOMA ſuffruticoſa, foliis lanceolato-ova- ſcabra.
ecurvis denticulato-ſerratis, pedunculis pubeſcen-
is,

Baccharis foliis ovato-lanceolatis ferratis, caul ticoso. *Hort cliff.* 404. *
Conyza africana tenuifolia subfrutescens, flore *Dill. elth.* 104. *t.* 88. *f.* 103.
Habitat in Æthiopia. ♄

* * *Herbaceæ.*

Lynofyris. 6. CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus calycibus laxis. *Fl. svec.* 2. *n.* 729. *Gouan. mo*
Chrysocoma calycibus laxis. *Hort. cliff.* 396. *Ro* 145.
Chrysocoma foliis linearibus, petiolo sub flore scente. *Hall. helv.* 380.
Chrysocome dioscoridis & plinii. *Col. ecphr.* *t.* 82.
Linosyris nuperorum. *Lob. hist.* 223.
Osyris austriaca. *Clus. hist.* 1. *p.* 325.
Linaria, folioso capitulo luteo, major & mino *pin.* 213.
Habitat in Europa *temperatiore.* ♃

biflora. 7. CHRYSOCOMA herbacea paniculata, foliis latis trinerviis punctatis nudis.
Aster calycibus oblongis laxis, foliis ex lin ceolatis integerrimis trinerviis: infra scrobic cavatis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 189. *t.* 82. *f.* 1.
Conyza lini foliis asperis rigidis & nervosis, luteis umbellatis. *Amm. ruth.* 192.
Habitat in Sibiria.
Flos *variat cum & sine radio.*

graminifolia. 8. CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus latis glabris, floribus corymbosis.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Habitus *Achilleæ Ptarmicæ dictæ.* Caulis *lævis, herbaceus, parum angulatus.* Folia *alterna, lineari-lanceolata, acuminata, glabra, inte margine scabro subcarinata, obsolete trinervi* rymbus *foliatus, ex floribus numerosissimis, f.* 4 *simul in singulo pedicello, subsessilibus, dine Achilleæ. Calyces semi-ovati, imbricati* Pappus *simplex.*

villosa. 9. CHRYSOCOMA herbacea, foliis lanceolatis sis, calycibus arctis.

r incanus, calycibus laxis oblongis, foliolis ex lineari lanceolatis, floribus nudis umbellatis. *Gmel.* . 2. *p.* 192. *t.* 82. *f.* 2.
nyz tomentosa & incana, floribus luteis umbellatis, echii scorpioid.s folio. *Amm. ruth.* 190.
bitat in Sibiria, Tataria.

TARCHONANTHUS.

ARCHONANTHUS. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 152. — camphoratus.
chryso affinis arbor africana, flore purpureo-violaceo, folio salviæ, odore rosmarini. *Herm. lugdb.* 228. *t.* 229 *Pluk. alm.* 134. *t.* 174. *f.* 1. *Moris. hist.* 3. *p.* 90.
bitat in Æthiopia. ♄

CALEA.

ALEA floribus subternis pedunculatis, foliis ovato-oblongis subserratis petiolatis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 404.* — jamaicensis.
ntolina subhirsuta, foliis ovatis acuminatis oppositis, capitulis axillaribus, pedunculis ternatis sessili allolatis. *Brown. jam.* 315.
bitat in Jamaica.
ppus scab. r, longitudine floris.

ALEA corymbis congestis, pedunculis longissimis, foliis lanceolatis, caule herbaceo. *Amæn. acad.* 5. *p.* 404. * — oppositifolia.
ntolina erecta, foliis linearibus oppositis f. ternatis, floribus remotis terminalibus. *Brown. jam.* 315.
bitat in Jamaica.
ina nuda. Paleæ interiores longiores.

ALEA floribus subpaniculatis, calycibus brevibus, feminibus nudis, foliis ovato lanceolatis petiolatis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 404. * — Amellus.
mellus ramosus, foliis ovatis dentatis, floribus remotis terminalibus, fulcris longis divaricatis. *Brown. jam.* 317.
bitat in Jamaica.

SANTOLINA.

NTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *Hort. upf.* 252. *Mat. med.* 383. *Roy. lugdb.* 146. — Chamæ Cyparissus.
rotanum femina, foliis teretibus. *Bauh. pin.* 136.

Abro-

Abrotanum femina vulgare. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 341.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

rofmarinifolia. 2. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis line margine tuberculatis. *Hort. cliff.* 397. *Roy. lugd*
Abrotanum femina, foliis roſmarini, majus. *Bau* 137. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 12. *ſ.* 6. *t.* 8. *f.* 22.
Abrotanum femina 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 342.
β. Abrotanum femina, foliis roſmarini, minus. *Ba* 137.
γ. Abrotanum femina viridis. *Bauh. pin.* 137.
δ. Abrotanum femina, flore majore, foliis villoſi canis. *Bauh. pin.* 137.
Habitat in Hiſpania.
Herba *vix ſuffruticoſa.* Folia *margine utroque bi tuberculis crenulata, ſed in caule floreſcente lineari apicem utrinque denticulata.* Pedunculi *longi,* *nales, uniflori.*

alpina. 3. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis bip tis, caulibus ſimplicibus.
Santolinoides alpina ſaxatilis, foliis glaucis & argenteis, floribus luteis. *Mich. gen.* 31. *t.* 27.
Pyrethrum alterum minus, ceſpitoſa radice, ant dis flore, italicum. *Barr. rar.* 1105. *t.* 522.
Habitat in monte Moronis Italiæ. ♃

anthemoides. 4. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis bip tis, caule ramoſiſſimo villoſo.
Santolina perennis, chamæmeli folio, caule ra *Vaill. act.* 372.
Habitat in Hiſpania, Italia. *Cl. Alſtræmer.* ♃
Planta *palmaris.* Caulis *villoſus, folioſus.* Folia *C millæ pubeſcentia.* Pedunculi *terminales, foliis lo res, fructiferi rigidiuſculi.*

ATHANASIA.

ſquarroſa. 1. ATHANASIA pedunculis unifloris lateralibus, liis ovalibus recurvatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 3 & 6. *afr.* 52. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

crenata. 2. ATHANASIA floribus ſolitariis terminalibus, linearibus.

Sant

Santolina foliis linearibus, flore solitario terminali, squamis calycinis crenatis. *Hort. cliff.* 398. *
Chrysocoma foliis subtrigonis, squamis calycinis crenatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 840.
Habitat in Æthiopia. ♄

ATHANASIA floribus terminalibus subsessilibus, foliis lanceolatis hirsutis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 50. * — capitata.
Chrysanthemum conyzoides æthiopicum, capitulo aphyllo, foliis majoranæ. *Breyn. cent. t.* 78.
Habitat in Æthiopia. ♄
Habitus Buphthalmi capensis, sed Folia alterna; Flores discoidei, flosculosi.

ATHANASIA corymbis compositis, foliis ovatis amplexicaulibus subdentatis recurvis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 51. * — lævigata.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

ATHANASIA corymbis compositis, foliis inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis serratis. — dentata.
Santolina corymbis compositis fastigiatis, foliis inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis serratis. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 147.
Coma aurea africana frutescens, foliis inferioribus incisis, superioribus dentatis. *Comm. rar.* 41. *t.* 41.
Habitat in Æthiopia. ♄

ATHANASIA corymbis simplicibus, foliis trilobis cuneiformibus. — trifurcata.
Santolina corymbo simplici terminali, foliis trifidis. *Hort. cliff.* 397. *Roy. lugdb.* 146.
Coma aurea africana fruticans, foliis glaucis & in extremitate trifidis. *Comm. hort.* 2. *p.* 97. *t.* 49.
Habitat in Æthiopia. ♄

ATHANASIA corymbis simplicibus, foliis semitrifidis linearibus. — crithmifolia.
Santolina corymbis simplicibus fastigiatis, foliis semitrifidis linearibus. *Mill. dict. t.* 327. *f.* 2.
Santolina corymbo simplici, foliis trifidis. *Hort. ups.* 252.
Coma aurea frutescens, foliis angustissimis trifidis. *Burm. afr.* 186. *t.* 69. *f.* 1.

Coma

Coma aurea africana fruticans, foliis crithmi m
Comm. hort. 2. *p.* 99. *t.* 50.
Jacobæa æthiopica, foliis abrotani trifidis, fru
caule capitulis parvis glomeratis. *Pluk. alm.* 1
302. *f.* 7.
Habitat in Æthiopia. ♄
Præcedenti nimis affinis.

pubescens. 8. ATHANASIA corymbis simplicibus, foliis la
latis indivisis villosis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 329.
Coma aurea africana fruticosa omnium maxima,
tomentosis & incanis. *Comm. hort.* 2. *p.* 93. *t.* 47.
Habitat in Æthiopia. ♄

annua. 9. ATHANASIA corymbis simplicibus coarctatis
liis pinnatifidis dentatis.
Elichrysum inodorum glabrum, coronopi folio
nuum. *Magn. monsp.* 307. *Herm. lugdb.* 228. *t.*
Chrysanthemum corymbiferum. *Triumf. obs.* 85. *t*
Bellis polyclonos annua africana, coronopi folio
ribus nudis compactis. *Moris. hist.* 3. *p.* 30.
Habitat in Africa. ☉

maritima. 10. ATHANASIA pedunculis unifloris subcorymb
foliis lanceolatis indivisis crenatis obtusis tomen
Santolina corymbo terminali subdiviso, foliis obl
integerrimis obtusis. *Hort. cliff.* 398. *Gron. o*
257.
Filago maritima. *Sp. pl.* 927. *Mill. dict. t.* 135.
Gnaphalium maritimum. *Bauh. pin.* 263.
Chrysanthemum perenne gnaphaloides maritimum. *M*
ris. hist. 3. *p.* 81. *s.* 6. *t.* 4. *f.* 47.
Habitat in Europæ *australis marisque* Mediterranei
ritimis. ♃
Semina pappo carent.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

* *Fruticosa.*

crithmifolium. 1. TANACETUM foliis pinnatis: pinnis linearibus
motis integerrimis.
Santolina corymbo composito terminali, foliis lin
ribus dentatis: dentibus longitudine folii. *Hort. cliff.*
397. *Roy. lugdb.* 146.

Com

a -aurea foliis multifidis glaucis, flosculis musco-
: *Burm. afr.* 185. *t.* 68. *f.* 4.
hrysum africanum frutescens, foliis crithmi marini.
omm. hort. 2. *p.* 113. *t.* 57.
ratum capense, crithmi folio, capitulis parvis. *Pet.*
az. *t.* 34. *f.* 1.
itat in Æthiopia.

NACETUM foliis pinnato multifidis: laciniis li- suffruticosum.
earibus subdivisis acutis caule suffruticoso. *Hort.*
ff. 398. *Roy. lugdb.* 155.
efolium camphoratum aureum monomotapense.
uk. mant. 130. *t.* 430. *f.* 7.
tanum africanum fruticans multiflorum, foliis ta-
ceti decuplo minoribus. *Comm. hort.* 2. *p.* 199. *t.*
00.
itat in Æthiopia. ♄

NACETUM foliis pinnatifidis: laciniis lanceola- frutescens.
obtusiusculis integerrimis.
cetum foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 398.
y. lugdb. 154.
cetum africanum arborescens, foliis lavendulæ
ltifido folio. *Comm. hort.* 2. *p.* 201. *t.* 101.
itat in Æthiopia. ♄

* * *Herbacea.*

NACETUM foliis pinnatis: laciniis lineari-fili- sibiricum.
rmibus, corymbis glabris, caule herbaceo.
cetum foliis pinnatis multifidis: laciniis linearibus
fidis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 134. *t.* 65. *f.* 2.
itat in Sibiria.
a *linearia, pinnata: pinnis linearibus, filiformibus,*
pe bifidis trifidisve, integerrimis. Corymbus *termi-*
lis & axillares pauciflori floribus luteis.

ANACETUM foliis bipinnatis tomentosis, co- incanum.
rymbo ovato composito.
temisia caule simplici, corymbo composito ovato
rminali. *Hort. cliff.* 404. *
nthium orientale incanum tenuifolium, floribus
lis in capitulum congestis & sursum spectantibus.
rnef. cor. 34.
t in Oriente. ♃

6. TA-

annuum. 6. TANACETUM foliis bipinnatifidis linearibus corymbis tomentosis. *Roy. lugdb.* 155.
Tanacetum annuum villosum, absinthii austriaci *Vaill. act.* 1719. *p.* 281.
Santolina corymbis simplicibus, foliis linearibu fertis. *Mill. dict. t.* 227. *f.* 1.
Absinthium corymbiferum annuum. *Tournef. in*
Elichrysum foliis abrotani. *Bauh. pin.* 264. *Pluk* 160. *f.* 1.
Elichryson. *Clus. hist.* 1. *p.* 325. *t.* 326.
Habitat in Hispania, Hetruria. ⊙
Rami *longiores quam umbella primaria, divaricati* lia *linearia, pinnato-quinquefida, trifidaque.* *a congeneribus defectu Radii feminei; ab Ati defectu palearum.*

vulgare. 7. TANACETUM foliis bipinnatis incisis serratis. *cliff.* 398. *Fl. svec.* 666; 730. *Mat. med.* 381. *lugdb.* 155. *Gmel. sib.* 2. *p.* 133. *t.* 65 *f.* 1.
Tanacetum foliis pinnatis planis: pinnis serrati *lapp.* 295.
Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.
Athanasia s. Tanacetum. *Dalech. hist.* 955.
Artemesia monoclonos. *Fuchs. hist.* 46.

crispum. β. Tanacetum foliis crispis. *Bauh. pin.* 132.
Tanacetum crispum. *Dod. pempt.* 36.
Habitat in Europæ *aggeribus.* ♃

Balsamita. 8. TANACETUM foliis ovatis integris serratis. *cliff.* 398. *Hort. upf.* 255. *Mat. med.* 382. *Roy.* 154.
Mentha hortensis corymbifera. *Bauh. pin.* 226.
Costus hortensis. *Dalech. hist.* 678.
Habitat in Hetruria, Narbona. ♃

ARTEMISIA.

* *Fruticosæ erectæ.*

æthiopica. 1. ARTEMISIA foliis linearibus confertis minimi visis, caule fruticoso tomentoso.
Abrotanoides africanum, foliis cinereis muscosis. pitulis florum globosis magnis. *Raj. suppl.* 23
Absinthium africanum arborescens, folio vermic incano. *Tournef. inst.* 358.
Habitat in Æthiopia. ♃

Cau

[Ca]ulis *fruticosus*, *paniculatus*, *albus*. Folia *Ericæ magnitudine*, *minima*, *coacervata*. Flores *in racemis subrotundis*, *magnitudine A. Absinthii*. Receptaculum *nudum*.

[A]RTEMISIA foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. *Hort. cliff.* 403. *Hort. upf.* 257. *Mat. med.* 385. *Gouan. monsp.* 432. — Abrotanum

[A]brotanum mas angustifolium majus. *Bauh. pin.* 136.

[A]brotanum mas. *Dod. pempt.* 21.

[H]abitat *in* Syriæ, Galatiæ, Cappadociæ, Italiæ, Monspelii *montibus apricis*. ♄

[Hu]milis *f. pedalis frequenter fruticulus*; *cultus hominis altitudinem attingit. Raj. extr.* 46.

* * *Procumbentes ante florescentiam.*

[A]RTEMISIA foliis caulinis linearibus pinnato multifidis, ramis indivisis, spicis secundis reflexis. *Linn. goett.* 397. — Santonicum

[Ar]temisia fruticosa incana ramosissima, corymbis sessilibus spicatis subrotundis, foliis superioribus linearibus brevissimis obtusiusculis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 113. *t.* 51.

[Se]men sanctum. *Lob. ic* 756.

[Ha]bitat *in* Tataria, Persia. &c.

[Ha]bitus *A. campestris*, *sed erecta*. Caulis *paniculatus*, *subincanus*. Folia *inferiora pinnato-multifida*, *linearia*, *canescentia*. Rami *virgati*: *Racemis f. Spicis alternis*, *secundis*, *recurvatis*: *Pedicellis adspersis foliis linearibus*, *obtusiusculis*, *recurvis*. Flores *solitarii*, *cylindrici*; *in Planta fructificante omnes Caules erecti*, *qui amisere incanum colorem*. Folia *in ramis minima*, *linearia*, *indivisa*. Receptaculum *nudum*.

[A]RTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. svec.* 668, 732. *Roy. lugdb.* 154. *Gmel. sib.* 2. *p.* 117. — campestris.

[A]brotanum campestre. *Bauh. pin.* 136.

[Am]brosia altera. *Cam. epit* 577.

[Ha]bitat *in* Europæ *campis apricis*, *aridis*. ♃

[Re]ceptaculum *nudum*.

[A]RTEMISIA foliis linearibus pinnatis integerrimis, [flo]ribus glomeratis subsessilibus. — palustris.

[Arte]misia herbacea, foliis multifidis linearibus, co[ry]mbis in spica interrupta glomeratis sessilibus. [Gm]el. *sib.* 2. *p.* 119. *t.* 55.

Absinthium capillaceis foliis, flosculis aureis densiss congestis. *Amm. ruth.* 197.
Habitat in Sibiria.
Caules *procumbentes, adscendentes.* Folia Coronopi, aria, *pinnatifida: segmentis* 5. *s.* 7. Flores *glom* *subsessiles, flavi.* Receptaculum *nudum.*

crithmifolia 6. ARTEMISIA foliis compositis divaricatis linear carnosis glabris, caule adscendente paniculato.
Abrotanum hispanicum maritimum, folio crasso spl dente & rigido. *Tournef. inst.* 459.
Absinthium inodorum, foliis crithmi lucidis obscure rentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 11. *Raj. suppl.* 232.
Habitat in Lusitaniæ *litoribus arenosis. Læfling.*
Habitus *A. campestris, glaber.* Caules *semipedales, s. dales, adscendentes, Panicula florum terminati.* F *pinnatifida trifidaque, linearia, glabra carnosa.* F res *A. campestris.* Receptaculum *nudum.*

maritima. 7. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, rac cernuis, flosculis femineis ternis.
Artemisia foliis compositis multifidis tomentosis, mis floriferis nutantibus. *It. æl.* 112. * *Fl. svec.* 6 734.
Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simpl bus alternis, floribus erectis sessilibus. *Roy. lugdb.* 1 *Sauv. monsp.* 264.
Absinthium seriphium belgicum. *Bauh. pin.* 139 *B hist.* 3. *p.* 178.
β. Absinthium seriphium germanicum. *Bauh. pin.* 139.
Habitat in Europæ *septentrionalioris litoribus maris.*
Receptaculum nudum.

upestris. 8. ARTEMISIA foliis pinnatis, caulibus adscendentib hirsutis, floribus globosis cernuis: receptaculo papp so. *It. gotl.* 285. *t.* 285. * *Fl. svec.* 669; 733. *
Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis adscendentib floribus oblongis suberectis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 111. 49. *f.* 1.
Absinthium ponticum repens & supinum. *C. B.* 1 *Pluk. alm.* 3. *t.* 73 *f.* 1.
β. Absinthium pumilum palmeum minus, argenteo se ceoque folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 81. *t.* 71. *Barr.* 1006. *t.* 462.
γ. Absinthium alpinum incanum. *Bauh. pin.* 139. *prod.* 71?

Absin-

bsinthium orientale tenuifolium argenteum & sericeum, flore magno. *Tournef. cor.* 34.
bsinthium alpinum spicatum, foliis petiolatis bis trifidis, caulinis pinnatis. *Allion. pedem.* 1. *p.* 3. *t.* 1.
bsinthium viride, foliis multifidis linearibus. *Gmel. sib.* 2. *p.* 131. *t.* 64. *f.* 2.
bitat in Sibiriæ, Oelandiæ *rupibus calcareis.*
fert *C. B.* β. (*ex Bursero*) *planta ramis longioribus, aliisque, forte ex loco natis; Sibirica magis fruticosa est.* Planta *in rupibus alba sericea; in horto major, atroviridis, nuda. Receptaculum pilosum est. Planta ex loco vario varia.*

RTEMISIA foliis palmatis multifidis sericeis, caulibus adscendentibus, floribus glomeratis subfastigiatis. glacialis.
temisia floribus umbellatis, foliis petiolatis palmatis sericeis. *Hall helv.* 694.
sinthium alpinum candidum humile. *Bauh. pin.* 139. *prodr.* 71. *Raj. suppl.* 231. *All. pedem.* 5. *t.* 1. *f.* 3.
bitat in Helvetia, Valesia. ♃
tura A. rupestris. Folia *parva, tripartita, linearia: laciniis trifidis, subfastigiata, albo-sericea, tomentosa, brevissima, longe petiolata, inferiora petiolis caulem vaginantia.* Caules *adscendentes, spithamæi, simplicissimi, subtomentosi, foliosi.* Flores *globosi, lutei, terminales, conglomerati, Pedunculis brevissimis, Calycibus subtomentosis.*

*** *Erectæ herbaceæ, foliis compositis.*

RTEMISIA foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. pontica.
Hort. ups. 257. *Hort. cliff.* 404. *Mat. med.* 387. *Jacq. vind.* 149.
sinthium ponticum tenuifolium incanum. *Bauh. pin.* 138.
sinthium tenuifolium. *Dod. pempt.* 24.
bitat in Hungaria *interiore*, Pannonia, Thracia, Mysia: *locis apricis, aridis.* ♃

RTEMISIA foliis triplicato pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus: receptaculo glabro conico. *Hort. upf.* 257. annua.
annua, radice annua, viridis. foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis, calycibus subrotundis fere erectis ex alis copiosissimis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 125.

Absinthium, tanaceti folio, odoratissimum. *Amm* 142. *t.* 193. *f.* 23. *imperfecte.*

β. Absinthium, folio tenui multifido; camphora rans. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 126.

Habitat in Sibiriæ *montosis.* ⊙. ♂

nilotica. 12. ARTEMISIA foliis bipinnatis, caule erectiu pedunculis solitariis unifloris nudis filiformib gitudine foliorum. *Amæn. acad.* 4. *p.* 289. *

Habitat in Ægypto.

Affinis ita Cotulæ anthemoidi, *ut cuinam generi benda facile dubium;* Flos *subglobosus.* Caly *liola æqualia, margine membranacea.*

tanacetifolia. 13. ARTEMISIA foliis bipinnatis subtus tomento tidis: pinnis transversis, racemis simplicibus.

Absinthium foliis radicalibus multoties pinnatis linis pinnatis longe petiolatis, floribus parvi sessilibus. *Allion. pedem.* 6. *t.* 2. *f.* 1.

Artemisia radice perenni, foliis pinnatis pinn incisis serratis, calycibus subrotundis viridib tantibus. *Gmel. sib.* 2. *p.* 122. *t.* 58.

Habitat in Sibiria, Pedemontio. ♃

Receptaculum pilosum. Hall.

Absinthium. 14. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, fl subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *cliff.* 404. *Fl. svec.* 670; 735. *Mat. med.* 386. *lugdb.* 153.

Absinthium incanum, foliis compositis latiuscule tifidis, floribus subglobosis pendulis. *Gmel.* *p.* 129. *t.* 63.

Absinthium ponticum s. romanum, officinarum scoridis. *Bauh. pin.* 138.

Absinthium. *Cam. epit.* 452.

Habitat in Europæ *ruderatis aridis.* ♃

Receptaculum pilosum.

arborescens. 15. ARTEMISIA foliis compositis multifidis linea floribus subglobosis, caule frutescente.

Absinthium arborescens. *Lob. ic.* 753.

Abrotanum latifolium arborescens. *Bauh. pin.* 1

Habitat in Italia, Oriente. ♄

Affinis nimium A. Absinthio.

vulgaris. 16. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisis: f tom

tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis: radio quinquefloro.
temisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Hort. cliff.* 404. *Fl. svec.* 667; 731. *Mat. med.* 384. *Roy. lugdb.* 153. *Gmel. sib.* 2. *p.* 108.
temisia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137. *Fl. lapp.* 379.
temisia vulgaris. *Bauh. hist.* 3 *p.* 184.
bitat in Europæ *cultis, ruderatis.* ♃
ceptaculum nudum.

* * * * *Foliis simplicibus.*

ARTEMISIA foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque, florum radio subquinquefloro. — integrifolia.
temisia foliis planis lanceolato-linearibus: inferioribus sæpe ex pinnato dentatis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 109. *t.* 8. *f.* 1.
bitat in Sibiria.
itus absolute Artemisiæ vulgaris; at Folia *lanceolata, rigidiuscula, glabra, subtus cano-tomentosa, margine integerrima, rarius uno alterove dente erecto notata.* Racemi *axillares, breves, terminales, glomerati.* Flores *rotundiusculi: flosculi feminei sæpius quinque.*

ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. *Hort. cliff.* 403. — cærulescens.
inthium maritimum, lavendulæ folio. *Bauh. pin.* 139. *Moris. hist.* 3. *p.* 7. *s.* 6. *t.* 1. *f.* 5. *Duham. arb.* t. 24. *f.* 5.
inthium angustifolium. *Dod. pempt.* 26.
rotanum latifolium rarius, artemisiæ folio. *Col. ecphr.* 1. *p.* 75. *t.* 76.
bitat in Europæ *australis litoribus maris.*
olia utrinque villosa. Flores *cylindrici, nutantes: flosculis radii ternis; hinc nimis affinis A. maritimæ, quamvis Folia toto cœlo recedant.*

ARTEMISIA foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Hort. cliff.* 403. *Hort. upsf.* 256. *Gmel. sib.* 2. *p.* 126. 59. & 60. *f.* 1. — Dracunculus.
otanum lini folio acriori & odorato. *Tournef. inst.* 59.
cunculus hortensis. *Bauh. pin.* 98.

Draco herba. *Dod. pempt.* 709.
Habitat in Sibiria, Tataria ♃
Receptaculum nudum. Hall. Flosculi feminei 6, *h phroditi* 12. *1077. t. app.* 106.

chinensis. 20. ARTEMISIA foliis simplicibus tomentosis o lanceolatis: inferioribus cuneiformibus trilobi
Artemisia foliis radicalibus a caulinis diversis. *Gn* 2. *p.* 61. *f.* 1 2.
Absinthium maritimum sinarum, lavendulæ folio chrioribus corymbis, inodorum, sapore arom *Pluk. amalth.* 3. *t.* 153. *f.* 5.
Habitat in China, *Lagerstrom.* Sibiria.
Folia *tomentosa, pollicem transversum longa: inf cuneiformia: triloba; superiora lanceolata, obtusa.* res *in summitate, conferti in Racemum sæpiu tum, simplicem, subrotundi:* Calyce *laxo, tomen*

maderaspatana. 21. ARTEMISIA foli[illegible]plicibus lyrato-sinuatis libus procumbenti[illegible]oribus pedunculatis fol globosis oppositifoliis.
Absinthium maderaspatanum, senecionis incano corymbis solitariis in ramulorum fastigio spe *Pluk. amalth.* 3. *t.* 357. *f.* 3.
Absinthium minus odoratum gangeticum, floribus mæmeli solitariis e foliorum alis. *Pluk. alm.* 2 *f.* 2. *mal.*
Habitat in India. ⊙
Herba *procumbens, terræ adpressa: Ramis alterni retibus, flexuosis, striatis, pubescentibus.* Foli *nato- s. dentato-sinuata, lyrata, extrorsum la mollia.* Pedunculi *solitarii, folio oppositi, un nudi, striati, villosi.* Flores *subglobosi disco co magni, lutei.* Flosculi *marginales feminei t stylo bifido tenuiore; discoidei hermaphroditi: simplici.*

minima. 22. ARTEMISIA foliis cuneiformibus repandis, procumbente, floribus axillaribus sessilibus.
Habitat in China. *Lagerstrom.* ⊙
Planta *omnium minima.* Folia *glabra.* Flores *ex* 7. *flosculis, minimi, sessiles, axillares, solitarii.*

ambigua. 23. ARTEMISIA foliis linearibus indivisis acerosi cis terminalibus, calycum foliolis intimis col caule fruticoso.

Fru

[F]rutex africanus aromaticus, flore ſpicato exiguo. *Comm. hort.* 2. *p.* 117. *t.* 59. *an?*
[H]*abitat ad* Cap. b Spei. ♄
[F]rutex *procumbens*, *cinereus*. Folia *ſimplicia*, *linearia*, *conferta*. Spicæ *longæ*, *ramos terminantes*. Flores *ſubrotundi*. Calyces *cinerei*, *at ſquamarum ordine interiore ſcarioſo ſ. membranaceo*, *colorato*, *albo ut in Gnaphaliis*. Floſculis *circumſtant radii* 4 *ſ.* 5, *capillares*, *longitudine floſculorum*, *apice plumoſi*. *Media eſt inter Seriphia*, *Artemiſias*, *Gnaphalia*, *Stæbes*. *Semina nuda ſunt.*

GNAPHALIUM.

* *Chryſocomæ.*

[G]NAPHALIUM fruticoſum, foliis ſeſſilibus linearibus ſupra glabris margine revolutis, floribus ſubcapitatis, pedunculis elongatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 53. * — **arboreum.**
[H]*abitat ad* Cap. b. Spei. ♄

[G]NAPHALIUM fruticoſum, foliis amplexicaulibus ovatis trinerviis utrinque lanuginoſis. — **grandiflorum.**
[Gn]aphalium tomentoſum, foliis inferioribus ſubrotundis; ſuperioribus acuminatis. *Burm. afr.* 213. *t.* 76. *f.* 1.
[He]lichryſum africanum lanuginoſum latifolium, calyce floris argenteo & ampliſſimo. *Old. afr.* 27.
[H]*abitat in* Æthiopia. ♄

[G]NAPHALIUM fruticoſum, foliis ſeſſilibus lanceolatis, corymbis comp[ac]tis ſeſſilibus: pedunculis aphyllis, calycibus coronatis. — **coronatum**
[G]naphalium foliis oblongis acutis craſſis & incanis, floribus albis umbellatis. *Burm. afr.* 188. *t.* 69. *f.* 3.
[H]*abitat ad* Cap. b. Spei. ♄
Caules *lignoſi*, *Ramis villoſis*. Folia *lanceolata*, *valde tomentoſa*. Ramuli *ex alis ſummis foliorum*. Corymbus *terminalis abſque pedunculo communi*. Pedicelli *partiales folio ſubjecto longiores: lateralibus intermedio longioribus; ferentes apice in capitulum plures* Calyces *ſeſſiles*, *hirſutos*, *margine dilatatos in radium rotundum*, *glabrum*, *niveum*.

GNAPHALIUM fruticoſum, foliis ſeſſilibus lanceolatis, calycibus albis: ſquamis inferioribus in[te]rnatis. — **diſcolorum**

Habitat ad Cap. b Spei. ♄
Caules *suffruticosi.* Folia *lanceolata, subtus tomentosa* ... *nata.* Pedunculi *communes elongati.* Calyces *glomerati* ... *squamis inferioribus sex, brevioribus, incarnatis;* ... *rioribus duodecim, albis, obtusis.* Flosculi *subquin*...

veum. 5. GNAPHALIUM fruticosum, foliis filiformibus ... mentosis subimbricatis, caule ramosissimo.
Gnaphalium incanum, folio lineari, caule accumb... te. *Burm. afr.* 215. *t.* 77. *f.* 1.
Elichrysum æthiopicum, tenuissimis stœchadis citr... foliis confertis, ramosissimum, comis argent... *Pluk. mant* 67. *Raj. suppl.* 171.
Habitat in Æthiopia. ♄
Calyces subtomentosi.

muricatum. 6. GNAPHALIUM fruticosum, foliis subulatis, ... bella composita, calycibus subtrifloris cylindri...
Gnaphalium caule fruticoso, foliis lanceolatis con... tis fasciculatis, calycibus cylindricis longis. *H... cliff.* 403.
Gnaphalium fruticosum, foliis lanceolatis conge... florum calyce tubuloso. *Burm. afr.* 221. *t.* 79. *f.* ...
Argyrocome capitis b. spei, thymi foliis. *Pet. gaz.* ... 7. *f.* 3.
Xeranthemum africanum frutescens, folio ericæ f... niperi angustiore breviore acuto, floribus cong... batis exiguis albis. *Raj. suppl.* 182.
Xeranthemum flœchadis citrinæ foliis rigidis pung... tibus, flore albo du[illegible]culo. *Pluk. mant.* 190.
Gnaphaloides æthiopic[illegible] frutescens, stœchadis ci... næ foliis spinosis. *Pluk. alm.* 92. *Raj. suppl.* 193.
Eupatorioides capitis b. spei, saturejæ foliis rigid... *Pet. cent.* 208. *Raj. suppl.* 239.
Lychnis coronaria monomotapensis globulifera, fol... exalbidis genistæ aculeatæ. *Pluk. amalth.* 134 ... 406 *f.* 6.

β. Gnaphalium fruticosum, foliis rarioribus, capitatum ... *Burm. afr.* 223. *t.* 79. *f.* 2.
Xeranthemum africanum, foliis brevioribus canesce... tibus, floribus minimis conglobatis albis. *Raj. supp.* ... 182.
Eupatorioides capensis capitatus. *Pet. gaz. t.* 8. *f.* ... *Raj. suppl.* 239.

Frutex

tex æthiopicus cineraceus, foliis nepetæ aculea-
s, floribus albis coronatus. *Pluk. phyt.* 410. *f.* 2.
aphalium frutescens, foliolis lanceolatis æquali-
is, umbellatum *Burm. afr.* 223. *t.* 79 *f.* 3.
hrysum æthiopicum frutescens, coridis foliis in-
anis, capitulis parvis glomeratis. *Pluk. alm.* 72.
itat in Æthiopia. ♄

APHALIUM fruticosum, foliis sessilibus linea- **ericoides.**
bus, calycibus exterioribus rudibus; interioribus
carnatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 57. *
itat ad Cap b. Spei. ♄

APHALIUM fruticosum, foliis linearibus, pe- **sordidum.**
unculis subtrifloris, calycinis squamis lanceolatis.
Hort. cliff. 401. * *Gouan. monsp.* 435.
hrysum sylvestre angustifolium, capitulis conglo-
tis. *Bauh. pin.* 264.
chadi citrinæ affinis, capitulis parvis raris. *Bauh.*
h. 3. *p.* 156. *Raj. hist.* 283.
chas citrina spuria, longioribus foliis. *Barr. ic.* 368.

atum aliud quorundam. *Dalech. hist.* 778.
itat in G. Narbonensi, Italia, *ad rupes, muros.* ♄
tes f. Calyces colore potius sordido, quam aureo.

APHALIUM fruticosum, foliis linearibus, ramis **Stœchas.**
gatis, corymbo composito. *Hort. cliff.* 401.
Hort. upf. 256. *Gouan. monsp.* 435.
hrysum f. Stœchas citrina angustifolia. *Bauh. pin.*
4.
chrysum f. Chrysocome angustifolia vulgaris. *Mo-*
r. hist. 3. *p.* 401. *f.* 7. *t.* 11. *f.* 7.
ysocome f. Stœchas citrina minor. *Barr. ic.* 410.
09. 278.
chas citrina. *Dod. pempt.* 268.
itat in Germania, Gallia, Hispania, Oriente; *in*
collibus aridis. ♄

GNAPHALIUM fruticosum ramosum, corymbis ra- **teretifolium**
mosis, foliis confertis teretiusculis. *Hort. cliff.* 401. *
aphalium frutescens, foliis tenuissimis teretibus,
ramis creberrimis. *Burm. afr.* 217. *t.* 77. *f.* 3.
llefolium æthiopicum, ericæ foliis, incanum, flo-
re speciosio. *Pluk. alm.* 251. *t.* 308. *f.* 2.

Habitat in Æthiopia. ♄

Calyces *glabri toti : extus ferruginei ; interi*
Folia *subulata , nuda , subtus tomentosa :*
margine.

ignescens. 11. GNAPHALIUM fruticosum , foliis sublar
tomentosis sessilibus , corymbis alternis con
floribus globosis. *Roy. lugdb.* 149.

Elichrysum flore suaverubente. *Boerh. lugdb.* 1
Habitat - - - - ♄

dentatum. 12. GNAPHALIUM fruticosum , foliis cunei
sessilibus dentatis , corymbo simplici. *Ro*
151. *

Coma aurea incana, foliis obtusis tridentatis, (
oblongis. *Burm. afric.* 185. *t.* 68. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

serratum. 13. GNAPHALIUM fruticosum, foliis amplexi
lanceolatis serratis , supra nudis.

Gnaphalium folio oblongo acuto molli, flori
rugineis. *Burm. afr.* 214. *t.* 76. *f.* 3. *Breyn.*
t. 18. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

patulum. 14. GNAPHALIUM fruticosum foliis amplexi
spatulatis , ramis patentibus , corymbis ag
, *Hort. cliff.* 402. *n.* 15. *

Elichrysum africanum, folio oblongo toment
lem amplectente, flore luteo. *Boerh. lugdb.* 1
Habitat in Æthiopia. ♃
Caulis herbaceus , Flores albi , squamis calycini
latis.

petiolatum. 15. GNAPHALIUM fruticosum, foliis ovatis
rimis petiolatis, floribus confertis terminalib
cliff. 402. *

Gnaphalium tomentosum , foliis orbiculatis su
canis. *Burm. afr.* 214. *t.* 76. *f.* 2.
Habitat in Æthiopia. ♄

cylindricum. 16. GNAPHALIUM herbaceum, foliis sessilibus
gis tomentosis, corymbis inæqualibus calycib
bris cylindricis sessilibus. *Amæn. acad.* 6. *afri*

Gnaphalium æthiopicum minus ramosum , c
coccineis. *Pluk. phyt.* 298. *f.* 4.
Habitat ad Cap. b. Spei.

17. G

NAPHALIUM subherbaceum, foliis lineari-lanceolatis sessilibus, corymbo composito, pedunculis longatis. orientale.
aphalium foliis confertis angusto-lanceolatis, caule uticoso, corymbo composito. *Hort. cliff.* 402. *Hort. ps.* 256.
chrysum orientale. *Bauh. pin.* 264. *prodr.* 123.
chrysum africanum frutescens, angustis & longioribus foliis incanis. *Comm. hort.* 2. *p.* 109. *t.* 55.
ichrysum frutescens latifolium, flore corymbifero toto aureo. *Moris. hist.* 3. *p.* 86. *s.* 7. *t.* 10. *f. ult.*
bitat in Africa. ♃. ♄

NAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule simplicissimo, corymbo composito. *Fl. svec.* 674; 738. *Mat. med.* 389. *Gmel. sib.* p. 107. arenarium.
chrysum s. Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264. *ael.* 160.
chas citrina germanica, latiore folio. *Bauh. hist.* 3. 153. *Raj. hist.* 281.
bitat in Europae *campis arenosis.* ⊙

NAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis, caule inferne ramoso, corymbo decomposito terminali. *Hort. cliff.* 401. * rutilans.
chrysum africanum, folio oblongo angusto, flore rutello postea aureo. *B. Dill. elth.* 127. *t.* 107. *f.* 127.
bitat in Africa. ♃

NAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis tomentosis, caule ramoso, squamis calycinis reflexis. imbricatum.
aphalium incanum angustifolium, calycis squamis errugineis reflexis. *Burm. afr.* 226. *t.* 80. *f.* 2.
bitat in Aethiopia.

NAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis trinerviis supra glabris, caule inferne ramoso, racemo terminali. *Hort. cliff.* 401. * cymosum.
ichrysum africanum, folio longo subtus cano supra viridi, flore luteo. *B. Dill. elth.* 128. *t.* 107. *f.* 128.
itat in Africa. ♃
es aurei toti, glabri, squamis obtusis. Calyces laeae.

nudifolium. 22. GNAPHALIUM herbaceum, foliis sessilib ceolatis trinerviis nudis reticulato-venosis.
Chrysocoma æthiopica, plantaginis folio. *Breyn. ce*
Habitat in Æthiopia. ♃
Folia *Radicalia lanceolato-ovata, trinervia, min mentosa, sed omnino nuda venis reticulatis, scabra.* Caulis *simplex, pedalis, inferne* Folii *ribus, magis lanceolatis; superne nudus.* Flor *in corymbo composito.*

luteo-album 23. GNAPHALIUM herbaceum, foliis semian caulibus ensiformibus repandis obtusis utrinq bescentibus, floribus conglomeratis. *Roy.* 149. *Gouan. monsp.* 434.
Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis coı tis. *Bauh. pin.* 264.
Gnaphalium majus, lato oblongo folio. *Bauh. p Pluk. alm.* 171. *t.* 31. *f.* 16. *Moris. hist.* 3. 7. *t.* 11. *f.* 20.
Gnaphalium ad stœchadem citrinam accedens. *hist.* 3. *p.* 160.
Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Hispania, tania. ⊙
Planta *valde lanata.* Calyces *flavo-albicantes, squamis ovato-lanceolatis.* Radius *femineus mu*

odoratissimum. 24. GNAPHALIUM herbaceum, foliis decurr obtusis mucronatis utrinque tomentosis plani
Elichrysum foliis linearibus decurrentibus sub canis, floribus corymbosis. *Mill. dict. t.* 13
Elichrysum latifolium villosum, alato caule, tissimum. *Pluk. alm.* 134. *t.* 173. *f.* 6.
Habitat - - - - -

* * *Argyrocomæ.*

sanguineum 25. GNAPHALIUM herbaceum, foliis decurr lanceolatis tomentosis planis apiculo nudo natis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 78. *
Gnaphalium ægyptiacum, latiore folio, ramosi re ex albicante purpureo. *Pluk. mant.* 91. *orient.* 262.
Gnaphalium syriacum. *Barr. ic.* 34.
Gnaphalio montano affinis ægyptiaca. *Bauh. pi*
Chrysocoma syriaca, flore atro-rubente. *Brey* 146.

charis diofcoridis. *Rauw. it.* 285. *t.* 285.
bitat in Ægypto, Palæltina: Libano, Carmel.

NAPHALIUM herbaceum, foliis amplexicauli-ibus integerrimis acutis fubtus tomentofis, caule ra-mofo. *Hort. cliff.* 402. *Hort. upf.* 256. — fœtidum.
phalium africanum latifolium fœtidum, capitulo rgenteo. *Comm. hort.* 2. *p.* 111. *t.* 56.
yza africana graveolens, capitulis argenteis. *Pluk.* *m.* 117. *t.* 243. *f.* 1. *Morif. hift.* 3. *p.* 115. *f.* 7. *t.* 0. *f.* 32.
itat in Æthiopia. ⊙
iat Calycibus argenteis & aureis.

NAPHALIUM herbaceum, foliis decurrentibus nceolatis acutis undatis fubtus tomentofis, caule mofo. *Hort. cliff.* 402. — undulatum.
hryfum graveolens acutifolium, caule alato. *Dill.* *th.* 130. *t.* 108. *f.* 130.
itat in Africa. ⊙

NAPHALIUM herbaceum, foliis amplexicauli-s fpatulatis tomentofis, calycibus obtufiffimis icato-undulatis: bafi tomentofis. — crifpum.
phalium. *Pluk. phyt.* 298. *f.* 3.
itat ad Cap. b. Spei. ♃
les *fimplices, duriufculi, tomentofi, ex alis ramulofi, tota planta albiffimi.* Folia *fpatulato-lanceolata, miamplexicaulia, utrinque tomentofa.* Corymbi *hylli.* Calyces *albi, nudi, plicato-undulati, nec in G. patulo ovato-lanceolati.*

NAPHALIUM herbaceum, foliis amplexicauli-us lanceolatis, corymbis compofitis, caule ramo-fiimo. — helianthemifolium.
phalium africanum, floribus minimis albicantibus. *olk. norib.* 194. *t.* 194.
itat in Æthiopia. ♃
les *virgati, ramofi, tomentofi.* Folia *feffilia, sub-mplexicaulia, ovata, obtufa, utrinque tomentofa, btus valde tomentofa & alba, fubundata, patentia, eflexa.* Corymbus *compofitus, terminalis, feffilis.* Calycum *fquamæ fubplicatæ.*

NAPHALIUM herbaceum, foliis feffilibus lin-gula- — fquarrofum.

gulatis tomentosissimis, calycum squamis l
bus subulatis recurvatis.
Gnaphalium foliis oblongis tomentosis sessili
pitulis foliosis villosissimis. *Roy. lugdb.* 15
Gnaphalium latiore folio æthiopicum, flore ro
lyculis spinosis. *Pluk. alm.* 171. *t.* 323. *f.* 1
Habitat in Æthiopia.
Caules *adscendentes*, *simplices*, *vix pedales*, *to*
mentosi. Folia *lingulata*, *obtusa*, *tomentosa.*
terminales, *conferti.* Calyces *squamis subul*
dis, *purpureis aut albis*, *recurvis*, *basi hirsuti*

stellatum 31. GNAPHALIUM herbaceum, foliis sessilib
ceolatis villosis, calycibus acutis extus in
Amœn. acad. 6. *afr.* 55. *
Gnaphalium tomentosum, foliis undulatis, f
cioso. *Burm. afr.* 225. *t.* 80. *f.* 1.
Habitat ad Cap. b. Spei.
Calyces *quamprimum deffloruere*, *planissime*
intus purpurei apicibus niveis, *unde singular*
scitur.

obtusifolium 32. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceola
le tomentoso paniculato, floribus terminali
meratis conicis. *Gron. virg.* 121.
Gnaphalium foliis lanceolatis, caule tomentoso,
bis supradecompositis, floribus sessilibus c
Gron. virg. 1. *p.* 95.
Elichrysum obtusifolium, capitulis argenteis co
tis. *Dill. elth.* 130. *t.* 108. *f.* 131.
Helichrysum Chrysocoma Gnaphaloides virgin
nua, foliis obtusioribus, capitulis argenteis co
tis. *Moris. hist.* 3. *p.* 88. *s.* 7 *t.* 10. *f.* 19.
Habitat in Virginia, Pensylvania. ☉
Caulis *tomentosus*, *pilosus*, *ramosus*, *erectus.* Fo
ceolata, *recurvata*, *nudiuscula.* Flores *ter*
conglobati, *inæquales*, *subsessiles.* Calyces *co*
bi, *acuti.* Corollæ *flavæ.*

margarita-ceum. 33. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lineari-l
latis acuminatis alternis, caule superne ramo
rymbis fastigiatis. *Hort. cliff.* 401. *Hort. u*
Gmel. sib. 2. *p.* 107. *Kalm. it.* 2. *p.* 257.
Gnaphalium latifolium americanum. *Bauh. pi*
Gnaphalium americanum *Clus. hist.* 1. *p.* 327.
Habitat in America septentrionali, Kamtschatca. 2

34. G

plantagini-folium.

APHALIUM sarmentis procumbentibus, caule pliciſſimo, foliis radicalibus ovatis maximis. *Gron.* . 121.
alium ſtolonibus reptatricibus longiſſimis, foliis :is, caule capitato. *Gron. virg.* 1. *p.* 95
alium, plantaginis folio, virginianum. *Pluk. alm.* *t.* 348. *f.* 9.
t in Virginia. ♃
s omnino præcedentis; *ſed* Folia *radicalia pollice ra, ovalia. Vidi ſolam fœminam; an ſequentis varietas?*

dioicum.

PHALIUM sarmentis procumbentibus caule liciſſimo, corymbo ſimplici terminali, floribus :is. *Hort. cliff.* 400. *Fl. ſvec.* 672; 736. *Mat.* 388. *Roy. lugdb.* 741. *Gm l. ſib.* 2 *p.* 105.
alium caule ſimpliciſſimo, floribus coloratis terto. *Fl. lapp.* 305.
alium montanum, flore rotundiore. *Bauh. pin.* 263. *mas.*
a minor. *Dod. pempt.* 68. *f. exterior.*
lium montanum, longiore & folio &. *Bauh.* *femina.* 163.
a minor. *Dod. pempt.* 68. *f. interior.*
in Europæ *apricis aridis.* ♃

alpinum.

PHALIUM sarmentis procumbentibus: cau- pliciſſimo, capitulo terminali aphyllo, floribus igis. *Fl. lapp.* 301. *Fl. ſvec.* 673; 737.
lium latiore folio, caule non ramoſo, ſpica fuſca terminato. *Hall. helv.* 701.
lium alpinum minus. *Bauh. pin.* 264.
alpina minor erecta. *Scheuch. alp.* 133.
in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃
ſimpliciſſimus, digito brevior, foliis 3 *ſ.* 4 *lan- is.* Folia *radicalia lanceolato-cuneiformia, ſu- viridia lævia, ſubtus tomento ſtriato albida, ut etiam a latere ſuperiore albus conſpiciatur. Ad m ſarmenta ut G. dioico.* Flores *terminales, conferti, absque foliis Calyx cylindricus, baſi coſus, ſquamis apice membranaceis, lanceolatis, erectis.* Floſculi *feminei, in planta a me cul- bsque ſtaminibus an G. dioici varietas ob ſexum, nta, caulem nudum; ſed Marem nullus adhuc avit.*

37. GNA-

indicum. 37. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lance caule herbaceo ramosissimo diffuso, corym qualibus. *Fl. zeyl.* 307. *
Gnaphalium, latiore folio, minus ramosum, c pallescentibus. *Pluk. alm.* 172. *t.* 187. *f.* 5.
Habitat in India, Cap. b. Spei. ♃

purpureum. 38. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceol dis, caule erecto simplicissimo, floribus spi teralibus sessilibus. *Roy. lugdb.* 148. *Gron vi*
Elichrysum spicatum obtusifolium basi angustio *elth.* 131. *t.* 109. *f.* 132.
Gnaphalium spicatum majus non ramosum virginianum, foliis obtusioribus. *Moris. hist.*
Habitat in America *septentrionali.*

* * * *Filaginoidea.*

sylvaticum. 39. GNAPHALIUM caule simplicissimo, flori sis. *Fl. lapp.* 298. *Fl. svec.* 675; 739. *H* 402. *Roy. lugdb.* 148. *Gmel. sib.* 2. *p.* 106.
Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, *Bauh. pin.* 263.
Gnaphalium rectum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 160.
Habitat in Europæ *sylvis arenosis.* ♂

glomeratum 40. GNAPHALIUM herbaceum, foliis sub caulibus lanceolatis, calycum squamis inte subulatis recurvis.
Habitat ad Cap. b. Spei. ☉
Statura *G. uliginosi.* Caules *ramosi, diffusi, sp tomentosi. Rami inæquales.* Flores *glomera les, tomentosi:* Calycum *squamæ interiores lo subulatæ, canaliculatæ, ferruginea, recurvæ.*

uliginosum. 41. GNAPHALIUM herbaceum, caule ramos so, floribus confertis terminalibus. *Fl. la Fl. svec.* 676; 740. *Hort. cliff.* 402. *Roy. lug Gmel. sib.* 2. *p.* 105.
Gnaphalium longifolium humile ramosum, c nigris. *Raj. hist.* 295. *angl.* 3. *p.* 18.
Gnaphalium annuum serotinum, capitulis nig bus, in humidis gaudens. *Moris. hist.* 3. *p.*
Habitat in Europæ *paludibus, ubi aquæ stagnant.*

XER

XERANTHEMUM.

* *Receptaculo paleaceo, semen corona quinqueseta.*

ERANTHEMUM herbaceum, foliis lanceolatis patentibus, caule herbaceo. *Jacq. vind.* 150. *Gouan. monsp.* 436. — annuum.
ranthemum receptaculis paleaceis, seminum pappo quinqueseto. *Hort. cliff.* 400.
ranthemum, oleæ folio, capitulis simplicibus incanis non fœtens, flore majore violaceo. *Moris. hist.* 3. p. 43. *s.* 6. *t.* 21. *f.* 2.
ea oleæ folio, capitulis simplicibus. *Bauh. pin.* 272.
rnica austriaca. *Clus. hist.* 2. *p.* 11.
ranthemum, oleæ folio, capitulis simplicibus, incanum fœtens, flore purpurascente minore. *Moris. hist.* 3 *p.* 43. *s.* 6. *t.* 12. *f.* 1. — *inapertum.*
ranthemum capitulis inapertis. *Hall. helv.* 709. 83.
æ oleæ folio, minore flore. *Bauh. pin.* 272.
ranthemum orientale, fructu maximo. *Tournef. cor.* 38. — *orientale.*
æ oleæ folio, capitulis compactis. *Bauh. pin.* 272.
ea incana, cyani capitulis. *Bauh. pin.* 272.
itat α. in Austria, *β. in* Italia, Helvetia, G. Narbonensi. ⊙
ta α robusta, erecta; Seminibus pluribus minoribus; alyce scarioso; Paleis integris; Radio polypetalo.
ta β angustior, debilis; Seminibus 6 s. 7. majoribus; alycis squamis solo margine membranaceo; Paleis lace-; Radio subhexapetalo.
RANTHEMUM foliis pinnatifidis. *Gmel. sib.* 2. 108. *t.* 47. *f.* 1. † — crucifolium
itat ad Tanain *prope oppidum Cavilnense.*

* * *Receptaculo nudo, seminum corona pilosa.*

RANTHEMUM fruticosum erectum, foliis ad tis lanceolato-linearibus apice calloso-mucronatis ramis unifloris foliosis. — vestitum.
ranthemum frutescens lanuginosum, foliis longis mollibus, flore argenteo amplissimo. *Burm. afr.* 177. 66. *f.* 1.
nthemum africanum ramosum, gnaphalii foliis angustioribus tomentosis oblongis, floribus albis maus apicibus nigris. *Raj. suppl.* 182.

Xeranthemum speciosum capense, flore albo ma
Pet. gaz. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Chrysocome s. Argyrocome africana ericoides,
albo. *Seb. thes.* 2. *p.* 45. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in Æthiopia. ♄

speciosissimum. 4. XERANTHEMUM fruticosum erectum, foli
plexicaulibus lanceolatis trinerviis, ramis un
subnudis.
Xeranthemum tomentosum latifolium, flore ma
Burm. afr. 178. *t.* 66. *f.* 2.
Elichrysum africanum arborescens, foliis incanis
ribus. *Bærh. lugdb.* 1. *p.* 121.
Elichrysum africanum lanuginosum latifolium,
floris argenteo & amplissimo. *Breyn. ic.* 27. *t*
1. *Raj. suppl.* 182. *n.* 13.
Chrysocome s. Argyrocome gnaphaloides afr
amplissimis floribus. *Seb. thes.* 2. *p.* 45. *t.* 43.
Habitat in Æthiopia. ♄

proliferum. 5. XERANTHEMUM caule fruticoso prolifero
ribus sessilibus, foliis granulato-subrotundis
catis obsoletis.
Elichrysum abrotani feminæ foliis. *Seb. mus.* 2.
f. 6. *Breyn. ic.* 28. *t.* 17. *f.* 1.
Carduus Xeranthemoides. *Raj. suppl.* 199.
Habitat in Æthiopia. ♄
Flos *plantarum æthiopicarum Regina merito*
Breynio.

canescens. 6. XERANTHEMUM caulibus fruticosis, folii
tis nudis, pedunculis squamosis. *Amæn. acad*
60. *
Xeranthemum incanum, foliis subrotundis, flo
pureo. *Burm. afr.* 183. *t.* 68. *f.* 1.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

imbricatum. 7. XERANTHEMUM fruticosum, foliis imb
ovato-subulatis glabris. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 2
Gnaphalium foliis thymi incanis dense stipatum.
ic. t. 18. *f.* 1.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

* * * *Receptaculo nudo, seminum coronis plumo*

retortum. 8. XERANTHEMUM caulibus frutescentibus
lutis, foliis tomentosis recurvatis.

Xe

nthemum receptaculis nudis, femiuum pappo plu-
ifo. *Hort. cliff.* 400. *
nthemoides procumbens, polii folio. *Dill. elth.*
3. *t.* 322. *f.* 415.
at in Æthiopia. ♄

ANTHEMUM squamis calycinis mucronato- spinosum.
nosis.
nthemum ramosum, foliolis simplicibus, capite
nofo. *Burm. afr.* 182. *t.* 67. *f.* 3.
nthemum spinosum æthiopicum, capitulis com-
tis purpurascentibus. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 105.
at in Æthiopia.

RANTHEMUM ramis unifloris imbricatis, fo sesamoides.
linearibus adpressis.
nthemum ramosum, foliis squamosis linearibus,
ibus argenteis. *Burm. afr.* 181. *t.* 67. *f.* 2.
nthemum sesamoides, flore albo, ericæ foliis
li tomentoso adstrictis; ad radicem vero stœcha-
citrinis longioribus & solutis. *Pluk. amalth.* 213.
49. *f.* 5.
ocome s. Argyrocome africana ericoides, capi-
b. spei. *Seb. thes.* 2. *t.* 43. *f.* 5.
ysum africanum lanuginosum, angustissimo fo-
calyce floris argenteo & amplissimo. *Breyn. ic.*
t. 16 *f.* 2.
it in Æthiopia.
in aliis niveus, in aliis ferrugineus.

RANTHEMUM floribus paniculatis, foliis li- paniculatum.
ri-lanceolatis.
themum incanum, foliis oblongo acutis, capi-
s plurimis argenteis. *Burm. afr.* 180. *t.* 67. *f.* 1.
t in Æthiopia.

CARPESIUM.

PESIUM floribus terminalibus. Cernuum.
sium. *Act. upf.* 1741. *p.* 81. *Hort. upf.* 257.
ita conyzæ folio, flore cernuo. *Vaill. act.* 336.
itticus, foliis circa florem mollibus *Bauh. pin.* 266.
cernuus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 251. *t.* 252.
nthemum conyzoides cernuum, foliis circa
m mollibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 18. *f.* 6. *t.* 5. *f.* 27.
t *in* Italia. ♃

abrotanoides. 2. CARPESIUM floribus lateralibus. *Osb. it. t.* 10.
Habitat in China. *Osbeck.*
Caules *ramosi, duriusculi.* Folia *alterna, lato-lanceol in petiolos attenuata, obsolete crenata, digitum lo* Flores *sparsi, sæpe solitarii ad axillas foliorum, l gitudinaliter secundum ramos, sessiles aut brevis pedunculis unifloris insidentes, magnitudine nucis co li, nutantes.* Calyces *umbilicati, cincti foliolis tulis.* Flosculi *numerosi.* Semina *oblonga, glabra, balsamo quasi illita.*

BACCHARIS.

ivæfolia. 1. BACCHARIS foliis lanceolatis longitudinaliter di tato-serratis. *Hort. cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 152.
Conyza frutescens, foliis angustioribus nervosis. *F peruv.* 750. *t.* 37.
Eupatorium africanum, agerato affinis peruvianæ, ribus albis. *Pluk. alm.* 400. *t.* 328. *f.* 2.
Pseudo-Helychrysum frutescens peruvianum, fo longis serratis. *Moris. hist.* 3. *p.* 90.
Habitat in Virginia, Peru. ♄

neriifolia. 2. BACCHARIS foliis lanceolatis superne uno alter denticulo serratis. *Hort. cliff.* 404. * *Roy. lugdb.* 1
Arbuscula foliis nerii. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 263.
Habitat in Æthiopia. ♄

halimifolia. 3. BACCHARIS foliis obovatis superne emargin crenatis. *Hort. cliff.* 405 *Gron. virg.* 121. *Roy. lug* 153.
Senecio virginianus arborescens, atriplicis folio. *R hist.* 1799. *Herm. parad.* 225. *t.* 225.
Pseudo-Helichrysum virginianum frutescens, hali latioris foliis glaucis. *Moris. hist.* 3. *p.* 90. *s.* 7. *t.* 1 *f.* 4.
Elichryso affinis virginiana frutescens, foliis cheno podii glaucis. *Pluk. alm.* 134. t. 27. *f.* 2.
Argyrocome virginiana, atriplicis folio. *Pet. gaz. t.* *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♄

dioscoridis. 4. BACCHARIS foliis lato-lanceolatis dentatis sessilib stipulatis. *Amæn. acad.* 4 *p.* 289. *
Conyza major altera. *Bauh. pin.* 265.

Cony-

Conyza dioscoridis. *Rauv. it.* 54. *t.* 54.
Conyza syriæ. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1054. *Raj. hist.* 262. *Gron. orient.* 110.
Habitat in Syria, Ægypto.

BACCHARIS foliis obovatis denticulatis petiolatis. indica.
Eupatorio affinis planta zeylanica, foliis ulmi. *Breyn. cent. t.* 70.
Habitat in India. *Braad. ad.* Cap. b. Spei.
Rami *striis elevatis.* Folia *obovata, glabra, medio subserrato-dentata magnitudine extimi pollicis.* Corymbus *magnus, terminalis: pedunculis angulatis bracteis aliquot subulatis.* Calyces *cylindrici, læves.* Rami *ex alis foliorum superiorum, corymbo longiores.*

BACCHARIS foliis obovatis integris scabris sessilibus subtus venosis. brasiliana.
Cremate. *Marcgr. bras.* 81.
Habitat in Brasilia.
Caulis *subangulatus.* Folia *obovata, obtusa, subintegerrima, subtus venosa & scabra.* Paniculæ *rami nudiusculi,* Floribus *remotis, alternis.* Calyx *squamis imbricatis, acutis.* Pappus *ferrugineus. Similis B. indicæ, sed folia rigidiora, sessilia, vix dentata; Flores majores, rariores, remotiores.*

BACCHARIS foliis lanceolatis serrato-dentatis, corymbis foliosis. *Gron. virg.* 121. fœtida.
Conyza americana frutescens fœtidissima. *Dill. elth.* 106. *t.* 89. *f.* 105?
Habitat in Virginia. ♃

CONYZA.

CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *Hort. cliff.* 405. *Hort. upf.* 257 * *Roy. lugdb.* 157. *Gouan. monsp.* 436. squarrosa.
Conyza major vulgaris. *Bauh. pin.* 265.
Conyza. *Cam. epit.* 612.
Habitat in Germaniæ, Belgii, Angliæ, Galliæ *siccis.* ♂

CONYZA foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis. linifolia.
Aster americanus albus, mezerei arabum exasperatis

 foliis,

foliis, florum petalis reflexis. *Pluk. alm.* 56. *t.* *f.* 2.
Habitat in America *septentrionali.*

saxatilis. 3. CONYZA foliis linearibus subdentatis, pedunc longissimis unifloris, caule frutescente tomen
Gnaphalium foliis alternis linearibus acutis planis, dunculis longissimis unifloris. *Hort cliff.* 401.
Helichrysum capitulis singularibus brevibus. *M hist* 3. *p.* 87. *s.* 7. *t.* 10. *f.* 16.
Helichrysum saxatile, singulari capitulo, amplo, gutto stoechadis folio. *Bocc. mus.* 142. *t.* 104.
Elichryso sylvestri, flore oblongo, similis. *Bauh* 165. *prodr.* 123. *t.* 123.
Habitat in Italia, Istria, Carinthia, Valesia, Pal na, Cap. b. Spei. ♄
Caules primum procumbentes, dein erecti. Calyce *lyndrici apice patulo membranaceo.* Flosculi *fe plurimi, nudi in ambitu.*

asteroides. 4. CONYZA foliis lato-lanceolatis subserratis, c lis radiatis.
Aster mariland cus, ptarmicae capitulis, flore a baccharidis monspeliensium folio & effigie. *mant.* 29
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Habitus *Asteris.* Corymbus *subfastigiatus.* Flores *cedentis radiati.*

virgata. 5. CONYZA foliis decurrentibus lanceolatis serrul caule virgato, floribus spicatis sparsis congest
Conyza altera, foliis helenii angustis, alato c *Plum spec.* 9 *ic.* 98 *f.* 2 ?
Conyza angustifolia subincana, caule alato, spica tiplici, floribus inferioribus ternatis; superio paucioribus. *Brown. jam.* 318.
Gnaphalium virgatum. *Amœn. acad.* 5. *p.* 405.
Helichrysum caule alato, floribus spicatis. *Sloan.* 125. *hist.* 1. *p* 206. *t.* 152. *f.* 5.
Habitat in Jamaica, Carolina. ♃

decurrens 6. CONYZA foliis decurrentibus lanceolatis serrul caule subdichotomo, floribus axillaribus sessil glomeratis.
Habitat in India. ☉

Statu

Statura *Filaginis*. Caulis *palmaris*, *erectus*, *villoso-tomentosus*, *ut tota planta*. Folia *lanceolata*, *decurrentia longius quam ipsa folia*, *ut in Genista sagittali*. Florum *glomerati cinerei*, *ex alis foliorum*, *globosi*.

CONYZA foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 405. — bifrons.
Eupatoria coryzoides maxima canadensis, foliis caulem amplexantibus. *Pluk. alm.* 141. *t.* 87. *f.* 4.
Habitat in Canada.
Conferatur Inula bifrons.

CONYZA foliis inferioribus trifidis, superioribus ovato-lanceolatis obsolete serratis, floribus corymbosis. *Hort. cliff.* 405. — lobata.
Conyza arborescens lutea, folio trifido. *Plum. spec.* 9. *ic.* 96.
Virga aurea major s. Doria folio sinuato hirsuto. *Sloan. jam.* 125. *hist.* 1. *p.* 260. *t.* 152. *f.* 4.
Habitat in Vera Cruce. ♄

CONYZA foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllis: bracteis oppositis. — bifoliata.
Eupatoria conyzoides, integro jacobææ folio molli & incano. *Pluk. alm.* 140. *t.* 177. *f.* 1.
Habitat in India.

CONYZA caule tortuoso fruticoso, foliis ovato-oblongis integerrimis, racemis reflexis. *Hort. cliff.* 405. * — tortuosa.
Conyza madagascariensis fruticosa, tortuoso caule, corni folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 396.
Habitat in Madagascar, Vera Cruce. ♄

CONYZA foliis lanceolato-ovatis serratis nudiusculis, pedunculis subunifloris. — anthelmintica.
Baccharoides. *Fl. zeyl.* 418. *
Conyza indica, virgæ aureæ folio, magno flore purpurascente. *Vaill. act.* 358.
Scabiosa conyzoides, foliis latis dentatis, semine amaro lumbricos enecante. *Burm. zeyl.* 210. *t.* 95.
Cattu-Schiragam. *Rheed. mal.* 2. *p.* 39. *t.* 24. *Raj. hist.* 1443.
Habitat in India.

candida. 12. CONYZA foliis ovatis tomentosis, floribus co[...] tis, pedunculis lateralibus terminalibusque. *H. cliff* 405. *Roy. lugdb.* 157.
Conyza cretica fruticosa, folio molli candidissimo [to]mentoso *Tournef. cor.* 33.
Conyza saxatilis, folio filaginis. *Buxb. cent.* 2. *p. t.* 17.
After tomentosus luteus, verbasci folio. *Bocc. sic. t.* 31. *f* 2.
Jacobæa cretica incana, integro limonii folio. *B rar. t.* 217.
Habitat in Creta.

[ba]lsamifera. 13. CONYZA foliis lanceolatis subtus tomentosis, [...]tiolis etiam serrato-dentatis.
Conyza odorata. *Rumph. amb.* 6. *t.* 24. *f.* 1.
Conyza arbor zeylanensis, subrotundo folio max[...] tomentoso. *Pluk. amalth.* 64.
Habitat in India. ♄

cinerea 14. CONYZA foliis oblongis, floribus paniculatis.
Senecioides. *Fl. zeyl.* 419. *
Senecio indica, foliis ternis crepatis. *Burm. zeyl.* [...] *t.* 96 *f.* 1.
Eupatorium, angustiore folio, bermudense, flori[...] flavescentibus. *Pluk. alm.* 141. *t.* 243. *f.* 3.
Olus scrophinum. *Rumph. amb.* 6. *t.* 14. *f.* 1.
Habitat in India. ☉
Variant Folia figura lanceolata s. ovata, crenata s. [...]*rata.*

odorata. 15. CONYZA foliis ovatis serratis subtomentosis [...]tis, caule corymboso, corollis subglobosis. *Am. acad.* 5. *p.* 406.
Conyza odorata minor erecta purpurascens corym[bo]sa, foliis ovatis villosis. *Brown. jam.* 318.
Conyza arborescens purpurea, folio verbasci denta[to]. *Plum. spec.* 9. *ic.* 97.
Conyza major odorata f. Baccharis floribus purpur[eis] nudis. *Sloan. jam.* 124. *hist.* 1. *p.* 258. *t.* 152. *f.* 1.
β. Eupatoria conyzoides maderaspatana, foliis glab[ris] flore purpurascente. *Pluk. alm.* 141. *t.* 177. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali.*

[...]virensis. 16. CONYZA foliis lanceolato-ovatis reflexo-serra[tis] subtus tomentosis, floribus terminalibus congesti[s].

Sene-

Senecio amboinicus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 36. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in China. *Toren.*
An *plures quam tres flores simul congesti.*

CONYZA foliis ovatis integerrimis obtusis, floribus sessilibus alternis, ramulis flexuosis. fruticosa.
Conyza frutescens, cydoniæ folio. *Plum. spec.* 9. *ic.* 95. *f.* 1.
Eupatorium americanum frutescens, hederæ terrestris folio, flore purpurascente. *Plum. spec.* 10.
Habitat in America *meridionali.* ♄

CONYZA foliis ovatis integerrimis acutis subtus tomentosis, spicis recurvatis secundis, bracteis reflexis. arborescens.
Conyza arborescens, floribus cæruleis. *Plum. spec.* 10. *t.* 130. *f.* 2.
Conyza fruticosa, flore pallide purpureo, capitulis ad lateribus ramulorum spicatim exeuntibus. *Sloan. jam.* 124. *hist.* 1. *p.* 257.
Eupatorium erectum hirsutum, foliis oblongis rugosis, floribus spicatis per ramulos terminales reclinatis, uno versu dispositis. *Brown. jam.* 313.
Habitat in America *meridionali.* ♄

CONYZA foliis ovalibus integerrimis scabris subtus hirsutis. hirsuta.
Habitat in China.
Caulis subvillosus. Folia *oblonga s. ovalia, integerrima, scabra, subtus valde hirsuta pallida.* Flores *in racemis conferti.* Calyces *Asteris.*

ERIGERON.

ERIGERON pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis denticulatis calycibus squarrosis, corollis radiatis. *Hort. upf.* 258.* *Gron. orient.* 267. *Gouan. monsp.* 437. viscosum.
Erigeron foliis serratis, pedunculis simplicibus lateralibus unifloris longitudine folii foliosis. *Hort. cliff.* 409.
Conyza mas theophrasti, major dioscoridis. *Bauh. pin.* 265.
Conyza major. *Dod. pempt.* 51.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia.
Planta adspersa pilis, interjectis glandulis viscidis.

graveolens. 2. ERIGERON ramis lateralibus multifloris, foli ceolatis integerrimis, calycibus squarrosis. *acad.* 4. *p.* 290. * *Gouan. monsp.* 437.
Virga aurea minor, foliis glutinosis & graveole *Tournef. inst.* 484.
Conyza femina theophrasti, minor dioscoridis *pin.* 261.
Conyza minor vera. *Lob. ic.* 346. *Barr. ic.* 37
Habitat Monspelii, *in* Oriente. ⊙
Simile E. viscoso, sed longe minus. Rami *multiflo* res *pallide lutei*, *radiati.*

siculum. 3. ERIGERON calycinis squamis inferioribus la rem superantibus. *Hort. cliff.* 407. *Gouan.* 438.
Conyza sicula annua, foliis atro-virentibus, e bente. *Bocc. sic.* 62. *t.* 31. *f.* 4. *Moris. hist.* 3. *s.* 7. *t.* 20. *f.* 28. *Pluk. phyt.* 168. *f.* 2.
Conyza caulibus rubentibus tenuioribus, flo nudo. *Magn. monsp.* 77. *t.* 76.
Conyzæ species foliis virgæ aureæ. *Bauh. hi* 1049.
Habitat in Siciliæ, Monspelii *paludosis.* ⊙
Flores absque radio, minores. Pedunculi tecti nearibus, recurvis, minutis. Cæterum simill graveolenti excepto radio omni.

carolinianum. 4. ERIGERON caule paniculato, floribus sub terminalibus, foliis linearibus integerrimis.
Virga aurea carolinensis, linariæ monspessulan *Dill. elth.* 412. *t.* 306. *f.* 393.
Habitat in Carolina

canadense. 5. ERIGERON caule floribusque paniculatis *cliff.* 407. *Hort. upf.* 258. *Gron. virg.* 122. G 475.
Conyza annua acris alba elatior, linariæ foli *ris. hist.* 3. *p.* 115. *s.* 7. *t.* 20. *f.* 29. *Bocc. sic.* 8
Habitat in Canada, Virginia, *nunc in* Europ *li.* ⊙

jamaicense. 6. ERIGERON caule paucifloro subvilloso, f neiformi-lanceolatis serraturis utrinque *Amæn. acad.* 5. *p.* 406. *
Senecio tomentosus, foliis oblongo-ovatis denticulatis, petiolis brevibus. *BrowVn. jan*

o minor, bellidis majoris folio. *Sloan. jam.* 125. *t. p.* 260. *t.* 152. *f.* 3.
t *in* Jamaica.

ERON foliis basi revolutis. **bonarienfe.**
on foliis inferioribus dentato-laciniatis; superio- integris. *Hort. cliff.* 407. *Hort. upf.* 258.
o bonarienfis purpurafceus, foliis imis corono- *Dill. elth.* 344. *t.* 257. *f.* 334.
t *in* America *auftrali.* ☉

ERON caule multifloro, foliis lanceolatis fub- **philadelphi- cum.**
tis; caulinis femiamplexicaulibus. *Gouan monfp.*

t *in* Canada. *Kalm.* ♃
pedalis, parum ramofus. Folia *lanceolata, fca- una alterave acuta ferratura;* Caulina *femiam- caulia, breviora.* Flores *fæpe 7 ad* 8, *radio albo purpurafcente; pappo albo.*

ERON pedunculis alternis unifloris. *Hort. cliff.* **acre.**
Fl. fvec. 691; 741. *Roy. lugdb.* 165.
on vulgare. *Fl. lapp.* 308.
a cærulea acris. *Bauh. pin.* 265.
is montanus æquicolorum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 25.
i.
t *in* Europæ *apricis, ficcis.* ♃

GERON caule fubbifloro, calyce fubhirfuto. **alpinum.**
a cærulea alpina major. *Bauh. pin.* 265. *prodr.* *Burf.* XV: 33.
montano purpureo fimilis f. globulariæ. *Bauh.* 2. *p.* 107.
t *in Alpibus* Helvetiæ. ♃
ruffo-ferrugineus eft. Nimium affine fequenti, ut fola varietas.

GERON caule unifloro, calyce pilofo. *Hort.* **uniflorum.**
407. *Fl. fvec.* 692; 742. *
caule unifloro, foliis integerrimis, calyce vil- fubrotundo. *Fl. lapp.* 307. *t.* 9. *f.* 3.
caule unifloro, calyce tomentofo. *Hall. helv.*

a cærulea alpina major. *Bauh. pin.* 265. *prodr.* *Burf.* XV: 34.
t *in Alpibus* Lapponiæ, Helvetiæ. ♃

12. ERI-

graminenm. 12. ERIGERON caule unifloro, foliis linearibus tis scabris.

Aster caule unifloro longitudine foliorum line *Gmel. sib.* 2. *p.* 174. *t.* 76. *f.* 2.

Aster acaulos albus, foliis gramineis. *Amm. rut*

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃

Minima planta, obvallata Foliis emarcidis, aridis

gouani. 13. ERIGERON floribus congestis, calycibus membranaceis, foliis lanceolatis subdentatis gine scabris.

Habitat - - - - D. Gouan.

Caulis *pedalis, nudiusculus.* Folia *alterna, remo ceolata, nuda, serrato-dentata, ad margines scabra: inferiora petiolata.* Flores *absque ra sculis multis femineis.*

camphoratum. 14. ERIGERON foliis lanceolato-ovatis villosi raturis apice cartilagineis. *Hort. upf.* 259. *Gro* 122.

Baccharis foliis ovato-lanceolatis serratis, herbaceo. *Gron. virg.* 1. *p.* 97.

Habitat in Virginia. ☉

tuberosum. 15. ERIGERON foliis linearibus, ramis unifloris, suffruticoso. *Gron. orient.* 266. *Gouan. monsp.*

Erigeron caule subunifloro, foliis lanceolato-line rigidis, radice tuberosa. *Sauv. monsp.* 55.

α. Chondrilla bulbosa syriaca, foliis angustioribus. *pin.* 130.

Chondrilla altera dioscoridis putata. *Clus. hist.* 145.

Conyza marina. *Moris. hist.* 3. *p.* 114. *f.* 7. *t.* 20. *bona.*

β. Chondrilla bulbosa syriaca, foliis latioribus. *pin.* 130.

Conyza tuberosa lutea, foliis angustis & rigidis. *monsp.* 77. *Moris. hist.* 3. *p.* 114. *f.* 7. *t.* 20. *f.*

γ. Aster conyzoides gesneri. *Moris. hist.* 3. *p.* 11 *t.* 22. *f.* 7.

Habitat in Galloprovincia, G. Narbonensi, Sy

Caulis *brevis, lignosus,* Rami *simplices, uniflori lia sparsa, lanceolata, subpetiolata, integerrima.* res *lutei, Asteris facie, terminales, sessiles.* I *griseus. Media inter Asteres & Erigera.*

16. E

GERON foliis lanceolato - linearibus retusis, ibus corymbosis. **fœtidum.**
io africanus, folio retuso. *Mill. dict. t.* 233.
io fœtidus africanus perennis, foliis confertim
entibus. *Pluk. alm.* 343. *t.* 223. *f.* 4.
ra africana, senecionis flore, retusis foliis. *Herm.*
b. 661. *t.* 662.
t in Africa. ♃
nimium Inulæ fœtidæ, sed flores flosculosi s. radia
tuti.

TUSSILAGO.

ILAGO scapo unifloro subsquamoso erecto, s lyrato - ovatis. **Anandria.**
go scapo unifloro, calyce clauso. *Hort. upf.*
t. 3. *f.* 1. * *Gmel. sib.* 2. *p.* 141. *t.* 68. *f.* 1.
ria. *Amæn. acad.* 1. *p.* 120. *t.* 11. *
igo scapo unifloro, calyce subaperto. *Gmel. sib.*
143. *t.* 67. *f.* 2.
in Sibiria. ♃
demque planta, quæ in solo libero tempore æstatis
em clausum flore occultato gerit, in olla loco ca-
i florem præcociorem radiatum expandit radii pe-
tripartitis, ut variis annis observavimus. Seminum
us sessilis, pilosus.
ILAGO scapo unifloro ebracteato, flore nu- s, foliis lyratis obtusis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 406. **nutans.**
idon foliis radicalibus oblongis obovatis subtus
ginosis incanis, scapo simplici nudo unifloro.
m. jam. 310.
eonis folio subtus incano, flore purpureo. *Sloan.*
123. *hist.* 1. *p.* 255. *t.* 150. *f.* 2.
primulæ veris folio, flore singulari purpureo.
spec. 14. *ic.* 41. *f.* 1.
in America.
LAGO scapo unifloro ebracteato, foliis lan- itis dentatis villosis. *Burm. plum.* 28. † **dentata.**
caulos, hieracii villosis foliis. *Plum. spec.* 10.
f. 2.
in America.
ILAGO scapo subnudo unifloro, foliis corda- rbiculatis crenatis. *Hort. cliff.* 411. *Roy. lugdb.* **alpina.**
Gouan. monsp. 438.

Tussi-

Tussilago alpina rotundifolia glabra. *Bauh. pin.*
Tussilago alpina 2 *Clus. hist.* 2. *p.* 113.
β. Tussilago alpina rotundifolia canescens. *Bau* 197.
Tussilago alpina 1, flore evanido. *Clus. hist.* 2.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Bohemi biriæ. ♃
Flos flosculosus: flosculis femineis in ambitu.

Farfara. 5. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foli cordatis angulatis denticulatis. *Hort. cliff.* 4 *svec.* 680; 743. *Mat. med.* 391. *Roy. lugd* *Dalib parif.* 256. *Gmel. sib.* 2. *p.* 140.
Tussilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
Tussilago. *Clus. hist.* 140. *Cam. epit.* 590. 591.
Habitat in Europæ *argillosis, subtus humidis.* ♃
Flores radiati.

frigida. 6. TUSSILAGO thyrso fastigiato, floribus r *Fl. lapp.* 303. *Fl. svec.* 682; 744.
Tussilago scapo imbricato, floribus spicatis f foliis infra incanis acutis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 150.
Petasites scapo paucifloro, foliis subtus toment bissimis. *Hall. helv.* 707.
Cacalia tomentosa. *Bauh. pin.* 198. *prodr.* 102. *alp.* 130. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat in Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Sibir *vallibus.* ♃
Flores radiati.

alba. 7. TUSSILAGO thyrso fastigiato, flosculis femir dis paucis. *Hort. cliff.* 411. *Fl. svec.* 681; 74 *lugdb.* 159.
Petasites minor. *Bauh. pin.* 197.
Petasites flore albo. *Cam. epit.* 593.
Habitat in Europa. ♃
Flores flosculosi: flosculis femineis in ambitu.

hybrida. 8. TUSSILAGO thyrso oblongo, flosculis f nudis plurimis. *Hort. cliff.* 411. *Roy. lugd* *Gort. gelr.* 478.
Petasites major, floribus pedunculis longis in bus. *Dill. elth.* 309. *t.* 230. *f.* 297.
Petasites in medio majoribus flosculis, reliquis ribus. *Buxb. hal.* 258.

tat in Germania, Hollandia. ♃
es flosculosi: flosculis hermaphroditis & femineis.

SSILAGO thyrso ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff.* 411. *Fl. svec.* 685; 746. *t. med.* 390. *Roy. lugdb.* 159. *Dalib. paris.* 256. lago major. *Cam. epit.* 592. ites major & vulgaris. *Bauh. pin.* 197. *tat in* Europa *temperatiore.* ♃ *es flosculosi: flosculis omnibus hermaphroditis.* — Petasites.

SENECIO.

* *Floribus flosculosis.*

NECIO corollis nudis, foliis amplexicaulibus laris, caule herbaceo erecto. *Hort. upf.* 261. cio foliis lanceolatis amplexicaulibus lævibus nte sinuatis denticulatis, caule herbaceo. *Hort. ff.* 406. *Roy. lugdb.* 163. cio americanus altissimus, blattariæ f. hieracii fo. *Herm. par.* 226. *t.* 226. *Pluk. phyt.* 112. *f.* 1. *at in* America *septentrionali.* ⊙ — hieracifolius.

NECIO corollis nudis, foliis lanceolatis dentatis bris, ramulis floriferis divaricatis. *tat in* China. *Osbeck.* *s erectus, angulatus, angustus, sesqui pedem altus.* lia *alterna, remota, lanceolata, petiolata, serra-dentata, tomentoso-scabra.* Ramorum *tantum rudimenta ex alis foliorum. Ex supremis alis foliorum quot ramuli cum floribus, basi admodum divaricati.* ores *terminales, aliquot, pedunculati, magnitudi- præcedentis, Calycibus basi squamis aliquot laxis subulatis adspersis.* — divaricatus.

NECIO corollis nudis, foliis lanceolatis integerrimis basi subdentatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 62. * *tat ad* Cap. b. Spei. — persicifolius

NECIO corollis nudis, foliis lyratis subtus tomentosis, pedunculis unifloris: squamis subulatis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 63. *tat ad* Cap. b. Spei. ♄ — virgatus.

NECIO corollis nudis, foliis lyratis hirtis: superioribus lanceolatis dentatis. — purpureus.

Sene-

Senecio viscosus æthiopicus, flore purpureo. *cent.* 139. *t* 67.
Habitat in Æthiopia.

Pseudo China. 6. SENECIO corollis nudis, scapo subnudo lon *Roy. lugdb.* 164.
Senecio maderaspatanus, rapi folio, floribus m cujus radix a nonnullis China dicitur. *Di* 345. *t.* 258 *f.* 335.
Habitat in India. ♃

vulgaris. 7. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato sinu plexicaulibus, floribus sparsis. *Roy. lugdb.* 16 *helv.* 733. *Fl. svec.* 690; 47 *Dalib. paris.* 257
Senecio foliis pinnatifidis denticulatis: laciniis libus patentissimis: rachi lineari. *Hort. cliff.*
Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131. *Fl. lap*
Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.
Habitat in Europæ *cultis, ruderatis, succulentis.*

* * *Floribus radiatis: radio revoluto.*

triflorus. 8. SENECIO corollis revolutis, foliis sessilibu tis, calycibus conicis: squamis minimis in *Hort. upf.* 261.
Senecio foliis pinnatifidis: laciniis inæqualib ctis. *Hort. cliff.* 406.
Senecio foliis sinuatis petiolatis, pedunculi longioribus, florum radiis disco brevibus. *lugdb.* 165.
Jacobæa ægyptica, senecionis folio, semiflosc conspicuis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 298.
Habitat in Ægypto. ☉

ægyptius. 9. SENECIO corollis revolutis, foliis amplexic sinuatis, squamis calycinis brevioribus i sphacelatis. *Hort. upf.* 261. *
Jacobæa ægyptica, senecionis folio, flore r *Vaill. act.* 1720. *p.* 298.
Habitat in Ægypto. ☉

lividus. 10. SENECIO corollis revolutis, foliis ampl libus lanceolatis dentatis, squamis calycin vissimis intactis. *Hort. upf.* 201. *
Senecio foliis sinuatis: basi latioribus ample bus, floribus corymbosis, radiis disco brev *Roy. lugdb.* 165?
Habitat in Hispania. ☉

11.

SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, squamis calycinis sphacelatis laceris. *Hort. upf.* 261. * — trilobus.
Jacobaea hispanica minus laciniata, petalis brevissimis. *Vaill. paris.* 21.
Habitat in Hispania. ⊙

SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Fl. svec.* 2. *n.* 749. * — viscosus.
Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis: superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 142. *It. w.got.* 142. *Dalib. paris.* 258.
Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.
Senecio incanus pinguis. *Bauh. pin.* 131.
Habitat in Europae *pagis, urbibus.* ⊙

SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. — sylvaticus.
Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *It. gotl.* 326. *Fl. svec.* 689; 748. *Dalib. paris.* 258.
Senecio minor, latiore folio, s. montanus. *Bauh. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.
Jacobaea, senecionis folio incano, perennis. *Raj. hist.* 285. *Hall. jen.* 177. *t.* 4.
Habitat in Europae *borealis sylvis caeduis.* ⊙

SENECIO corollis recurvatis, foliis lyratis sinuatis obtusis petiolatis, caule hirsuto. — nebrodensis
Jacobaea montana, senecionis pallido parvo flore. *Barr. rar.* 1081. *t.* 401.
Jacobaea nebrodensis altera, oblongo folio latiori minus incano lacerato. *Raj. suppl.* 179.
Habitat in Sicilia, Hispania, Pyrenaeis. *Alstraemer.* ⊙
Statura *S. vulgaris*, *sed* Folia *majora*, *obtusiora*, *repando-sinuata*, *integerrima.* Caulis *minus divisus*, *valde hirsutus.* Pedunculi *solitarii*, *viscidi.* Flores *solitarii*, *magnitudine S. Jacobaeae*, *radio minus revoluto.* Calyx *non sphacelatus.*

SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus lanceolatis obtusis dentatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 164. — glaucus.
Jacobaea aegyptia annua, coronopi folio glauco. *Vaill. act.* 1720. *p.* 297.

Jacobæa ægyptia, folio glauco coronopi. *Boerh* 1. *p.* 99.
Habitat in Ægypto. ⊙
Planta pubescens cinerea.

varicosus. 16. SENECIO corollis revolutis, foliis ovatis tis dentatis puculato-varicosis. *Linn. dec.* 9.
Habitat in Ægypto. ⊙
Folia subtus sanguinea.

* * * *Floribus radiatis: radio patente, Foliis pin*

hastulatus. 17. SENECIO corollis radiantibus, petiolis a caulibus, pedunculis folio triplo longiorib liis pinnato-sinuatis. *Roy. lugdb.* 164.
Jacobæa afra perennis viscosa lutea, asplenii foli *act.* 1720. *p.* 298. *Dill. elth.* 183. *t.* 152. *f.* 18.
Habitat in Africa. ♃

pubigerus. 18. SENECIO corollis radiantibus, petiolis radi lanatis, foliis pinnatifidis, caulibus simplicissi ribus lateralibus sessilibus. *Amœn. acad.* 6. *a*
Jacobæa spicata monomotapensis. *Breyn. ce* *Moris. hist.* 3. *s.* 7. *t.* 18. *f.* 32.
Habitat ad Cap. b Spei.

elegans. 19. SENECIO corollis radiantibus, foliis pin æqualibus patentissimis: rachi inferne a *Hort. cliff.* 406. *Hort. ups.* 260.
Aster africanus annuus, senecionis foliis. *Com* 2. *p.* 59. *t.* 30.
Jacobæa capensis, flore purpureo, senecion dentato. *Seb. mus.* 1 *p.* 33. *t.* 22. *f.* 1.
β. Jacobæa africana frutescens, flore amplo p elegantissimo, senecionis folio. *Volk. norib* 225.
Habitat in Æthiopia.
Varietas β. major Caule frutescente ab α videtur o

squalidus. 20. SENECIO corollis radiantibus calyce lon integris, foliis pinnatifidis: laciniis lineari stantibus. *Hort. ups.* 260.
Habitat in Europa *Australi.* ⊙

crucifolius. 21. SENECIO corollis radiantibus, foliis pin dentatis subhirtis, caule erecto. *Fl. svec.* 2

:io fcanorenfis. *It. fcan.* 225.
:io Jacobæa felandica incana. *Lob. illuftr.* 76.
æa incana altera. *Bauh. pin.* 131.
æa artemifiæ folio, radice repente. *Vaill. act.* 566.
æa altiffima, foliis erucæ artemifiæve fimilibus
æmulis. *Rupp. jen.* 164.
æa incana repens. *Barr. rar.* 1075. *t.* 153.
at in aggeribus Europæ *temperatæ.*

NECIO corollis radiantibus, foliis utrinque to- incanus.
ntofis fubpinnatis obtufis, corymbo fubrotundo.
ll. helv. 731. *Gouan. monfp.* 440.
anthemum alpinum incanum, foliis laciniatis.
h. pin. 134.
anthemum alpinum 1. *Cluf. hift.* 1. *p.* 333.
æa alpina incana minor. *Barr. ic.* 262. *Bocc. muf.*
. 20. *t.* 8.
thium alpinum umbelliferum tenuifolium & mi-
. *Bauh. pin.* 140.
t in Alpibus Helvetiæ, Auftriæ, Pyrenæorum,
nfpelii.
s digitales, foliofi. Folia *Achilleæ clavennæ f.
onnæ maritimæ licet parva, pinnatifida, obtufa, to-
tofa, alba, lineata.*

NECIO corollis radiantibus, foliis pinnato-mul- abrotanifolius.
lis linearibus nudis acutis, floribus corymbofis.
t. vind. 288. * *Gouan. monfp.* 440.
io foliis decompofitis. *Guett. ftamp.* 360.
anthemum alpinum, foliis abrotani multifidis.
h. pin. 134.
anthemum alpinum II. *Cluf. hift.* 1. *p.* 333. *t.*
.
t in Alpibus Stiriacis, Pyrenaicis, Carinthiæ,
to Dei. ♃

NECIO corollis radiantibus, foliis bipinnatis li- canadenfis.
ibus.
t in Canada. *Kalm.*
erectus, lævis. Folia *bipinnata, linearia, gla-
fumma fimpliciter pinnata.* Corymbus *termi-
compofitus, faftigiatus, flavus.* Calyces *rufe-
es.*

NECIO corollis radiantibus, foliis pinnato-lyra- Jacobæa.
 tis:

tis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Hort. cliff.* *Fl. svec.* 688; 751. *Roy. lugdb.* 174. *Dalib. parif.* *Meese. frisl.* 357.

Jacobæa vulgaris laciniata. *Bauh. pin.* 131.

Herba f. Jacobi. *Fuchs. hist.* 742.

β. Jacobæa vulgaris, flore nudo. *Raj. angl.* 2. *p.* 82. *ris. hist.* 3. *p.* 108.

Jacobæa vulgaris laciniata, flore discoide. *Vaill.* 1720. *p.* 383.

Habitat in Europæ *pascuis humentibus.* ♃

Varietas discoidea β. vix differt specie, quam sit fi ma; frequentissima in dunis Belgicis.

aureus. 26. SENECIO corollis radiantibus, foliis crenatis: fimis cordatis petiolatis; superioribus pinnatifid ratis. *Gron. virg.* 126.

Jacobæa virginiana, foliis imis alliariæ glabris; c scentibus barbareæ. *Moris. hist.* 3. *p.* 110. *Raj.* 180.

Habitat in Virginiæ, Canadæ *madidis umbrosis.* ♃

Antecedenti nimis affinis.

umbellatus. 27. SENECIO corollis radiantibus calyce longior foliis pinnato-dentatis denticulatis: laciniis di bus. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 64. *

Habitat ad Cap. b. Spei.

* * * * *Floribus radiatis: radio patente, Foliis indiv*

linifolius. 28. SENECIO corollis radiantibus, foliis linearibu tegerrimis, corymbo subsquamato, caule herb

Solidago foliis linearibus integerrimis, corymbo plici. *Hort. cliff.* 410.

Linariæ aureæ affinis. *Bauh. pin.* 213. *prodr.* 107.

Jacobæa linifolia hispanica & italica. *Bocc. mus.* 2. *p* *t.* 49. *Barr. rar.* 97. *t.* 802.

Habitat in Hispania, Italia. ♃

Pedunculi *squamis minutis acutis adsperfi.* Calyx *necionis, licet non sphacelatus.*

paludosus. 29. SENECIO corollis radiantibus, foliis ensiform acute serratis subtus subvillosis, caule stricto. *svec.* 2. *n.* 752.

Senecio foliis integris serratis. *Guett. stamp.* 2. *p.* *It. scan.* 396. *

Solidago caule simplici, corymbo terminali, fol subtus

us tomentosis, flosculis femineis sedecim. *Lech.* . 68. *Fl. svec.* 686.
ea foliis longis integris & mucronatis. *Moris.* 3. *p.* 110. *s.* 7. *t.* 19. *f.* 22.
a palustris serratifolia. *Bauh. pin.* 266.
go palustris altissima incana & tomentosa, fo- longioribus serratis. *Amm. ruth.* 220. *Gmel. sib.* . 162.
t in Europæ *paludibus maritimis.* ♃
foliis utrinque tomentosis.

ECIO corollis radiantibus octonis, foliis lan- atis biserratis subtus villosis, caule ramoso. nemorensis.
an. monsp. 441.
o foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, flori- umbellatis. *Hall. helv.* 734. *itin.* 23.
ea nemorensis, latiore rigidiore & hirsuto folio. *). jen.* 142.
go foliis lanceolatis serratis, floralibus ad pe- culum minimis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 165.
t in Germaniæ, Sibiriæ *nemoribus.* ♃

ECIO corollis radiantibus, floribus corymbosis, Doria.
s subdecurrentibus lanceolatis serratis: superio- s sensim minoribus. *Jacq. vind.* 155. *Gouan. p.* 440.
go caule simplici, corymbo terminali, pedun- terminalibus nudis foliolo subjecto brevissimo. *t. cliff.* 410.
aurea major s. Doria. *Bauh. pin.* 268.
monspeliensium s. Doria. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1054.
t in Oriente, Austriæ *sylvis*, Monspelii *ad La- pas.* ♃
Doria orientalis, limonii folio. *Dill. elth.* 125. 05. *f.* 125.
Caulis superiora evadunt minuta, ut corymbus longius pedunculatus appareat; in sequenti folia scula usque ad corymbum continuant.

ECIO corollis radiantibus, floribus corymbo- foliis lanceolatis serratis glabriusculis. *Hort. upf.* saracenicus
Gouan. monsp. 441.
o foliis lanceolatis serratis, floralibus peduncu- æquantibus. *Vir. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 163. *Gort.* 481.

 Soli-

Solidago caule simplici, corymbo terminali: culis partialibus alternis nudis longitudi *Hort. cliff.* 410.
Solidago saracenica. *Fuchs. hist* 728.
Virga aurea angustifolia serrata. *Bauh. pin.* 26
Jacobæa, subrotundo minus laciniato folio. *pin.* 131.
Habitat in Helvetiæ, Monspelii *montanis*, *sis.* ♃
Dignoscitur facie, latis foliis, magnitudine, ra xime reptante.

Doronicum. 33. SENECIO corollis radiantibus, caule indivi unifloro, foliis indivisis serratis: radicalibus subtus villosis. *Gouan. monsp.* 441.
Solidago Doronicum. *Sp. pl.* 1. *p.* 880.
Doronicum foliis lanceolatis alternis dentatis nis amplexicaulibus, caule ramoso. *Roy. lug*
Doronicum longifolium hirsutie asperum. *B* 185.
Doronicum II. austriacum 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 17.
β. Doronicum foliis oblongo-lanceolatis serratis. *nier. obs.* 152.
Doronicum integro & crasso hieracii folio. *monsp.* 295.
γ. Doronicum foliis lanceolatis denticulatis sub mentosis, caule unifloro. *Roy. lugdb.* 160.
Doronicum helveticum incanum. *Bauh. pin prodr.* 97. *Burs. X.* 29.
δ. Tussilago alpina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 197. 101.
ε. Virga aurea montana serrata, magno flore. *B* 268.
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Monspeliacis, He cis, Austriacis, Italicis. ♃
Caulis *simplicissimus, villosus:* Folia *Radicalia oblonga, petiolata, serrata, obtusiuscula, crassi villosa subtus, supra glauca. Caulina parva, la ta, & fere subulata.* Flos *terminalis, sæpius crassiusculus.* Calyx *calyculatus.*

longifolius. 34. SENECIO corollis radiantibus, foliis line sparsis, caule fruticoso.
Jacobæa africana, folio capillaceo viridi. *Herm.*

Jacobæa africana fruticans, oblongis foliis angustis integris incanis. *Volk. norib.* 224.
Jacobæa africana frutescens, lavendulæ folio latiore & angustiore. *Comm. hort.* 2. *p.* 141. *t.* 71.
Jacobæa æthiopica, lavendulæ folio. *Breyn. cent. t.* 63.
Jacobæa æthiopica, augustissimis & prælongis foliis rarius crenatis. *Pluk. mant.* 107. *t.* 421. *f.* 5.
Habitat ad Cap. b. Spei. *Burmannus.* ♄
Folia *linearia*, *sparsa*, *longa*, *nuda*, *scabra.* Flores *corymbosi.*

SENECIO corollis radiantibus, foliis oblongis remote dentatis spinoso-denticulatis supra nudis, caule herbaceo. byzantinus
Senecio foliis crenato dentatis: inferioribus pinnato-lyratis: superioribus pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 530.
Habitat Byzantii. ♂
Caulis *quadripedalis*, *teres*, *striatus*, *viridis*, *adspersus pilis albis.* Rami *in inferiore parte Caulis*, *patentissimi.* Folia *lanceolata*, *sessilia*, *amplexicaulia*, *revoluta*, *serrata dentibus acutis*, *sinubus obtusis*, *acuminibus denticulis scabris*, *supra viridia*, *nitida*, *scabriuscula*; *subtus venosa*, *subvillosa*, *viridia.* Ramorum *rudimenta ex singulis alis foliorum.* Scapi *terminales*, *teretes*, *caule longe angustiores*, *filiformes*, *longissimi*, *læviores*, *striati*, *inferne adspersi Foliis linearibus*, *indivisis*, *non dentatis*, *sed serrato-spinosis*; *subnudi.* Corymbi *terminales*, *alterni*, *subdivisi.* Calyces *apice sphacelati.* Corollæ *luteæ*: Radio *octifloro*, *ovato*, *vix tridentato.* Facies *Serratulæ arvensis.*

SENECIO corollis radiantibus, foliis obovatis carnosis subdentatis, caule fruticoso. halimifolius
Solidago foliis obverse ovatis carnosis crenatis, caule fruticoso, corymbo ramoso. *Hort. cliff.* 411.
Doria africana arborescens, foliis crassis & succulentis atriplicem referentibus. *B. Dill. elth.* 124. *t.* 104. *f.* 124.
Habitat in Æthiopia. ♄

SENECIO corollis radiantibus, foliis sagittatis amplexicaulibus dentatis, caule fruticoso. *Vir. cliff.* 84. *Hort. cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164. ilicifolius.

Jacobæa africana frutescens, foliis incisis & fl cinereis. *Comm. rar.* 42. *t.* 42.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

[...]us. 38. SENECIO corollis radiantibus, foliis amplexi[...]bus oblongis indivisis denticulatis nudis, caul[...]ticoso.
Jacobæa africana frutescens, folio longo glauco. (*hort.* 2. *p.* 143. *t.* 72. *Raj. suppl.* 174.
Jacobæa africana perennis, integro oblongo folio co. *Volk. norib.* 226. *t.* 226. *Raj. suppl.* 17[...]
Jacobæa ramosa, folio rigido glauco per limbum [...]ro. *Raj. suppl.* 176. *n.* 35.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Folia margine quasi erosa. Flores parvi.

[...]gidus. 39. SENECIO corollis radiantibus, foliis spatulat[...] p[...]ndis amplexicaulibus scabris erosis, caule fr[...]so hirto. *Hort. cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164.
Jacobæa africana frutescens, foliis rigidis & hi[...] *Comm. hort.* 2. *p.* 149. *t.* 75. *Seb. mus.* 1. *t.* 2[...]
Jacobæa africana ramosissima, foliis senecionis pi[...] rigidis & lucentibus subtus incanis. *Raj. suppl.*
Habitat in Æthiopia. ♄
foliorum margo subspinulosus, pagina superiore l[...] licet non glabra.

[...]pulifolius 40. SENECIO corollis radiantibus, foliis ovatis [...]latis integris obtusis supra demum glabris, [...] fruticoso.
Jacobæa africana, populi albæ foliis. *Raj. suppl.*
Habitat ad Cap. b. Spei. *Burmannus.* ♄
Planta *undique lana alba induta.* Folia *subrotund[...]ta, integerrima s. vix denticulo uno alterove [...] festo, lanata, supra demum nuda evasura, peti[...] petiolis longis, basi dilatata amplexicaulibus.*

ASTER.

* *Fruticosi.*

[...]lifolius. 1. ASTER suffruticosus, foliis decurrentibus obo[...] subtus tomentosis subserratis, floribus termina[...] sessilibus.
Aster fruticosus africanus, foliis parvis chamædr[...] floribus cæruleis. *Raj. suppl.* 160. *n.* 29.

As[...]

...ropterus fruticosus cæruleus, polii foliis. *Vaill. act.* ...385.
...bitat *ad* Cap. b. Spei. *Burmannus.* ♄
...tex *durus, divaricatus.* Pappus *pilosus & hirsu-* ...*us, ut in Asteribus plerisque.*

...TER fruticosus, foliis decurrentibus subulatis margine scabris, floribus terminalibus. *Amæn. acad.* ...*afr.* 69. * — **taxifolius.**
...*bitat ad* Cap. b. Spei. ♄

...TER fruticosus, foliis ovatis subimbricatis recurvatis serrato-ciliatis, floribus terminalibus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 68. * — **reflexus.**
...bitat ad Cap. b. Spei. ♄
...lia *conferta, subimbricata, sessilia, adnata, parva, glabra: inferiora serrata; superiora ciliata, fere Borteriæ spinosæ, sed decies minora omnia.* Flores *terminales, solitarii, sessiles. Radius floris fertilis est.*

...TER fruticulosus, foliis ovato-oblongis acutis subtus tomentosis, calycibus pilo terminatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 66. * — **crinitus.**
...bitat ad Cap. b. Spei. ♄
...mi *minus ramosi.* Folia *sessilia, subtus albo-tomentosa, margine scabra.* Pedunculi *terminales, foliosi, uniflori.* Calycis *squamæ in pilum fuscum desinentes.* Floris *radius cæruleus.*

...TER fruticosus, foliis linearibus punctatis, pedunculis unifloris nudis. *Hort. cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 168. — **fruticosus.**
...er africanus frutescens, foliis angustis & plerumque conjunctis. *Comm. hort.* 2. *p.* 53. *t.* 27.
...er maritimus fruticosus, hyssopi foliis confertis, flore albo. *Pluk. mant.* 29. *t.* 340. *f.* 19.
...bitat ad Cap. b. Spei *in saxosis.* ♄

* * *Herbacei, integrifolii, pedunculis nudis.*

...TER foliis subfiliformibus scabris, pedunculis nudis, calycibus hemisphæricis glabris. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 67. — **tenellus.**
...nta. *Pluk. phyt.* 271. *f.* 4.
...bitat ad Cap. b. Spei.

alpinus. 7. ASTER foliis lanceolatis hirtis: radicalibus obt… caule simplicissimo unifloro. *Gouan. monsp.* 44…
Aster montanus cæruleus, magno flore, foliis ob… gis. *Bauh. pin* 267?
Aster VII. austriacus V. *Clus. hist.* 2. *p.* 15?
β. Aster atticus alpinus alter. *Bauh. pin.* 267.
Aster atticus cæruleus alpinus. *Bauh. pin.* 905.
γ. Aster hirsutus austriacus cæruleus, magno flore, … subrotundis. *Bauh. pin.* 267. *prodr.* 124.
Habitat in Austria, Vallesia, Helvetia, Pyre… Monspelii. ♃

sibiricus. 8. ASTER foliis lanceolatis venosis scabris extim… ratis, caulibus striatis, pedunculis tomentosis.
Aster foliis ovatis oblongis supra serratis, cau… striatis, pedunculis unifloris umbellatis. *Gmel…* 2. *p.* 186. *t.* 80. *f.* 10.
Habitat in Sibiria.

Tripolium. 9. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnosis gl… ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Roy. lugdb.* … *Fl. svec.* 697; 753. *Gmel. sib.* 2. *p.* 187. *t.* 80. *f.* …
Aster maritimus Tripolium dictus. *Raj. hist.* 270. … *cliff.* 408.
Tripolium majus cæruleum. *Bauh. pin.* 267.
Tripolium. *Dod. pempt.* 379.
Habitat in Europæ *litoribus maritimis* & *ad Si…* *lacus salsos.* ♃

Amellus. 10. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trin… integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, sq… mis calycinis obtusis. *Gouan. monsp.* 442.
Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus … serratis, calycibus laxis: squamis lanceolatis. *H…* *cliff.* 407. *Roy. lugdb.* 168. *Gmel. sib.* 2. *p.* 185.
Aster atticus cæruleus vulgaris. *Bauh. pin.* 267.
Aster atticus. *Dod. pempt.* 266.
Aster VIII, italorum fuchsii. *Clus. hist.* 2. *p.* 16.
Amellus virgilii. *Calceol. veron.* 8.
Habitat in Europæ *australis asperis collibus.* ♃

divaricatus. 11. ASTER ramis divaricatis, foliis ovatis serratis, … ralibus integerrimis obtusiusculis amplexicaulib… *Gron. virg.* 123.
Aster caule infirmo, foliis ovatis acuminatis integ…

rimis

rimis, pedunculis unifloris nudis, calycibus simplicibus. *Gron. virg.* 1. *p.* 99.
ter americanus latifolius albus, caule ad summum brachiato. *Pluk. alm.* 56. *t.* 79. *f.* 1.
abitat in Virginia. ♃

* * * *Herbacei, integrifolii, pedunculis squamosis.*

ASTER foliis linearibus integerrimis, caule paniculato, floribus terminalibus. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 167. *Gron. virg.* 123. — dumosus.
ter novæ angliæ, linariæ foliis, chamæmeli floribus. *Herm. par.* 95. *t.* 95.
ter americanus multiflorus, flore albo bellidis: disco luteo. *Pluk. alm.* 56. *t.* 78. *f.* 6.
bitat in America *septentrionali.* ♃
ulis *paniculato-ramosissimus, ramis filiformibus.* Folia *caulina angusto-lanceolata.* Ramorum *linearia.* Pedunculi *filiformes, striati, uniflori, adspersi foliolis angustissimis.* Flores *parvi: Calyce erecto, imbricato, laxo:* Radius *copiosus, albus; Discus flavus, radio parcior.*

ASTER foliis linearibus integerrimis, caule paniculato, pedunculis racemosis, pedicellis foliosis. *Gron. virg.* 124. — ericoides.
ter caule paniculato, floribus racemosis, calycibus patulis oblongis, foliis subulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 168.
ter ericoides dumosus. *Dill. elth.* 40. *t.* 36. *f.* 40.
bitat in America *septentrionali.* ♃

ASTER foliis sublinearibus integerrimis, pedunculis foliolosis. — tenuifolius.
Aster americanus, belvedere foliis, floribus ex cæruleo albicantibus, spicis longis. *Pluk. alm.* 56. *t.* 78. *f.* 5.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Caules *tenues, angulati, læves.* Folia *alterna, lineari-sublanceolata, integerrima, minus scabra.* Caulis *parum ramosus.* Flores *terminales, solitarii.* Pedunculis *foliolis subulatis, minimis adspersis.*

ASTER foliis linearibus integerrimis mucronatis scabris carinatis, pedunculis foliolosis. — linarifolius.
ter americanus frutescens, saturejæ foliis scabris, floribus amplis saturate violaceis. *Pluk. alm.* 56. *t.* 14. *f.* 7.

Aster

Aster marilandicus, rosmarini foliis angustioribus caule crebris inordinatis, floribus in summitate cis. *Raj. suppl.* 175.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Caules *purpurascentes.* Folia *linearia*, *viridia*, *scabra*, *acuta*, *carinata*, *sparsa.* Pedunculi *foliolis minimis adspersi.* Flores *terminales*, *soli* *pauci.*

linifolius. 16. ASTER foliis linearibus acutis integerrimis, c corymboso ramosissimo. *Hort. cliff.* 408. *Gron.* 123. *Roy. lugdb.* 167.
Aster tripolii flore, angustissimo & tenuissimo fo *Moris. hist.* 3. *p.* 121.
Habitat in America *septentrionali.* ♃

acris. 17. ASTER foliis lanceolato-linearibus strictis inte rimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pe culis foliolosis. *Gouan. monsp.* 442.
Aster caule erecto umbellifero, rarius simplicibus, liis ligulatis. *Sauv. monsp.* 54. *Garid. aix.* 47. *t.*
Aster tripolii flore. *Bauh. pin.* 267.
Aster angustifolius, tripolii flore. *Barr. ic.* 606.
Aster minor narbonensium, tripolii flore, linariæ lio. *Lob. ic.* 349. *bene. Pluk. alm.* 56. *t.* 271. *f.* 3
Habitat in Hungaria *interamni*, Hispania, Monsp

concolor. 18. ASTER caule simplicissimo, foliis oblongo-ov tomentosis sessilibus integerrimis, racemo termin *Gron. virg.* 123. *
Aster purpureus non ramosus, foliis parvis rigidis, ribus concoloribus seriatim ad caulem disposit *Clayt. ibid.*
Habitat in Virginia. ♃
Planta tota tomentosa, imprimis Folia & calyces. R*acemus simplex pedunculis brevissimis.*

rigidus. 19. ASTER floribus terminalibus solitariis, foliis line ribus alternis. *Gron. virg.* 124.
Aster foliis parvis rigidis crebris, caule non ramo ligneo infirmo, flore unico specioso: barbulis pu pureis longis, flosculis in disco ferrugineis, calyc squamoso tumido rotundo. *Clayt. ibid.*
Habitat in Virginia. ♃

undulatus. 20. ASTER foliis cordatis amplexicaulibus undulati

sub-

[s]ubtus tomentosis, floribus racemosis adscendenti-[b]us. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 167. *Gron. virg.* [1]24.
[Af]ter novæ angliæ purpureus, virgæ aureæ facie & foliis undulatis. *Herm. par.* 96. *t.* 96.
[Af]er virginianus comosus, foliis latioribus & flosculis minimis cæruleis. *Moris. hist.* 3. *p.* 120.
[Ha]bitat in America *septentrionali.* ♃
[Flo]sculorum *folia minuta, ovata.*

[A]STER foliis lanceolatis alternis integerrimis semiamplexicaulibus, floribus confertis terminalibus, caule hispido. *Hort. cliff.* 408. *Gron. virg.* 124. *Roy. lugdb.* 166. **novæ angliæ.**
[Af]ter novæ angliæ altissimus hirsutus, floribus amplis purpuro-violaceis. *Herm. par.* 98. *t.* 98.
[P]eripholis (receptaculis paleaceis) *Pont. diss.* 244.
[Ha]bitat *in* Nova Anglia. ♃
[Ca]ulis *fuscus.* Peduculi *brevissimi, ut vix appereant inter flores.* Corollæ *radius cæruleus.*

* * * * *Herbacei, serratifolii, pedunculis lævibus.*

[A]STER foliis cordatis serratis petiolatis, caule paniculato. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 167. **cordifolius.**
[Af]ter latifolius glaber humilis ramosissimus, flore parvo cæruleo, foliis ad basin cordatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 121. *s.* 7. *t.* 22. *f.* 34.
[Af]er latifolius autumnalis. *Corn. canad.* 64. *t.* 65.
[H]abitat *in* America & Asia *septentrionali.* ♃

[A]STER foliis semiamplexicaulibus lanceolatis serratis scabris, pedunculis alternis subunifloris, calycibus discum superantibus. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 166. **puniceus.**
After americanus latifolius, puniceis caulibus. *Herm. lugdb.* 649. *t.* 651. *Moris. hist.* 3. *p.* 120.
[H]abitat *in* America *septentrionaliori.* ♃

ASTER foliis ovatis : inferioribus crenatis, caule corymboso, pedunculis nudis, calycibus hemisphæricis. *Hort. cliff.* 409. *Hort. upf.* 262 * *Roy. lugdb.* 169. **annuus.**
[Af]ter annuus ramosus albus latifolius canadensis. *Moris. hist.* 3. *p.* 122.

Bellis

Bellis ramosa umbellifera. *Corn. canad.* 193. *t.*
Habitat in Canada. ⊙

vernus. 25. ASTER caule subnudo filiformi subramoso dunculis nudis, foliolis radicalibus lanceolat gerrimis obtusis. *Gron. virg.* 124.
After palustris, foliis bellidis non serratis, b tenuibus albis, disco luteo, caule viridi erecto. *Clayt. ibid.*
Habitat in Virginia. ♃

* * * * * *Herbacei, serratifolii, pedunculis squam*

indicus. 26. ASTER foliis ovato-oblongis serratis: florali vali-lanceolatis integerrimis, ramulis uniflori
After conyzoides ind. orient. ramosior, caulibu sis. *Pluk. alm.* 57. *t.* 149. *f.* 4.
Habitat in China.

lævis. 27. ASTER foliis lanceolatis sessilibus lævibus ratis, pedunculis foliolis subdivisis.
Habitat in America *septentrionali. Kalm.*. ♃
Caulis *erectus, lævis, angulatus, angustus.* Fo *terna, remota, medio parum serrata, sessilia lanceolata, utrinque glaberrima.* Panicula *min mosa:* Pedunculis *foliolis subulatis, minimis a sis.* Radius *corollarum cæruleus.*

mutabilis. 28. ASTER foliis lanceolatis serratis, calycibus rosis, panicula subfastigiata.
After novi belgii latifolius paniculatus, floribus rate violaceis. *Herm. lugdb.* 65. *t.* 67.
After cæruleus americanus non fruticosus ser anguftifolius humilis, flore amplo floribundus. *alm.* 56. *t.* 326. *f.* 1.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Differt *ab A. tradescanti Calycibus magis arcte catis & Corollæ radiis saturate purpureis; florum primum luteus, dein purpureus. Ceterum ta Astere novi belgii humilior, valde corymbosa lia pedunculorum & calycis recurvato-squarrosa bus facile distinguitur; Calycis squamæ inferior majores reliquis.*

tradescanti. 29. ASTER foliis, lanceolato-linearibus medio ser pedunculis foliosis, caule racemoso, calycibu

ß

is. *Hort. cliff.* 408. *Hort. upf.* 262. * *Roy. lugdb.* 7.
r virginianus ferotinus, parvo albente flore. *Park. atr.* 132.
r virginianus ramofiffimus ferotinus, parvis flori-s albis tradefcanti. *Morif. hift.* 3. *p.* 121.
tat in Virginia. ♃
lla radius primum albus, demum purpurafcens evadit.

STER foliis lanceolatis fuferratis feffilibus, cau- paniculato, ramulis unifloris folitariis, calycibus uarrofis. *Hort. cliff.* 408. *Hort. upf.* 262. * **novi belgii**
r novæ belgiæ latifolius umbellatus, floribus di-te violaceis. *Herm. lugdb.* 66. *t.* 67.
itat in Virginia, Penfylvania. ♄

STER foliis fpatulato-lanceolatis ferratis obliquis miamplexicaulibus bafi flexuofis, caulibus proftra-i, floribus terminalibus. **tardiflorus.**
r canadenfis humilior, falicis minoris folio. *Vaill.* t. 584?
tat in America *feptentrionali.*
es bipedales, vix ramofi, læves, fæpius proftrati. olia *majufcula, lævia, rigidula, medio ferrata, fe-amplexicaulia, fpatulato-lanceolata, flexura margi-i fupra bafin utrinque, altera margine per ramum urrente, ftria pubefcente.* Ramorum *axillæ di-ricatæ, purpurafcentes.* Flores *A. novi belgii, ei; Radio anguftiore margaritaceo f. fubviolaceo-icante, apice vix crenato.* Calycis *foliola imbri-ta: inferioribus longioribus.* Pedunculi *unico fo-lo.* Floret *rariffime, nec apud me nifi femel per* . *annos, nimium ferotinus. Differt ab* A. novi lgii *ramis magis divaricatis, bafi nodo quafi inter-tis, flexuofis. Foliis dein duplo majoribus denti-s exfertis, difco obliquis, & utrinque fupra bafin lexis.*

STER caule corymbofo, foliis lingulatis reflexis, ribus folitariis, calycibus fquarrofis. *Roy. lugdb.* 8. **grandiflorus**
r foliis lanceolatis femiamplexicaulibus crenatis ibris, ramis unifloris foliofis. *Gron. virg.* 99; 124.
r grandiflorus afper: fquamis reflexis. *Dill. elth.* *t.* 36. *f.* 41.

After

Aster virginianus pyramidatus, buglossi foliis al calycis squamulis foliaceis. *Mart. cent.* 19.
Habitat in America *septentrionali.* ♃

miser. 33. ASTER floribus ovatis, disco radiis longiore.
Aster ericoides, meliloti agriæ umbone. *Dill. el t.* 35. *f.* 39.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Habitus *proximorum.* Caulis *sesquipedalis, crassi ridis, minus paniculatus, quam in reliquis. caulis parum serrata, nutantia.* Ramorum *lan integerrima.* Calyces *cum disco corollæ ovati, cati foliolis erectiusculis, longitudine radii.* I *albus, brevissimus & miser.* Discus *parvus, convexus, pallidus, stylis flavis.*

macrophyllus. 34. ASTER foliis serratis: radicalibus trinervati datis maximis, caulinis ovatis sessilibus.
Aster canadensis, foliis imis amplioribus cordat ratis. *Vaill. act.* 583.
Habitat in America *septentrionali.* ♃
Folia *Radicalia magna, petiolata, cordata s trinervata ut in Petasitide.* *Ramea parva, sessilia, serrata.* Pedunculi *ad apicem confert pe trifidi.*

chinensis. 35. ASTER foliis ovatis angulatis dentatis petic calycibus terminalibus patentibus foliosis. *Ho* 407. *Hort. upf.* 262. *Roy. lugdb.* 169.
Aster, chenopodii folio, annuus, flore ingenti s so. *Dill. elth.* 38. *t.* 34. *f.* 38.
Habitat in China? ⊙
Fructificatio nonnihil differt a reliquis: plena est exi

* * * * * * *Herbacei, pinnatifolii.*

aurantius. 36. ASTER foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 407. * *Mill. di*
Aster americanus, foliis pinnatis & serratis, florib rantiis. *Houst. mss. c. fig. Amm. herb.* 466.
Habitat in Vera Cruce. ⊙
Planta a me non sufficienter observata; Facies ali Asteribus est.

SOLIDAGO.

sempervirens. 1. SOLIDAGO foliis lanceolatis subcarnosis gla mis margine scabriusculis, panicula corymbo

S

go panicula corymbosa, racemis reflexis, flori- adscendentibus, foliis glaberrimis. *Gron. virg.* 97.
go maxima. *Corn. canad.* 168.
aurea noveboracensis glabra, caulibus rubentibus, s angustis glabris. *Herm. flor.* 26.
aurea canadensis, foliis carnosis non serratis: oribus s. angustioribus. *Morif. hist.* 3. *p.* 124. *s.* 7. *f.* 15.
aurea s. Solidago procerior americana, caule plici. *Pluk. alm.* 389. *t.* 235. *f.* 5.
in Noveboraco, Canada. ♃
is Caule rubro, homine altiore, foliis glaberrimis, nosis, margine parum scabris, tota hyeme per- tibus; tempore florendi nimis sero, ut apud nos s sæpissime flores suffocet.

DAGO paniculato-corymbosa, racemis recur- s, floribus adscendentibus, foliis trinerviis sub- tis scabris. *Hort. upf.* 259. *Hort. cliff.* 409. *Gron.* 97. *Roy. lugdb.* 161. — canadensis
aurea angustifolia, panicula speciosa, canadensis. *alm.* 389. *t.* 263. *f.* 1. *Morif. hist.* 3. *p.* 125.
aurea americana, foliis serratis angustis subtus rosis. *Morif. blef.* 322.
in Virginia, Canada. ♃
angusto-lanceolata, vix manifeste serrata, fere

DAGO paniculato-corymbosa, racemis recur- floribus adscendentibus, foliis enervis serratis. *upf.* 259. — altissima.
aurea altissima serotina, panicula speciosa patu- *Mart. cent.* 14. *t.* 14.
in America *septentrionali.* ♃
præcedenti simillimus, diversus magnitudine, ser- s nervisque foliorum; cæterum eadem commiscet s vix genuinas, forte hybridas, ut vix limites ias. Itaque conferantur.
urea novæ angliæ altissima, paniculis nonnun- reflexis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 97.
ea americana hirsuta, radice odorata. *Dill.* *t.* 304. *f.* 391.
a novæ angliæ, rugosis foliis crenatis. *Dill.* *t.* 308. *f.* 396.

Virga aurea americana aſpera, foliis brevioribu ratis. *Dill. elth.* 411. *t.* 305. *f.* 392.

Virga aurea marilandica, ſpicis florum racemoſi liis integris ſcabris. *Mart. cent.* 13. *t.* 13.

lateriflora. 4. SOLIDAGO panicula corymboſa: racemis re adſcendentibus, caule inferne ramoſo florife

Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.*

Planta *S. canadenſi dimidio minor.* **Folia** *non ſ meliora, ſed uno alterove dente interdum notata res & omnia ut in præcedentibus, at caulis medium Ramos emittit ſimplices, caule paulo res, apice corymboſos; nullos vero ramos in rymbum terminalem caulis & medium ſeu quod in hac ſingulare.*

cæſia. 5. SOLIDAGO panicula corymboſa, racemis denſioribus, caule glabro lævi.

Virga aurea marilandica cæſia glabra. *Dill. elt t.* 307. *f.* 395.

Virga aurea marilandica, foliis longis auguſtis ramis ſ. virgulis floriferis e foliorum alis e bus longa ſerie. *Raj. ſuppl.* 168.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

mexicana. 6. SOLIDAGO caule obliquo, pedunculis erec liolatis ramoſis, foliis lanceolatis integerrimis *cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 161. *Gron. virg.* 122.

Virga aurea mexicana. *Bauh. pin.* 517.

Virga aurea, limonii folio, panicula uno verſu ſita. *Tournef. inſt.* 404. *Pluk. phyt.* 235. *f.* 2 *dart. act.* 4. *p.* 219. *t.* 219.

Habitat in Mexico? ♃

flexicaulis. 7. SOLIDAGO caule flexuoſo, foliis ovatis ac tis ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus. *lugdb.* 161. *Gron. virg.* 123.

Virga aurea montana, ſcrophulariæ folio. *Pl* 390. *t.* 235. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 124.

Virga aurea canadenſis, alteriſci folio. *Herm. pa t.* 244.

Habitat in Canada.

latifolia. 8. SOLIDAGO caule erecto, foliis ovatis acur ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus.

V

a aurea, latiſſimo folio, canadenſis glabra. *Pluk.* . 389. *t.* 235. *f.* 4.
at in Canada. ♃
s affinis S. flexicauli. Caulis *rectus*, *acute angu-us.* Folia *ovata*, *utrinque mucronata*, *ſerrata*, *ra lævia*, *ſubtus ſcabra.* Racemi *ex alis*, *folio rumque breviores.*

IDAGO caule ſubflexuoſo angulato, racemis iculatis erectis confertis. Virga aurea

ago caule erecto, racemis alternis erectis. *Hort.* *f.* 409. *Fl. ſvec.* 685; 754. *Mat. med.* 393. *Roy.* *db.* 161. *Hall. helv.* 729. *Dalib. pariſ.* 256. *Gmel.* 2. *p.* 154.
ago floribus per caulem ſimplicem undique ſpar- *Fl. lapp.* 306.
aurea vulgaris latifolia. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 162.
aurea latifolia ſerrata. *Bauh. pin.* 268.
at in Europæ *paſcuis ſiccis.* ♃

IDAGO caule ſimpliciſſimo, foliis caulinis egerrimis, pedunculis axillaribus unifloris. minuta.

aurea humilis alpina. *Moriſ. blæſ.* 329.
aurea omnium minima, floribus maximis. *Herm.* 245. *t.* 245. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 97.
aurea montana biuncialis pumila. *Pluk. alm.* *t.* 235. *f.* 7. 8.
at in Pyrenæis. ♃
denti nimis affinis.

IDAGO foliis caulinis ovatis ſcabris, ramis rnis faſtigiatis, corymbis terminalibus. *Hort.* 410. *Roy. lugdb.* 162. *Gouan. monſp.* 444. rigida.

aurea novæ angliæ, lato rigidoque folio. *Herm.* 243. *t.* 243.
t in Penſylvania. ♃

IDAGO foliis radicalibus ovato-oblongis pe-atis, caule nudiuſculo ramoſo faſtigiato. noveboracenſis.

t in America *ſeptentrionali.* ♃
radicalia S. virgæ aureæ maxime ſcabra. Caulis *lis*, *tribus quatuorve foliis minoribus*: *ſuperne ra-us*, *faſtigiatus.* Flores *ſolitarii ramos terminant*, *ni*, *lutei.*

INULA.

elenium. 1. INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugosis: f tomentosis, calycum squamis ovatis. *Amœn. ac p.* 410. *Mat. med.* 392.
Aster foliis ovatis rugosis amplexicaulibus: subt mentosis, calycum squamis ovatis patulis. *diss.* 407. *Fl. svec.* 695; 755. *Roy. lugdb.* 166. *lib. paris.* 260. *Gmel. sib.* 2. *p.* 175.
Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 267.
Helenium. *Cam. epit.* 35. *Fuchs. hist.* 242.
Habitat in Anglia, Belgio. ♃

tuans. 2. INULA foliis spatulatis, subtus tomentosis. †
Helenium virgæ pastoris folio subtus incano & mentoso. *Vaill. act.* 573.
Aster primulæ veris foliis, semiflosculis tenuil *Plum. spec.* 10. *ic.* 41. *f.* 2.
Habitat in America *calidiore.*

frons. 3. INULA foliis oblongis decurrentibus dentic floribus congestis terminalibus subsessilibus.
Conyza pyrenaica, foliis primulæ veris. *Herm. p* 127.
Conyza latifolia viscosa suaveolens, flore aureo loprovincia. *I. Garid. aix.* 125. *t.* 23.
Conyza præalta, caule alato, odorata. *Bocc. m p.* 168. *t.* 121. *Raj. suppl.* 153.
Habitat in Italia, Galloprovincia, Pyrenæis. ♂
Conf. Conyza bifrons, *quam eandem absque radi tuunt Botanici; nostra est Caule pedali, rigidulo rymbosa, fortiter odora ut Tanacetum. Flores radio brevi.*

ora. 4. INULA foliis amplexicaulibus dentatis hirsutiss radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule cifloro.
Aster luteus, radice odora. *Bauh. pin.* 266.
Asteris altera species apula. *Col. ecphr.* 1. *p.* 2 253.
Conyza altera apula. *Moris. hist.* 3. *p.* 113. *f.* 7. *f.* 6.
Habitat in Italia, Galloprovincia, Narbona. ♃
Folia *radicalia magna; omnia supra hirta, subtus issima allida.* Caulis *simplex, pilosus.*

5. IN

[...]LA folliis amplexcaulibus oblongis integerrimis [...]ftatis, caule pilofo corymbofo. — Oculus Christi.
[...] caule fuperne ramofo ampliato, foliis lanceola[...] amplexicaulibus integris, calycibus laxis termi[...]libus. *Hort. cliff.* 407.
[...]yza pannonica lanuginofa. *Bauh. pin.* 265. *Moris.* [...] 3. p. 113. *f.* 7. *t.* 19. *f.* 1.
[...]yza 3 auftriaca. *Cluf. hift.* 2. *p.* 20.
[...]tat in auftria. ♃
[...] tota hirfuta eft.

[...]LA foliis amplexicaulibus lanceolatis diftinctis [...]ratis fubtus villofis, caule ramofo villofo erecto. — Britannica.
[...] *fvec.* 2. *n.* 756.
[...]zis affinis. *Bauh. pin.* 265.
[...]za paluftris repens britannica dicta. *Morif. hift.* [...]p. 113. *f.* 7. *t.* 19. *f.* 8.
[...]za aquatica, afteris flore aureo. *Bauh. pin.* 266. [...]r. 124. *Burf. XV.* 41.
[...]t *in* Lufatia, Bavaria, Scania.
[...]s *J. dyfentericæ, fed Caulis altior, erectior.* Fo[...] *anguftiora, argutius ferrata. Varietas β differt* [...] *Caule & Foliis fubtus magis villofis. Radii pe*[...] *anguftiffima.*

[...]A foliis amplexicaulibus cordato-oblongis [...]omentofis, caule villofo paniculato, fquamis [...]inis fetaceis. *Amæn. acad.* 1. *p.* 410. *Sauv.* [...] 85. — dyfenterica
[...]liis femiamplexicaulibus oblongis, caule pani[...]o hirfuto, floribus latis, fquamis calycinis fe[...] *Fl. fvec.* 694; 757. *Guett. ftamp.* 2. *p.* 355. [...]. *parif.* 260. *Gmel. fib.* 2. *p.* 180.
[...]ratenfis autumnalis, conyzæ folio. *It. gotl.* 273.
[...]a media, afteris flore luteo, f. tertia diofcoridis. [...] *pin.* 265.
[...]a 1. *Tabern. hift.* 1243.
[...]nthæ tertium genus. *Fuchf. hift.* 436.
[...] *in* Europæ *foffis fubhumidis.* ♃
[...] *fquamæ fubulatæ, molles, recurvatæ, margine co-*

foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis, [...]ulis filiformibus, floribus fubglobofis. — indica.

Helenium ramosum, caulibus sparsis, calthæ arv folio. *Vaill. act.* 575.
Aster conyzoides ind. orient. ramosior, caulibus s sis. *Pluk. alm.* 57. *t.* 149. *f.* 4.
Jacobæa perfoliata, folio longo acuto auricu *Burm. zeyl.* 124. *t.* 55. *f.* 2.
Habitat in India *orientali.* ⊙
Simillima J. Pulicariæ, sed major, strictior. Foli *ceolata, basi cordata, amplexicaulia, acuta,* *nuda, subtus vix villosa.* Pedunculi *filiformes,* *multoties longiores, unico foliolo interdum in* Flores *J. Pulicariæ, sed radius longior,* Calyx *nus hirsutus.*

Pulicaria. 9. INULA foliis amplexicaulibus undulatis, caule strato, floribus subglobosis.
Erigeron foliis undulatis amplexicaulibus. *Fl.* 693; 758.
Conyza ramis secundum flores gradatim enasce foliis lanceolatis obtusis. *Hort. cliff.* 405.
Conyza major, flore globoso. *Bauh. pin.* 266.
Conyza minima. *Dod. pempt.* 52.
β. Helenium palustre annuum, hyssopi foliis c *Vaill. act.* 575.
Aster palustris fruticosus minimus. *Barr. ic.* 36
Conyza minor exotica. *Bauh. pin.* 265.
Conyza minor hispanica ex oris gaditanis. *Pluk.* 56. *t.* 384. *f.* 2.
Conyza media crispa lacustris, flore nullatenus to. *Raj. suppl.* 152.
Habitat ad vias & plateas Europæ *temperatæ.* ⊙
Varietas *β. major, rigidior, vix meretur disting*

Spiræifolia. 10. INULA foliis subsessilibus ovato-oblongis nudi ticulatis sessilibus serrulatis confertis, floribus minalibus.
Conyza media monspeliensi affinis multiflora. *hist.* 2. *p.* 1049.
Habitat in Italia.
Flores *vix pedunculati sunt.*

Salicina. 11. INULA foliis sessilibus lanceolatis recurvis ser scabris, floribus inferioribus altioribus, ramis angulatis glabris. *Amœn. acad.* 1. *p.* 410. *Sauv.* 86.

Aste

ter foliis lanceolatis amplexicaulibus ferrato-ciliatis glabris acuminatis recurvis, floribus folitariis, caule ftriato. *Fl. fvec.* 696; 759. *Dalib. parif.* 259. *Gmel. fib.* 2. *p.* 177. *t.* 67.
ter montanus luteus, falicis glabro folio. *Bauh. pin.* 266.
bonium luteum 1. *Tabern. hift.* 716.
abitat in Europæ *borealis pratis uliginofis, afperis.* ♃
iffert ab Inula hirta, *Caule glabro, fuperne fulcato f. angulato;* Foliis *glabris, margine tantum fcabris.*

INULA foliis feffilibus lanceolatis recurvatis fubferrato-fcabris, floribus inferioribus altioribus, caule teretiufculo fubpilofo, hirta.
ter foliis lanceolatis feffilibus integerrimis, caulibus fimplicibus unifloris, fquamis calycinis fubulatis. *Dalib. parif.* 259.
ter luteus, hirfuto falicis folio. *Bauh. pin.* 266.
ter tertius pannonicus clufii luteus, folio hirfuto falicis. *Bauh. hift.* 2. *p.* 1047.
bitat in Bavaria, Gallia, Sibiria, Genevæ. ♃
bitus Inulæ falicinæ, *fed Folia latiora, obtufiora, vix manifefte ferrata, venofa, fcabra præfertim margine & carina: Caulis foliis pilisque rigidiufculis adfperfus, ubique teres, nec fulcato-angulatus. Calyx quafi foliofus.*
fer. After conyzoides odoratus luteus. *Segu. ver.* . *p.* 211.
ter luteus, cifti hirfutis & crenatis foliis, fummo caule ramofo, floribus amplis. *Pluk. alm.* 57. *t.* 78. *f.* 4.
ter luteo flore, alis Conyzæ fpecies. *Cam. epit.* 907.
ronæ lecta differt Foliis ovalibus, nec lanceolatis aut ferratis; Calyx videtur indicare eandem fpeciem.

INULA foliis feffilibus lanceolatis recurvis fcabris, floribus fubfafciculatis. germanica.
After foliis lanceolatis amplexicaulibus oris reflexis, ramis multifloris, calycibus oblongis laxis. *Gmel. b.* 2. *p.* 181. *t.* 78. *f.* 1.
nyzæ affinis germanica. *Bauh. pin.* 266. *Morif. hift.* . *f.* 7. *t.* 19. *f.* 26.

Aster thuringiacus altissimus latifolius montanus, re luteo parvo. *Hall. jen.* 181.
Habitat in Misnia, Pannonia, Sibiria. ♃
Habitus J. Salicinæ. Folia *eadem; at* Flores *drici, conferti ad apicem caulis in corymbum.*

uarrosa. 14. INULA foliis ovalibus lævibus reticulato-ve subcrenatis, calycibus squarrosis.
Aster conyzoides odoratus luteus. *Tournef. inst.* 4
Aster luteus latifolius glaber, foliis rigidis & min sime crenatis. *Pluk. alm.* 37. *t.* 16. *f.* 1.
Habitat in Italia, Monspelii. ♃
Differt ab J. hirta *caule foliisque glabris, ut & lyce, cujus inferiora foliola disco breviora & imbricata.* Flos *solitarius, magnus, terminalis vero planta hoc flore mutiletur, exoriuntur* Fl *plures, minores, petiolis adspersis foliolis parvis, etiam a loco.*

ıfifolia. 15. INULA foliis sessilibus linearibus acuminatis vosis glabris sparsis, caule subunifloro. *Kram.* 253.
Aster montanus saxatilis luteus, angusto nervoso to & molli plantaginis folio, multicaulis. *mus.* 1. *p.* 31. *t.* 18.
Aster luteus, linariæ rigido glabro folio. *Bauh.* 267.
Habitat in Austria *inferiore.* ♃

ıariana. 16. INULA foliis sessilibus lanceolatis subserratis lis, pedunculis subunifloris subviscosis: foliol nearibus.
Aster luteus marianus, saligneis brevioribus foliis sutie pubescentibus, summo caule ramosus. *mant.* 30. *t.* 340. *f.* 1.
Aster carolinianus pilosus, coryzæ cæruleæ foliis, ribus luteis quasi umbellatim dispositis. *Mill. t.* 56.
Habitat in America septentrionali. ♃
Planta *tota adspersa pilis raris, mollibus, albis, im mis pagina foliorum inferiore.* Flores *quasi cory bosi caulem terminant, sed pedunculi s. rami sæp uniflori, adspersi glandulis pedicellatis.*

ithmoides. 17. INULA foliis linearibus carnosis tricuspidatis. *Go monsp.* 445.

Aster

flore terminali, foliis linearibus tricuſpidatis.
rt. cliff. 409. *Roy. lugdb.* 168. *Guett. ſtamp.* 2. *p.*
1.
mum maritimum, colore aſteris attici. *Bauh. pin.*
1.
mum chryſanthemum. *Dod. pempt.* 706.
at in Angliæ, Galliæ, Luſitaniæ, Hiſpaniæ *mari-*
is. ♃

LA foliis ſubſerratis ſubtus tomentoſis: radica- **provincialis**
is petiolatis ovatis, caule erecto unifloro.
æa rotundifolia incana. *Bauh. pin.* 131. *prodr.*
Burſ. VI. 127.
at in Collendareis Galloprovinciæ. ♃
: fibris validis. Caulis *pedalis*, *ſimpliciſſimus*,
llus, *villoſus.* Folia *Radicalia ovata*, *petiolata*,
iſe ſerrata, *ſubtus villoſa*, *obtuſiuſcula;* Caulina
ca, *lanceolata*, *ſeſſilia*, *minus ſerrata*, *ſubtus vil-*
i: ſumma linearia. Flos *ſat magnus*, *flavus.*

LA foliis lanceolatis hirſutis integerrimis, cau- **montana.**
unifloro, calyce brevi imbricato. *Gouan. monſp.*
1.
atticus luteus montanus villoſus, magno flore.
uh. pin. 267.
anguſtifolius luteus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 1046.
at Viennæ, Monſpelii & *in* Hiſpania. ♃
i pube nivea villoſa eſt. Calyx & ſtructura plan-
Aſteribus nimis affinis.

LA foliis linearibus integerrimis tomentoſis aromatica.
rſis, caule fruticoſo. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 71. *
frutescens luteus mauritanicus. *Pluk. alm.* 58. *t.*
i. f. 2.
at ad Cap. b. Spei. ♄

LA foliis ſubulato-linearibus triquetris confer- pinifolia.
imis, caule fruticoſo. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 70. *
æa æthiopica, laricis folio. *Breyn. cent. t.* 64.
riſ. hiſt. 3. *ſ.* 7. *t.* 18. *f.* 31.
at in Æthiopia. ♄

LA foliis lanceolatis-linearibus integerrimis, co- fœtida.
nbis ramoſis, radiis breviſſimis. *Mill. ic.* 233.
ago foliis lanceolato-linearibus &c. *Hort. cliff.* 410.

Conyza melitensis, retusis foliis. *Bocc. sicc.* 26
Habitat in Melita. ☉
Simillima Erigeronti fœtido, sed floribus radiatis.

CINERARIA.

geifolia. 1. CINERARIA pedunculis ramosis, foliis ren
bus suborbiculatis sublobatis dentatis petiolat
Solidago foliis reniformibus suborbiculatis d
Hort. cliff. 410.
Jacobæa africana, hederæ terrestris folio, 1
Comm. hort. 2. *p.* 145. *t.* 73.
Jacobæa capensis, malvæ folio lanuginoso. *S*
1. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

cymbalarifolia. 2. CINERARIA foliis lyratis: impari reniformi
culato, caulinis summis amplexicaulibus lob
tegris. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 81. *
Aster flore luteo, folio cymbalariæ. *Raj. supp*
Aster africanus minimus monanthos luteus, f
angulosis minimis aceris forma s. cymbalariæ
suppl. 161.
β. Jacobæa afra, geranii columbini folio. *Vaill. ac*
Habitat ad Cap. b. Spei. *Burmannus.*

sibirica. 3. CINERARIA racemo simplici, foliis cordatis
sis denticulatis lævibus, caule simplicissimo
phyllo.
Othonna foliis cordatis, caule subnudo simplic
Hort ups. 273. *Hill. plant.* 588. *t.* 14.
Jacobæastrum cacaliæ folio. *Amm. ruth.* 221. *t.*
Jacobæa orientalis, cacaliæ folio. *Tournef. cor.*
Jacobæoides ari crenato folio. *Vaill. act.* 1720.
Solidago foliis cordatis subrotundis dentatis p
tis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 169.
Habitat in Sibiria, Oriente. ♃

glauca. 4. CINERARIA racemo simplici, foliis cordatis
gerrimis lævibus, caule simplicissimo.
Solidago floribus spicatis, foliis subcordatis gl
mis glaucis oblonge ellipticis amplexica
Gmel. sib. 2. *p.* 166. *t.* 74.
Habitat in Sibiria. ♃
Similis præcedenti, sed Folia integerrima, Caulis
Floris radius copiosior.

5. CI

[C]INERARIA foliis amplexicaulibus sinuatis diffor- *sonchifolia*
mibus.
[Ja]cobæa sonchi folio, flore purpureo amplo, africana.
Breyn. prodr. 3. *p.* 31. *t.* 21. *f.* 1.
[Ha]*bitat ad* Cap. b. Spei.

[C]INERARIA floribus corymbosis, foliis lato-lan- *palustris.*
ceolatis dentato-sinuatis, caule villoso.
[O]thonna palustris. *It. scan.* 241; 95. * *Fl. svec.* 687;
778.
[So]lidago foliis inferioribus lanceolatis serrato-sinuatis:
superioribus integris amplexicaulibus. *Hort. cliff.*
410. *Gmel. sib.* 2. *p.* 158. *t.* 72.
[Ja]cobæa aquatica elatior, foliis magis dissectis. *Moris.*
hist. 3. *p.* 110. *s.* 7. *t.* 19. *f.* 24.
[Co]nyza aquatica laciniata. *Bauh. pin.* 266.
[Ha]*bitat in* Europæ *cespitosis, aquosis.* ♃
[Fo]*lia tegunt caulem ad ipsos usque flores; sequenti affinis.*

[C]INERARIA umbella involucrata, pedunculo com- *alpina.*
muni nudiusculo, foliis oblongis villosis.
[So]lidago foliis cordatis petiolatis dentatis. *Roy. lugdb.*
162. *Jacq. vind.* 286. *
[Ja]cobæa montana, integro rotundo folio. *Bocc. mus.*
2. *p.* 61. *t.* 49. *Barr. ic.* 145.
[Ja]cobæa alpina, foliis subrotundis serratis. *Bauh. pin.*
131. *prodr.* 70. *t.* 71.
[Se]necio foliis petiolatis cordatis serratis subtus inca-
nis, floribus luteis e summo caule racemosis. *Hall.*
helv. 731.
[Ja]cobæa alpina laciniata, flore buphthalmi. *Bauh.* *alata.*
pin. 131.
[Ja]cobæa 3, latifolia 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 23.
[O]thonna foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, flo- *integrifolia*
ribus umbellatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 925.
[Ja]cobæa montana lanuginosa angustifolia non lacinia-
ta. *Bauh. pin.* 131. *Moris. hist.* 3. *p.* 111. *s.* 7. *t.* 12.
f. 28.
[Ja]cobæa montana non laciniata nostras. *Raj. hist.* 272.
[Ja]cobæa montana polyanthos, flore aureo, foliis lon-
gis & integris. *Barr. ic.* 260.
[Se]necio foliis lingulatis tomentosis simplicissimis. *Hall.*
helv. 736.
[Sol]idago foliis lanceolatis sessilibus integris denticula-
[t]is, floribus umbellatis, involucro setaceo. *Gmel.*
sib. 2. *p.* 154. *t.* 71. δ. Othon-

helenitis. δ. Othonna foliis lanceolatis integris subdentatis vi floribus umbellatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 925. *Gouan.* 464.
Conyza helenitis mellita incana. *Lob. ic.* 347. *ex*
Conyza incana. *Bauh. pin.* 265.
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Helveticis, Austr Monspelii, Sibiricis. ♃
Polymorpha, in solo natali extricata a Jacquin addo & helenitin ε. facie nimis affinem, inquir hac ejus populares ulterius.

.urea. 8. CINERARIA floribus corymbosis, foliis lance serratis subtus tomentosis.
Habitat in Sibiria. ♃
Statura Senecionis paludosæ, sed flores duplo ma lutei, radio amplo. Pedicelli bracteis aliquot li bus. Folia æqualiter & distincte serrata, subti mentosa, supra obsolete villosa. Caulis villosus.

maritima. 9. CINERARIA floribus paniculatis, foliis pinna tomentosis: laciniis sinuatis, caule frutescente.
Othonna 2. *Hort. upf.* 273.
Solidago foliis pinnatifidis: laciniis sinuatis, cor racemosis. *Hort. cliff.* 140. *Gron. orient.* 277.
Jacobæa maritima. *Bauh. pin.* 131.
Cineraria. *Dod. pempt.* 642.
Habitat ad maris inferi *litora.* ♄

anadensis. 10. CINERARIA floribus paniculatis, foliis pinnat subvillosis: laciniis sinuatis, caule herbaceo.
Jacobæa maritima f. Cineraria latifolia. *Bauh. pin prodr.* 69.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃
Filia præcedentis, sed Folia *non tomentosa, verum villosa, imprimis subtus.* Corollæ *radius patens revolutus.* Caulis *annuus, nec perennis.* Caly *rum apice sphacelatus, quod non in illa.*

nifolia. 11. CINERARIA pedunculis unifloris, foliis sp caule fruticoso. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 82. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Diversa a Senecione linifoliæ floribus solitariis.

thonnites. 12. CINERARIA pedunculis unifloris, foliis obl indivisis subdentatis petiolatis alternis nudis.

So

ago afra frutescens, foliis crassis dentatis. *Vaill.* 563.
at in Africa.
s quodammodo Othonnæ cheirifoliæ, sed Calyx po-hyllus. Semina lævia, longitudine calycis; pappo ilo longiore. Petioli margine decurrentes.
. Jacobæa africana frutescens, crassis & succu-tis foliis. *Comm. hort.* 2. *p.* 147. *t.* 74. *Raj. suppl.* 4.

ERARIA pedunculis unifloris, foliis oppositis atis, caule suffruticoso. Amelloides.
ago africana frutescens cærulea, hyperici foliis rumque conjugatis. *Vaill. act.* 564.
africanus frutescens ramosus, floribus cæruleis, lis oppositis minimis, caulibus & ramulis in pe-culos nudos exeuntibus. *Raj. suppl.* 158.
caule ramoso scabro perenni, foliis ovatis sessi-us, pedunculis nudis unifloris. *Mill. dict. t.* 76. 1.
at ad Cap. b. Spei. ♄
s nimium Amelli lychniti, *sed Receptaculi paleæ le. Flosculi varii abortiunt, sed absque ordine, i in disco, quam in radio.*

A R N I C A.

IICA foliis ovatis integris: caulinis geminis op-positis. montana.
nicum foliis caulinis oppositis. *Fl. svec.* 684; 760. *t. med.* 395. *Gmel. sib.* 2. *p.* 153. *Hall. opusc.* 103.
nicum foliis oblongis-ovalibus. *Fl. lapp.* 304. *Roy. db.* 160.
nicum, plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin.* 5.
a. *Matth. diosc.* 934.
tica. *Renealm. spec.* 118.
nicum foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 305. *Roy. lugdb.* 0. alpina.
a alpina. *Tabern. ic.* 336.
at in Alpibus & pratis Europæ *frigidioris.* ♃
a *foliis angustissimis, a Pratensi ovatis maxime ert.*

IICA foliis integerrimis ellipticis, villosis, scapo uni- piloselloides

unifloro aphyllo lanato, calyce radium æq
Amæn. acad. 6. *afr.* 73. *
After æthiopicus, pilofellæ facie, tomento c
Raj. fuppl. 165. *n.* 95.
Habitat in Æthiopia.

corpioides. 3. ARNICA foliis alternis ferratis. *Hall. helv.* 7
Jacq. vind. 152. *Gouan. monfp.* 446.
Doronicum radice fcorpii brachiata. *Bauh. pin*
Doronicum brachiata radice. *Dalech. hift.* 120
ic. 649.
β. Doronicum radice dulci. *Bauh. pin.* 184.
Habitat in Helvetia, Auftriæ *fubalpinis humidis.*

naritima. 4. ARNICA foliis lanceolatis: inferioribus fe
caule foliofo multifloro. †
After f. potius Helenium maritimum fruticofum
le craffo, foliis fere helenii officinalis. *Gme*
p. 175.
Habitat in Kamtfchatca & America *feptentriona*

roces. 5. ARNICA foliis ovalibus ferrato-denticulatis
tomentofis.
Gerbera foliis planis dentatis, flore purpureo.
afr. 157. *t.* 56. *f.* 2.
Dens leonis, enulæ folio. *Pet. muf.* 393. *Raj*
238.
Doronici forte fpecies pumila, auriculæ urfi fol
bro, flore faturate croceo. *Pluk. mant.* 65.
f. 4.
Carlina foliis latis ad oras fpinis dentatis, flore
Burm. afr. 154. *t.* 55.
Tuffilago pyrolæ folio. *Vaill. act.* 560.
Habitat in Æthiopia. ♃
Caput radicis *lanatum.* Folia *radicalia, petiolata*
lia, glabra, rigida, fupra glabra, ferrato-d
Scapi *nudi, uniflori, bracteis adfperfi rarioribu*
ribus. Floris *radius ftaminibus inftructus.*

Gerbera. 6. ARNICA foliis pinnatifidis: lobis rotundatis.
Gerbera foliis ex radice oblongis excavatis fi
fubtus lanugine ruffa villofis. *Burm. afr.* 155
f. 1.
After africanus monanthos, fcolopendriæ folio
luteo. *Raj. fuppl.* 161.

D

nicum africanum, folio asplenii. *Buxb. cent.* 5.
12. *f.* 24.
opendriæ s. Asplenii facie planta æthiopica, sum-
s pinnis acuminatis fericea lanugine ex ruffo can-
ante villosa. *Pluk. alm.* 336. *t.* 313. *f.* 5.
tat in Æthiopia.
*lobis retrorsum imbricatis, dum etiamnum tene-
, subtus tomentosa.* Scapus *nudus, uniflorus.* Ca-
x *imbricatus.* Corollæ *radius luteus, subtus pur-
rascens.*

NICA foliis pinnatis: laciniis linearibus. coronopifo-
tat in Æthiopia. lia.
edenti nimis affinis.

DORONICUM.

RONICUM foliis cordatis obtusis denticulatis: pardalian-
dicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. ches.
at. med. 394. *Mill. dict. t.* 128. *Gouan. monsp.* 446.
nicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso.
rt. cliff. 411. *Roy. lugdb.* 159.
nicum maximum, foliis caulem amplexantibus.
uh. pin. 185. *Cam. epit.* 823.
nicum VII, austriacum 3. *Clus. hist.* 2. *p.* 19.
onicum radice scorpii. *Bauh. pin.* 184.
nicum latifolium. *Clus. hist.* 2. *p.* 16.
itum Pardalianches. *Dod. purg.* 305.
at in Alpibus Helvetiæ, Pannoniæ, Vallesiæ. ♃

RONICUM foliis ovatis acutis subdentatis, ra- plantagine-
alternis. *Hort. cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 160. *Da-* um.
paris. 256. *Gouan. monsp.* 446.
nicum plantaginis folio. *Bauh. pin.* 184.
nicum minus officinarum. *Dalech. hist.* 1202.
onicum, plantaginis folio, lusitanicum. *Tournef.*
. 488.
at in Lusitania, Hispania, Gallia. ♃

RONICUM scapo nudo simplicissimo unifloro. Bellidia-
rt. cliff. 500. *Roy. lugdb.* 160. *Jacq. vind.* 285. * strum.
llastrum alpinum, foliis brevioribus hirsutis,
lle palmari, flore albo. *Mich. gen.* 32. *t.* 29.
s sylvestris media, caule carens. *Bauh. pin.* 261.
s media. *Clus. hist.* 2. *p.* 44. *Cam. epit.* 654. *Hall.*
sc. 174. *

β. Bellis

β. Bellis caule pedali f. bipedali nudo, foliis magni floribus rubris & albis. *Mentz. pug. t.* 8.
Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis, Tyrole *locis umbrosis.* ♃
Semina radii in hac etiam papposa sunt.

PERDICIUM.

semiflosculare. 1. PERDICIUM scapo unifloro nudo, flore fl flosculoso. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 72. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Statura *Leontodontis.* Corollulæ *mediæ inter* f *sculosos & radiatos flores.*

radiale. 2. PERDICIUM caule fruticoso, floribus fubra calycibus exterioribus tetraphyllis.
Inula Trixis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 406. *
Trixis frutefcens, foliis nitidis ovatis dentatis bus comosis. *Brown. jam.* 312. *t.* 33. *f.* 1.
Habitat in Jamaica. ♄
Habitus *florum Inulæ f. Conyzæ. Ambæ hæ spe ta facie differunt, vixque affines; at singularis corollularum, in exterioribus laciniis lævior, in Elephantopo, facit ut eas conjungam donec viva acutius examen subeat.*

HELENIUM.

autumnale. 1. HELENIUM.
Helenium foliis decurrentibus. *Hort. cliff.* 418. *upf.* 266. *Gron. virg.* 126. *Roy. lugdb.* 180.
Chryfanthemum americanum perenne, caule folio anguftato glabro. *Morif. hift.* 3. *p.* 24. *f. f.* 74.
After floridanus aureus, caule alato. *Pluk. amal t.* 372. *f.* 4.
After luteus alatus. *Corn. canad.* 52. *t.* 63.
Habitat in Americæ *feptentrionalis fubhumidis.* ♃
Varietas hirfuta datur; an fatis diftincta?

BELLIS.

perennis. 1. BELLIS fcapo nudo.
Bellis fcapo nudo unifloro. *Hort. cliff.* 418. *Ho* 265. *Fl. fvec.* 707; 761. *Mat. med.* 405. *Roy.* 177. *Dalib. parif.* 264.
Bellis fylveftris minor. *Bauh. pin.* 267.

B

[Be]llis sylvestris. *Dod. pempt.* 265.
[B]ellis hortensis, flore pleno. *Bauh. pin.* 261. *hortensis.*
[B]ellis hortensis, flore albo bullato. *Tournef. inst.* 491.
[B]ellis hortensis rubra, flore multiplici fistuloso. *Tour-[n]ef. inst.* 491.
[Be]llis hortensis prolifera.
[Ha]bitat in Europæ apricis pascuis. ♃

[B]ELLIS caule subfolioso. *Gouan. monsp.* 447. annua.
[B]ellis minima pratensis, caule folioso. *Bocc. muf.* 2. p. 96. t. 35.
[Be]llis maritima minima, roris solis folio, cyrnea. *Bocc. muf.* 2. p. 149. t. 107.
[Be]llis maritima, foliis agerati. *Bauh. pin.* 261. *prodr.* 121. *Burs. XIV:* 70.
[Be]llis hortensis pediculo folioso. *Bauh. pin.* 262. *prodr.* 121.
[B]ellis minima annua. *Triumf. obs.* 80 *t.* 80.
[B]ellis minima, caule folioso pubescens. *Cup. cath.*
[Be]llis Leucanthemum annuum italicum. *Mich. gen.* 34.
[Ha]bitat in Sicilia, Hispania, Monspelii. ☉

LEYSERA.

[L]EYSERA. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 74 * gnaphalodes.
[A]steropterus luteus, laricis foliis lanuginosis. *Vaill. act.* 585.
[A]ster æthiopicus, stœchadis foliis, flore aureo. *Herm. lugdb.* 68. *t.* 71. *Breyn.* 26. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

TAGETES.

TAGETES caule subdiviso patulo. *Hort. cliff.* 418. patula.
Hort. upf. 267. *Roy. lugdb.* 180.
Tanacetum africanum s. Flos africanus minor. *Bauh. pin.* 132.
Flos africanus. *Dod. pempt.* 255.
Tagetes indicus minor, multiplicato flore. *Tournef. inst.* 488.
Tagetes minor, flore fulvo maculato. *Dill. elth.* 273. *t.* 279. *f.* 361.
[Hab]itat in Mexico. ☉

[T]AGETES caule simplici erecto, pedunculis nudis u-[ni]floris. *Hort. cliff.* 418. *Hort. upf.* 267. *Roy. lugdb.* 180. erecta.

Tanacetum africanum majus, simplici flore. *Ba* 133.
Cariophyllus indicus. *Cam. epit.* 406.
β. Tagetes maximus rectus, flore maximo multi *Bauh. hist.* 3. *p* 100.
γ. Tagetes mexicanus, flore fistuloso, simplex *ecphr.* 2. *p.* 47. *t.* 46. *f.* 1.
δ. Tagetes mexicanus alter polyanthos, fistulos *Col. ecphr.* 2. *p.* 48. *t.* 46.
Habitat in Mexico. ⊙

minuta. 3. TAGETES caule simplici recto, pedunculi mosis multifloris. *Hort. cliff.* 419.
Tagetes multiflora, minuto flore albicante. *D* 374. *t.* 280. *f.* 362.
Habitat in Chili. ⊙

P E C T I S.

ciliaris. 1. PECTIS foliis linearibus ciliatis. *Amœn. aca* 407. *
Jacobæa foliis salicis ad margines villosis. *Plu* 10. *ic.* 151. *f.* 2.
Habitat in America. ⊙

punctata. 2. PECTIS foliis linearibus integerrimis subtus p tis. *Jacq. amer.* 28. *t.* 128.
Chondrilla foliis angustis & ad oras punctatis. *spec.* 10. *ic.* 86. *f.* 1.
Habitat in America.

linifolia. 3. PECTIS foliis linearibus integerrimis utrinque bus. *Amæn. acad.* 5. *p.* 407. *
Tagetes minor, caule subdiviso, diffuso foliis l bus integris. *Brown. jam.* 319.
Hieracium fruticosum, angustissimis gramineis capitulis parvis. *Sloan. jam.* 123. *hist.* 1. *p.* 255. *f.* 3.
Habitat in America. ⊙

minuta. 4. PECTIS foliis ovatis petiolatis. *Schreber. a*
Bellis cretica fontana omnium minima. *Tourn* 37. *Vaill. act.* 547.
Habitat in Creta & Oriente. ⊙

CHI

CHRYSANTHEMUM.

** Leucanthema.*

CHRYSANTHEMUM fruticosum, foliis linearibus dentato-trifidis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 174. **frutescens.**
Leucanthemum canariense, sapore pyrethri. *Walth. hort.* 31. *t.* 24.
Chamæmelum canariense ceratophyllum fruticosius. *Moris. hist.* 3. *p.* 35.
Bellis canariensis frutescens, foliis crassis pyrethri sapore. *Raj. suppl.* 221
Buphthalmum canariense leucanthemum, cotulæ fœtidæ crassioribus foliis. *Pluk. alm.* 73. *t.* 272. *f.* 6.
Habitat in Canariis *insulis.* ♄

CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis inciso-serratis, caule multifloro. *Roy. lugdb.* 174. *Sauv. monsp.* 267. *Gouan. monsp.* 449. **corymbiferum.**
Tanacetum montanum inodorum, minore flore. *Bauh. pin.* 132.
Tanacetum leucanthemum. *Tabern. hist.* 379.
Tanacetum inodorum, flore majore. *Bauh. pin.* 132.
Habitat in Thuringiæ, Bohemiæ, Helvetiæ, Sibiriæ *sylvaticis montosis.* ♃

CHRYSANTHEMUM foliis lanceolatis superne serratis utrinque acuminatis. *Hort. cliff.* 416. *Roy. lugdb.* 174. *it. scan. append.* **serotinum.**
Aster foliis profunde dentatis & quasi laciniatis, ramosus. *Raj. suppl.* 162.
Bellis major, radice repente, foliis latioribus serratis. *Moris. hist.* 3. *p.* 29. *s.* 6. *t.* 9. *f.* 11. *bles.* 239. *Raj. hist.* 351.
Bellis americana frutescens ramosa. *Raj. hist.* 1865.
Bellis americana procerior serotina ramosa, flore amplissimo. *Pluk. alm.* 65. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat forte in America *septentrionali? cum sero floreat.* ♃

CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis. *Hort. cliff.* 416. *Fl. svec.* 700; 763. *Mat. med.* 404. *Roy. lugdb.* 174. *Dalib. paris.* 261. **Leucanthemum.**
Chrysanthemum foliis oblongis serratis. *Fl. lapp.* 310.
Bellis sylvestris, caule folioso, major. *Bauh. pin.* 261.

Bellis major. *Fuchs. hist.* 148. *Cam. epit.* 635.
Habitat in pratis Europæ. ♃

atratum. 5. CHRYSANTHEMUM foliis omnibus cunei oblongis serratis carnosis. *Jacq. vind.* 151.
Bellis alpina major, folio rigido. *Bauh. pin.* 261. 120.
Bellis alpina major, foliis angustis rigidis. *B* 3. *p.* 115.
β. Bellis alpina minor, folio non rigido. *Bauh.* *p.* 115.
Bellis montana major, folio acuto. *Bauh. pin.* *prodr.* 121.
Habitat in Alpium Helvetiæ, Austriæ *pratensibus.*

montanum. 6. CHRYSANTHEMUM foliis imis spathulato-ovatis serratis, summis linearibus. *Sauv. mo* *Gouan. monsp.* 448. †
Leucanthemum montanum minus. *Tournef. in*
Bellis montana minor. *Bauh. hist.* 3. *p.* 115. *monsp.* 36.
Habitat Monspelii.

graminifolium. 7. CHRYSANTHEMUM foliis linearibus subin rimis, caule simplicissimo. *Sauv. monsp.* 87. *G* *monsp.* 448.
Leucanthemum gramineo folio. *Tournef. inst.* 4
Bellis montana, gramineis foliis. *Magn. monsp.* *Hort.* 31. *t.* 31.
Habitat Monspelii. ♃

Balsamita. 8 CHRYSANTHEMUM foliis ovatis oblongis ratis.
Leucanthemum orientale, costi hortensis folio. *T* *nef. cor.* 37.
Bellidioides balsamitæ majoris folio facie & o *Vaill. act.* 550.
Habitat in Oriente. ♃

monspeliense. 9. CHRYSANTHEMUM foliis imis palmatis: lis linearibus pinnatifidis. *Sauv. monsp.* 304. *G* *monsp.* 448.
Bellis montana major, foliis chrysanthemi cretic gustioribus. *Magn. monsp.* 306. *

eucanthemum montanum, foliis chrysanthemi. *Tournef. inst.* 492.
Habitat Monspelii. ♃

CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. **inodorum.**
Matricaria inodora, receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Fl. svec.* 2. *n.* 765.
Chamæmelum inodorum annuum humilius, foliis obscure virentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 36. *Raj. angl.* 3. *p.* 186.
Chamæmelum inodorum s. Cotula non fœtida. *Bauh. hist.* 3. *p.* 120. *
Chamæmelum maritimum. *It. w. goth.* 148.
Habitat in ruderatis Sveciæ *& præstantioris* Europæ. ☉
Calyx margine scarioso hanc Chrysanthemis adsociat.

CHRYSANTHEMUM foliis cuneiformibus pinnatifidis: laciniis integris, caulibus unifloris. **alpinum.**
Chamæmelum alpinum. *Bauh. pin.* 136.
Pyrethrum foliis omnibus longe petiolatis palmatis incanis. *Hall. helv.* 721.
Leucanthemum alpinum tenuifolium. *Clus. hist.* 1. *p.* 335. *Barr. ic.* 458. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Helvetiæ *ad Thermas Piperinas.*
Caules *stoloniferi.* Folia *petiolatis, pinnatifidis: laciniis sæpe 7, integris, acutis, distantibus.* Caules *terminales simplicissimi, vix spithamei, uniflori:* Foliis 3. *f.* 4, *linearibus, plerumque indivisis, imprimis superioribus.*

* * *Chrysanthema.*

CHRYSANTHEMUM foliis simplicibus ovatis sinuatis angulatis serratis acutis. **indicum.**
Matricaria sinensis, minore flore, petalis & umbone ochroleucis. *Pluk. amalth.* 142. *t.* 430. *f.* 2.
Matricaria sinensis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 259. *t.* 91. *f.* 1.
Tsjetti-pu. *Rheed. mal.* 10 *p.* *t.* 44.
Chrysanthemum maderaspatanum, oxyacanthæ foliis cæsiis ad marginem spinosis, calyce argenteo. *Pluk. alm.* 101. *t.* 160. *f.* 6.
Matricaria indica, latiore folio, flore pleno. *Moris. hist.* 3. *p.* 33.

 Matri-

Matricaria sinensis, flore monstroso. *Vaill. act. p.* 368. *Fl. zeyl.* 421. *
Matricaria zeylanica hortensis, flore pleno. *Raj.* 224.
Habitat in India.

...cticum. 13. CHRYSANTHEMUM foliis simplicibus cu... nibus subpalmatis multifidis obtusis.
Pyrethrum foliis longe petiolatis palmatis supra d... tis: ultimis laciniis trilobis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 203.
Habitat in Kamtschatca, America *septentrionali.*
Caules *debiles, diffusi, herbacei, inferne ramosi.* ... *petiolis longis, subcarnosa, lævia, cuneiformia lobata, sinuato-angulata, obtusa.* Flores *termi... solitarii, magnitudine C. coronarii, Pedunculo villoso.*

...yconis. 14. CHRYSANTHEMUM foliis lingulatis obtus... ratis, calycum squamis æqualibus.
Chrysanthemum myconis. *Dalech. hist.* 873. *t.* 87...
Chrysanthemum latifolium. *Bauh. hist.* 3. *p.* 105.
Bellis lutea, foliis subrotundis. *Bauh. pin.* 262.
Habitat in Lusitaniæ, Hispaniæ, Italiæ, *agris.* ☉
Simillimum C. segetum, *sed* Caulis *rigidior.* Foli... *laciniata.* Pedunculi *ante florescentiam obscu... subfusci, apice minime incrassati.* Calyx *non im... tus.* Radius *corollæ brevior.*

...getum. 15. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus ... perne laciniatis; inferne dentato-serratis. *Hort.* 416. *Fl. svec.* 699; 762. *Roy. lugdb.* 174. *Dal... ris* 261.
Chrysanthemum segetum. *Clus. hist.* 1. *p.* 334.
Chrysanthemum segetum vulgare glaucum. *Moris.* 3. *p.* 15. *s.* 6. *t.* 4. *f.* 1.
Bellis lutea, foliis profunde incisis, major. *Bauh* 262.
Habitat in Scaniæ, Germaniæ, Belgii, Angliæ, ... liæ *agris.* ☉

...ronarium. 16. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatifidis incisi... trorsum latioribus. *Hort. cliff.* 416. *Hort. ups. Roy. lugdb.* 174.
Chrysanthemum foliis matricariæ. *Bauh. pin.* 13...
Chrysanthemum majus, folio profundius laciniato ... gno flore. *Bauh. pin.* 134. Ch...

Chrysanthemum creticum. *Clus. hist.* 1. *p.* 334. *Moris. hist.* 3. *p.* 16. *s.* 6. *t.* 4. *f.* 2. 3.
Habitat in Creta, Sicilia. ⊙

CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis linearibus parallelis acutis integerrimis, pedunculis solitariis unifloris. pectinatum

Chamæmelum montanum incanum absinthioides italicum. *Barr. ic.* 457? *repræsentat florem & habitum.*
Leucanthemum fruticans pinnatis superioribus quamoclit foliis, imis vermiculatis & torosis. *Barr. ic.* 422. *folia refert.*
Habitat in Hispania, Italia. ♃
Caules *brevissimi, crassiusculi, prostrati, repentes.* Folia *pinnata, parva, (Tanaceti frutescentis) pubescentia.* Pedunculus *altior, basi folio uno alterove subulato.* Flos *flavus.*

CHRYSANTHEMUM foliis bipinnatis serratis villosis. bipinnatum

Pyrethrum foliis duplicato-pinnatis: pinnulis incisis, pedunculis unifloris. *Gmel. sib.* 2. *p.* 205. *t.* 85. *f.* 1.
Habitat in Sibiria. ♃
Habitus Anthemidis tinctoriæ. Folia *bipinnata, pinnulis sublanceolatis, hirsutis, fere Tanaceti.* Pedunculi *axillares, nudi, uniflori, pubescentes, longitudine foliorum.* Flores *lutei: radio disco longe breviore.*

CHRYSANTHEMUM flosculis omnibus uniformibus hermaphroditis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 174. *Gouan. monsp.* 449. * flosculosum

Tanacetum foliis integris rigidis dentatis, scapo unifloro. *Hall. goett.* 370.
Balsamita foliis agerati. *Vaill. act.* 336.
Bellis major spinosa, petalis carens s. nuda. *Moris. hist.* 3. *p.* 29. *s.* 6. *t.* 9. *f.* 16.
Bellis spinosa, foliis agerati. *Bauh. pin.* 262.
Bellis spinosa. *Alp. exot.* 327. *t.* 326.
Habitat in Africa, Creta. ♄

MATRICARIA.

MATRICARIA foliis compositis planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* 416. *Hort. ups.* 263. *Mat. med.* 400. *Roy. lugdb.* 173. parthenium

Matricaria vulgaris s. sativa. *Bauh. pin.* 133.
Matricaria. *Dod, pempt.* 35.
Habitat in Europæ *cultis, ruderatis.* ♃. ♂

maritima. 2. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, f bipinnatis subcarnosis: supra convexis, subtus rinatis.
Chamæmelum maritimum perenne humilius, f brevioribus crassis obscure virentibus. *Raj.* 3. *p.* 186. *t.* 7. *f.* 1. *It. w. goth.* 148. *
Habitat in Europæ *septentrionalis litoribus maris.*

Chamomilla. 3. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis pat bus, seminibus nudis, squamis calycinis mar æqualibus. *Fl. svec.* 702; 764. *Mat. med.* *Dalib. paris.* 262. *Gmel. sib.* 2. *p.* 200.
Matricaria foliis supradecompositis setaceis, ped culis solitariis. *Hort. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 17
Chamæmelum vulgare s. Leucanthemum, dioscor *Bauh. pin.* 135.
Anthemis vulgaris. *Lob. ic.* 770. *Fl. lapp.* 309.
Habitat in Europæ *agris, cultis.* ☉

argentea. 4. MATRICARIA foliis bipinnatis, pedunculis sol riis. *Hort. cliff.* 415. * *Roy. lugdb.* 173.
Matricaria monoleucanthemos, foliis argenteis rumque conjugatis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 369.
Chamæmelum orientale incanum, millefolii fo *Tournef. cor.* 37.
Habitat in Oriente.

suaveolens. 5. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis de xis, seminibus nudis, squamis calycinis mar æqualibus. *Fl. svec.* 701; 766. *Gmel. sib.* 2. *p.*
Matricaria leucanthemos annua suaveolens, cha meli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. paris.* 1
Chamæmelum tenue incisum, foliis floris deo protensis: umbone extuberante, suavius o *Cup. cathol. suppl.* 17.
Habitat in Europa. ☉

COTULA.

anthemoides. 1. COTULA foliis pinnato-multifidis dilatatis, c lis radio destitutis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.*
Ananthocyclus chamæmeli folio V. *Dill. elth.* 23. *f.* 25.

Ch

ıthemum exoticum perpusillum nudum, foliis
ıopi. *Pluk. alm.* 101. *t.* 274. *f. ult.*
in Insula Helenæ, Hispania.
receptaculum & flos ut in sequenti specie.

LA caule simplici erecto, foliis lanceolatis **grandis.**
ıtis.
in Barbaria.
tripedalis, simplicissimus, hirtus versus basin,
us. Flos *terminalis, duplo major Leucanthemo*
anthemo, luteus. Calycis *squamæ apice sub-*
ranaceæ. Receptaculum *nudum.* Seminis *co-*
est squama a latere exteriori germinis. Simi-
a D. Allionio habui, sed minorem, ramosam,
magis dentatis.

LA foliis lanceolato-linearibus amplexicau- **coronopifo-**
pinnatifidis. *Hort. cliff.* 417. *Hort. upf.* 266. *Roy.* **lia.**
. 173. *Mochr. E. N. C.* 1742. *vol.* 6. *p.* 298.
ıocyclus coronopi folio V. *Dill. elth.* 27. *t.*
. 26.
nthemum exoticum minus, capite aphyllo,
ıæmeli nudi facie. *Breyn. cent.* 156. *t.* 76.
ınnua, capite aphyllo luteo coronopi folio,
bus procumbentibus. *Herm. lugdb.* 86. *Moris.*
3. *p.* 30. *f.* 6 *t.* 6. *f. ult.*
in Æthiopia, *nunc in* Frisiæ *inundatis prope*
en, Mæhringio teste. ⊙

LA foliis pinnato-setaceis multifidis, corol- **aurea.**
ıdio destitutis.
foliis pinnatim setaceis, caulibus procumben-
t. *Læfl. it.* 163. *
melum luteum, capite aphyllo. *Bauh. pin.* 135.
melum aureum peregrinum, capite sine foliis.
. *hist.* 3. *p.* 119.
nis Chrysanthemum herbariorum. *Lob. ic.* 771.
in Hispania, Europa *australi.* ⊙
nthemis nobilis, *cujus varietatem statuit Vaillantius.*

LA foliis lyrato-pinnatis, corollis radiatis. **viscosa.**
. *cliff.* 417. *
a americana odorata viscosa, florum radiis bre-
nis albis. *Houst. mss.*
in Vera Cruce.

 6. CO-

turbinata. 6. COTULA receptaculis subtus inflatis turbinatis: *cliff.* 417. *Hort. upf.* 266. *Roy. lugdb.* 173.
Chamæmelum æthiopicum lanuginosum. *Brey* 148. *t.* 73. *Moris. hist.* 3. *p.* 36. *s.* 6. *t.* 12.
Habitat in Æthiopia. ⊙

verbesina. 7. COTULA foliis oppositis cordatis crenatis trin *Amæn. acad.* 5. *p.* 407. *
Tanacetum herbaceum erectum, foliis cordatis tis oppositis, capitulis paucioribus remotis te libus. *Brown. jam.* 316.
Crysanthemum sylvaticum repens minus, cha os folio, flore luteo nudo, semine rostrato. *jam.* 126. *hist.* 1. *p.* 262. *t.* 155. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

ANACYCLUS.

creticus. 1. ANACYCLUS foliis decompositis linearibus niis divisis planis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugd*
Cotula cretica minima, chamæmeli folio, cap flexo. *Tournef. cor.* 37.
Santolinoides annua procumbens, chamæmeli *Vaill. act.* 372.
Habitat in Creta. ⊙

orientalis. 2. ANACYCLUS foliis compositis setaceis acutis *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 171.
Chamæmelum orientale, foliis pinnatis. *Tourn* 37. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 110. *t.* 110.
Habitat in Oriente.

valentinus. 3. ANACYCLUS foliis decompositis linearibus: niis divisis teretiusculis acutis, floribus flosc *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 171.
Chrysanthemum valentinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 33
Buphthalmum lanuginosum, foliis millefolii. *pin.* 135.
Buphthalmo tenuifolio simile. *Bauh. hist.* 3. *p.*
Chamæmelum tenuifolium, flore bullato aureo. *rar.* 1095. *t.* 450?
Habitat ad Reg. Valentini *agros & vias.* ⊙
Confer. Anthemidem valentinam.

ANTI

ANTHEMIS.

* *Radio dicolore s. albo.*

[AN]THEMIS florum paleis rigidis pungentibus. *Roy.* [lu]*gdb.* 172. — Cota.

[Anth]emis italica arvensis annua major vulgatissima, [fl]ore maximo: disco pungente. *Mich. gen.* 32.

[Cha]mæmelum annuum ramosum, cotulæ fœtidæ flo[ri]bus amplioribus, capitulis spinosis. *Moris. hist.* 3. 36. *f.* 6. *t.* 8. *f.* 11. *pro* 12. *Till. pis.* 38. *t.* 21. *f.* 2

[Bell]is montana, tanaceti foliis, caule singulari, annua. [Pl]*uk. alm.* 65. *t.* 17. *f.* 5.

[Hab]*itat* in Italiæ *arvis*.

[AN]THEMIS erecta, foliorum apicibus subspinosis. [G]*ouan. monsp.* 450. — altissima.

[Ant]hemis foliorum serraturis setaceis, radiis florum [al]bis. *Sauv. monsp.* 265.

[Cha]mæmelo affine Buphthalmum italicum segetum al[ti]ssimum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 120.

[Ch]amæmelum Leucanthemum hispanicum, magno [fl]ore. *Bauh. pin.* 135. *prodr.* 70.

[Hab]*itat* in Italiæ, Hispaniæ, G. Narbonensis *agris.* [D]. *Sauvages.* ☉

[Cau]lis *multiflorus, segete fere altior, striatus, erectus.* [P]*edunculi superne parum incrassati.* Calyces *gla*[b]*ri.* Paleæ *latæ, subtruncatæ, terminatæ seta rigi*[d]*iuscula longitudine calycis.* Folia *multifido-compo*[si]*ta dentibus acuminatis: acuminibus pallidis, quasi* [s]*pinosis.*

[A]NTHEMIS foliis pinnatis dentatis carnosis nudis punctatis, caule prostrato, calycibus subtomentosis. — maritima.

[An]themis maritima annua odorata præcox, flore albo, caule purpurascente. *Mich. gen.* 33. *Till. pis. t.* 19. *f.* 3.

[M]atricaria maritima. *Bauh. pin.* 134.

[Ch]amæmelum maritimum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 122.

[Ha]*bitat* Monspelii, *inque* Italia. ♃

[Cau]les *late prostrati, læves, purpurascentes.* Folia [p]*innata, incisa, nuda, punctis excavatis adspersa, versus basin confertius dentata, sub basi linea transversa elevata purpurascente.* Pedunculi *terminales, solitarii, substriati, pubescentes, superne crassiores.* Flores *odore Matricariæ Parthenii.*

tomentosa. 4. ANTHEMIS foliis pinnatifidis obtusis plani dunculis hirsutis foliosis, calycibus tom *Hort. cliff.* 415. * *Roy. lugdb.* 172.
Chamæmelum, coronopi folio, tomentosum. *act.* 1720. *p.* 412.
Chamæmelum maritimum incanum, folio i crasso. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 110.
Habitat in Græciæ *maritimis.*

mixta. 5. ANTHEMIS foliis simplicibus dentato-lacini
Anthemis foliis singularibus pinnato-dentatis. *stamp.* 346.
Anthemis maritima lanuginosa annua, foliis pyrethri sapore, semiflosculis albis juxta dis teis. *Mich. gen.* 32. *t.* 30. *f.* 1.
Chamæmelum annuum ramosum, coronopi fol re mixto. *Moris. hist.* 3. *p.* 36. *f.* 6. *t.* 18. *f.* 1
Chamæmelum lusi anicum latifolium, f. coron lio. *Breyn. cent.* 149. *t.* 74.
Bellis pumila crenata agerati æmula crenis bico asperiusculis. *Pluk. alm.* 65. *t.* 17. *f.* 4.
Habitat in Italia, Gallia. ☉
Folia non composita, sed laciniata; Radius flor bus, basi luteus.

chia. 6. ANTHEMIS foliis pinnatifidis laciniatis, pedu nudis subvillosis. *Hort. cliff.* 415. *Roy. lugd*
Habitat in Chio.

nobilis. 7. ANTHEMIS foliis pinnato-compositis lin acutis subvillosis.
Anthemis foliis pinnato-decompositis: lacinii ceis. *Hort. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 172.
Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis nibus nudis, squamis calycinis margine æqu *Fl. svec.* 701. *Mat. med.* 401. *Dalib. paris.*
Chamæmelum nobile f. Leucanthemum od *Bauh. pin.* 135.
Chamæmelum odoratum. *Dod. pempt.* 270.
β. Chamæmelum nobile, flore multiplici. *Bauh. p*
Chamæmelum romanum, flore multiplici. *C.* 646.
Chamæmelum chium vernum, folio crassiore magno. *Tournef. cor.* 37. *Roy. lugdb.* 172.
Habitat in Europæ *pascuis apricis.* ♃ 8.

[I]EMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, arvensis.
ibus coronato-marginatis. *Fl. svec.* 704; 768.*
. *parif.* 263.
iis arvensis. *It. scan.* 177.
nelum inodorum. *Baub. pin.* 135. *Raj. angl.*
185? *Rupp. gen.* 173.
in Europæ, *præsertim* Sveciæ, *agris.* ♂
canescens. Caulis *diffusus.* Paleæ *lanceolatæ.*

EMIS foliis dentato-pinnatis linearibus inte- alpina.
nis, caule villoso unifloro, paleis sphacelatis,
s ovatis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 330. *
nelum alpinum saxatile perenne, flore albo
ari, calyce nigricante. *Till. pis.* 39. *t.* 19. *f.* 1.
ver. 3. *p.* 282.
in Alpibus Tyrolis, Baldi. ♃

HEMIS receptaculis conicis: paleis setaceis, Cotula.
ibus nudis. *Fl. svec.* 703; 767. *Mat. med.* 403.
. *paris.* 263.
is foliis pinnato-decompositis: laciniis linea-
, caulibus diffusis, radice annua. *Roy. lugdb.* 172.
nelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135.
nelum fœtidum s. Cotula fœtida. *Bauh. hist.*
36.
in Europæ *ruderatis, præcipue in* Ucrania. ⊙
hac minutissimæ sunt.

IEMIS foliis pinnato-multifidis planis: laci- montana.
nearibus acutis trifidis, pedunculo longissimo.
cliff. 415. * *Roy. lugdb.* 172.
um montanum, chamæmeli flore magno.
pin. 140. *Bauh. hist.* 1. *p.* 184.
um montanum, abrotani feminæ flore. *Col.*
. 1. *p.* 117. *t.* 33.
ielum alpinum, abrotani folio. *Vaill. act.* 591.
cana, chrysanthemi cretici folio. *Bocc. mus.*
36. *t.* 98.
mila monanthos, foliis nasturtii petræi. *Raj.*
182.
n Italia, Helvetia.

[I]EMIS caule suffruticoso, foliis sublanceola- leucantha.
itatis acutis indivisis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 75. *
ad Cap. b. Spei. ♄

Pyrethrum. 13. ANTHEMIS caulibus simplicibus unifloris bentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cl.* *Hort. upſ.* 263. *Mat. med.* 396. *Mill. dict.* 38. *monſp.* 451.
Chamaemelum ſpecioſo flore, radice longa *Shaw. afr.* 138.
Pyrethrum flore bellidis. *Bauh. pin.* 148.
Habitat in Arabia, Syria, Creta, Apulia, Th Bohemia, Monſpelii, Apennino. ♃
Caules *plures*, *proſtrati*, *ſæpius uniflori*, *rarius* Radius *floris albus*, *ſubtus purpureus*. Radi *ſapore Polygalæ Senegæ*.

* * *Radio concolore ſ. luteo.*

valentina. 14. ANTHEMIS caule ramoſo, foliis pubeſc tripinnatis, calycibus villoſis pedunculatis. *H* 414. *Gouan. monſp.* 451.
Buphthalmum cotulæ folio. *Bauh. pin.* 134.
Buphthalmum tenuifolium, folio fere millefoli *hiſt.* 3. *p.* 124.
Buphthalmum creticum, cotulæ facie. *Brey* 150. *t.* 75.
Buphthalmum alterum penæ. *Dalech. hiſt.* 853
β. Buphthalmum flore luteo ſubtus purpuraſcente *pin.* 134.
Buphthalmum flore purpuraſcente. *Cam. epit.*
Buphthalmum narbonenſe. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 33
γ. Chamaemelum fœtidum marinum. *Vaill. a* *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 121.
Habitat in G. Narbonenſi. ☉
Affinis admodum Anacyclo valentino.
Caulis *diffuſus*, *purpuraſcens.* Pedunculi *ſupern* *ſati.* Calycis *ſquamæ villoſæ*, *ſed intimæ ſ* *crenatæ*, *glabræ*.
Varietas *β. ex Aquis mortuis Monſpelii*, *radi* *ſanguineo.*
Corollulas *ariſtatas obſervavit in hac ſpecie F* *ſimiles in aliis?*

repanda. 15. ANTHEMIS foliis ſimplicibus ovato lanceo pando-crenatis.
Chryſanthemum luſitanicum, agerati folio. *inſt.* 492.
Chryſanthemum parvum ſ. Bellis lutea parva *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 105.

tat in Hispania, Lusitania.

les simpliciusculi, erecti. Folia *ovato-oblonga, repan-crenata, petiolata, alterna, obtusa, vix villosa.* lores *terminales, subsolitarii, globosi;* Calyx *minus bricatus.* Radius *angustus; Discus convexus flavus.* mina *tetragona, coronata squamis quatuor, quarum in setas desinunt.*

THEMIS foliis bipinnatis: laciniis linearibus in-gris, pedunculis nudis longissimis. *Roy. lugdb.* 271. Millefolia.
llea foliis pinnatis: foliolis lineari-lanceolatis basi fum auctis. *Mill. ic.* 6. *t.* 9.
anthemum, folio absinthii, alpinum ciassi. *Boerh. lb.* I. *p.* 107.
thrum foliis duplicato-pinnatis: pinnulis incisis, pe-nculis unifloris, caule procumbente. *Gmel. sib.* 2. 207. *t.* 86. *f.* 1. 2.
at in Sibiria.
tus *Millefolii.* Folia *Millefolii, sed paulo majo-* Pedunculi *in summis ramis, alterni, longissimi.* ores *Anthemidis tinctoriæ, sed parvi lutei.*

THEMIS foliis bipinnatis serratis subtus tomen-is, caule corymboso. tinctoria.
thalmum caule ramoso, foliis pinnatifidis: laciniis earibus dentatis serratis, floribus pedunculatis.
rt. cliff. 414. *Fl. svec.* 698; 769. *Roy. lugdb.* 171.
thalmum tanaceti minoris foliis. *Baub. pin.* 134.
anthemum foliis tenaceti. *Loes. pruss.* 47. *t.* 9.
thalmum alpinum, flore candido. *Triumf. obs.* 79. *triumfetti.*
to.
alpina, parthenii foliis, elatior. *Pluk. alm.* 66. *t. f.* 6.
amelum tanaceti minoris folio, flore albo ma-a. *Vaill. act.* 592.
at in Sueciæ, Germaniæ *apricis pratis siccis.* ♃
a β. *differt radio perfecte explicato albo, basi ta-luteo; reliqua conveniunt ut vix species diversa tatur.* Calycis *squamæ interiores utrinque apice atæ.*

THEMIS caule decomposito, calycibus ramife- arabica.
Hort. cliff. 413. *t.* 24. * *Hort. upf.* 264. *Roy. lb.* 170.

Aste-

Asteriscus annuus trianthophorus Crassas arabi
ctus. *Shav. afr.* 58. *t.* 36. *f.* 58.
Habitat in Arabia. ☉

A C H I L L E A.

* *Corollis flavis.*

santolina. 1. ACHILLEA foliis setaceis dentatis: dentic
integris subulatis reflexis. *Hort. cliff.* 412.
Achillea lutea tomentosa, santolinæ folio. *V*
1720. *p.* 417.
Ptarmica orientalis, santolinæ folio, flore
Tournef. cor. 37.
Habitat in Oriente. ♃

Ageratum. 2. ACHILLEA foliis lanceolatis obtusis acute
Hort. cliff. 413. *Hort. upf.* 265. *Mat. m*
Roy. lugdb. 176. *Mill. dict. t.* 10. *Goua*
452.
Ageratum foliis serratis. *Bauh. pin.* 221.
Balsamita minor. *Dod. pempt.* 295. *Moris.*
38. *f.* 6. *t.* *f.* 2.
Habitat in G. Narbonensi, Hetruria. ♃

falcata. 3. ACHILLEA foliis linearibus dentatis obt
nis: denticulis crenatis. *Hort. cliff.* 412. *R*
176.
Achillea incana, santolinæ foliis plerumque
asperis, flore sulphureo. *Vaill. act.* 1720. *p*
Habitat in Oriente. ♃

tomentosa. 4. ACHILLEA foliis pinnatis hirsutis: pinnis
bus dentatis.
Achillea foliis linearibus pinnatifidis pubesc
foliolis tripartitis transversalibus: media
ore. *Hort. cliff.* 413. *Hort. upf.* 265. *R*
175.
Millefolium tomentosum luteum. *Bauh. pin.*
Stratiotes millefolia, flavo flore. *Clus. hist.*
Habitat in G. Narbonensi, Vallesia, Tataria.

pubescens. 5. ACHILLEA foliis pinnatis: foliolis lanceol
sis serratis subtus lanigeris. *Hort. cliff.* 4
lugdb. 175.
Millefolium orientale, foliis tanaceti incan
pallide luteis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 112.

ica orientalis, foliis tanaceti incanis, semiflosculorum pallide luteis. *Tournef. cor.* 37.
caria tomentosa & incana, achilleæ folio, flore ...o. *Vaill. act.* 1722. *p.* 286.
it in Oriente. ♃
aculum paleaceum adesse negat Vaillant, nec observi ipse.

ILLEA foliis pinnatis supradecompositis: laciniis aribus distantibus. *Roy. lugdb.* 175. — abrotanifolia.
olium orientale altissimum luteum, abrotani fo- *Tournef. cor.* 37.
it in Oriente.

ILLEA foliis bipinnatis tomentosis: foliolis ovaintegris. *Hort. cliff.* 413. *Roy. lugdb.* 176. — bipinnata.
it in Oriente. ♃

ILLEA foliis pinnatis: foliolis obtuse lanceo- s serrato-dentatis. *Hort. cliff.* 413. *Roy. lugdb.* 175. — ægyptiaca.
ica incana, pinnulis cristatis. *Tournef. cor.* 37.
. *p.* 228. *t.* 87.
hium santonicum æpyptiacum. *Bauh. pin.* 139.
hium ægyptiacum. *Dod. pempt.* 25.
it in Ægypto, Oriente. ♃

ILLEA foliis dentato-laciniatis integerrimis: e trifidis. *Roy. lugdb.* 176. — inodora.
tum, laciniatis foliis, inodorum africanum. *m. flor.* 55. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 125.
it in Africa.

* * *Corollis radio albis.*

HILLEA foliis pinnatis planis inciso-serratis: imis majoribus coadunatis. — macrophylla.
ea foliis bipinnatis: pinnulis linearibus indivisis. *meth.* 267.
ea foliis pinnatis, pinnis serratis maximis: extreconfluentibus. *Hall. helv.* 713.
nculus alpinus, foliis scabiosæ. *Bauh. pin.* 98. *r.* 39.
ca alpina, matricariæ foliis. *Triumph. obs.* 83. *t.* Bocc *mus.* 2. *p.* 150. *t.* 110. *Barr. rar.* 1119. *t.* 991.
bifera millefolii umbella, folio alato & laciniato. *hist.* 345.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ.

Folia *magnitudine Tanaceti.* Caulis *subpubescens*, *pedalis.* Flores *Ptarmicæ: calycis squamæ nigro*[illegible] *gine.*

impatiens. 11. ACHILLEA foliis pinnatis: pinnis diſtantibus l ari-lanceolatis: baſi ſurſum acutis. *Roy. lugdb.* [illegible]

Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis: infe ribus ſurſum dente auctis glaberrimis. *Gmel. fl. p.* 197. *t.* 83. *f.* 1.

Habitat in Sibiria.

Planta *albis gaudet floribus.* Foliorum *pinnæ remot admodum diſtantes, diſtinguunt plantam a reliquis.*

Clavennæ. 12. ACHILLEA foliis laciniatis planis obtuſis to toſis.

Achillea foliis ſinuato-laciniatis planis villoſis ni obtuſis. *Hort. cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 176.

Abſinthium alpinum umbelliferum latifolium. *pin.* 139.

Abſinthium alpinum umbelliferum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.*

Dracunculus argenteus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 40. *ſ.* 6. *f.* 5.

Habitat in Alpibus Auſtriæ, Pannoniæ, Cari *aſperis.* ♃

Ptarmica. 13. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argut ratis.

Achillea foliis integris minutiſſime ſerratis. *V. cliff.* 412. *Hort. upſ.* 265. *Fl. ſvec.* 706; 771. *med.* 398. *Roy. lugdb.* 176. *Hall. helv.* 713. *pariſ.* 264. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 196.

Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 9

Ptarmica vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 12.

β. Ptarmica vulgaris, flore pleno. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 1

Habitat in Europa *temperata.* ♃

alpina. 14. ACHILLEA foliis lanceolatis dentato-ſerratis ticulis tenuiſſime ſerratis. *Hort. cliff.* 413. *lugdb.* 176.

Ptarmica alpina, foliis profunde inciſis. *Tournef.* 497.

Ptarmica alpina, incanis ſerratis foliis. *Herm. lugd.*

Habitat in Alpibus Sibiriæ. ♃

An locus potuerit ex præcedenti formaſſe hanc?

15. ACH

ACHILLEA foliis pinnulis pectinatis integriusculis, pedunculis villosis. *Jacq. vind.* 157. — atrata.
Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis subhirsutis, raro dentatis. *Hall. helv.* 714.
Matricaria alpina, chamæmeli foliis. *Bauh. pin.* 134.
Parthenium alpinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 336.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Vallesiæ, Austriæ: *locis asperis humidis.* ♃
Margines calycis atri & sphacelati. Folia *interdum bipinnata.*

ACHILLEA foliis pinnatis dentatis hirsutissimis, floribus glomerato-umbellatis. — nana.
Achillea foliis pinnatis lanugine obductis, floribus albis umbellatis. *Hall. helv.* 713. *Allion. pedem.* 3. *t.* 2. *f.* 3.
Millefolium alpinum incanum, flore specioso. *Bauh. hist.* 3. *p.* 138. *Moris. hist.* 3. *p.* 39. *s.* 6. *t.* 11. *f.* 11. *Raj. hist.* 347.
Millefolium alpinum tomentosum odoratum nanum. *Bocc. mus.* 2. *p.* 166. *t.* 120.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Vallesiæ.
Planta parva. Paleæ inter flosculos luteos disci sunt apice atræ.

ACHILLEA foliis bipinnatis subpilosis: laciniis linearibus dentatis: auriculis decussatis. — magna.
Millefolium maximum, umbella alba. *Bauh. pin.* 140. *prodr.* 72.
Habitat in Europa *australi.* ♃
Simillima A. Millefolio, *sed duplo major.* Caulis *adspersus pilis raris.* Folia *similia Millefolio, sed majora, basi quasi auriculata auriculis duabus: altera inferiore sub folio; altera superiore supra costam prominente, methodo plane eadem, quæ in Athamantha libanotide.*

ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus sulcatis. *Hort. cliff.* 413. *Fl. svec.* 705; 770. *Mat. med.* 397. *Roy. lugdb.* 175. *Gron. virg.* 101. *Dalib. paris.* 263. — Millefolium.
Achillea foliis pinnato-pinnatis. *Fl. lapp.* 311.
Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140.
Achillea tanaceti folio, flore purpureo. *Vaill. act.* 593.
Millefolium purpureum majus. *Bauh. pin.* 140.

Millefolium purpureum. *Tabern. hist.* 130.
Habitat in Europæ *pascuis pratisque.* ♃

nobilis. 19. ACHILLEA foliis bipinnatis: inferioribus n planis, superioribus obtusis tomentosis, cory convexis confertissimis.
Millefolium nobile. *Trag. hist.* 476.
Tanacetum minus album, odore champhoræ. *pin.* 132.
Habitat in Helvetia, Misnia, Bohemia, G. N nensi, Tataria. ♃
Folia *bipinnata, obtusa, tomentosa, at vero Folia mis summis floralibus simplicia, semipinnata, im rima, tomentosa, obtusa.* Corymbi *dense con* Caules *teretes, non sulcati.* Florum *radius reflectitur, ut non appareat.*

odorata. 20. ACHILLEA foliis bipinnatis ovalibus nudius corymbis fastigiatis confertis.
Achillæa pinnis æqualibus confertis tomentosis: nulis capillariter divisis. *Hall. helv.* 716. *Sauv.* 267.
Millefolium minimum crispum, flore albo, his cum. *Barr. rar.* 1116. *t.* 992.
Millefolium odoratum minus monspeliensium. *blæs. Magn. monsp.* 177.
Habitat in Helvetia, Narbona, Hispania. ♃
Folia æqualiter bipinnata, pinnulis distinctis, integer acutis. Caulis *vix palmo altior.*

cretica 21. ACHILLEA foliis linearibus: pinnis subrot retrorsum imbricatis, caule tomentoso.
Millefolium incanum creticum. *Bauh. pin.* 140. *prod.*
Millefolium creticum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 139.
Habitat in Creta. ♃
Habitus A. Millefolii. Caulis *tomentosus.* Fol *nearia, subtomentosa, retrorsum imbricata: pinn niformibus, supra quadrifariam imbricatis.* F *albi.*

TRIDAX.

ocumbens. 1. TRIDAX. *Hort. cliff.* 418. *
Aster americanus procumbens, foliis laciniatis futis. *Houst. mss.*
Habitat in Vera Cruce.

SIG

SIGESBECKIA

ESBECKIA petiolis sessilibus, calycibus exte- orientalis.
ribus linearibus majoribus patentibus.
beckia. *Hort. cliff.* 412. *t.* 23. *. *Hort. upf.* 267.*
ti similis foliis latissimis serratis. *Buxb. cent.* 3.
9. *t.* 52.
rio affinis Lapsana sinica, menthastri foliis, ca-
e fimbriato hispido. *Pluk. amalth.* 58. *t.* 380. *f.* 2.
at *in* China, Media *ad pagos.* ♃

ESBECKIA petiolis decurrentibus, calycibus occidental
is. *Gron. virg.* 128.
esina foliis ovatis petiolatis decurrentibus opposi-
flosculis radiorum solitariis. *Gron. virg.* 1. *p.*
*
anthemum americanum, caule alato, foliis am-
oribus binatis, floribus pallide lutescentibus par-
. *Raj. suppl.* 213. *Pluk. mant.* 46. *t.* 342. *f. penult.*
toriophalacron folio trinervi scrophulariæ, caule
o. *Vaill. act.* 598.
at *in* Virginia.
s *strictus.* Folia *opposita, lanceolato-ovata, tripli-
via, serrata, decurrentia utrinque per caulem, unde
ue angulis* 4 *membranaceis, subtus subtomentosa.
unculi terminales, brachiati; an proprii generis?*

ZINNIA.

NIA floribus paucis. pauciflora.
fogonum foliis sessilibus amplexicaulibus, caly-
us sessilibus squamosis. *Sp. pl.* 1. *p.* 920.
s calyce oblongo, seminibus radii corolla non
idua coronatis. *Mill. dict. t.* 64.
eckia foliis oppositis. *Zinn. gœtt.* 409. *t.* 1.
Hill. exot. n. 29.
na. *Scepin. diss. acad.*
at in Peru. ⊙
s *teres, erectus, compositus.* Folia *opposita, ses-
, amplexicaulia, cordato-lanceolata, glabra, sub-
ervia, integerrima, margine scabra.* Calyx *ter-
alis, sessilis, solitarius, glaber, cylindricus.* Co-
la *lutea, persistens.* Rami *ex alis foliorum, non
i proximis, cauli similes, altiores.*

NIA floribus numerosis. † multiflora
at - - - - *N. L. Burmannus.*

Semina hujus misit Burmannus, plantam non dum
Flores coccineo-purpurascentes, an mera varietas
le pubescente?

VERBESINA.

** Alternifoliæ.*

alata 1. VERBESINA foliis alternis decurrentibus und
ti obtusis. *Hort. cliff.* 411. *Hort. upf.* 262.
Cannabia indica, foliis integris, alato caule. *M*
hort. 40. *t* 40.
Chrysanthemum curassavicum, alato caule, flori
aurantiis. *Herm. par.* 125. *t.* 125.
Chrysanthemum americanum, caule alato, flore api
lo globoso aurantio, foliis baccharidis. *Co*
hort. 1. *p.* 5. *t.* 3.
Chrysanthemum americanum bidens alatum, flore
vo aurantiaco. *Pluk. alm.* 100. *t.* 84. *f.* 3.
Chrysanthemum conyzoides curassavicum, abro
fœminæ flore aurantio. *Volk. norib.* 106. *t.* 106.
Habitat in Curassao, Surinamo. ♃
A reliquis maxime differt habitu & structura, ut f
proprii generis.

hinensis. 2. VERBESINA foliis alternis petiolatis ovato-lan
latis serratis.
Habitat in China. *Osbeck.* ♄
Caulis *simplex, teres, subtomentosus.* Rami *simpli*
ex alis superioribus foliorum. Folia *ovato-oblon*
subtomentosa obtusiuscula, petiolata, obtuse serr
dentata, alterna. Flores *terminales, solitarii,*
dunculati. Calyx *hemisphæricus, imbricatus, to*
tosus. Corolla *lutea.* Flosculi *Radii lanceolati,*
tegri, multi; Disci vero copiosi, paleis interstin
Semina *coronata margine & setis* 4 *lævibus.*

irginica 3. VERBESINA foliis alternis lanceolatis petiola
floribus corymbosis. *Gron. virg.* 128.
Habitat in Virginia.

** * Oppositifoliæ.*

do-Ac- 4. VERBESINA foliis lanceolatis subserratis, ped
ella, culis flore longioribus. *Fl. zeyl.* 308. *
Bidens zeylanica, flore luteo, melissæ folio, Acn
la dicta. *Seb. thes.* 1. *p.* 19. *t.* 10. 11.

Chry-

Chrysanthemum maderaspatanum latifolium, scabiosæ capitulis parvis. *Pluk. alm.* 99. *t.* 159. *f.* 4.
Habitat in Zeylona.

VERBESINA foliis oblongo-ovatis trinerviis subdentatis petiolatis, pedunculis elongatis axillaribus, floribus conicis. — Acmella

Verbesina foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolatis serratis, pedunculis unifloris dichotomiæ caulis. *Fl. zeyl.* 309. * *Aiat. m. d.* 406.
Ceratocephalus ballotes foliis. *Vaill. act.* 600.
Bidens zeylanica, flore luteo, melissæ folio, Acmella dicta. *Seb. muf.* 1. *p.* 19. *t.* 9. 10.
Chrysanthemum bidens s. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio, Acmella dicta. *Raj. suppl.* 228. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 48.
Senecio ind. orient. ocymi majoris folio profunde crenato. *Pluk. alm.* 343. *t.* 315. *f.* 2.
ABCdaria. *Rumph. amb.* 6. *p.* 145. *t.* 65.
Habitat in Zeylona. ☉
Calyx *simplex*. Receptaculum *subulatum*. Radius 5-*florus*, *minimus*. Semina *ancipitia*, *angulis ciliata: aristæ* 2, *capillares*.

VERBESINA foliis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso. — fruticosa

Bidens foliis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 399.
Bidens frutescens, ilicis folio, flore luteo. *Plum. spec.* 10. *ic.* 52.
Habitat in America *meridionali*. ♄
Semina lata, ut in Coreopsi.

VERBESINA foliis ovatis serratis, calycibus oblongis sessilibus caulinis confertis lateralibus. *Amœn. acad.* 4 *p* 290 * — nodiflora

Bidens nodiflora, folio tetrahit *Dill. elth.* 53. *t.* 45. *f.* 53.
Chrysanthemum conyzoides nodiflorum, semine rostrato bidente. *Sloan. jam.* 126. *hist.* 1. *p.* 262. *t.* 154.
Habitat in Caribæis ☉
Semina disci aristis 2. *Radii mutica*, *margine dentato-ciliata*.

VERBESINA foliis ovatis trinerviis glabris petiolatis, feminibus tricornibus. *Fl. zeyl.* 310. * — Lavenia

Eupatoriophalacron scrophulariæ folio trinervi. *V. act.* 598.
Eupatoriophalacron scrophulariæ aquaticæ foliis politis. *Burm. zeyl.* 94. *t.* 42.
Chrysanthemum aquaticum, scrophulariæ folio, venia dictum. *Raj. suppl.* 217.
Habitat in Zeylona.

biflora. 9. VERBESINA foliis oblongo-ovatis triplin acuminatis serratis, pedunculis geminis biflori
Habitat in India.
Statura Sigesbeckiæ. Folia *opposita, petiolata, serrata, ovato-oblonga, scabriuscula.* Rami *op* Pedunculus *terminalis, foliis brevior, biflorus.* dunculi *axillares, gemini utrinque, biflori cu liolo altero pedicello opposito.* Flores *lutei.* S *gibba, triquetra, mutica. Affinis Laveniæ*

alba. 10. VERBESINA foliis lanceolatis serratis sessi *Hort. cliff.* 500. *Gron. virg.* 128.
Eupatoriophalacrom balsaminæ feminæ folio, albo discoide. *Vaill. act.* 597. *Dill. elth.* 138. *t. f.* 137.
Scabiosa conyzoides americana latifolia, capitu floribus albis parvis. *Pluk. alm.* 335. *t.* 109. *f.* 1 *ris. hist.* 3. *p.* 47. *s.* 6. *t.* 13. *f.* 16.
Habitat in Virginia, Surinamo. ♂
Semina mutica. Calyx simplex. Pedunculi lanati.

prostrata. 11. VERBESINA foliis lanceolatis serratis, flo alternis geminis subsessilibus.
Eupatoriophalacron menthæ arvensis folio. *Vai* 598. *Dill. elth.* 139. *t.* 113. *f.* 138.
Chrysanthemum maderaspatanum, menthæ ar folio & facie, floribus bigemellis ad alas, pec curtis *Pluk. alm.* 100. *t.* 118. *f.* 5.
Habitat in India.
Semina mutica, quadrifariam muricata. Calyx *simp*

calendulacea. 12. VERBESINA foliis lanceolatis obtusiusculis dunculis longis unifloris, calycibus simplicibu *zeyl.* 311. *
Caltha flore solitario, ex alis foliorum, longissim dunculo prodeunte. *Burm. zeyl.* 52. *t.* 22. *f.* 1
Habitat in Zeylona.

Se

submutica, *coronata margine 4-dentato breviſſimo.*
x 5-phyllus.

[M]ILBESINA foliis trifido-laciniatis ſerratis, cau- [r]epente. — mutica.

[Ana]nis americana. *Sp. pl.* 1. *p.* 895.
[...] apiifolia. *Amæn. acad.* 5. *p.* 405.
[Buphth]almum foliis triternatis, pedunculis termina-[li]s ramo longioribus. *Hort. cliff.* 414.
[Chrysa]nthemum paluſtre minimum repens, apii folio. [Slo]*. jam.* 126. *hiſt.* 1. *p.* 263. *t.* 155. *f.* 1. *Raj. ſuppl.*

[Chrysa]nthemum humile, ranunculi folio. *Plum. ſpec.* [...] *ic.* 86. *f.* 2.
[Habita]*t in* America *meridionali.* ☉
[...] *difficile determinatur charactere*, *cum ſemina ſunt* [...]*ca & Calyx bidentis.*

TETRAGONOTHECA.

[TET]RAGONOTHECA. — helianthoides.
[Tetrag]onotheca doronici maximi folio. *Dill. elth.* 378. [t. 28]3. *f.* 365. *Gron. virg.* 128.
[Habita]*t in* Virginia.

BUPHTHALMUM.

* *Aſteriſci T.*

[BUPH]THALMUM foliis oppoſitis lanceolatis, pe-[dunculi]s bidentatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 415. [Gro]*n. virg.* 127. *Roy. lugdb.* 170. — frutescens.
[Asteri]ſcus fruteſcens, leucoji foliis ſericeis & incanis. [Dil]*l. elth.* 44. *t.* 38. *f.* 44.
[Bellis] foliis fruteſcens, lychnidis folio carnoſo, flo-[re l]uteo. *Plum. ſpec.* 10. *ic.* 107. *f.* 1.
[Chrys]anthemum ex inſulis caribæis, leucoji incanis [s]ericeis foliis craſſis. *Pluk. alm.* 102. *t.* 115. *f.* 4. [Mo]*riſ. hiſt.* 3. *p.* 25. *Raj. ſuppl.* 211.
[Chrys]anthemum fruticoſum maritimum, foliis glaucis [obl]ongis, flore luteo. *Sloan. jam.* 125. *hiſt.* 1. *p.* [...]. *Catesb. car.* 1. *p.* 93. *t.* 93.
[Habit]*at in* Jamaica, Virginia. ♄

[BUP]HTHALMUM foliis oppoſitis lanceolatis utrin-[qu]e tomentoſis edentulis integerrimis, caule fruticoſo. — arboreſcens.
[Asteri]ſcus fruteſcens, leucoji foliis viridibus & ſplen-[den]tibus. *Dill. elth.* 43. *t.* 38. *f.* 43.

Chrysanthemum bermudense, folio rigido viri- *ris. hist.* 3. *p.* 25.
Chrysanthemum bermudense, leucoji virenti- liis crassis. *Pluk. alm.* 102. *Raj. suppl.* 210.
Corona solis frutescens, laureolæ folio, flore *Plum. spec.* 10. *t.* 106. *f.* 2.
Habitat in America. ♄

capense. 3. BUPHTHALMUM foliis oppositis lanceol- aribus recurvis denticulato-ciliatis, calycib- foliosis, caule suffruticoso. *Amæn. acad.* 6. a
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

spinosum. 4 BUPHTHALMUM calycibus acute foliosis alternis lanceolatis amplexicaulibus integ- caule herbaceo. *Hort. cliff.* 414. *Roy. lug- Gouan. monsp.* 455.
After luteus, foliis ad florem rigidis. *Bauh.*
After legitimus clusii alter s. spinosus luteus *ic.* 551.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia, *ad margines agrorum.* ☉

aquaticum. 5. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliol- bus axillaribus, foliis alternis oblongis obtu- le herbaceo. *Hort. cliff.* 414. *Hort. ups.* 4 *lugdb.* 170. *Sauv. monsp.* 87. *Gouan. monsp.*
Asteriscus annuus lusitanicus odoratus. *B. Sel p.* 47. *t.* 29. *f.* 7.
Chrysanthemum conyzoides lusitanicum. *Bre* 157. *t.* 77.
Habitat in Creta, Lusitania, Massiliæ. ☉
Caulis dichotomus: Flores sessiles in dichotomia

maritimum. 6. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliosis culatis, foliis alternis spatulatis, caule h- *Hort cliff.* 414. *Hort. ups.* 264. *Roy. lugd.*
After supinus lignosus siculus, conyzæ odo- *mus.* 2. *p.* 161. *t.* 129.
After supinus luteus massilioticus. *Barr. ic.* 1
After 2. supinus. *Clus. hist.* 2. *p.* 13.
After luteus supinus. *Bauh. pin.* 267.
Asteriscus maritimus perennis (& annuus) *Tournef. inst.* 498.
Habitat ad maris Mediterranei *litora.* ♃

* * *Asteroidea. T.*

THALMUM foliis alternis lanceolatis sub- salicifolium
is villosis, calycibus nudis, caule herbaceo.
cliff. 414. *Roy. lugdb.* 170. *Hall. helv.* 711.
312. *Sauv. monsp.* 87. *Gouan. monsp.* 455.
teus major, foliis succisæ. *Bauh. pin.* 266.
austriacus 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 13.
es hirsuta. *Mich. flor.* 12. *t.* 3. 4.
major altera, *Thal. herc.* 21. *t.* 2.
ad radices Alpium Austriæ, Stiriæ, Helvetiæ,
æ, Monspelii. ♃
mium sequenti.

THALMUM foliis alternis lanceolatis subden- grandiflorum
tis glabris, calycibus nudis, caule herbaceo.
cliff. 415. * *Hort. upf.* 264. *Roy. lugdb.* 170.
es alpina, salicis folio. *Tournef. cor.* 50. *Mich.*
2. *t.* 5.
teus angustifolius. *Bauh. pin.* 266.
themum perenne minus, salicis glabro folio,
um. *Moris. hist.* 3. *p.* 21. *s.* 6. *t.* 7. *f.* 52.
in Alpibus Austriæ, Italiæ, Monspelii. ♃
*um Inulæ salicinæ, sed Calyx tantum duplici fo-
ordine, ut in B. salicifolio.*

THALMUM foliis alternis lanceolatis inte- durum.
ris, caule suffruticoso.
us afer, imo calyce non folioso. *Vaill. act.*

themum africanum, asteris facie, imo flore non
, capitulis duris. *Pluk. alm.* 101. *t.* 21. *f.* 3.
ad Cap. b. Spei. ♄

THALMUM calycibus foliosis, foliis op- Helianthoides.
s ovatis serratis triplinerviis, caule herbaceo.
upf 264.
us foliis ovatis acuminatis serratis, pedun-
longissimis. *Gron. virg.* 127.
Solis caroliniana, parvis floribus, folio triner-
olo aspero, pediculo alato. *Mart. cent.* 20. *t.* 20.
themum, scrophulariæ folio, americanum.
alm. 99. *t.* 22. *f.* 1.
themum virginianum, foliis glabris scrophu-
vulgaris æmulis. *Moris. hist.* 3. *p.* 24. *s.* 6.
69. *Raj. suppl.* 211.

Habi-

Habitat in America *septentrionali.* ♃

Folia *summa altero latere baseos interdum brevi* Radius *pistillis instructus & calycis folia* i *reddunt plantam distinctam ab Helianthemis*, *simillima.*

AMELLUS.

lychnitis. 1. AMELLUS foliis oppositis lanceolatis obtusis culis unifloris.

Buphthalmum foliis oppositis lanceolato-li obtusis integerrimis, calycibus subrotundis *cliff.* 415. *

Verbesina asteroides. *Sp. pl.* 1. *p.* 902.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

Caulis *teres.* Folia *opposita, lanceolata, ob tegerrima, sessilia, scabriuscula, incana.* P li *terminales uno alterove foliolo, uniflori.* *imbricatus.* Flos *Asteris radio violaceo,* *teo; ob paleas longitudine seminum nequit* *Asteroidi associari.* Pappus *villosus, simplex radiis.*

umbellatus. 2. AMELLUS? foliis oppositis triplinerviis su mentosis, floribus umbellatis. *Amæn. acad.* 5.

Solidago villosa incana, foliis ovatis oppositis assurgente subnudo tripartito, floribus sub tis. *Brown. jam.* 320. *t.* 33. *f.* 2.

Habitat in Jamaica. ♃

Diversissimus a præcedenti, sed paleæ flosculos di apice setaceæ, nec lubet multiplicare genera.

POLYGAMIA FRUSTRA

HELIANTHUS.

annuus. 1. HELIANTHUS foliis omnibus cordatis trin floribus cernuis.

Helianthus radice annua. *Vir. cliff.* 88. *Hort. c* *Hort. upf.* 268. *Roy. lugdb.* 180.

Helenium indicum maximum. *Bauh. pin.* 276.

Herba maxima. *Dod. pempt.* 264.

Chrysis. *Reneal. spec.* 84. *t.* 83.

Habitat in Peru, Mexico. ⊙

2.

ANTHUS foliis inferioribus cordatis triner- multiflorus.
s: superioribus ovatis.
thus radice tereti inflexa perenni. *Hort. cliff.* 419.
t. upf. 268. *Roy. lugdb.* 180.
ium indicum ramosum. *Bauh. pin.* 277.
a Solis minor femina. *Tabern. ic.* 764.
nthemum americanum majus perenne, floris
foliis & floribus. *Morif. hist.* 3. *p.* 23. *Pluk.*
t. 159. *f.* 2.
t in Virginia. ♃
constat squamis 40 *ad* 50.
& *Pedunculi scabri. Folia cordato-ovata. Caly-*
laxe imbricati; nec squarrosi aut cernui.

IANTHUS foliis ovato-cordatis triplinerviis. tuberosus.
virg. 129.
thus radice tuberosa. *Hort. cliff.* 419. *Hort. upf.*
Roy. lugdb. 180.
ium indicum tuberosum. *Bauh. pin.* 277.
nthemum latifolium brasilianum. *Bauh. prodr.* 70.
Solis farnesianus. *Col. ecphr.* 2. *p.* 11. *t.* 13.
t in Brasilia. ♃

IANTHUS calycibus squarrosis undulatis fron- frondosus.
s, radiis octopetalis, foliis ovatis, caule in-
e glabro. *Amæn. acad.* 4. *p.* 290. *
at in Canada.
s H. decapetalo.

IANTHUS caule inferne lævi, foliis tripliner- decapetalus.
is lanceolato-cordatis, radiis decapetalis, pedun-
lis scabris.
at in Canada *ex semine D. Kalm.*
limus H. multifloro, sed differt quod Caulis, *vix*
manæ altitudinis, scaber, inferne glaber. Folia
gis lanceolato-ovata (nec cordata), opposita, tri-
nervia, basi ciliata. Corolla *radiis non pluribus*
am decem. Calyx *squamis viginti constat, squar-*
sus, hispidus, foliolis non undulatis & rarissime in
lium enatis.

LIANTHUS radice fusiformi. *Hort. cliff.* 420. strumosus.
oy. lugdb. 181.
anthemum canadense latifolium altissimum. *Mo-*
blæf. 250.

Chry-

Chrysanthemum canadense latifolium elatio
sic. 52. *t.* 27. *f.* 4.
Chrysanthemum canadense strumosum vulg
lugdb. 143. * *Moris. hist.* 3. *p.* 23.
Habitat in Canada
Determinetur, a structura herbæ, vera differ cundum vivam plantam.

altissimus. 7. HELIANTHUS foliis alternis latiuscule l scabris, petiolis ciliatis, caule stricto gl
Chrysanthemum virginianum altissimum, pun libus. *Moris. hist.* 3. *p.* 24. *s.* 6. *t.* 7. *f.* 6;
Habitat in Pensylvania.
Soror sequentis, ejusdemque structuræ & altitu huic Folia *latitudine* ¼, *nec* ⅛, *serraturis basi triplinervia, petiolata, latius & fere o ceolata.* Caulis *totus non modo lævis; sed rascens.* Calyces *minus copiosis foliolis &* Radius *flosculis* 16. *sæpius.* Paleæ *in hac v sequenti vero nigricantes, unde illi discus ant tionem niger; huic viridis.*

giganteus. 8. HELIANTHUS foliis alternis lanceolati basi ciliatis, caule stricto scabro.
Helianthus foliis lanceolatis sessilibus. *Gron.*
Chrysanthemum virginianum altissimum angu puniceis caulibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 24. *s.* 6.
β. Chrysanthemum virginianum elatius anguf caule hirsuto viridi. *Pluk. alm.* 99. *t.* 159.
Habitat in Virginia, Canada. ♃
Caulis 10 *pedum, viridis, hispidus f. scaber. lanceolata, minime triplinervia, serrata, utri bra, alterna, desinentia in petiolos ciliatos.* culi *scabri, hispidi.* Flores *radio sæpius* 2 *apice bifido. Ramorum prima duo folia oppo unde caulina quasi stipulis* 2 *instructa.* Flo *magis nutant.*

lævis. 9. HELIANTHUS foliis oppositis trinerviis l tis serratis lævibus, caule pedunculisque
Gron virg. 129. *
Habitat in Virginia.
Caulis *humanæ altitudinis, glaber, subfuscus ro co.* Petioli *læves.* Folia *Caulina opposita, la serrata, basi magis integerrima, subpetiolata,*

; *Ramea alterna*, *sæpius integerrima*, *glaberri-* Pedunculi *læves*. Calycis *foliola subulata*, *lævia*, *ila*, *disco paulo breviora*. Radius *sæpe* 13 *flosculis*.

LIANTHUS foliis alternis linearibus. *Gron.* !. 129. — angustifolius.

Solis marianus, foliis alternis angustissimis sca-
I. *Pet. muf.* 103.
it in Virginia.

LIANTHUS foliis oppositis sessilibus ovato-ongis trinerviis, panicula dichotoma. — divaricatus.

anthemum virginianum repens, foliis asperis bi-im sessilibus acuminatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 22. *s.* 6. '. *f.* 66. *mala*.
at in America *septentrionali*. ♃
vix humanæ altitudinis, *superne lævissimus pilis sis asperis*, *purpureus rore glauco*. Flores *in pa-ila ramis trichotomis*, *flavi*, *parvi*, *pedunculati*: *inter-dio pedunculo simplici*. Pedunculi *subscabri*.

LIANTHUS foliis oppositis spatulatis crenatis, linerviis scabris, squamis calycinis erectis longi-ine disci. *Gron. virg.* 128. *Mill. dict.* 9. — atrorubens.

a Solis minor, disco atrorubente. *Dill. elth.* 111.
14. *f.* 110.
na solis caroliniana, parvis floribus, folio triner-amplo aspero, pediculo alato. *Mart. cent.* 20.
10.
at in Virginia, Carolina. ♂
a & Facies Rudbeckiæ, *sed Seminum pappus bi-flatus*.

RUDBECKIA.

)BECKIA foliis compositis laciniatis. *Vir. cliff.* *Hort. cliff.* 420. *Hort. upf.* 269. *Roy. lugdb.* 181. *on. virg.* 129. — laciniata.

santhemum americanum perenne, foliis divisis utius virentibus, majus. *Morif. hist.* 3. *p.* 22. 5. *t.* 6. *f.* 53. & 54.
nicum americanum, laciniato folio. *Bauh. pin.* 5.
itum helianthemum canadense. *Corn. canad.* 178. 179.
tat in Virginia, Canada. ♃

2. RUD-

triloba. 2. RUDBECKIA foliis spatulatis: caulinis trilobis, rameis indivisis. *Hort. upf.* 269
Rudbeckia foliis trilobis. *Gron. virg.* 130.
Chrysanthemum cannabinum virginianum disco magno, petalis aureis radiato. *Pluk* t. 22. f. 2.
Chrysanthemum annuum majus virginianum ciniatis & hirsutis, umbone nigricante. 3. p. 19. n. 37.
Habitat in Virginia. ♂
Caulis paniculatus, multiflorus.

hirta. 3. RUDBECKIA foliis indivisis spatulato-ov nerviis, radii petalis emarginatis. *Gron.*
Rudbeckia, ramis indivisis unifloris, foliis ceolatis, hirta. *Buttn. cunon.* 227. *
Rudbeckia foliis lanceolato ovatis alternis petalis radii integris. *Gron. virg.* 1. p. 18
Obeliscotheca integrifolia, radio aureo, umb rubente. *Dill. elth.* 295. t. 218. f. 285.
Chrysanthemum helenii folio, umbone floris sculo prominente. *Pluk. alm.* 99. t. 242. *ris. hist.* 3. p. 23. *Raj. suppl.* 210.
Habitat in Virginia, Canada. ♂. ♃
Radius luteus. Caulis *simplex uno alterove flor*

purpurea. 4. RUDBECKIA foliis lanceolato-ovatis alte visis, petalis radii bifidis. *Gron. virg.* 1 *dict.* t. 224. f. 1.
Chrysanthemum americanum, doronici folic persici coloris: umbone magno prominent purpureo viridi & aureo fulgente. *Pluk. al* 21. f. 1. *Catesb. car.* 2. p. 59. t. 59.
Dracunculus virginianus latifolius, petalis longissimis purpurascentibus. *Moris. hist.* f. 6. t. 9. f. 1. *Raj. suppl.* 218.
Bobartia. *Pet. mus. Amm. herb.* 473.
Habitat in Virginia, Carolina.
Radius purpureus.

oppositifolia. 5. RUDBECKIA foliis oppositis lanceolato serratis, petalis radii bifidis. *Gron. virg.* 1
Habitat in Virginia.
Calyx *brevissimus foliolis ovatis.* Radius *flav gissimus.* Discus *convexus, flavus,*

)BECKIA foliis oppositis linearibus integerrimis. angustifolia.
opsis foliis linearibus integerrimis. *Gron. virg.*
1. *Mill. dict. t.* 224. *f.* 2.
tat in Virginia. ♃
Radio luteo, longo, 12-petalo. Calycis *squamæ teriores subulatæ, patulæ; interiores obtusæ, arctæ.* iscus *floris atro-rubens corollulis basi ventricosis.* mina *mu:ica.*

C O R E O P S I S.

REOPSIS foliis decomposito-pinnatis linearibus. verticillata.
opsis foliis verticillatis linearibus multifidis. *Gron.* *g.* 131. *
tocephalus delphinii foliis. *Vaill. act.* 1720. *Ehret.* *t.* 9. *f.* 1.
ysanthemum marianum, scabiosæ tenuissime divi- foliis, ad intervalla confertis. *Pluk. mant.* 48. *t.* 4. *f.* 4.
tat in Virginia. ♂
r *Bidentis calyculo patulo.* Folia *sæpe verticillata.*

REOPSIS foliis pinnatis serratis lineatis glabris. coronata.
tocephalus foliis pentapteris acutis, flore radia- . *Vaill. act.* 601.
ns pentaphylla, flore radiato. *Plum. spec.* 10. *ic.* *f.* 2.
tat in Virginia. ⊙
ta omnino Bidentis frondosæ, sed flores Coreopsis rticillatæ radio magno, octopetalo, striato, ovali.

REOPSIS foliis serratis ovatis: summis ternatis, reptans. ule repente. *Amæn acad* 5. *p.* 407. *
besina foliis inferioribus simplicibus oppositis: su- rioribus pinnato-ternatis. *Brown. jam.* 319.
ysanthemum trifoliatum scandens, flore luteo, se- ine longo rostrato bidente. *Sloan. jam.* 125. *hist. p.* 261. *t.* 154. *f.* 2, 3.
tat in America.
x *Bidentis calyculo patente.* Semina *aristata.* Plan- *magna.*

REOPSIS foliis lanceolatis serratis oppositis Bidens. plexicaulibus. *Fl. svec.* 2. *n.* 772. *
opsis bidentis. *It. wgoth.* 272. *

Hepatorium aquatile, folio non diviso, flore petalis undique radiato. *Triumf. obs.* 65.
Chrysanthemum aquaticum bidens, folio non di flore aureis petalis undique radiato. *Moris. hist.* 17. *s.* 6. *t.* 5. *f.* 25.
Eupatorium cannabinum chrysanthemum. Ba 1209.
Habitat ad fossas Europæ, Pensylvaniæ. ⊙
Si *observationibus evincatur hanc BIDENTIS* c *solam esse varietatem, ad Bidentes reducatur; si stans sit, permaneat.*

Chrysantha. 5. COREOPSIS foliis ternatis ovato oblongis ser florum radio concolore.
Bidens americana triphylla, angelicæ folio, fl diato. *Plum. spec.* 10. *ic.* 53. *f.* 1.
Habitat in America.

leucantha. 6. COREOPSIS foliis pinnatis serratis, florum diversicolore. *Amœn. acad.* 4. *p.* 291. *
Habitat in America. ⊙
Flos radiatus Leucanthemi facie. Planta facie dentis.

auriculata. 7. COREOPSIS foliis integerrimis ovatis: inferi ternatis. *Gron. virg.* 131.
Chrysanthemum hirsutum virginianum, auriculat camaræ folio, octopetalon. *Pluk. alm.* 101. *t.* 5. & *t.* 242. *f.* 4. *Raj. suppl.* 212.
Chrysanthemum virginianum trifoliatum humiliu tusioribus foliis hirsutis. *Moris. hist.* 3. *p.* 20. 3. *f.* 45.
Habitat in Virginia.

alba. 8. COREOPSIS foliis subternatis cuneatis serratis
Coreopsis scandens, foliis serratis ternato-pinnat ceptaculo nudo. *Brown. jam.* 321.
Chrysanthemum americanum, ciceris folio gl bellidis majoris flore. *Herm. par.* 121. *t.* 124. albo. *Pluk. alm.* 101. *t.* 160. *f.* 3.
Habitat in Insula St. crucis. ♃

tripteris. 9. COREOPSIS foliis subternatis integerrimis. *upf.* 269. * *Gron. virg.* 131.
Rudbeckia foliis compositis integris. *Roy. lugd*

Ch

rysanthemum virginianum, folio acutiore lævi tri-
oliato s. anagyridis folio. *Moris. hist.* 3. *p.* 21. *s.* 6.
. 3. *f.* 44. *Raj. suppl.* 215.
bitat in Virginiæ *umbrosis subhumidis.* ♃
lia *pleraque ternata, sæpe etiam in caule fernie pin-
nata.* Calyx *Bidentis calyculo patulo.*

ORFOPSIS foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. lanceolata
reopsis foliis integerrimis. *Roy. lugdb.* 181.
reopsis. *Hort. cliff.* 420.
lens succisæ folio, radio amplo laciniato. *Dill. elth.*
55. *t.* 48. *f.* 56.
lens caroliniana, florum radiis latissimis insigniter den-
tatis, semine alato per maturitatem convoluto. *Mart.*
cent. 26. *t.* 26.
ibitat in Carolina. ♂

OREOPSIS foliis lanceolatis serratis alternis pe- alternifo.
tiolatis decurrentibus. *Hort. ups.* 270.
oreopsis foliis serratis. *Roy. lugdb.* 181.
hrysanthemum canadense bidens, alato caule. *Moris.*
bles. 253. *Raj. hist.* 337.
hrysanthemum virginianum, alato caule, bidens al-
tissimum, folio aspero, flore minore serotino. *Mo-*
ris. hist. 3. *p.* 25. *s.* 6. *t.* 7. *f.* 75. & 76.
hrysanthemum virginianum, caule alato, ramosius,
flore minore. *Pluk. alm.* 100. *t.* 159. *f.* 3.
Habitat in Virginia, Canada. ♃
*olia inferiora terna s. quaterna; superiora alterna, de-
currentia.*

GORTERIA.

GORTERIA foliis lanceolatis integris sinuatisque, personata
caule erecto, floribus pedunculatis.
Carduus æthiopicus perpusillus, pilosellæ foliis incanis
hispidis, personatæ capitulis. *Pluk. phyt.* 273. *f.* 6.
Habitat ad Cap. b. Spei. ⊙
*Radicant semina per calycem deciduum, unde calyx ad
basin radicis.* Caules *spithamæi, minus ramosi, tere-
tiusculi, pilosi.* Folia *alterna, angusto-lanceolata, ses-
silia, hispida, subtus albo-tomentosa: majora duabus
sæpius incisuris profundis utrinque incisa.* Calyces
*terminales, ovati, monophylli, imbricati squamis hi-
spidis, mucronatis: mucronibus interioribus sensim lon-*

 gioribus,

gioribus, *rectis*, *setaceis*, *rigidis*, *vix pungenti*
Radius *luteus*, *basi & subtus cæruleus.*

lgens. 2. GORTERIA scapis unifloris, foliis lanceolatis natifidis, caule depresso. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 8
Arctotis ramis decumbentibus, foliis lineari-lan latis rigidis, subtus argenteis. *Mill. dict. t.* 4
Arctotis foliis lanceolatis subtus tomentosis int laciniatisque. *Leys. orig.* 6.
Arctotheca foliis rigidis leniter dissectis. *Vaill* 1728. *n.* 9.
Anemonospermos foliis rigidis tenuiter divisis su incanis, flore aureo umbone nigricante. *Raj.* 182.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

quarrosa. 3. GORTERIA foliis lanceolatis decurrentibus n vis ciliato-spinulosis, floribus sessilibus. *A acad.* 6. *afr.* 77.
Xeranthemum caulibus frutescentibus provolutis liis ciliatis hirsutis. *Sp. pl.* 1. *p.* 859.
Aster africanus frutescens, splendentibus parv reflexis foliis. *Comm. hort.* 2. *p.* 55. *t.* 28.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Folia *sessilia*, *parum decurrentia*, *apice spinosa*, *que spinulis* 3. *s.* 4. *ciliata.* Calyx *terminalis*, *se squarrosus foliolis recurvatis*, *caulinis similibus.* dius *albus*, *subtus purpurascens.* Variat *foliis su tis*, *floribus parvis luteis.*

liaris. 4. GORTERIA foliis imbricatis bifariam ciliatis: exterioribus spinaque terminali reflexis.
Carlina foliis imbricatis oblongis reticulatis & in leum aduncum desinentibus. *Burm. afr.* 151. *t f.* 1.
Carduus africanus luteus, atractylidis facie, ext foliorum aculeo adunco. *Raj. suppl.* 196.
Aculeosa æthiopica, atractylidis facie. *Pluk. an* 51. *t.* 354. *f.* 3. *Seb. mus.* 1. *t.* 23. *f.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *obtegunt caules stupendo naturæ artificio.*

uticosa. 5. GORTERIA foliis lanceolatis integris dentato-sp sis subtus tomentosis, caule fruticoso.
Atractylis foliis oblongo-ovatis denticulatis spir

cal

alycibus patentibus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 95. *Roy. lugdb.* 137.
thamus africanus frutescens, folio ilicis, flore au-
eo. *B. Walth. hort.* 13. *t.* 7.
llina? africana, foliis integris tomentosis & in am-
itu spinulis aureis exasperata. *Pluk. alm.* 86. *t.* 73. *f.* 5.
itat in Æthiopia. ♄
cis squamæ apice setaceæ & longis rarioribus setis liatæ.

OSMITES.

MITES foliis linearibus tomentosis, calycibus ariosis. Bellidiastrum,
hemis suffruticosa, foliis linearibus triquetris to-
entosis indivisis, floribus sessilibus. *Amœn. acad.* p. 330. *
is frutescens africana camphorata. *Raj suppl.* 221.
idiastrum subhirsutum linifolium. *Vaill. act.* 588.
itat in Æthiopia. ♄

MITES foliis lanceolatis subserratis. *Amæn. acad. afr.* 78. * camphorin
tat ad Cap. b. Spei. ♄

MITES foliis lanceolatis punctatis, calycibus fo-
fis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 79. * Asteriscoides.
anthemum fruticosum, foliis crassis. *Burm. afr.* 1. *t.* 58. *f.* 1.
s frutescens africana camphorata. *Raj. suppl.* 221.
s aquatica camphorata umbellata frutescens,
h. mus. 1. *t.* 16. *f.* 4.
tat ad Cap. b. Spei, *locis humentibus.* ♄

CENTAUREA.

* Jaceæ *calycibus lævibus inermibus.*

TAUREA calycibus inermibus: squamis linea-
subulatis, foliis pinnatis serratis. *Hort. cliff.* 420. Crupina.
rt. upſ. 271. *Roy. lugdb.* 137. *Gouan. monſp.* 457.
m. orient. 274.
rilla foliis laciniatis serratis, purpurascente flo-
Bauh. pin. 130.
lo-Carduus apulus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 32. *t.* 34.

Habitat in Hetruriæ, G. Narbonensis, Orientalibus. ⊙

Foliola *scabra: infima recurvata.* Corollæ dis(... radii 5, *quadrifidæ.*

oschata. 2. CENTAUREA calycibus inermibus subrotundis ...bris: squamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. ... *cliff.* 421. *Hort. upf.* 271. *Roy. lugdb.* 138.

Cyanus orientalis major moschatus, flore purpur albo. *Moris. hist.* 3. *p.* 135. *f.* 7. *t.* 25. *f.* 5.

nberboi. *β.* Cyanus orientalis major, foliis magis dissectis, luteo. *Moris. hist.* 3. *p.* 135. *f.* 7. *t.* 25. *f.* 9.

Cyanus orientalis, flore luteo fistuloso. *Dodart.* 267.

Habitat in Persia. ⊙

Varietas β Corollulis radii magnis differt.

ucifolia. 3. CENTAUREA calycibus inermibus; squamis ceolatis, foliis lanceolatis subdentatis lanugi *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 138.

Jacea foliis erucæ lanuginosis. *Tournef. inst.* 44

Amberboi, erucæ folio, majus. *Vaill. act.* 1718. *p.*

Stœbe major, foliis erucæ mollibus lanuginosis. *pin.* 273.

Habitat - - - - ♃

ippii. 4. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis cronatis, foliis decurrentibus pinnatifidis obtu

Amberboi, erucæ folio, minus. *Isn. act.* 1719. *p.* *t.* 10.

Habitat in Ægypto *inter Alexandriam & Rosette.*

uticosa. 5. CENTAUREA calycibus inermibus oblongis liis lanceolatis obtusiusculis glabris, caule f scente.

Cyanus repens angustifolius. *Bauh. pin.* 274.

Cyanus repens. *Lob. ic.* 548.

Jacea frutescens, plantaginis folio, flore albo. *To* *cor.* 32.

Rhaponticoides frutescens, oleæ folio. *Vaill. act.*

Habitat in Creta, Oriente. *Gerard.* ♄

pina. 6. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis tis obtusis, foliis pinnatis glabris integerrimis pari serrato. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 138

C

[Ce]ntaurium alpinum luteum. *Bauh. pin.* 117. *prodr.* 56. *Moris. hist.* 3. *p.* 132. *s.* 7. *t.* 25. *f.* 5.
[Ce]ntaurium majus luteum. *Corn. canad.* 69. *t.* 70.
[H]*abitat in* Baldo.

CENTAUREA calycibus inermibus: squamis ovatis, foliis pinnatis: foliolis decurrentibus serratis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 137. — Centauri[um]
[C]entaurium majus, folio in lacinias plures diviso. *Bauh. pin.* 117.
[C]entaurium majus 1 vulgare. *Clus. hist.* 2. *p.* 10.
[H]*abitat in Alpibus* Gargano, Baldo, Tataria. ♃

* * Cyani *calycinis squamis serrato-ciliatis.*

CENTAUREA calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis. *Fl. svec.* 2. *n.* 775. *Gouan. monsp.* 458. — phrygia.
Centaurea calycibus ciliatis: ciliis setaceis recurvatis. *Hort. cliff.* 422. *Hort. ups.* 270. *Roy. lugdb.* 139. *Dalib. paris.* 266.
Jacea latifolia & angustifolia, capite hirsuto. *Bauh. pin.* 271.
[Ja]cea 4 austriaca, capite villoso. *Clus. hist.* 2. *p.* 7.
Jacea alba, hirsuto capite. *Bauh. pin.* 271.
Habitat in Helvetia, Austria, Finlandia. ♃
Calycis plumæ a pluvia eriguntur.

CENTAUREA calycibus erecto-plumosis, foliis lyratis denticulatis: rameis lanceolatis integerrimis. — pectinata.
Jacea montana incana aspera, capitulis hispidis. *Bauh. pin.* 272. *prodr.* 128.
Jacea montana incana mollis, capitulis hispidis. *Bauh. pin.* 272.
Jacea montana incana laciniata, capitulo hispido. *Bauh. prodr.* 128.
Jacea cum squamis pennatis s. capite villoso, elatior & humilior. *Bauh. hist.* 3. *p.* 29.
Habitat in Gallia Narbonensi, Galloprovincia.
Calyces *C. phrygiæ, terminales, sessiles. Rami magis divaricati.* Folia *oblonga, amplexicaulia, lyrata, dentibus versus basin majoribus. Folia* floralia *lanceolata, integerrima, pubescentia.*

CENTAUREA calycibus seta recurvato-plumosis, foliis imis pinnatis dentatis; summis lanceolatis. — capillata.

 Cya-

Cyanus foliis calycinis plumosis reflexis, foliola... natis. *Act. goett.* 1. *p.* 208. *t.* 6.
Habitat in Sibiria. *Gmelinus.* Hispania.
Conf. Jacea hispanica pumila, linariæ folio. *To...* 445. *Barr. ic.* 162.
Conf. Cyanus alpinus, lychnidis candidissimo fo... capite reticulato. *Bocc. mus.* 2. *t.* 2. *Caule simp... unifloro; Foliis lanceolatis, tomentosis, incanis, ... ovatis amplexicaulibus.*

...igra. 11. CENTAUREA calycibus ciliatis: squamula ov... ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angula... floribus flosculosis. *Gouan. monsp.* 458.
Centaurea squamis calycinis ciliatis inermibus, fo... pinnatis: foliolis lineari-lanceolatis scabris. *S... monsp.* 239.
Jacea nigra laciniata. *Bauh. pin.* 271.
Jacea austriaca VI. *Clus. hist.* 2. *p.* 7.
Jacea nigra. *Raj. hist.* 325. *angl.* 3. *p.* 199.
β. Centaurea calycibus serratis ciliatisque, foliis l... ceolatis dentatis, floribus sessilibus. *Hort. cliff.* 42... *Roy. lugdb.* 139.
Habitat in Anglia, Helvetia, Austria, Monspelii.
Differt a *C. phrygia, quod squamula ciliaris sit ova... erecto-patens, nec recurva & subulata.*

...ullata. 12. CENTAUREA calycibus ciliatis verticillato foli... sis, foliis lyratis dentatis obtusis. *Mill. ic.* 152. 2. *Gouan. monsp.* 458.
Centaurea inermis, calycum ciliis pinnatis, foliis o... longis villosis humifusis, floralibus verticillatis l... gulatis. *Sauv. monsp.* 288.
Jacea humilis alba, hieracii folio. *Bauh. pin.* 271 *Moris. hist.* 3. *p.* 140. *s.* 7. *t.* 28. *f.* 18.
Jacea monspessulana, cui in squamis fibræ nigræ, in... terdum acaulis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 29.
Jacea pumila serpens acaulis ferme, flore albo. *Lob. ic* 542.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Oriente. ⊙
Calyx *foliis cingitur sessilibus; intra haec folia Squamæ calycinæ lineari-lanceolatæ margine atro, apice seti... flavis ciliatæ.* Folia *in caule sæpe lyrata sunt.* Planta *humilis.* Corolla *purpurascens radio magno.*

13. CEN-

TAUREA calycibus serratis, foliis lanceolatis rentibus, caule simplicissimo. *Hort. cliff.* 422. *ups.* 270. *Roy. lugdb.* 138. *Gouan. monsp.* 6. **montana.**
montanus latifolius s. Verbasculum cyanoi- *Bauh. pin.* 273.
montanus, caule folioso, capitulo oblongo. *mus.* 2. *p.* 20. *t.* 2.
major. *Lob. ic.* 548.
itegrifolia humilis. *Bauh. pin.* 271. *prodr.* 127. *XV.* 29.
in Alpibus Helveticis, Austriacis. ♃
ß. foliis minoribus, parum basi decurrentibus, nec oximum folium, a vulgari differt.

TAUREA calycibus serratis: foliis linearibus errimis: infimis dentatis. *Hort. cliff.* 422. *Fl.* 710; 776. *Mat. med.* 408. *Roy. lugdb.* 130. *paris.* 265. **Cyanus.**
segetum. *Bauh. pin.* 273.
vulgaris. *Lob. ic.* 546.
hortensis, flore simplici. *Bauh. pin.* 273.
hortensis, flore pleno. *Bauh. pin.* 273.
inter Europæ *segetes biennes.* ⊙

TAUREA calycibus ciliatis: squamis planis, bipinnatifidis, rameis pinnatifidis linearibus, paniculato. *Leys. hall.* 786. *Gouan. monsp.* 459. **paniculata.**
ea calycibus ciliatis, foliis filiformibus bipin- caule folioso ramoso. *Sauv. monsp.* 264.
ea calycibus ciliatis oblongis, foliis scabris, m pinnatis, ramorum simplicissimis linearibus. *fib.* 2. *p.* 98. *t.* 43.
n spinosa, foliis magis divisis, elatior, capi- minoribus non splendentibus. *Moris. hist.* 3. *f.* 7. *t.* 28. *f.* 15.
najor, cauliculis non splendentibus. *Bauh. pin.*

i majoris species tenuifolia. *Bauh. hist.* 3. *p.* 31.
in G. Narbonensi, Austria, Hispania, Vero- Ibiria, Germania. ⊙
purpurei pistillis albis. Folia *ramea pinnatifida.* *em hujus etiam habemus Floribus majoribus, ma- ine C. Jaceæ, Foliis canescentibus, facieque non- Eversam.*

spinosa. 16. CENTAUREA calyce subciliato, ramis
Hort. cliff. 422.*
Jacea cretica aculeata incana. *Tournef. inst.*
Stœbe spinosa cretica. *Moris. hist.* 3. *p.* 136.
Cyanus spinosus. *Alp. exot.* 163. *t.* 162.
Habitat in Creta.

ragusina. 17. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis to
pinnatifidis: foliolis obtusis ovatis integerri
terioribus majoribus. *Hort. cliff.* 422. *Ro*
139.
Jacea cretica lutea, foliis cinaræ. *Moris. hist.* 3
s. 7. *t.* 27. *f.* 22.
Jacea arborea argentea ragusina. *Zan. hist.* 10
Mill. dict. t. 152. *f.* 1.
Stœbe montana nivea, capite cardui, subrotu
liorum lobis. *Barr. ic.* 309.
Habitat in Creta, Epidauro. ♃
Folia *alba quasi papposa, pinnata lobis rotundati*
Flos *solitarius, pedunculatus, luteus. Radio pa*
lis longis. Calyx *magnus; squamis acutis,*
flavescentibus.

Cineraria. 18. CENTAUREA calycibus ciliatis termina
bus, foliis tomentosis bipinnatifidis: lobis
Hort. cliff. 422. *Roy. lugdb.* 139.
Jacea montana candidissima, stœbes foliis. *B*
272. *prodr.* 126. *Moris. hist.* 3. *p.* 141. *s.*
f. 20.
β. Jacea cineraria laciniata, flore purpureo. *Tri*
72. *Moris. hist.* 3. *p.* 141. *Barr. ic.* 348; 3
Habitat in Italia. ♃
Folia *alba quasi papposa: caulina bipinnata lob*
acutis: extimo palmato; Ramea *pinnatifida.*
cilia fusca. Flos *purpureus;* Styli *albi; ra*
rolla vix longior.

argentea. 19. CENTAUREA calycibus serratis, foliis t
sis: radicalibus pinnatis: foliolis uniauritis.
Centaurea calycibus ciliatis villosis, foliis cun
bus superne serratis inferne dentatis. *Hort. c*
Jacea cretica laciniata argentea, flore parvo fla
te. *Tournef. cor.* 31. *Barr. ic.* 218.
Habitat in Creta.
Caulis *ad radicem valde tomentosus.* Folia R

*ta, dense tomentosa: foliolis subæqualibus, ovali-
basi inferiore tantum lobulo auctis.* Caulina *fo-
mplicia, cuneiformia, ad basin altero margine in-
cti denticulo obtuso.*

TAUREA calycibus ciliatis, foliis tomento- sibirica.
ndivisis pinnatifidisque integerrimis, caule decli-

rea calycibus ciliatis subrotundis, foliis pinnatis
ntegris: foliolis simplicissimis: extremo maximo.
el. sib. 2. *p.* 96. *t.* 42. *f.* 2.
at in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃
*tomentosa, lanceolata: radicalia pleraque pinna-
a: Lobis sursum versis, lanceolatis, integerrimis,
rrentibus, extimo majore.* Folia *caulina sæpius
7, superioribus indivisis.* Caulis *simplicissimus,
o unico ramulo, pubescens, subsulcatus.* Flos *sæ-
unicus.* Calyce *ventricoso: foliolis auctis Squamu-
vata, magnitudine folioli calycini, argute ciliatis,
idis.* Corolla *purpurea; radio sterili magno.*

TAUREA calycibus ciliatis, foliis lanceolatis sempervirens.
atis: inferioribus hastatis. *Hort. cliff.* 422.* *Roy.
lb.* 139.
lusitanica sempervirens. *Moris. hist.* 3. *p.* 139. *s.
t.* 28. *f.* 9.
at in Lusitania. ♃
teres, pubescens, inferne griseus. Folia *lanceo-
, serrata, pubescentia, mollia: inferiora hastata.*
ulæ *lanceolatæ, versus caulem sæpius falcatæ.*
dunculi *superne incrassati.* Calycis *cilia grisea.*

NTAUREA calycibus ciliatis, foliis pinnatifi Scabiosa.
: pinnis lanceolatis. *Hort. cliff.* 422. *Fl. svec.* 708;
73. *Roy. lugdb.* 139. *Dalib. paris.* 266. *Gmel. sib.* 2.
93.
iosa major, squamatis capitulis. *Bauh. pin.* 269.
iosa major altera, squamatis capitulis. *Bauh. pin.*
9. *ex Hall.*
osa major. *Dalech. hist.* 1066.
t in Europæ *septentrionalis pratis.* ♃

TAUREA calycibus squama ciliatis, foliis pin- orientalis.
fidis: pinnis lanceolatis.

Cen-

Centaurea calycibus ciliatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis integerrimis. *Hort. ups.*
Cyanus foliis radicalibus: partim integris, pinnatis, bractea calycis ovali, flore sulphureo. *act. angl.* 1745. *vol.* 43. *n.* 472. *p.* 94.
Habitat in Sibiria ♃
Differt a C. Scabiosa, *cui simillima, non tantum la sulphurea, sed præcipue Calyce, cujus folia nata squama ovata, ferruginea, ciliata, ciliis dine ipsius squamæ, pectinatis; cum in C foliorum calycis margo niger ciliato-lacerus, in squamam eductus.*

Stœbe. 24. CENTAUREA calycibus ciliatis oblongis pinnatifidis linearibus integerrimis. *Roy. lu*
Stœbe incana, cyano similis, tenuifolia. *Bauh.*
Stœbe austriaca humilis. *Clus. hist.* 2. *p.* 10.
Habitat in Austria.

acaulis. 25. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis caule subnullo.
Jacea acaulos lutea, erucæ folio, squaman candidis. *Shaw. spec.* 342. *t.* 342.
Habitat in Arabia.

*** Rhapontica *calycinis squamis membranaceis, ar tegerrimis, muticis.*

Behen. 26. CENTAUREA calycibus scariosis, foliis bus lyratis: lobis oppositis, caulinis ampl libus. *Mat. med.* 409. *Gron. orient.* 273.
Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diffect teris carthami. *Vaill. act.* 1718. *p.* 229.
Serratulæ affinis, capitulo squamoso luteo u re. *Bauh. pin.* 235.
Behen album. *Rauw. itin.* 288. *t.* 288. *Bauh. p.* 36. *t.* 37. *Bauh. pin.* 234.
Habitat in Asia *minore*, Libano. ♃

amara. 27. CENTAUREA calycibus scariosis, caulibus bentibus, foliis lanceolatis integerrimis.
Cyanus repens latifolius. *Bauh. pin.* 274.
Cyanus repens. *Lob. ic.* 548.
β. Jacea saxatilis, longo incano angusto helichry ci folio. *Bocc. mus.* 31. *t.* 17.
Habitat in Italia, Monspelii. ♃

28. C

TAUREA calycibus fcariofis, foliis lanceola- bpetiolatis dentatis, pedunculis filiformibus ális. repens.

rientalis, cyani folio, flore parvo, calyce ar-eo. *Tournef. cor.* 92.

in Oriente. ♃

angulatus, ramofus, lævis. Folia *lanceolata, læ- dentata, bafi attenuata, margine fcabra.* Pedun- *filiformes, longitudine foliorum, nudi.* Calycis *æ acutæ, integerrimæ.*

TAUREA calycibus fcariofis laceris, foliis olatis: radicalibus finuato-dentatis, ramis an-tis. *Hort. cliff.* 421. *Fl. fvec.* 709; 774. *Roy.* . 142. *Dalib. parif.* 265. Jacea.

nigra pratenfis latifolia. *Bauh. pin.* 271.

nigra. *Paul. dan. t.* 256.

nigra anguftifolia, lithofpermi arvenfis foliis, le afpero & lævi. *Bauh. pin.* 271. *prodr.* 127.

in Europa *feptentrionali.* ♃

nuda funt.

tem *β. autumnalem hujus fpeciei facit Magn.* *p.*

NTAUREA calycibus fcariofis integris mucro-s, foliis pinnato-dentatis: caulinis linearibus dentatis. alba.

calyculis argenteis, minor. *Tournef. inft.* 444.

lba. *Tabern. ic.* 153.

, calyculis argenteis, minor. *Bauh. pin.* 273.

in Hifpania.

nimium Jaceæ. Caulis *paniculatus.* Folia *line-, pinnato-dentata, acuminata: fuperiora tantum ata; fuprema linearia, fimpliciffima.* Calyces *ter-ales, ovati, parvi: Squamis membranaceis, laxis, cronatis, niveis.*

NTAUREA calycibus fcariofis obtufis, foliis calibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis denti-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 142. *Sauv. meth.* 289. fplendens.

calyculis argenteis, major. *Tournef. inft.* 444.

caliculis argenteis. *Bauh. pin.* 273.

falmantica 3. *Cluf. hift.* 2. *p.* 10.

t in Helvetia, Hifpania, Sibiria. ♂

32. CEN-

Rhapontica. 32. CENTAUREA calycibus scariosis, foliis oblongis denticulatis integris petiolatis: su mentosis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 14
Rhaponticum folio helenii incano. *Bauh. pi*
Rhaponticum angustifolium incanum. *Bauh. Hall.*
Rha s. Rhei ut existimatur. *Dod. pempt.* 389
Habitat in Alpibus Helveticis, Veronæ.

glastifolia. 33. CENTAUREA calycibus scariosis, foliis d tibus indivisis integerrimis. *Hort. cliff.* 42 *lugdb.* 142. *Gmel. sib.* 2. *p.* 83.
Centaurium majus orientale erectum, glasti fl re luteo. *Comm. rar.* 39. *t.* 39.
Habitat in Oriente, Sibiria. ♃
Flos luteus: Radio disco minore.

conifera. 34. CENTAUREA calycibus scariosis, foliis sis: radicalibus lanceolatis, caulinis pinnati le simplici. *Roy. lugdb.* 142. *Hort. upf.* 2 *monsp.* 289. *Gouan. monsp.* 459. *
Jacea montana incana, capite pini. *Bauh Mill. dict. t* 153.
Chamæleon non aculeatus. *Lob. ic.* 7.
Habitat Monspelii *in saxosis glareosis.* ♃
Pappus seminum plumosus. Dill.

* * * * Stœbæ *calycinis spinis palmatis*

sonchifolia. 35. CENTAUREA calycibus palmato-spino decurrentibus spinulosis repando-dentatis. 423. *n.* 22. *Roy. lugdb.* 140.
Jacea laciniata, sonchi folio, s. Jacea latifolia capite spinoso. *Bauh. pin.* 272. *prodr.* 12 *lugdb.* 331. *t.* 675. *Pluk. phyt.* 39. *f.* 1.
Habitat in maritimis maris Mediterranei. ☉.
Folia *incana: Radicalia sublyrata, margine ta; Caulina lanceolata, dentata: dentibus o cronatis non pungentibus.* Caulis *simplex, foliis decurrentibus, repando-spinulosis.* R *longior.* Flores *terminales, solitarii.* C *tus, viridis spinis flavescentibus: media long recurva. Floris Radius 5fidus, major,* *Discus albidus, apice purpurascens.*

feridis. 36. CENTAUREA calycibus palmato-spino

urrentibus tomentosis oblongis: infimis sinuato-
tatis. *Sauv. meth.* 288. *Gouan. monsp.* 460.
foliis seridis candicantibus, purpurea. *Bauh. pin.*

purpurea hispanica muricata. *Bauh. hist.* 3. *p.* 33.
r.
latifolia, caule alato, capite magno turbinato.
phyt. 38. *f.* 1.
atifolia, spinosis capitulis pulchris, flore purpu-
Bauh. hist. 3. *p.* 33. *Raj. hist.* 320.
t in Hispania. ♃
tomentosa, vix pedalis: Caulibus subramosis.
la lato-lanceolata, serrata, decurrentia, serraturis
inosis. Calyces *terminales, ovati, Squamis apice*
atis Spinis setaceis 9 *pluribusque.* Corollæ *pur-*
o radio; disco *albido paucifloro.*

TAUREA calycibus palmato spinosis, foliis urrentibus inermibus: radicalibus pinnatifidis: ari maximo. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 141. — romana.
spinosa cretica. *Zan. hist.* 141. *t.* 42.
s erucæ folio, flore rubro *Barr. rar.* 87. *t.* 504.
t in Campania Romana. ⊙

TAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis o-lanceolatis petiolatis dentatis. *Hort. cliff.* 423. *lugdb.* 140. — sphærocephala.
sphærocephala spinosa tingitana. *Herm. lugdb.*
t. 333. *Moris. hist.* 3. *p.* 143. *f.* 7. *t.* 27. *f.* 9.
t in Mauritania, Hispania.

TAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis to-dentatis hispidis subamplexicaulibus, floribus ibus terminalibus. — isnardi.
apoides procumbens, cichorii folio, flore pur-
scente. *Isn. paris.* 1719. *p.* 154. *t.* 9.
t in Europa *australi?* ♃
is forte sola C. pullatæ vel ejus hybrida proles?

TAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis urrentibus sinuatis spinulosis: radicalibus lyratis. *lugdb.* 141. *Hort. upf.* 272.* — napifolia.
yanoides altera, alato caule. *Herm. par.* 189. *t.*
bon.
peregrina napifolia, echinatis capitulis, caule
alato.

lato. *Pluk. alm.* 192. *t.* 94. *f.* 2. *Morif.* h 154. *f.* 7. *t.* 26. *f.* 20.
Habitat in Creta. ⊙
Folia *radicalia lyrata.* Calycis *spinæ palmat.* Corolla *radiata purpurea : Neutræ 5fidæ duabus interioribus minoribus.*

asfpera. 41. CENTAUREA calycibus fquamis palma quefpinofis, foliis lanceolatis dentatis. *Sa* 289. *Gouan. monfp.* 460.
Centaurea calycibus fpinofis, foliis lanceola tis. *Roy. lugdb.* 142.
Stœbe fquamis afperis. *Bauh. pin.* 273. *Raj.*
Jacea, cum fpinofis capitulis, purpurea t *Bauh. hift.* 3. *p.* 33.
Jacea fupina maritima laciniata, capite fpin re rubello. *Bocc. muf.* 2. *p.* 35. *t.* 26.
Habitat Monfpelii, *inque* Hetruria, Lufitani

* * * * * Calcitrapæ *calycinis fpinis comp*

benedicta. 42. CENTAUREA calycibus duplicato-fpin tis involucratis, foliis femidecurrentibus lato-fpinofis.
Cnicus caule diffufo, foliis dentato-finuatis. 395. *Hort. upf.* 250. *Mat. med.* 379. *Sp. pl.*
Carduus fylveftris hirfutus f. Carduus be *Bauh. pin.* 378.
Carduus benedictus. *Cam. epit.* 562.
Habitat in Chio, Lemno, Hifpania *ad verfu*
Radii flofculi parvi, trifidi.

eriophora. 43. CENTAUREA calycibus duplicato-fpin tis, foliis femidecurrentibus integris finuati le prolifero. *Hort. upf.* 272. * *Roy. lugdb.*
Centaurea calycibus duplicato-fpinofis, fol rentibus integris. *Hort. cliff.* 423.
Calcitrapa lutea, alato caule, capite eriopho *act.* 1718. *p.* 212.
Carduus lufitanicus canefcens, alato caule lanuginofo. *Tournef. inft.* 441.
Habitat in Lufitania. ⊙
Caulis *prolifer.* Flofculi *neutri quadrifidi h ditis breviores.*

[C]ENTAUREA calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis lateribus dentatis, caule piloso. *Hort. upf.* 273. * *Gouan. monsp.* 460. — Calcitrapa.

[Ce]ntaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 140. *Gort. gelr.* 496. *Dalib. paris.* 266. *Sauv. monsp.* 288. *Gron. orient.* 275.

[Ca]rduus stellatus s. Calcitrapa. *Bauh. hist.* 3. *p.* 89.

[Ca]rduus stellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh. pin.* 387. *Raj. hist.* 317.

[Ca]rduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. *Clus. hist.* 2. *p.* 7.

[Hi]ppophæstum. *Col. phytob.* 85. *t.* 24.

[Ha]bitat *in* Helvetia, Anglia & Europa *australiori secus vias.* ☉

[F]los *huic purpureus, nec ut in Solstitiali, melitensi aut* [Si]*cula luteus. Caulis prolifer.*

[C]ENTAUREA calycibus subduplicato-spinosis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indivisis serratis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 291. * *Gouan. monsp.* 461. — calcitrapoides.

[Ca]rduus stellatus, foliis integris serratis. *Magn. monsp.* 292.

[H]abitat Monspelii & *in* Palæstina.

[S]i*milia C. Calcitrapæ, sed foliis indivisis.*

[C]ENTAUREA calycibus duplicato-spinosis solitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis radicalibus, lyrato-pinnatifidis. *Hort. cliff.* 423. *n.* 21. *Hort. upf.* 272. * *Roy. lugdb.* 140. *Dalib. paris.* 267. *Sauv. monsp.* 288. *Gron. orient.* 276. *Gouan. monsp.* 460. — solstitialis.

[Ca]rduus stellatus luteus, foliis cyani. *Bauh. pin.* 387. *Raj. hist.* 317.

[Ca]rduus stallatus mitior apulus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 30. *t.* 31.

[H]abitat *in* Gallia, Anglia, Italia. ☉

[F]olia *radicalia lyrata, acuminata.* Flores *terminales, solitarii.* Pedunculi *longissimi, foliosi; ad calycem nullum foliolum.* Spinæ calycis *longiores sub calyce, basi tantum dentatæ.*

[C]ENTAUREA calycibus duplicato spinosis terminalibus confertis; foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus. *Roy. lugdb.* 140. *Sauv. monsp.* 288. *Gouan. monsp.* 460. — melitensis.

Jacea melitensis, capitulis conglobatis. *Bocc. sic* *t.* 35. *Moris. hist.* 3. *p.* 145. *Raj. hist.* 323.
Habitat in Melita, Monspelii. ⊙
Folia *radicalia lyrata, obtusa.* Flores *terminales ferti,* 2. *s.* 3. Pedunculi *brevissimi.* Spinæ *lyce non longiores, supra basin etiam dentatæ; lycem foliolum unum alterumve, calycis ipsius tudine.*

sicula. 48. CENTAUREA calycibus ciliato spinosis, fol currentibus lyratis inermibus incanis, capitul minalibus. *Sauv. monsp.* 290.
Jacea sicula, cichorii folio, flore luteo, capite sp *Magn. monsp.* 138. *Moris. hist.* 3 *p.* 144 *s.* 7. *t.* 28
Habitat in Sicilia. ♃
Folia *Radicalia lyrata, obtusa, denticulata, s Caulina lanceolata, decurrentia.* Calyces *mag vati, Squamis spina majore fusca.*

Centauroides. 49. CENTAUREA calycibus ciliatis spinosis, fol rato-pinnatis integerrimis: lacinia impari m *Roy. lugdb.* 141. *n.* 27. *Gouan. monsp.* 461.
Jacea lutea spinosa centauroides. *Bauh. pin.* 272
Jacea lævis maxima centauroides apula. *Col. ecp* *p.* 33. *t.* 35.
Habitat in Italia, Hispania, Monspelii.

rupestris. 50. CENTAUREA calycibus ciliatis spinosis, bipinnatis linearibus.
Jacea laciniata lutea. *Bauh. pin.* 272.
Jacea montana minima tenuifolia. *Col. ecphr.* 1. t. 35. *f.* 2.
Habitat in Italia. ♃
Affinis C. collinæ, calycinis squamis fusco-ciliati minatis spina debili, simplici, squama ipsa bre Squamis vero intimis scariosis. Caulis *parum sus, vix angulatus.* Folia *fere omnia bipinnat nearia, excepto margine lævia; minime vero l lata pinnis cornu cervi modo ramosis.*

collina. 51. CENTAUREA calycibus ciliatis inermi-spi foliis bipinnatifidis, caule angulato. *Gouan. monsp*
Jacea lutea, capite spinoso. *Bauh. pin.* 272.
Jacea luteo flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 8.
Habitat in Italia, Hispania, Monspelii. ♃

* * * * * Ci

* * * * * Crocodiloidea *spinis simplicibus.*

[C]ENTAUREA calycibus simplicissime spinosis: [d]entibus duobus oppositis, foliis decurrentibus lan[c]eolatis integris. *Amæn. acad.* 4. *p.* 292. * verutum.
[Ha]bitat in Oriente.

[J]ACEA calycibus setaceo-spinosis, foliis decurren[ti]bus indivisis serrato-spinosis. † cichoracea.
[Jac]ea foliis cichoreis, caule alato, flore purpureo. [R]aj. *suppl.* 203. *Till. pis.* 84. *t.* 27.
[Ha]bitat in *monte argentario* Italiæ.

[C]ENTAUREA calycibus setula reflexa spinosis [g]labris, foliis lyrato-runcinatis, serratis. *Hort. [c]liff.* 421. *Roy. lugdb.* 138. *Sauv. monsp.* 287. *Gouan. [m]onsp.* 461. salmantica.
[Jac]ea major, foliis cichoraceis mollibus, flore sta[m]ineo. *Moris. hist.* 3. *p.* 140. *s.* 7. *t.* 26. *f.* 14.
[Jac]ea major, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis. *Bauh. pin.* 273.
[Ja]cebe salmantica 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 9. *Raj. hist.* 324.
[Ha]bitat *in* Europa *australi.* ♃
[Sq]uamæ *calycinæ parvæ sunt, ut vix manifestæ. Radii flosculi quadrifidi.*

CENTAUREA calycibus simplicissime spinosis, fo[l]iis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceola[t]is, pedunculis longissimis. *Roy. lugdb.* 141. muricata.
[Jac]ea cyanoides, echinato capite. *Bauh. pin.* 272. *Moris. hist.* 3. *p.* 145.
[Cy]anoides flos. *Dod. pempt.* 251.
[H]abitat in Hispania. ☉

CENTAUREA calycibus setaceo-spinosis, foliis lanceolatis petiolatis: interne dentatis. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 141. peregrina.
[C]entaureum majus, folio molli acuto laciniato, flore aureo magno, calyce spinoso. *Bærh. lugdb.* 1. *p.* 144.
[H]abitat *in* Europa *australi.* ♂

CENTAUREA calycibus scariosis simplicissimè [s]pinosis, foliis pinnatifidis integerrimis: lacinia ex[ti]ma majore dentata. Crocodylium.
[Cr]ocodilium vulnerariæ foliis. *Vaill. act.* 183.

Cyanus purpureus, capite spinoso, syriacus *Barr.* 927. *t.* 503. *bon.*
Habitat in Syria. ☉
Caulis *Ramis striatis, scabris.* Folia *lyrato-pi aut indivisa.* Pedunculi *longi, uniflori.* Calycis *næ ovatæ, gibbæ marginibus membranaceis, apice spina simplici terminatis.* Flores *Neutr ximi, 5 fidi, subæquales, purpurascentes; H phroditi albidi apicibus purpurascentibus, longi radii.*

nudicaulis. 58. CENTAUREA calycibus setaceo-spinosis, foli divisis: superioribus subdentatis, caule simpli diusculo unifloro. †
Jacea folio cerinthes, purpurascente flore, e ru ctoriæ. *Herm. parad.* 190. *t.* 190.
Jacea intybacea, capite rubro spinoso. *Barr. ic.* *Bocc. mus.* 2. *p.* 60. *t.* 48.
Habitat in Italia, *rupe victoriæ* Galloprovinciæ
Folia *prima obovata, integerrima; reliqua ovato-la lata, basi dentata.* Caulis *subnudus.*

pumila. 59. CENTAUREA calycibus simplicissimis spinosi liis dentato-pinnatis villosis, caule nullo. *acad.* 4. *p.* 292. *
Crocodilium acaulon ferme, calcitrapæ foliis c *Vaill. act.* 163.
Habitat in Ægypto.
Similis C. acauli.

tingitana. 60. CENTAUREA calycibus margine spinosis, lanceolatis indivisis serrato-subspinosis, caulibu floris. †
Cyanus foliis ellipticis dentatis rigidis, floribus leis oblongis. *Hall. goett.* 370. * *Zinn. goett.*
Cnicus perennis cæruleus tingitanus. *Herm. lugdb.* *t.* 163.
Habitat in Agro Tingitano. ♃
Planta radio sterili distincta erit a Carthamo tin & cæruleo. H. Z.

galactites. 61. CENTAUREA calycibus setaceo-spinosis, decurrentibus sinuatis spinosis. *Hort. cliff.* 424. *lugdb.* 141. *Sauv. monsp.* 289. *Gouan. monsp.*
Carduus tomentosus, capitulo minore. *Bauh. pin.*
Carduus galactites. *Bauh. hist.* 3. *p.* 54.

β. Ca

rduus creticus non maculatus, caule alato. *Tournef. or.* 31.
bitat in Europa *australi.* ♃

OLYGAMIA NECESSARIA.

MILLERIA.

LLERIA foliis cordatis, pedunculis dichotomis. *Hort. cliff.* 425. * *Roy. lugdb.* 182. — quinque-flora.
lleria annua erecta, floribus spicatis luteis. *Mart. cent.* 41. *t.* 41.
lleria annua ramosior, foliis maculatis profundius serratis. *Mart. cent.* 47. *t.* 47. *f.* 2.
bitat in Panama, Vera Cruce. ♃
ulæ solitariæ, obtusæ, reflexæ.

ILLERIA foliis ovatis, pedunculis simplicissimis. *Hort. cliff.* 425. *t.* 25. * *Hort. upf.* 275. *Roy. lugdb.* 182. *Lxfl. it.* 239. * — biflora.
lleria annua erecta minor, foliis parietariæ, floribus ex foliorum alis. *Mart. cent.* 47. *t.* 47. *f.* 1.
bitat in Campechia. ⊙

SILPHIUM.

LPHIUM foliis alternis pinnato sinuatis. — laciniatum.
bitat in America *septentrionali*, Missisippi. *Collinson.* ♃
dix *perennis.* Caulis *bis humanæ altitudinis, crassitie pollicis, simplicissimus, inferne lævis, superne tuberculis fuscis pilisque patulis albis scaber, teres.* Folia *alterna, petiolata, bipedalia longitudine, pedalia latitudine, basi amplexicaulia, pinnatifida: Laciniis utrinque* 4 *f.* 5, *distantibus, angustis, dentato-sinuatis, scabris, costis utrinque elevatis solidissimis; margo foliorum superiorum purpurascens.* Cal. *ex squamis* 10, *in magnas subulatas spinas exeuntibus.* Petala *Radii* 30, *longitudine calycis; Stylo bifido, tenui.* Flosculi *Disci multi, flavi, paleis distincti, basi attenuati; Stylo simplici.* Semina *in radio membranacea, ovalia, marginata, aristis* 2 *parvis.* Semina *disci columnaria, tetragona, abortientia.*

PHIUM foliis oppositis deltoidibus petiolatis perfoliatis. — perfoliatum.

Silphium foliis radicalibus cordato-ovatis inæqu dentatis, caulinis subintegerrimis. *Gouan. monsp.*
Habitat in Mississippi. ♃
Caulis *homine altior, tetragonus, lævis.* Folia *o ta, ovata s. deltoidea, serrata, per petiolos dec tia & opposito perfoliata.* Folia *summa sessilia tissi a, perfoliata.* Pedunculus *terminalis, ala ultimorum foliorum, teres, inclinatus.* Calyx *rosus, obtusus* Corolla *lutea radiis 24, stylis titis.* Discus *stylis simplicibus, longioribus, steril*

Asteriscus. 3. SILPHIUM foliis indivisis sessilibus oppositis; rioribus alternis.
Silphium foliis oppositis. *Roy. lugdb.* 181. *Gron.* 133.
Silphium. *Hort. cliff.* 494.
Asteriscus coronæ solis folio & facie. *Dill. elth.* 37. *f.* 42.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃

solidaginoides. 4. SILPHIUM foliis oppositis lanceolatis peti acute serratis.
β. Silphium *helianthoides* foliis oppositis petiolatis tis. *Gron. virg.* 134.
Chrysanthemum marianum, virgæ aureæ amer foliis, florum petalis tridentatis. *Pluk. mant.*
Habitat in Virginia. *D. Gronovius.*
Caulis *glaber.* Folia *subtus glabra.* Calyx *ser plici foliorum.* Radii *petala leviter trifida; abortientia.*

trifoliatum. 5. SILPHIUM foliis ternis. *Roy. lugdb.* 181. *virg.* 133.
Chrysanthemum virginianum, foliis asperis tri quaternis ad genicula sitis. *Moris. hist.* 3. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 68. *Raj. suppl.* 211.
Habitat in Virginia. ♃

trilobatum. 6. SILPHIUM foliis oppositis sessilibus cuneifor trilobis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 307. *
Buphthalmum hirsutum, foliis trilobis ad basin stioribus oppositis, floribus solitariis axilla *Brown. jam.* 321.
Corona solis maritima humilis, folio carnoso spidi, flore luteo. Plum. spec. 10. ic. 107. f.

Chrysanthemum paluſtre repens minus odoratum, folio ſcabro trilobato. *Sloan. jam.* 126. *hiſt.* 1. *p.* 262. *t.* 155. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 450. *f.* 4.
Habitat in America.

POLYMNIA.

POLYMNIA foliis alternis haſtato-ſinuatis. — canadenſis.
Polymnia. *Amœn acad.* 3. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 5. *
Habitat in Canada. ♃

POLYMNIA foliis oppoſitis haſtato ſinuatis. — Uvedalia.
Osteoſpermum foliis oppoſitis palmatis. *Hort. cliff.* 424. *Hort. upſ.* 274. *Gron. virg.* 133.
Chryſanthemum angulosis platani foliis, virginianum. *Pluk. alm* 99 *t.* 83. *f.* 3.
Chryſanthemum perenne virginianum majus, platani orientalis folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 22. *ſ.* 6. *t.* 7. *f.* 55.
Habitat in Virginia. ♃

CHRYSOGONUM.

CHRYSOGONUM. *Hort. cliff.* 424. *Gron. virg.* 133. — virginianum.
Chryſanthemum virginianum villoſum, diſco luteo: quinis petalis crenato. *Pluk. alm.* 100. *t.* 83. *f.* 4. & *t.* 242. *f.* 3. *Raj. ſuppl.* 213.
Habitat in Virginia.

MELAMPODIUM.

MELAMPODIUM caule erecto, foliis ſublinearibus utrinque unidentatis. — americanum.
Melampodium. *Hort. cliff.* 425. *
Habitat in Vera Cruce.

MELAMPODIUM caule decumbente, foliis ovalibus ſerratis. † — auſtrale.
Melampodium ſeminibus quinque oblongis hiſpidis, calyce pentaphyllo, caule decumbente. *Loefl. it.* 268.
Habitat in Cumana. ♃

CALENDULA.

CALENDULA ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis: extimis erectis protenſis. *Fl. ſvec.* 711. 777. — arvenſis.

Caltha arvensis. *Bauh. pin.* 275.
Caltha minima. *Bauh. hist.* 3. *p.* 103.
Habitat in Europae *arvis.* ⊙
Affinis nimium C. officinali Foliis subdentatis, sed cordato lanceolatis, nec spatulatis. Floribus mini bus. Seminibus angustioribus, linearibus: exteriori erectis, longioribus.

cta. 2. CALENDULA seminibus urceolatis obovatis la bus, calycibus submuricatis.
Habitat in Palæstina. ⊙
Simillima C. arvensi, sed Calyx extus muricatus; Se na magis ventricosa, minime muricata, absque sem bus radialibus aculeatis. Planta *tota nuda abs hirsutie. Folia margine scabra.*

icinalis. 3. CALENDULA seminibus cymbiformibus muric incurvatis omnibus.
Calendula seminibus radii cymbiformibus echina bicornibus. *Hort. cliff.* 425. *Hort. upf.* 274. *M med.* 407. *Roy. lugdb.* 77. *Dalib. parif.* 268.
Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.
β. Caltha polyanthos major. *Bauh. pin.* 275.
γ. Caltha floribus reflexis. *Bauh. pin.* 275.
δ. Caltha prolifera, majoribus floribus. *Bauh. pin.*
Habitat in Europae *australis arvis.* ⊙

uvialis. 4. CALENDULA foliis lanceolatis sinuato-dentic tis, caule folioso, pedunculis filiformibus. *Hort.* 274.
Calendula foliis dentatis. *Roy. lugdb.* 177. *Mill. di* 75. *f.* 2.
Calendula seminibus radii obsolete serratis; disci datis. *Hort. cliff.* 425.
Calendula humilis africana, flore intus albo, foris laceo simplici. *Herm. lugdb.* 104. *t.* 105. *Breyn* 26 *t.* 14. *f.* 1. *Stiss. bot.* 59. *t.* 59.
Caltha africana, flore intus albo extus ferrugi *Moris. hist.* 3. *p.* 14. *f.* 6. *t.* 3. *f.* 8.
Habitat in Æthiopia. ⊙

brida. 5. CALENDULA foliis lanceolatis dentatis, caule lioso, pedunculis superne incrassatis. *Hort. upf.*
Calendula foliis radicalibus sinuatis, caulinis sup denticulatis. Roy. lugdb. 177. Mill. dict. t. 75

africana, flore intus albo, foris violaceo, [sem]ine majore oblongo. *Breyn. ic.* 26. *t.* 14.

[...]ermum africanum pubefcens, foliis incifis, par[v]ore *Trant. act. parif.* 1724. *p.* 39. *t.* 2.
[Habita]t *in* Æthiopia. ♂

[CALE]NDULA foliis lanceolatis finuato-dentatis, [caul]e fubnudo. nudicaulis.
[Calend]ula africana, foliis fcabiofæ argenteæ viridibus. [Her]m. *afr.* 5.
[...] florum pediculis pene aphyllis, foliis incifis. [Comm]. *hort.* 2. *p.* 66. *t.* 33.
[...] africana, flore intus albo extus leviter viola[ceo], femine plano cordato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 113.
[Habita]t *in* Æthiopia.
[...] *funt orbiculata.*

[CALE]NDULA foliis linearibus fubintegerrimis, cau[le fu]bnudo. graminifolia
[Calend]ula foliis linearibus denticulatis & integerrimis. [Roy]. *lugdb.* 177. *Mill. dict. t.* 76.
[Calend]ula africana, foliis gramineis rarius dentatis au[...]. *Herm. afr.* 5.
[...] africana, foliis croci anguftis, florum petalis [ext]rue purpurafcentibus interne albis. *Boerh. lugdb.* [1. p]. 113.
[Calend]ula africana furrecta, rorifmarini folio. *Pluk.* [alm]. 35. *t.* 370. *f.* 7.
[Dimor]photheca ftatices folio. *Vaill. act.* 1720. *p.* 280.
[...] africana, florum pediculis foliofis, foliis anguftis [in]tegris. *Comm. hort.* 2. *p.* 67. *t.* 34.
[Habita]t *in* Æthiopia.

[CALE]NDULA foliis obovatis fubdentatis, caule fruticofa. [fru]ticofo. *Amœn. acad.* 5. *p.* 25. *
[Calend]ula foliis obverfe ovatis denticulatis, caule [per]enni. *Roy. lugdb.* 531.
[Habita]t *ad* Cap. b. Spei. ♄

ARCTOTIS.

[ARCT]OTIS flofculis radiantibus fterilibus quinque- fuperba. [par]titis, *foliis pinnatis dentatis*: laciniis bipartitis. [Amœ]n. *acad.* 4. *p.* 331. *

Jacobæa africana, ftoebes facie, flore amplio talis radialibus trifidis. *Volk. norib.* 224. *t.*
Habitat in Æthiopia.
Pedunculi villosi, adsperfi fetis hyalinis, nocturbentes, nunquam vero cernui. Radius fubtus noctu connivens. Corollulæ disci luteæ, Anteis.

tristis. 2. ARCTOTIS flofculis radiantibus vicenis tr
Arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo radii profunde trifidis. *Roy. lugdb.* 179.
Anemonofpermos afra, foliis & facie taraxac *Breyn. ic.* 27. *t.* 15.
Habitat in Æthiopia. ⊙

Calendula. 3. ARCTOTIS flofculis radiantibus fterilibus nis fubintegris, foliis lyratis nigro-dentic
Arctotis foliis ovatis dentatis: petiolis longi perne dentatis, caule ramofo. *Hort. c* *Roy. lugdb.* 178.
Anemone affinis æthiopica, fibrofa radice, f ris, taraxaci foliis fubincanis. *Herm. lugdb.*
Anemonofpermos africana, jacobææ maritin flore fulphureo. *Comm. rar.* 36. *t.* 36.
Habitat in Æthiopia. ⊙
Pedunculi *villosi, adsperfi fetis rubris, ante & refcentiam nutantes.* Radius *flavus, fubtus fcens, noctu contortus.* Corollulæ *disci ext* Antheris *nigris.* Calycis *fquamæ exteriores fubulatæ, breviffimæ, hifpidæ.*

acaulis. 4. ARCTOTIS pedunculis radicalibus, foliis l
Anemonofpermos africana, folio plantagini fulphureo. *Comm. rar.* 35. *t.* 35.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

plantaginea. 5. ARCTOTIS flofculis radiantibus fertilibus, f ceolato-ovatis nervofis denticulatis ampl bus.
Anemonofpermos afra, folio plantaginis, fl diis intus aureis extus fufcis. *Bærh. lugdb.* 1
Habitat ad Cap. b. Spei.
Folia fubtus tomentofa. Difcus fterilis.

anguftifolia. 6. ARCTOTIS flofculis radiantibus fertilibus, f ceolatis integris dentatis. Hort. cliff. 412.

onofpermos afra, folio ferrato rigido, flore in-
fulphureo extus puniceo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 100.
t in Æthiopia.
i difci fteriles. Receptaculum valde lanatum.

TOTIS flofculis radiantibus fertilibus, foliis pin- afpera.
-finuatis villofis: laciniis oblongis dentatis.
t. cliff. 412. *Hort. upf.* 275. *Roy. lugdb.* 178.
heca jacobææ folio, radiis florum intus luteis,
is purpureis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 428.
onofpermos africana, foliis cardui benedicti,
m radiis intus fulphureis. *Comm. hort.* 2. *p.* 43.

onofpermos afra, folio jacobææ tenuiter laci-
, flore aurantio pulcherrimo. *Boerh. lugdb.* 1.
9. *t.* 100.
t in Æthiopia.
difci fteriles funt, at in radio fertiles.

TOTIS flofculis radiantibus fterilibus, paleis paradoxa.
longioribus coloratis. foliis bipinnatis linea-
. *Amœn. acad.* 4. *p.* 330. * *non fynonymum.*
Pluk. phyt. 312. *f.* 5.
t in Æthiopia. ⊙
*elongatæ, coloratæ, longitudine fere radii, unde
quafi plenus adparet.*

TOTIS flofculis radiantibus fterilibus, paleis paleacea.
ulos difci æquantibus, foliis pinnatis linearibus.
n. acad. 6. *afr.* 84. *
oliis integris anguftis, flore magno luteo. *Burm.*
176. *t.* 65. *f.* 1.
ad Cap. b. Spei.

TOTIS paleis flofculo brevioribus, foliis fu- anthemoi-
ecompofitis linearibus. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 85. * des.
melum pumilum, foliis anguftis pinnatis. *Burm.*
174. *t.* 63. *f.* 2.
ad Cap. b. Spei.

TOTIS flofculis radiantibus fterilibus, foliis dentata.
atis: pinnis pinnatifido-dentatis.
nthemum foliorum pinnis breviffimis dentatis.
. afr. 175. *t.* 64.
ad Cap. b. Spei.

OSTEO-

OSTEOSPERMUM.

›iliferum. 1. OSTEOSPERMUM foliis lanceolatis mu subpetiolatis glabris ferratis, ramulis denticu gulatis.
Osteospermum foliis lanceolatis acute dentati fruticoso. *Mill. ic.* 129. *t.* 194. *f.* 1.
Osteospermum fruticans lanuginosum, foliis dentatis. *Burm. afr.* 171. *t.* 61. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Ramorum anguli a petiolorum dorso decurrent culati, sæpe toti lana involuti, quam ætat Flores parvi. Semina obovata.

licifolium. 2. OSTEOSPERMUM foliis oblongis dentato tis scabris semiamplexicaulibus, ramis sulca
Osteospermum foliis scabris sinuato-denticulati *zeyl.* 172. *t.* 62.
Habitat ad Cap b. Spei. ♄
Folia *ilicis sessilia, fere amplexicaulia, utri tibus tribus angulata, margine involuta, an cronata, supra scabra, subtus villosa & fere*

pinosum. 3. OSTEOSPERMUM spinis ramosis. *Hort.* c *Roy. lugdb.* 179.
Chrysanthemoides osteospermum africanum o spinosum & viscosum. *Comm. hort.* 2. *p.* 85.
Chrysanthemum africanum frutescens spinosur *norib.* 105. *t.* 105.
Habitat in Æthiopia. ♄

moniliferum. 4. OSTEOSPERMUM foliis ovalibus serratis tis subdecurrentibus. *Hort. cliff.* 424. *Roy. lu*
Chrysanthemoides afrum, populi albæ foliis. *elth.* 80. *t.* 68. *f.* 79.
Chrysanthemum africanum frutescens, telephii liis crassis, osteocarpon. *Pluk. amalth.* 55. *f.* 4.
Chrysanthemum arborescens æthiopicum, fo puli albæ. *Breyn. cent.* 155. *t.* 76.
Habitat in Æthiopia. ♄
Petioli sub basi nodum gerunt.

polygaloides. 5. OSTEOSPERMUM foliis lanceolatis glabri bricatis integerrimis decurrentibus. Roy.

illifera polygalæ foliis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 374.
rsanthemum fruticosum, polygoni foliis, africanum,
ulibus scabris, flore minore. *Pluk. mant.* 47. *t.* 382.
tat in Æthiopia. ♄
ınculi *Calycesque pubescentes, viscosi.* Caulis *læ*-
. Folia *ovato lanceolata, integerrima, acuta, læ*-
ı, *margine scabra, subdecurrentia, basi interiore vil*-
a. Semina *crenulata.*

OTHONNA.

IONNA foliis oblongis nudis petiolatis, caule bulbosa.
rbaceo, pedunculis unifloris longissimis.
nna foliis ovatis integris, caule herbaceo.
ææ affinis planta tuberosa capitis b. spei. *Breyn.*
ıt. t. 66. *Moris. hist.* 3. *p.* 111. *f.* 7. *t.* 18. *f.* 33.
onna dentata, foliis ovato-cuneiformibus dentatis.
pl. 1. *p.* 926.
ago foliis oblongis dentatis glabris, floribus ma-
is. *Burm. afr.* 164. *t.* 59.
at in Æthiopia. ♄
morpha, *siquæ alia, planta.* Folia *floralia ad pe*-
culos sæpe opposita. Pedunculi *sæpe bini.* Calyces
nquepartiti.
ıt *α. herbacea, fol. ovatis, integerrimis.*
cea, *fol. radicalibus pinnatis integerrimis.*
ıcea, *fol. linearibus, angustissimis.*
cea, *fol. lanceolatis, integerrimis.*
cea, *fol. lanceolatis, dentatis.*
cea, *fol. lanceolato-subellipticis.*
cea, *fol. sublanceolatis, tridentatis.*
osa, fol. apicis lanceolatis, subsessilibus.
sa, fol. alternis, lanceolatis, dentatis.

ONNA foliis linearibus pinnatis subdentatis, Tagetes.
le herbaceo.
es minimus tenuiter diviso folio. *Breyn. prodr.*
. 99.
anthemum africanum pumilum ramosum, foliis
uissimis. *Raj. suppl.* 212.
at ad Cap. b. Spei. ⊙
filiformis, flexuosus. Calyx *urceolatus ore den*-
circiter 14; *radius multiflorus.*

NNA foliis pinnatifidis laciniis linearibus pectinata.
paral-

parallelis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 17
dict. t. 194. *f.* 2.
Jacobæa africana frutescens, foliis absinthii u
ri incanis. *Comm. hort.* 2. *p.* 137. *t.* 69. *R*
β. Jacobæa absinthites, tomentosis cinerariæ fol
thiopica, calyce integro summis oris dentat
alm. 106.
Habitat in Æthiopia. ♄
Planta sæpe tota tomentosa est.

abrotanifolia. 4. OTHONNA foliis multifido-pinnatis linearib
lis geniculis villosis. *Roy. lugdb.* 380.
Asteroplatycarpos africana frutescens, crithm
foliis. *Comm. hort.* 2. *p.* 63. *t.* 32.
Jacobæa africana fruticans, foliis abrotani C
major & minor. *Volk. norib.* 225. *t.* 225. *R*
179. *Pluk. phyt.* 323. *f.* 2. *Seb. muf.* 2. *t.* 23.
Habitat in Æthiopia. ♄

coronopifolia. 5. OTHONNA foliis infimis lanceolatis integ
superioribus sinuato-dentatis. *Hort. cliff.* 41
lugdb. 179.
Jacobæa africana frutescens, coronopi folio.
hort. 2. *p.* 139. *t.* 70. *Raj. suppl.* 175.
Habitat in Æthiopia. ♄

cheirifolia. 6. OTHONNA foliis lanceolatis trinerviis inte
caule suffruticoso repente. *Hort. cliff.* 419. *R*
179. *Duham. arb.* 2. *p.* 94. *t.* 17. *Gouan. mon*
Aster fruticosus africanus luteus, foliis th
Raj. suppl. 167.
Habitat in Æthiopia. ♄

arborescens. 7. OTHONNA foliis obovatis integerrimis, c
borescente.
Doria africana arborescens, floribus singularit
elth. 123. *t.* 103. *f.* 123.
Habitat in Æthiopia. ♄
Calyx 5fidus; radius 5florus.

ERIOCEPHALUS.

africanus. 1. ERIOCEPHALUS foliis integris divisisqu
bus subcorymbosis. *Hort. cliff.* 424. *Roy. lu*
Eriocephalus sempervirens, foliis fasciculati
tatis. Dill. elth. 132. t. 110. f. 134.

tanum africanum, folio tereti tridentato. *Waltb.*
. I. *t.* I.
it in Æthiopia. ♄

)CEPHALUS foliis linearibus indivisis, flori- racemosis. *Amœn. acad.* 6. *afr.* 87. * — racemosus.
tanum africanum, foliis argenteis angustis, flori- spicatis. *Raj. suppl.* 233.
it ad Cap. b. Spei. ♄

FILAGO.

ᴀGO floribus sessilibus terminalibus, foliis flo- bus majoribus. *Loefl. it.* 165. * *Gouan. monsp.* — pygmæa.

lina caule simplicissimo, foliis superioribus ma- bus. *Roy. lugdb.* 147.
halium (species omnes). *Vaill. act.* 1719. *p.* 314.
ıalium roseum hortense. *Bauh. pin.* 263. *prodr.*
. *Barr. ic.* 127.
it in Europæ *australis* & Orientis *stagnis exsicca-*
⊙
sæpius acaulis est.

ᴀGO panicula dichotoma, floribus rotundatis laribus hirsutis, foliis acutis. — germanica.
ıalium caule erecto dichotomo, floribus in alis llibus. *Fl. lapp.* 299. *Fl. svec.* 677; 779.
ıalium vulgare majus. *Bauh. pin.* 263.
ıalium germanicum *Bauh. hist.* 3. *p.* 158.
ıallium. *Fuchs. hist.* 222.
it in Europa. ⊙

ᴀGO caule dichotomo, floribus pyramidatis tagonis axillaribus, flosculis femineis seriatis. — pyramidata.
pl. 1. *p.* 1199.
ıalium medium. *Bauh. pin.* 263.
it in Hispania. ⊙
bipollicaris, erectus. Ramis radicalibus. Folia *eolata, obtusiuscula. Flores e dichotomia caulis & inales, sessiles, pentagono-pyramidati, tomentosi ut planta, aggregati.*

ᴀGO caule erecto diviso, floribus conicis late- bus *axillaribus. Fl. svec.* 2. *n.* 780. — montana.

Gna-

Gnaphalium caule erecto diviso, floribus pyra axillaribusque. *Fl. svec.* 1. *n.* 678.
Gnaphalium caule erecto ramoso, foliis brevi glomerulis sessilibus dissitis prope summitate *helv.* 705.
Gnaphalium minus repens. *Bauh. pin.* 263.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Bauh. h* 159. *Raj. hist.* 296.
Habitat in Europæ *sabulosis, montosis.* ☉

gallica. 5. FILAGO caule erecto dichotomo, floribus tis axillaribus, foliis filiformibus.
Gnaphalium vulgare medium. *Moris. hist.* 3. *s.* *f.* 14. *Pet. herb. t.* 18. *f.* 12.
Gnaphalium minimum alterum nostras, stoecl trinæ foliis tenuissimis. *Pluk. alm.* 172. *t.* 29
Habitat in Anglia Gallia.
Folia subtomentosa, tamen glabra, nec hirsuta.

arvensis. 6. FILAGO floribus conicis lateralibus, caule lato. *Fl. svec.* 2. *n.* 781.
Gnaphalium paniculatum hirsutum. *Fl. svec.* 1
Gnaphalium majus, angusto oblongo folio. *I* 263?
Gnaphalium caule erecto ramosissimo, glome rum ad alas longe sessilibus. *Hall. helv.* 70
Filago incana tomentosa erecta. *Vaill. act.* 391.
Habitat in Europæ *campis sabulosis.* ☉

Leontopodium. 7. FILAGO caule simplicissimo, capitulo bracteis hirsutissimis radiato. *Scop. carn.* 2 *vind.* 150.
Gnaphalium alpinum, magno flore, folio oblon *pin.* 264.
Gnaphalium alpinum pulchrum. *Bauh. hist.* 3
Gnaphalium alpinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 328.
Leontopodium. *Dod. pempt.* 69.
β. Gnaphalium magno flore, brevi folio. *Bauh.*
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valesiæ, Corin striæ, Sibiriæ.
Fructificatio *hujus nonnihil differt a reliquis; asse quadrat aut cum Filaginibus aut A* Flos terminalis masculus cum *adjacentibus tribus minoribus, qui gerunt in disco flos*

s, *in ambitu femineos. Conferatur Scopoli fl. car-*
; *ulterius hanc describant ejus populares.*

MICROPUS.

ROPUS caule proftrato, foliis geminis. fupinus.
opus. *Hort. upf.* 275. *Roy. lugdb.* 145.
alium fupinum, echinato femine. *Pluk. alm.*
t. 187. *f.* 6. *Raj. fuppl.* 191.
) - Gnaphalium fupinum, femine echinato. *Mo-*
uft. 3. *p.* 93.
t in Lufitaniæ, Italiæ, Orientis *maritimis.* ⊙
ROPUS caule erecto, calycibus edentulis foli- erectus.
s. *Amæn. acad.* 3. *p.* 421. *
ipus feminibus compreffis lanatis inermibus. *Læfl.*
166. *t.* 1. *f.* 3. *
ialium caule ramofo diffufo, floribus confertis
. tectis. *Hort. cliff.* 402.
ialium minus repens. *Magn. monfp.* 111. *
ialium plateau. 3. *Cluf. hift.* 1. *p.* 229.
) f. Impia capitulis compreffis. *Vall. parif.* 52.
opodium verius diofcoridis. *Barr. ic* 496.
it in Orientis, Galliæ, Hifpaniæ *collibus.* ⊙

LYGAMIA SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS.

PHANTOPUS foliis oblongis fcabris. *Hort.* fcaber.
. 390. *Hort. upf.* 147. *Gron. virg.* 176. *Roy. lugdb.*
:.
iantopus erectus, foliis oblongo-ovatis rugofis
ratis: floralibus cordiformibus ternatis, capitulis
notis terminalibus. *Brown. jam.* 312.
hantopus conyzæ folio. *Dill. elth.* 126. *t.* 106. *f.*
6.
is frutefcens, foliis oblongis utrinque acuminatis
nofis & lanuginofis. *Breyn. ic.* 32. *t.* 34.
nophoræ indicæ affinis, femine & floribus in ca-
ulis lævibus, in caulium cymis. *Pluk. alm.* 131.
388. *f.* 6.
ehovadi. *Rheed. mal.* 10. *p.* 13. *t.* 7.
tat in Indiis. ♃

tomentosus. 2. ELEPHANTOPUS foliis ovatis tomentosis. *virg.* 115. *
Elephantopus erectus hirsutus, foliis inferioribus tis utrinque productis, floribus oblongis, alaribus. *Brown. jam.* 311.
Habitat in America.
Affinis nimium præcedenti.

SPHÆRANTHUS.

indicus. 1. SPHÆRANTHUS pedunculis crispatis. *Fl.* 312. * *Roy. lugdb.* 145.
Sphæranthus purpurea alata serrata. *Burm.* *t.* 94 *f.* 3.
Scabiosa indica major, caule & pediculis foliosis *phyt.* 312. *f.* 6.
Adaca-manjen. *Rheed. mal.* 10. *p.* 85. *t.* 43. *Raj.* 241.
Habitat in India. ♃
africanus. 2. SPHÆRANTHUS pedunculis lævibus.
Sphæranthus, folio oblongo, minor. *Vaill.* *act.*
Scabiosa minor, alato caule, maderaspatana. *Pl.* 335. *t.* 108. *f.* 7. *Raj. suppl.* 235.
Habitat in Africa, Asia. ☉
Affinis nimium præcedenti, sed non pilis adspersus pedunculis alatis s. crispatis.

ECHINOPS.

sphærocephalus. 1. ECHINOPS capitulis globosis, foliis pubescentibus.
Echinops calyculis unifloris, caule multifloro, spinosis supra nudis. *Sp. pl.* 1. *p.* 814.
Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. *cliff.* 390. *Hort. upf.* 248. *Dalib. paris.* 245.
Echinopus major. *Bauh. hist.* 3. *p.* 69.
Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris. *Bauh.* 381.
Chalcepos. *Dalech. hist.* 1480.
Habitat in Italia, Austria. ♃
Caulis *ramosus, multiflorus, pubescens villis patentibus.* Folia *supra pilosa.* Calycis *squamæ omnes ad* *usque pubescentes.*
Ritro. 2. ECHINOPS capitulo globoso; foliis supra glabris.
Echinops caule subunifloro. *Hort. upf.* 248. * *Mill.* *t.* 130.

inops caule subunifloro, foliis duplicato pinnatidis, foliolis latiusculis vicinis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 100.
duus sphærocephalus cæruleus minor. *Bauh. pin.* 81.
ro floribus cæruleis. *Lob. ic.* 2. *p.* 8.
codylium monspeliensium. *Dalech. hist.* 1476.
hinops caule subunifloro, foliis duplicato-pinnafidis: foliolis linearibus remotis. *Gmel. sib.* 2. *p.* 102. *t.* 46.
itat in Sibiriæ, Galliæ, Italiæ *collibus aridis.* ♃
lis *albus, tomentosus.* Folia *supra glabra, subtus al-tomentosa.* Calycis *squamæ ad apicem usque ciatæ.*

HINOPS capitulis fascicularibus, calycibus lateralibus sterilibus, foliis supra strigosis. *Læfl. hisp.* 59. * — strigosus.
duus tomentosus, capitulo majore. *Bauh. pin.* 382.
biosa carduifolia annua. *Herm. par.* 224. *t.* 224.
na alba. *Lob. ic.* 2. *p.* 9.
itat in Hispania. ☉
a pinnatifida, latiuscula: laciniis lanceolatis, spina inima terminatis, lateribus inermibus, supra pilis igidis, strigosa, subtus tomentosa. Calyces *squamis arinatis, superne læves, basi ciliati, non in capitum globosum congesti, sed fasciculati: calycibus lateralibus s. inferioribus minoribus, sterilibus s. flosculo destitutis.*

GUNDELIA.

UNDELIA. *Sp. pl.* 1. *p.* 814. *Gron. orient.* 251. — Tournefortii.
ndelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro. *Tournef. cor.* 51. *itin.* 2. *p.* 108. *t.* 108.
yngium syriacum, foliis chamæleontis longis & spinosis. *Moris. hist.* 3. *p.* 167.
hybum dioscoridis s. Hacub. alcardeg serapionis. *Rauw. itin.* 74. *t.* 74.
undelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus intense purpureis, capite araneosa lanugine obsito. *Tournef. cor.* 51.
itat in America, Syria, Aleppo. ♃

STOEBE.

OEBE *Hort. cliff.* 390. * — æthiopic

Conyza africana frutescens, foliis ericæ hamatis & canis. *Tournef. inst.* 455.
Helichrysoides juniperi creberrimis aduncis foliis, tibus in ramulorum cymis. *Vaill. act.* 1719. *p.*
Habitat in Æthiopia. ♄

MONOGAMIA.

STRUMPFIA.

maritima. 1. STRUMPFIA. *Jacq. amer.* 28.
Thymelæa humilior, foliis acutis atrovirentibus. *jam.* 168. *hist.* 2. *p.* 93. *t.* 189. *f.* 1. 2. *Raj. dend.*
Thymelæa frutescens, rosmarini folio, flore *Plum. spec.* 17. *t.* 251. *f.* 1.
Habitat in America. ♄

SERIPHIUM.

cinereum. 1. SERIPHIUM floribus verticillato-spicatis, foli tentibus.
Artemisia floribus simplicibus. *Hort. cliff.* 403.
Breynia cineroides capensis. *Pet. gaz.* 2. *t.* 3. *f.*
Tamariscus æthiopicus, coridis folio glabro, impiæ capitulis in spicam sessilibus. *Pluk. mant* *t.* 297. *f.* 1.
Abrotanoides africanum, foliis minimis argente flexis, floribus in summis caulibus & ramu spicas oblongas. *Raj. suppl.* 233.
Frutex cinereus muscosus, herbæ impiæ capitu spicam sessilibus. *Pluk. alm.* 159. *mant.* 85.
Habitat in Æthiopia. ♄
Folia *lanceolata*, *parva*, *conferta*, *recurva*, *basi* *cana*. Spicæ *terminales*, *solitariæ*, *oblongæ*, *subverticillatæ*, *ferrugineæ*.

plumosum. 2. SERIPHIUM floribus spicatis, foliis granulato tis.
Stœbe floribus spicatis, calycibus unifloris. *Roy.* 145.
Breynia capensis, capitulis albis plumosis. *Pet. g* *t.* 5. *f.* 4.
Abrotanoides africanum, foliis cinereis muscosis pitulis florum globosis magnis. *Raj. suppl.* 23
Habitat in Æthiopia. ♄

SERIPHIUM floribus capitatis, foliis imbricatis. fuscum.
upatorium ericoides capitis bonæ spei. *Breyn. cent.* *t.* 69. *Moris. hist.* 3. *p.* 97. *f.* 7. *t.* 18. *f.* 10.
brotanoides capensis, ericæ folio. *Pet. gaz.* 9. *t.* 5. *f.* 2.
Seriphium *gnaphaloides* floribus spicatis unifloris. *Amœn. acad.* 4. *p.* 292. *
upatorioides capensis capitatus. *Pet. gaz.* 13. *t.* 8. *f.* 1.
brotanoides afric. foliis argenteis minoribus & brevissimis, floribus in spicas breves congestis. *Raj. suppl.* 233.
abitat in Æthiopia. ♄
abitus *Ericæ magnitudine, foliis, flosculis.* Fruticulus *Ramis lignosis, teretibus, inæqualibus.* Folia *acerosa, filiformia, conferta, imbricata, tomentosa.*

CORYMBIUM.

CORYMBIUM. *Hort. cliff.* 494. — africanum.
orymbium foliis ad radicem longissimis lyratis. *Burm. afr.* 189. *t.* 70. *f.* 1.
upleurifolia, semine papposo, valerianoides umbellata, cauliculo scabro. *Pluk. alm.* 73. *t.* 272. *f.* 5.
upleuri similis planta æthiopica, ad caulium nodos tomentosa. *Pluk. alm.* 73. *t.* 272. *f.* 4, 5.
abitat in Æthiopia. ♃

JASIONE.

ASIONE. *Jacq. vind.* 289. montana.
sione foliis lineari-lanceolatis obsolete serratis. *Hort. cliff.* 426. *Fl. svec.* 713; 782. *Roy. lugdb.* 191. *Hall. helv.* 496. *Dalib. paris.* 268.
apunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Bauh. pin.* 92.
apuntium montanum capitatum leptophyllon. *Col. ecphr.* 1. *p.* 226. *t.* 227.
phyllanthes. *Dalech. hist.* 804.
abitat in Europæ *collibus siccissimis.* ☉

LOBELIA.

* *Foliis integerrimis.*

LOBELIA frutescens, foliis ovali-oblongis integerrimis. *Fl. zeyl.* 313. * *Osb. it.* 275. plumierii.
Lobelia frutescens, portulacæ folio. *Plum. gen.* 21. *ic.* 165. *f.* 1. *Catesb. car.* 1. *p.* 79. *t.* 79.

Habitat in Indiis. ♄

Racemus *dichotomus*, *bracteis subulatis*, *opposit[illegible]* *terne ad basin villosis.* Fructus *bilocularis.* C[illegible] *intus villosa.* Flos *generi proprius*, *quamvis* [illegible] *& fructus aliena.*

pinifolia. 2. LOBELIA fruticosa, foliis linearibus confert[illegible] tegerrimis. *Roy. lugdb.* 241.

Rapunculus æthiopicus, violaceo galeato flore [illegible] liis pinastri. *Breyn. cent.* 173. *t.* 87.

Rapunculus fruticosus, foliis nervosis acutis, fl[illegible] in ramulorum summo. *Burm. afr.* 111. *t.* 41. [illegible]

Rapunculus flore cæruleo galericulato, rosmar[illegible] lio angustiore. *Raj. suppl.* 384.

Rapuntium æthiopicum, violaceo galeato flore [illegible] liis pinastri. *Raj. suppl.* 385.

Habitat in Æthiopia. ♄

[illegible]ortmanna. 3. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus intege[illegible] caule subnudo. *Fl. svec.* 714; 783.

Lobelia foliis bilocularibus subulatis. *Fl. lapp* [illegible] *Hort. cliff.* 426.

Dortmanna lacustris, floribus sparsis pendulis. [illegible] *act. upf.* 1720. *p.* 97. *t.* 2.

Gladiolus stagnalis s. lacustris. *Rudb. elys.* 2. *p* [illegible] *f.* 15.

Gladiolus stagnalis dortmanni. *Clus. cur.* 40. *R*[illegible] 1911. *

Anonymus. *Oed. dan. t.* 39.

Habitat in Europæ *frigidissimæ lacubus & ripis.* ♃

Tupa. 4. LOBELIA foliis lanceolatis integerrimis, r[illegible] spicato.

Rapuntium spicatum, foliis acutis, vulgo Tupa. [illegible] *peruv.* 2. *p.* 739. *t.* 29.

Habitat in Peru.

Venenatissima herba & radix, solo odore vom[illegible] *Fewill.*

kalmii. 5. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolato-linea[illegible] obtusiusculis alternis integerrimis, racemo term[illegible]

Rapuntium canadense pumilum, linariæ folio. *To*[illegible] *inst.* 164.

Habitat in Canada. *Kalm.* ☉

Planta *pedalis*, *Caule tereti*, *vix ramoso.* Fol[illegible]

neari-lanceolata inferne, superne linearia, integerri-ma, obtusiuscula, nuda, sessilia. Racemus *terminalis, laxus: Pedunculis alternis, unifloris, ex alis supremorum foliorum, foliolo instructis.* Flores *cærulei.*

OBELIA foliis linearibus integerrimis, panicula dichotoma. paniculata.
puntium, foliis linearibus acutis, floribus gemellis, polyanthos. *Burm. afr.* 100. *t.* 38. *f.* 3.
bitat in Æthiopia.

OBELIA foliis ovatis petiolatis, staminibus longissimis. cornuta.
bitat in Cayenna.
antam *apud D. Royenum vidi, utrum* Folia *integerrima, e memoria excidit.*

* * *Caule erecto, foliis incisis.*

OBELIA foliis ovato-oblongis crenatis, caule subnudo spicato, antheris hirsutis distinctis. Phyteuma.
bitat in Æthiopia.

OBELIA foliis inferioribus pedatis. bulbosa.
puntium tuberosum, foliis multifidis, floribus spicatis. *Burm. afr.* 99. *t.* 38. *f.* 1.
bitat in Æthiopia.

LOBELIA caulibus erectis, foliis oblongis dentatis. cheiranthu
eiranthus africana, flore luteo. *Comm. hort.* 2. *p.* 83. *t.* 42.
bitat ad Cap. b. Spei. ⊙
olia *oblonga s. lanceolato-ovata, dentata.* Floralia *folia linearia.* Pedunculi *sæpius triflori.* Flores *parvi: Corollæ laciniis linearibus s. subulatis.*

LOBELIA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollæ filiformi longissimo. *Roy. lugdb.* 241. *Brown. jam.* 322. longiflora.
apunculus aquaticus, foliis cichorei, flore albo: tubo longissimo *Sloan. jam.* 58. *hist.* 1. *p.* 158. *t.* 101. *f.* 2. *Raj. suppl.* 383.
achelium sonchi folio, flore albo longissimo. *Plum. spec.* 3. *ic.* 253. *f.* 1.

Habitat in Jamaica *ad ripas.*
Planta venenatissima. Jacquin.

Cardinalis. 12. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis se... spica terminali *Hort cliff.* 426. *Hort. upf.* 276 *lugdb.* 241. *Gron. virg.* 134.
Rapuntium galeatum virginianum, coccineo flo... jore *Moris. hist.* 2. *p.* 466. *s.* 5. *t.* 5. *f.* 54.
Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. *mex* 879. *t* 880.
Habitat in Virginia. ♃

siphilitica. 13. LOBELIA caule erecto, foliis ovato lanc... crenatis, calycum sinubus reflexis. *Hort. cliff* * *Amæn. acad.* 4. *p.* 527. *Gron. virg.* 134.
Rapunculus galeatus virginianus, flore violace... jore. *Moris. hist.* 2. *p.* 466. *s.* 5. *t.* 5. *f.* 55.
Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo *dart. mem.* 297.
Trachelium americanum, flore cæruleo. *Rob.* i...
Habitat in Virginiæ *sylvis aridis, lutosis.* ♃

Surinamensis. 14. LOBELIA caule suffruticoso, foliis oblong... bris serratis, floribus axillaribus pedunculat...
Habitat Surinami. ♄
Fruticulus. Folia *alterna, oblonga, subpetiolata, acuta, serrata tenuissime.* Pedunculi *axillares tarii, vix foliorum longitudine, versus basin* b... *dualus, linearibus.* Calyx *gibbus, torulosus: lineari-lanceolatis.* Corolla *longitudine folii, gona, supra basin quinquefariam impressa.* C... *ventricosa.*

...ata. 15. LOBELIA caule erecto, foliis ovatis subs... pedunculo longioribus, capsulis inflatis. *Hor...* 276. *Act. upf.* 1741. *p.* 23. *t.* 1. *Gron. virg.* 1...
Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-la... latis obsolete incisis, capsulis inflatis. *Hort...* 500. *Roy. lugdb.* 528.
Habitat in Virginia, Canada. ⊙

cliffortiana. 16. LOBELIA caule erecto, foliis cordatis obl... dentatis petiolatis, corymbo terminali. *Hort.* 426. *t.* 26. * *Gron. virg.* 107.

ntium trachelii folio, flore purpurascente. *Plum.*
:. 5. *ic.* 235. *f.* 2.
it in Virginia, Canada. ☉

IELIA foliis lanceolatis serratis inferne denta- racemis compositis terminalibus. *Amæn. acad.* . 408. * — assurgens.
ia major brachiata assurgens, foliis oblongo-ova- lenticulatis basi appendiculatis utrinque produ- *Brown. jam.* 322.
t in Jamaica.

IELIA caule erectiusculo, foliis inferioribus otundis crenatis, superioribus lanceolatis ser- , floribus racemosis. — urens.
ia caule erecto, foliis lanceolatis subdentatis, a laxa longa terminali. *Læfl. it.* 167. *
ia foliis oblongo ovatis, floribus laxe spicatis. *tt. stamp.* 1. *p.* 35. *Dalib. parif.* 268.
iculus galeatus blesensis s. soloniensis, flore vio- o minore. *Moris. hist.* 2. *p.* 407. *f.* 5. *t.* 5. *f.*
itium urens soloniense. *Moris. blef.* 300. *Bocc.* 20. *t.* 11. *Raj. hist.* 746. *Monnier. obs.* 131.
flore cæruleo galeato. *Bauh. prodr.* 53. *pin.* 110.
t in Gallia, Hispania. ☉

* * * *Caule prostrato, foliis incisis.*

ELIA caule prostrato, foliis lanceolatis ova- s crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis loris longissimis. *Gouan. monsp.* 466. — Laurentia.
ntia annua minima, flore cæruleo. *Mich. gen.* :. 14.
iculus aquaticus repens, flore cæruleo inaper- *Raj. suppl.* 383. *Bocc. mus.* 35. *t.* 27.
it in Italia. ☉

IELIA caule patulo, foliis lanceolatis serratis, le erecto ramoso, pedunculis longissimis. — Erinus.
inula minor africana, erini facie, flore violaceo, libus erectis. *Herm. lugdb.* 110. *t.* 111.
it in Æthiopia. ☉
spithamæus, filiformis, inferne ramosus. Folia *alia ovalia, caulina lanceolata, omnia* glabra,

O o o o 5 *sub-*

subdentata. Pedunculi *axillares*, *nudi*, *foli longiores*, *uniflori.* Corollæ *cæruleæ.*

erinoides. 21. LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis latis serratis, pedunculis lateralibus. *Ho* 426. *Gron. virg.* 134.

Campanula minor africana, erini facie, caulib cumbentibus. *Herm. lugdb.* 108. *t.* 100.

Habitat in Æthiopia. ⊙

zeylanica. 22. LOBELIA caulibus procumbentibus, folii serratis: inferioribus obtusis, superioribus pedunculis unifloris, capsulisque subvillosi

Campanula zeylanica, senecionis folio, flore reo. *Seb. thes.* 1. *p.* 37. *t.* 22. *f.* 12?

β. Lobelia hirta. *Sp. pl.* 1. *p.* 935.

Habitat in China. *Osbeck. in* Æthiopia.

Planta *parva*, *facie Veronicæ chamædryos.* Ca *pens.* Folia *alterna*, *ovata*, *petiolata*, *fere inferiora obtusa crenata*; *superiora acuta*, *an rata.* Pedunculi *axillares*, *subsolitarii*, *fo giores*, *uniflori*, *pubescentes.* Calyx *subvillosi*

lutea. 23. LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis latis serratis, floribus sessilibus subspicatis.

Rapuntium foliis oblongis dentatis, flore lute to, flagellis procumbentibus. *Burm. afr.* 10 *f.* 1.

Rapunculus africanus ramosus, foliis dentatis bus gladioli lacustris. *Herm. afr.* 18. *Raj. su*

Habitat in Æthiopia.

hirsuta. 24. LOBELIA foliis ovalibus crenatis lanatis, lateralibus solitariis.

Rapuntium foliis subrotundis hirtis, flore ex litario. *Burm. afr.* 105. *t.* 40. *f.* 2.

Rapuntium africanum galeatum, foliis oblong dis dentatis villosis. *Raj. suppl.* 385.

Rapunculus galeatus æthiopicus cæruleus, hi subrotundis crenatis foliis. *Pluk. alm.* 316.

Habitat in Æthiopia.

coronopifolia. 25. LOBELIA foliis lanceolatis dentatis, ped longissimis.

ıtium folio longo profunde dentato, florum pe-
ı longissimis. *Burm. afr.* 98. *t.* 38. *f.* 1.
ıtium æthiopicum, flore cæruleo galeato, foliis
ınopi. *Herm. afr.* 18. *Breyn. cent. t.* 88.
t in Æthiopia.

ıRLIA foliis linearibus dentatis, spica termi- comosa.
foliosa. *Hort. cliff.* 500.
t in Æthiopia. ⊙

VIOLA.

* *Acaules.*

A acaulis, foliis palmatis quinquelobis denta- palmata.
ndivisisque. *Gron. virg.* 135.
foliis palmatis sinuatis, stolonum reniformibus.
ı. virg. 1. *p.* 182.
virginiana, platani fere foliis parvis & incanis.
. *mant.* 187.
alba, folio securis romanæ effigie, floridana.
. *amalth.* 209. *t.* 447. *f.* 1.
t in Virginia. ♃

A acaulis, foliis pedatis septempartitis. *Gron.* pedata.
. 135.
foliis palmatis. *Gron. virg.* 1. *p.* 107.
virginiana tricolor, foliis multifidis, cauliculo
ıllo. *Pluk. alm.* 388. *t.* 114. *f.* 7.
mariana, folio digitato. *Pet. sicc.* 20.
t in Virginia. ♃

A acaulis, foliis pinnatifidis. pinnata.
alpina, folio in plures partes dissecto. *Bauh. pin.*

montana, folio multifido. *Bauh. hist.* 3. *p.* 544.
t in Sibiria & *Alpibus* Europæ.

A acaulis, foliis lanceolatis crenatis. lanceolata.
acadiensis, folio longo sinuata. *Dierv.*
t in Canada, Sibiria.
Canadensis *a D. Kalm. allata* Folia *habuit an-*
ı, longe petiolata, nervis alternis, parallelis ob-
e serrata; Sibirica *a D. Gmelino.* Folia *habuit*
ı-lanceolata, petiolis folio dimidio brevioribus, mi-
striata & Flores *majores.*

5. VIO-

primulifolia. 5. VIOLA acaulis, foliis oblongis subcordatis: p
membranaceis. *Gron. virg.* 135.
Habitat in Sibiria, Virginia.
Folia *cordata, oblonga, obtusissima, crenata*, *basi*
rentia per petiolum, omnino ut in Primula offi

hirta. 6. VIOLA acaulis, foliis cordatis piloso-hispid
svec. 718; 788. *Dalib. paris.* 269.
Viola martia hirsuta inodora. *Moris. hist.* 2. *p.*
5. *t.* 35. *f.* 4.
Viola trachelii folio. *Raj. hist.* 1051.
Viola. *Brunsf. herb.* 1. *p.* 137. *f.* 3.
Habitat in Europæ *frigidioribus nemoribus.* ♃

palustris. 7. VIOLA acaulis, foliis reniformibus. *Hall. hel*
Fl. svec. 717; 786. *Dalib. paris.* 270.
Viola foliis subrotundo-cordatis; pedunculis ra
Fl. lapp. 278.
Viola palustris rotundifolia glabra. *Moris. hist.*
4. 5. *s.* 5. *t.* 35. *f.* 5.
Habitat in Europæ *frigidioribus paludibus.* ♃

odorata. 8. VIOLA acaulis, foliis cordatis, stolonibus r
tibus.
Viola acaulis, stolonibus teretibus reptantibu
dunculis radicalibus. *Hort. cliff.* 427. *Fl. sve*
784. *Mat. med.* 410. *Hasselq. it.* 483.
Viola martia purpurea, flore simplici odoro.
pin. 119.
Viola odorata. *Renealm. spec.* 141. *t.* 140.
Viola nigra s. purpurea. *Dod. pempt.* 156. *t.* 1.
β. Viola martia alba. *Bauh. pin.* 199.
γ. Viola martia, multiplici flore. *Bauh. pin.* 199.
Habitat in Europæ *nemoribus.* ♃

* * *Caulescentes.*

canina. 9. VIOLA caule adultiore adscendente, foliis obl
cordatis.
Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis c
tis. *Hort. cliff.* 427. *Fl svec.* 716; 785. *Roy.*
430. *Gron. virg.* 182. *Hall. helv.* 501. *Dalib. pari*
Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis subradi
Fl. lapp. 277.
Viola martia inodora sylvestris. *Bauh. pin.* 199.

ola cærulea maritima inodora sylvatica, in acumine
men ferens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 543.
itat in Europæ *apricis.* ♃

OLA caulibus filiformibus indivisis prorepentibus, foliis ovatis petiolatis integerrimis glabris, stipulis indivisis pedunculo solitario, — *cenisia.*
ola foliis ovalibus integerrimis uniformibus, pedunculis caulinis. *All. pedem.* 14. *t.* 3. *f.* 4.
bitat in Cenesii *alpinis Ronche dictis.* ♃
les filiformes, perennantes, indivisi, sub terra prorepentes, summitate adscendentes, simplicissimi. Folia *ovata, minima, petiolata, glabra, ad apicem caulis conferta.* Pedunculus *solitarius, longus.* Flos *magnus, cæruleus: calcari petalis breviore.*

VIOLA caulibus erectis, foliis cordatis oblongis. — *montana.*
Fl. svec. 2. *n.* 787.
ola foliis ovato-lanceolatis, caule erecto, stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 430. *Dalib. parif.* 269.
la martia arborescens purpurea. *Bauh. pin.* 199.
la erecta, flore cæruleo & albo. *Moris. hist.* 2. *p.* 475. *s.* 5. *t.* 7. *f.* 7.
la arborescens. *Cam. epit.* 911.
itat in Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Baldo. ♃

IOLA caule fruticoso, foliis lanceolatis integerrimis. — *arborescens.*
la hispanica fruticosa longifolia. *Tournef. inst.* 421.
la hispanica fruticans. *Barr. ic.* 568.
la montana pumila angustifolia, flore inodoro. *Bauh. pin.* 199.
itat in Hispania. ♄

VIOLA caule elongato, florum nectario subulato petalis longiore, foliis oblongo-ovatis, stipulis dentatis. — *cornuta.*
ola pyrenaica longius caudata, teucrii folio. *Tournef. inst.* 421.
ola pyrenaica, folio teucrii, serotina. *Raj. suppl.* 510.
bitat in Pyrenæis.
*Dif*t *a V.* calcarata *quod huic Caulis longus, erectus; illi vero subacaulis; huic Petala oblonga foliis minora; illi rotunda foliis majora; huic folia oblongo-ovata; illi rotundato-ovata; cæterum nimis affinis.*

VIOLA *caule abbreviato,* floris nectario subulato *petalis longiore, foliis subovatis,* stipulis dentatis. — *calcarata.*

Viola

Viola alpina purpurea, exiguis foliis. *Bauh. pin.*
Viola montana cærulea grandiflora. *Tournef. inst.*
Melanium montanum. *Dalech. hist.* 1204.
β. Viola montana lutea grandiflora. *Bauh. pin.* 19
Habitat in Pyrenæis, Helveticis *alpibus.*
Quæ demit natura ex herba V. tricolore, adjecit
in hac planta.

tricolor. 15. VIOLA caule triquetro diffuso, foliis oblong
sis, stipulis dentatis. *Fl. svec.* 721; 791. *Dalib. pari*
Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis ob
pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis cr
Hort. cliff. 527.
Viola bicolor arvensis. *Bauh. pin.* 200.
Trinitatis herba. *Fuchs. hist.* 803.
Jacea altera. *Cam. epit.* 913.
β. Viola tricolor hortensis repens. *Bauh. pin.* 19
Viola tricolor. *Renealm. spec.* 144. *t.* 140.
Jacea s. Flos trinitatis. *Cam. epit.* 912.
Habitat in Europæ *cultis.* ⊙

canadensis. 16. VIOLA caule erecto, foliis cordatis acumin
Viola caulescens, foliis cordatis oblongis acum
Amæn. acad. 1. *p.* 157. *
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis *erectus, spithamæus, teretiusculus.* Foli
na, reniformi-cordata, acuminata, serrata, læv
tus pallida, petiolis folio dimidio brevioribus,
mis adhuc minoribus. Stipulæ *binæ, erectæ, l*
tæ, marcescentes. Pedunculi *ex singulis alis s*
nudi, longitudine foliorum. Flores *corollati.* D
sequenti Foliis magis mucronatis & Floribus
corollatis, Caulibus firmioribus majoribus.

mirabilis. 17. VIOLA caule triquetro, foliis reniformi-co
floribus caulinis apetalis.
Viola floribus radicalibus corollatis abortie
caulinis apetalis seminiferis. *Hort. cliff.* 427
81. * *Fl. svec.* 719; 789. *
Viola montana latifolia, flores e radice, se
cacumine ferens. *Dill. elth.* 408. *t.* 303. *f.* 390
Habitat in Germaniæ, Sveciæ, *nemoribus.* ♃
Corollæ albidæ petalo impari venis violaceis.

biflora. 18. VIOLA caule bifloro, foliis reniformibus

ola foliis reniformibus, pedunculis caulinis. *Fl. lapp.* 76. *Fl. svec.* 720; 790. *Hort. cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 31.
ola alpina rotundifolia lutea. *Bauh. pin.* 199.
ola rotundifolia montana major. *Pluk. alm.* 388. *t.* 34. *f.* 1.
la alpina rotundifolia minor lutea. *Pluk. alm.* 388. 233. *f.* 7.
la montana 1. *Oed. dan. t.* 46.
itat *in Alpibus* Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ, angliæ. ♃

IOLA caule unifloro, foliis cordatis dentatis. uniflora.
itat *in* Sibiria. ♃
lis *vix spithamæus, nudus, firmus, apice ferens* Fo-*tria, subalterna, cordata, dentata, subvillosa, pe-olis brevissimis insidentia.* Flos *unicus, pedunculo evissimo, luteus, foliis major.*

Floribus non resupinatis, Calyce postice non lobato.

IOLA caule basi ramosissimo, foliis lanceolato-earibus integerrimis distantibus, calycibus posti-æqualibus. *Fl. zeyl.* 317. * enneasperma.
a indica, flore monopetalo labiato, capsula e ro-ndo-trilaterali octosperma. *Raj. suppl.* 402.
m-parenda. *Rheed. mal.* 9. *p.* 117. *t.* 60.
tat *in* India. ♃

IOLA caule procumbente, foliis lanceolatis sub-ratis confertis, calycibus postice æqualibus. *Fl. yl.* 318. * suffruticosa.
tat *in* India. ♄

OLA caule simplici hirsuto herbaceo, foliis lan-olatis pilosis, floribus solitariis. Calceolaria.
eolaria caule simplici hirsuto, floribus axillaribus litariis. *Læfl. it.* 184. *
tat *in* Cumana. ♃

IOLA caule suffruticoso brachiato, foliis opposi-ta floribus racemosis. oppositifolia.
eolaria caule brachiato glabro, floribus racemosis. *Læfl. it.* 183. *
tat *in* Cumana. ♄

Hybanthus. 24. VIOLA arborefcens fcandens, foliis oblong... tufis glabris. *Læfl. it.* 282. * 185. *n.* 3.
Hybanthus. *Jacq. amer.* 17.
Habitat in America *meridionali.* ♄

IMPATIENS.

* *Pedunculis unifloris.*

chinenfis. 1. IMPATIENS pedunculis unifloris folitariis, ... oppofitis ovatis, nectariis arcuatis.
Habitat in China. ⊙
Caulis *alternatim ramofus, ruber.* Folia *oppofita, ... ovata, fubferrata.* Pedunculi *axillares, folitari... lio longiores, uniflori.* Flos *purpureus.* Nect... *valde arcuatum, craffum.*

latifolia. 2. IMPATIENS pedunculis unifloris folitariis, ... ovatis: ferraturis lanceolatis, nectariis flore... gioribus.
Valli-onapu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 91. *t.* 48.
Habitat in India. ⊙
Folia *lanceolata, alterna, crenata, e fingula cre... crone prominente.* Pedunculi *folitarii, uniflori, ... gitudine fere foliorum.* Flos *magnitudine* J. *Ba... næ, at Calcar fubulatum, longitudine fere ped...*

oppofitifolia 3. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, oppofitis linearibus. *Fl. zeyl.* 314. *
Kondam-pallu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 57. *t.* 31. ?
Habitat in Zeylonæ *arenofis.*

cornuta. 4. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Fl. zeyl.*
Balfamina latifolia, floris calcari longiffimo. *zeyl.* 41. *t.* 16. *f.* 1.
Habitat in Zeylona. ⊙

Balfamina. 5. IMPATIENS pedunculis unifloris fubaggr... foliis lanceolatis: fuperioribus alternis, n... flore brevioribus *Hort. upf.* 276.
Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Ho...* 428.
Lacca herba. *Rumph. amb.* 5. *p.* 274. *t.* 90.
Tilo-onapu f. Nolengu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 101.

nina femina. *Bauh. pin.* 306.
mina. *Dod. pempt.* 671.
at in India. ☉

* * *Pedunculis multifloris.*

ATIENS pedunculis trifloris solitariis, foliis an- to-lanceolatis. *Fl. zeyl.* 315. *
nina angustifolia, floribus ternis communi pe- iculo ortis. *Burm. zeyl.* 41. *t.* 16. *f.* 2.
mina erecta s. femina, persicæ angusto folio, zey- ica. *Herm. par.* 105. *t.* 105.
at in Zeylonæ paludosis.

triflora.

ATIENS pedunculis multifloris solitariis, foliis atis, geniculis caulinis tumentibus. *Fl. svec.* 722;
i. *Dalib. paris.* 270.
tiens pedunculis solitariis multifloris. *Hort. cliff.*
i. *Roy. lugdb.* 431. *Hall. helv.* 405. caule angu-
o. *Gort. gelr.* 502.
nina lutea s. Noli me tangere. *Bauh. pin.* 306.
me tangere. *Col. ecphr.* 1. *p.* 149. *t.* 150.
at in Europæ, Canadæ *nemoribus.* ♃

noli tangere

Classis XX.

GYNANDRI

DIANDRIA.

ORCHIS.

* *Floris galea calcarata.*

bicornis. 1. ORCHIS bulbis indivisis, corollæ galea bicalc labio quinquepartito. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 90.
Orchis lutea, caule geniculato. *Buxb. cent.* 3. *p.*
Habitat ad Cap. b. Spei.
Notabilis Calcari gemino, & quidem e galea, se *bello orto.*

biflora. 2. ORCHIS bulbis indivisis, corollæ galea unicalc alis patentibus, labio lanceolato acuminato. *acad.* 6. *afr.* 92.*
Habitat ad Cap. b. Spei.

cornuta. 3. ORCHIS bulbis indivisis, corollæ galea unical alis patentibus, labio minimo subovato. *Amæn* 6. *afr.* 91. *
Habitat ad Cap. b. Spei.

sancta. 4. ORCHIS bulbis indivisis? nectarii labio lanc quinquedentato; cornu incurvo, petalis con tibus.
Habitat in Palæstina.
Caulis *pedalis, maximam partem nudus, superne tus uno alterove foliolo acuto.* Racemus *laxus* E *lanceolatis, longitudine germinis.* Petala *acu tria, confluentia in galeam oblongam apice d* Labium *lato-lanceolatum, divisum in dentes* 5 *intermediis sensim longioribus.*

* * *Bulbis indivisis.*

susannæ. 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii alis amplioril liatis.
Orchis amboinensis, floribus albis fimbriatis. *parad.* 209. *t.* 209. *Rai. suppl.* 588.
Flos susannæ. Rumph. amb. 5. p. 286. t. 287
Habitat in Amboina.

ORCHIS bulbis indivisis? nectarii labio tripartito: lateralibus setaceis, cornu filiformi petalis decuplo longiore. *Amaen. acad.* 5. *p.* 408. * habenaria.

Satyrium erectum, foliis oblongis, petiolis vaginatis amplexicaulibus, spica terminali, nectariis longissimis. *Brown. jam.* 324.

Habitat in Jamaica.

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato ciliato, cornu longissimo. *Act. upf.* 1741. *p.* 6. *Gron. virg.* 136. * ciliaris.

Orchis nectarii labio lanceolato ciliato, seta germine intorto longiore. *Roy. lugdb.* 15.

Orchis palmata elegans lutea americana, cum longis calcaribus luteis. *Moris. hist.* 3. *p.* 499.

Orchis marilandica grandis & procera, floribus luteis, calcari longissimo: lobulo fimbriato. *Raj. suppl.* 588.

Habitat in Virginia, Canada. ♃

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus. *Act. upf.* 1740. *p.* 5. *Fl. svec.* 723; 793. *Dalib. paris.* 273. *Mat. med.* 411. bifolia.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. paris.* 151. *t.* 30. *f.* 7. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 10.

Testiculi species V. *Cam epit.* 625.

Orchis trifolia minor. *Bauh. pin.* 83.

Orchis bifolia altera. *Bauh. pin.* 82.

Orchis bifolia latissima. *Bauh. pin.* 82.

Habitat in Europae *pascuis asperis.* ♃

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus, scapo flexuoso. *Amaen. acad.* 5. *afr.* 89. * flexuosa.

Habitat ad Cap. b Spei.

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio indiviso ampliato emarginato crenato: cornu subulato, petalis conniventibus. papilionacea.

Orchis papilionem expansum referens. *Bauh. pin.* 83?

Habitat in Hispania. *Alstraemer.*

Statura O. militaris & flos fere ejusdem, sed Labium *maximum, magnitudine totius unguis pollicis, latius quam longum, retusum s. emarginatum, indivisum, denticulatum, uti flos purpurascens.*

cullata. 11. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido, petalis confluentibus, caule nudo.
Orchis radice rotunda, cucullo tridentato. *Gmel. sib.* 1. *p.* 16. *t.* 3. *f.* 2.
Habitat in Sibiria. ♃
Folia *radicalia ovata, bina.*

ramidalis 12. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido aequali integerrimo: cornu longo, petalis sublanceolatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 798.* *Jacq. vind.* 292.*
Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido antice bidentato: cornu longo, petalis acuminatis. *Act. upf.* 1740 *p.* 7.
Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. *Hort. cliff.* 429.
Orchis purpurea, spica congesta pyramidali. *Raj. angl.* 3. *p.* 377. *t.* 18. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 11.
Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata. *Bauh. pin.* 81. *prodr.* 28.
β. Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, altera. *Bauh. pin.* 81.
γ. Cynosorchis latifolia, spica compacta. *Bauh. pin.* 81.
Habitat in Helvetiae, Belgii, Angliae, Galliae *arenosis, cretaceis.* ♃

bosa. 13. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido medio trilobo: cornu brevi, petalis apice subulatis. *Jacq. vind.* 292.*
Orchis radicibus conicis, spica brevi densa, petalis caudatis. *Hall. helv.* 265. *opusc.* 226.
Orchis flore globoso. *Bauh. pin.* 81.
Habitat in Helvetia.

iophora. 14. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Act. upf* 1740. *p.* 8. *Dalib. paris.* 272. *Gouan. monsp.* 469.
Orchis bulbis indivisis, labello trifido punctato: lacinula media longiore, cornu germinibus breviore. *Sauv. monsp.* 23.
Orchis odore hirci minor. *Bauh. pin.* 82. *Vaill. paris.* 149. *t.* 31. *f.* 30. 31. 32. *Hall. it. herc.* 7.
Tragorchis minor, flore fuliginoso. Raj. hist. 1213.
Tragorchis minor & verior gemmae. Lob. ic. 177.

β. Or-

Orchis odore hirci minor, ſpica purpuraſcente. *Bauh. pin.* 82.
Habitat in Europæ *auſtralioris*, Orientis *paſcuis.* ♃

5. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio trifido filiformi: intermedia ovata: cornu germinibus breviore. *Fl. zeyl.* 320. * — **cubitalis.**
Habitat in Zeylona. ♃

6. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo, petalis omnibus conniventibus. *Act. upſ.* 1740. *p.* 8. *Mat. med.* 412. *Fl. ſvec.* 724; 794. *Dalib. pariſ.* 273. — **Morio.**
Orchis radicibus ſubrotundis, nectarii labio quadrifido æquali crenulato: cornu obtuſo. *Roy. lugdb.* 15.
Orchis morio femina. *Bauh. pin.* 82. *Vaill. pariſ. t.* 31. *f.* 13. 14. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 7.
Triorchis ſerapias mas. *Fuchſ. hiſt.* 559.
Habitat in Europæ *ſylvis aſperis.* ♃

7. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 795. * — **maſcula.**
Orchis morio mas, foliis (non) maculatis. *Bauh. pin.* 81. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 191. *f.* 1. *Vaill. pariſ.* 151. *t.* 31. *f.* 12. *It. gotl.* 171. *
Teſticulus IV. *Cam. epit.* 624.
Orchis foliis ſeſſilibus non maculatis. *Bauh. pin.* 82.
Habitat in Europæ *lucis.* ♃

8. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *Act. upſ.* 1741. *p.* 11. *Fl. ſvec.* 726; 797. *It. æl.* 45. * *Dalib. pariſ.* 272. — **uſtulata.**
Orchis militaris pratenſis humilior. T. *Vaill. pariſ.* 149. *t.* 31. *f.* 35. 36. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 4.
Orchis pannonica IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 268.
Cynoſorchis militaris pratenſis humilior. *Bauh. pin.* 81.
Habitat in Europæ *temperatæ pratis.* ♃

9. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quinquefido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis confluentibus. *Act. upſ.* 1740. *p.* 11. *Fl. ſvec.* 725, 798. *It. æl.* 45. * *Dalib. pariſ.* 271. — **militaris.**
Orchis galea & alis cinereis. *Bauh. hiſt.* 2. p. 755.

Orchis mas latifolia. *Fuchs. hist.* 554.
Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. *Bauh. pin.* 80.
β. Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante. *J B. Raj. angl.* 3. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 2.
γ. Orchis latifolia, hiante cucullo minor. *T. Vaill. paris.* *t.* 31 *f.* 22. 23. 24.
Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. *Bauh. pin.* 81.
δ. Orchis militaris major. *Tournef. inst.* 438. *t.* 247. *Vaill. paris.* 148. *t.* 31. *f.* 21. 27. 28. *Segu. ver.* 2. *p.* 122. *t.* 11. *f.* 2
Cynosorchis militaris major. *Bauh. pin.* 81.
ε. Orchis flore simium referens. *Bauh. pin.* 82.
Orchis zoophora cercopithecum exprimens oreades. *Col. ecphr* 1. *p.* 320.
Habitat in Europæ *temperatæ pratis.* ♃

…mannia-na. 20. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio multipartito lineari, folio cordato amplexicauli, scapo unifloro. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 88. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

*** *Bulbis palmatis.*

…ifolia. 21. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Act. upf.* 1740. *p.* 15. *Fl. svec.* 728; 801. *It. œl.* 48. * *Dalib. paris.* 274.
Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. *Hort. cliff.* 429.
Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus. *Bauh. pin.* 85. *Vaill. paris.* *t.* 31. *f.* 1. 2. 3. 4 5.
β. Orchis palmata palustris latifolia. *Bauh. pin.* 86.
γ. Orchis palmata montana altera. *Bauh. pin.* 86.
δ. Orchis palmata palustris maculata. *Bauh. pin.* 86.
Habitat in Europæ *pratis.* ♃
Petala 2 *lateralia sursum flexa; tria vero conniventia.* Nectarii *labium lateribus reflexum.* Caulis *fistulosus.*

…mbucina. 22. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio ovato subtrilobo, bracteis longitudine florum. *Fl. svec.* 2. *n.* 803. *
Orchis palmata, sambuci odore. *Bauh. pin.* 86. *Rudb. elys.* 2. *p.* 213. *f.* 9.

Orchis

Orchis pannonica VIII. *Cluf. hift.* 1. *p.* 269.
Habitat in Europa.
Variat Floribus albis & rubris.

ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu conico: labio obfolete trilobo ferrato, petalis dorfalibus reflexis. *Fl. fvec.* 2. *n.* 802. * — **incarnata.**
Orchis palmata lutea, floris labio maculato. *Segu. ver.* 3. *p.* 349 *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Europa. ♃

ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorfalibus patulis. *Act. upf.* 1740. *p.* 14. *Fl. fvec.* 729; 800. *It. œl.* 48. * *Dalib. parif.* 274. — **maculata.**
Orchis palmata pratenfis maculata. *Bauh. pin.* 85.
Orchis palmata montana maculata. *Bauh. pin.* 86. *Vaill. parif. t.* 31. *f.* 9. 10.
Satyrium bafilicum femina. *Dod. pempt.* 240.
Habitat in Europæ *pratis fucculentis.* ♃
Petala 3 *exteriora erecta; 2 interiora conniventia.* Nectarii *labium trifidum, planum: lobis lateralibus majoribus crenatis: intermedio anguftiffimo, integerrimo.*

ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo; labio ovato acuto, foliis linearibus. *Gouan. monfp.* 471. — **odoratiffima.**
Orchis palmata anguftifolia minor odoratiffima. *Bauh. pin.* 86. *prodr.* 30. *t.* 30. *Raj. hift.* 1225. *Segu. ver.* 3. *p.* 250. *t.* 8 *f.* 6
Habitat in Italia, Gallia, Germania, *rariffima in* Svecia.

ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu fetaceo germinibus longiore: labio trifido; petalis duobus patentiffimis. *Act. upf.* 1740. *p.* 13. *Fl. fvec.* 727; 799. * *Dalib. parif.* 275. *It. œl.* 46. * — **conopfea.**
Orchis radicibus palmatis, bracteis longitudine floris, nectarii labio trifido, feta germinibus longiore. *Hort. cliff.* 429
Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Bauh. pin.* 85. *Vaill. parif. t.* 30. *f.* 8. 8. *Rudb. elyf.* 2. *p.* 212. *f.* 5.
Satyrium bafilicum mas. *Fuchf. hift.* 712.
Orchis palmata anguftifolia minor. *Bauh.* pin. 85.

γ. Orchis palmata pratensis maxima. *Bauh. pin.*
Habitat in Europæ *pratis montosis.* ♃
Labium *æquale trifidum integerrimum.* Petala *exteriora lateralia patentissima; reliqua conniv... galeam.*

lava. 27. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu fili... longitudine germinis, labio trifido integ... *Gron. virg.* 137.
Orchis palmata elegans lutea virginiana cum ... calcaribus luteis. *Moris. hist.* 3. *p.* 499.
Habitat in Virginia. ♃
Folia *inferiora palmaria, lanceolata, magna.* Spica ... *gusta;* Flores *obsolete lutei.*

* * * * *Bulbis fasciculatis.*

fuscescens. 28. ORCHIS bulbis fasciculatis, nectarii cornu lo... dine germinis, labio ovato basi dentato.
Orchis radicibus multis, labello quasi alato, c... germinis longitudine. *Gmel. sib.* 1. *p.* 20. *t.* 4...
Habitat in Sibiria. ♃

strateumatica. 29. ORCHIS bulbis fasciculatis, nectarii labio b... integerrimo, cornu longitudine germinis. *Fl.* ... 319. *.
Habitat in Zeylona. ♃

abortiva. 30. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectar... bio ovato integerrimo. *Act. upf.* 1740. *p.* 17. *D... parif.* 275. *Gouan. monsp.* 471.
Orchis radicibus cylindricis, bracteis flore brev... bus, labello trifido obtuso, seta germinibus bre... re. *Sauv. monsp.* 23.
Orchis abortiva violacea. *Bauh. pin.* 86.
Limodorum. *Hall. opusc.* 212.
Habitat in Galliæ, Helvetiæ, Angliæ, Italiæ, *f... umbrosis.* ♃

* * * * *

psycodes. 31. ORCHIS nectarii cornu setaceo longitudine ge... nis: labio tripartito ciliari. *Gron. virg.* 137.
Orchis marilandica, spica brevi conferta, flo... parvis: calcaribus longissimis. *Raj. suppl.* 58...
Orchis floribus aureis, spica habitiore congestis, ... cteis longitudine floris, labio inferiore nectarii ... briato capillaceo. Gron. virg. 1. p. 184.
Hab...

at in Canada. *Kalm.*
us *Orchidis maculatæ.* Caulis *foliis linearibus, minatis, sparsis.* Spica *longa, densa.* Corollæ *ala* 5, *conniventia: quorum tria exteriora ovata: interiora oblonga, subciliata.* Labium *reflexum, artitum: laciniis basi angustissimis, cuneiformibus, e ciliatis.*

CHIS nectarii cornu longitudine germinis, labio ali emarginato, caule aphyllo, foliis ovalibus. **spectabilis.**
s foliis radicalibus binis ovalibus, galea tripeta- nectarii labio ovato integerrimo. *Gron. virg.* 136.
s flore pulcherrimo magno speciosō, nectarii ga- saturate cærulea, calcari niveo, foliis amplis ob- go-ovatis saturate viridibus. *Clayt.*
s foliis inferioribus ovatis: superioribus ovato- ongis, floribus ex alis superioribus. *Gron. virg.*). 109.
at in Virginia. *D. Gronovius.*
radicalia bina, ovalia, petiolata, obtusa, longitu- fere plantæ. Caulis *nudus.* Spica *ex* 5. 6. *flo- is.* Bracteæ *lanceolato-ovales, longitudine germi-* *Florum* petala 2 *exteriora patula, viridia;* 3. *niventia teneriora.* Labium *ovale, emarginatum: ibus divaricatis.*

SATYRIUM.

YRIUM bulbis indivisis, foliis lanceolatis, ne- **hircinum.**
ii labio trifido: intermedia lineari elongata obli- præmorsa. *Act. upf.* 1740. *t.* 18. *Dalib. parif.* . *Gouan. monsp.* 471.
s barbata fœtida. *Bauh. hist.* 2. *p.* 756. *Vaill. pa- t.* 30. *f.* 6. *Segu. ver. t.* 15. *f:* 1.
s barbata, odore hirci, breviore latioreque fo- *Bauh. pin.* 20. *Moris. hist.* 3. *p.* 491. *f.* 12. *t. f.* 9.
at in Galliæ, Cantii *campestribus.* ♃

YRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtu- **viride.**
nectarii labio lineari trifido: intermedia obsole- *Act. upf.* 1740. *p.* 18. *Fl. svec.* 730; 804. *Dalib. f.* 276.
ium foliis oblongis caulinis. *Fl. lapp.* 313.
palmata, flore viridi. Bauh. pin. 86. prodr. 30.

Orchis palmata, flore galericulato dilute viridi *pruss.* 182. *t.* 56.

β. Orchis palmata batractites. *Bauh. pin.* 86. *Vai* 153. *t.* 31. *f.* 6. 7. 8.

Habitat in Europæ *frigidioris asperis.* ♃

nigrum. 3. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis linearib ribus resupinatis, nectarii labio indiviso ov minato. *Act. upf* 1740. *p.* 19. *Fl. svec.* 7 *Jacq. vind.* 293.

Satyrium foliis linearibus. *Roy. prodr.* 14.

Orchis palmata angustifolia alpina, nigro flor *pin.* 86.

Palma christi minor. *Cam. epit.* 627.

Palmata angustifolia, flore supinato, calcare mo. *Hall. opusc.* 228.

Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis. 2

albidum. 4. SATYRIUM bulbis fasciculatis, foliis lan nectarii labio trifido acuto: lacinia interm tusa. *Act. upf.* 1740. *p.* 19. *Fl. svec.* 7 *Jacq. vind.* 294.

Satyrium scanense. *It. scan.* 153.*

Orchis palmata alpina, spica densa albo-virid *opusc.* 149.

Pseudo Orchis alpina, flore herbaceo. *Mich.* *t* 26.

Limodorum montanum, flore albo dilute vi *Chom. act. paris.* 1705. *p.* 517.

Habitat in Scaniæ, Germaniæ, Helvetiæ, . *pratis sylvaticis.* ♃

Epipogium 5. SATYRIUM bulbis compressis dentatis, c ginato, corollis resupinatis, nectarii lab indiviso. *Jacq. vind.* 164.

Epipogium. *Gmel. sib.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 2.

Habitat in Sibiriæ, Austriæ *sterilissimis umbrosis.*

plantagineum. 6. SATYRIUM bulbis subfibrosis, foliis cauli tis petiolatis vaginantibus, nectarii labio *Amœn. acad.* 5. *p.* 408. *

Orchis elatior latifolia, asphodeli radice, spic sa. *Sloan. jam* 119. *hist.* 1. *p.* 250. *t.* 147. *f.*

Helleborine foliis liliaceis, radice asphodeli *Plum. spec.* 9. *ic.* 190.

a erectum minus, asphodeli radice, foliis ob-
ovatis radicalibus, scapo assurgente. *Brown.*
24.
s America.

IUM bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, repens.
s secundis. *Act. upf.* 1740. *p.* 20. *Fl. svec.*
707. *Dalib. paris.* 278.
foliis ovatis radicalibus. *Fl. lapp.* 314.
iinor, flosculis albis, f. radice repente. *Cam.*
11. *t.* 35.
rchis. *Bauh. pin.* 84.
ngustifolia polyanthos, radice geniculata. *Læs.*
210. *t.* 68.
s foliis ovatis radicalibus. *Gmel. fib.* 1. *p.* 13.
adice repente, foliis maculis nigris & albis
fis, *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 4. 5.
n Sveciæ, Angliæ, Sibiriæ, Helvetiæ *sylvis.* ♃

IUM bulbis - - - nectarii labio longitudine capense.
rum latiore obtuso emarginato utrinque uni-
o. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 93. *
d Cap. b. Spei.

O P H R Y S.

* *Bulbis ramosis.*

S bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, Nidus avis
ii labio bifido.
bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. *Act.*
740. *p.* 33. *Fl. svec.* 742; 815. *Dalib. paris.*

bortiva fusca. *Bauh. pin.* 86.
vis. *Lob. ic.* 195.
s Sveciæ, Germaniæ, Galliæ *nemoribus.*

S bulbis ramosis flexuosis, caule vaginato, Corallo-
ii labio trifido. rhiza.
bulbis reticulatis, nectario labio trifido. *Act.*
740. *p.* 34 *Fl. svec.* 743; 816.
radice reticulata. *Fl. lapp.* 315.
he radice coralloide. *Bauh. pin.* 88.
he sueonum radice coralloide, flore albo.
elys. 2. *p.* 234. *f.* 16.
he *spuria f. Corallorhiza. Rupp. jen.* 284. t. 2.

Oro-

Orobanche radice coralloide ruberrima. *M*
t. 9. *f*. 1.
Habitat in Europæ *borealis desertis*. ♃
Conf. Orobanche virginiana. *Pluk. phyt*. 211.

spiralis. 3. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule
so, floribus secundis, nectarii labio indivi
to. *Act upſ*. 1740. *p*. 32. *Dalib. pariſ*. 27
Triorchis alba odorata minor. *Bauh. pin*. 84
Satyrium odoriferum *Brunſf. herb*. 1. *p*. 105
Testiculus odoratus. *Lob. ic*. 186.
β. Triorchis s. Tetrorchis alba odorata major.
84.
γ. Orchiastrum æstivum palustre album odorat
gen. 30. *t*. 26.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ *graminosis*

cernua. 4. OPHRYS bulbis fasciculatis, caule folioso
cernuis, nectarii labio oblongo integro ac
Habitat in Virginia, Canada.
Radix *fibris plurimis, crassis*. Folia *radical*
ria, longa: Caulina *vaginantia, brevissim*
densa, oblonga. Flores *arcte recurvati, co*
rollæ *parvæ petalis superioribus confluentib*
inferiore oblongo, acuto, integro.

ovata. 5. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foli
nectarii labio bifido.
Ophrys foliis ovatis. *Hort. cliff*. 429. *Act*.
p. 28. *Fl. ſvec*. 738; 808. *Roy. lugdb*. 15.
277. *Gmel. ſib*. 1. *p*. 25. *Dalib. pariſ*. 278.
Ophrys bifolia. *Bauh. pin*. 87.
Ophrys. *Fuchſ. hiſt*. 565.
β. Ophrys trifolia *Bauh pin*. 87.
Habitat in Europæ *ſubhumidis pratis*. ♃

cordata. 6. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, fo
datis.
Ophrys foliis cordatis. *Fl. lapp*. 247. *Fl. ſ*
809. *Act. upſ*. 1740. *p*. 29. *Gmel. ſib*. 1. *p*.
Ophrys minima. *Bauh. pin*. 87. *prodr*. 31.
Bifolium minimum. *Bauh. hiſt*. 3. *p*. 534.
β. Ophrys minima, floribus purpureo-croceis.
pug. t. 9. *f*. 2.
Habitat in Europæ *frigidæ ſylvis humentibus*.

* * *Bulbis rotundis.*

[illegible]RYS bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lan-[illegible]latis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus [illegible]ribus. *Fl. svec.* 2. *n.* 811. *Gron. virg.* 138. — lilifolia.

[illegible]s scapo nudo, foliis radicalibus ovato-oblongis [illegible]dii scapi longitudine. *Gron. virg.* 1. *p.* 185.

[illegible]s radicibus ovatis tunicatis, scapo nudo. *Hort.* [illegible] 429. (vix memini)?

[illegible]at *in* Virginiæ, Canadæ, Sveciæ *paludibus.* ♃

[illegible] virginica *sexies major nostrate, at structura ea-*[illegible], *notabilis flore petalis exterioribus linearibus.*

[illegible]RYS bulbo subrotundo: scapo nudo trigono, [illegible]ario labello ovato. — Lœselii.

[illegible]s diphyllos bulbosa. *Læs. pruss.* 180. *t.* 58.

[illegible]at *in* Sveciæ, Borussiæ *paludibus.*

[illegible] *bulbus adscendens ramo.* Folia *lanceolata, bina,* [illegible]*itudine fere scapi.* Scapus *nudus, superne tri-*[illegible]*ter.* Petala *angusta, reflexa.* Nectarii *labium* [illegible]*tum, magnum respectu reliquorum.* Flores *in sca-*[illegible]5 *ad* 8, *nec ultra.*

[illegible]RYS bulbo subrotundo, scapo subnudo pentago-[illegible], foliorum apicibus scabris, nectario labio inte-[illegible]. — paludosa.

[illegible]s minima bulbosa. *Raj. suppl.* 587.

[illegible]s bifolia minor palustris. *Pluk. alm.* 270. *t.* 247.

[illegible]m palustre. *Raj. angl.* 3. *p.* 385.

[illegible]at *in* Sveciæ *paludibus turfosis. Bergius.*

[illegible]us *ovatus, incurvus, infra radicatus.* Scapus *pen-*[illegible]*gonus, maxima parte nudus.* Folia *radicalia* 3. *s.* [illegible] *spathulata, alterna, apice præsertim in pagina in-*[illegible]*riore scabra, in exteriore breviora.* Flores *in ra-*[illegible]*mo plurimi, virides, flavescentes.* Petala 2 *latera-*[illegible] *ovato-oblonga, reflexo-erecta.* 2. interiora *late-*[illegible]*lia linearia, recurva;* 1 *supremum rectum, forni-*[illegible] *staminum formans.* Labium *nectarii lanceolato-*[illegible]*tum, reflexum, integrum.* Bulbi *cohærent deor-*[illegible] *quasi catenatim ramulo interstincti. Differt ab* [illegible] *Læselii floribus pluribus & labio floris angusto;* [illegible] *O. monophyllo foliis non ovatis apice scabris, pe-*[illegible]*cellis non capillaceis.*

10. O.

monophyllos. 10. OPHRYS bulbo rotundo, scapo nudo, fol[...] to, nectarii labio integro.
Ophrys monophyllos bulbosa. *Læs. pruss.* 1[...]
Monochris ophioglossoides. *Mentz. pug. t.* [...]
Pseudo Ochris monophyllos. *Clus. hist.* 1. *p.* [...]
Habitat in Borussiæ, Medelpadiæ *paludibus* [...]*cis.* ♃

Monorchis. 11. OPHRYS bulbo globoso, scapo nudo, nect[...] trifido cruciato.
Herminium bulbo supra radiato, nectarii labi[...] *Fl. svec.* 740. 810. *Act. upf.* 1740. *p.* 29.
Herminium radice globosa. *Fl. lapp.* 317.
Orchis radice subrotunda, labello hastato. [...] 1. *p.* 18. *t.* 4. *f.* 1.
Orchis odorata moschata s. monorchis. *Bau*[...]
Orchis trifolia, floribus spicatis herbaceis. [...] 2. *p.* 131. *t.* 16.
Orchis coleo unico s. Monorchis flosculis p[...]ridibus. *Læs. pruss.* 184. *t.* 61.
Monorchis. *Mich. gen.* 30. *t.* 26. *Rupp. jen.*
β. Orchis lutea, hirsuto folio. *Bauh. pin.* 84.
γ. Triorchis lutea, folio glabro. *Bauh. pin.* 84
δ. Triorchis lutea altera. *Bauh. pin.* 84.
ε. Monorchis bifolia, flore pallide virente, [...] *Mentz. pug. t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Europæ *pratis uliginosis.*

alpina. 12. OPHRYS bulbis ovatis, scapo nudo, folii[...]tis, nectarii labio indiviso obtuso utrinqu[...]tato. *Fl. svec.* 2. *n.* 817. *Jacq. vind.* 295.
ChamæOrchis alpina, folio gramineo. *Bau*[...] *prodr.* 29.
Orchis radicibus subrotundis, calcare nullo, [...]gis & perangustis. *Hall. helv.* 269.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃
Radix *Bulbis duobus, subrotundis (nec uno* [...]*dicato, ut præcedentes tres), supra radicati* [...] *radicalia sæpius* 4, *filiformia, subulata, pol*[...]*ga.* Caulis *nudus, longitudine foliorum.* [...]*ribus* 4. *s.* 5. *alternis.* Petala 5, *conniven*[...] *ovato-oblonga, integra, vix petalis longior*[...] næ 2 *obvestiunt basin plantæ & includunt* [...] *scapo inferne.*

13. OP

RYS bulbis - - - - scapo filiformi vaginato, camtschatca.
mo laxo, nectarii labio lineari bifido.
a nectarii labio bifido lineari. *Amœn. acad.* 2. *p.*
t. 4. *f.* 24. *
in Sibiria.
RYS bulbis subrotundis, scapo folioso, necta- anthropophora.
ıbio lineari tripartito: medio elongato bifido.
a bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido,
upʃ. 1740. *p.* 32. *Dalib. pariʃ.* 277.
, flore nudi hominis effigiem repreſentans, fe-
. *Bauh. pin.* 82. *Vaill. pariʃ.* 147. *t.* 31. *f.* 19; 20.
antropophora oreades. *Col. ecphr.* 1. *p.* 320.
t in Italia, Luſitania, Gallia.
RYS bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii inſectifera.
o ſubquinquelobo. *Gouan. monſp.* 473.
ɔedium bulbis ſubrotundis, foliis oblongis cau-
. *Act. upʃ.* 1740. *p.* 26. *Fl. ſvec.* 737; 818. *It.*
44; 121.
muſcæ corpus referens minor, galea & alis myodes.
ɔidis. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. pariʃ.* 147. *t.* 31. *f.* 17. 18.
myodes prima, floribus muſcam exprimens.
. *ic.*
s muſcam referens major. *Bauh. pin.* 83.
s muſcam referens lutea. *Bauh. pin.* 83.
s muſcam cæruleam majorem repræſentans.
yn. Moriʃ. hiʃt. 3. *p.* 494. *ʃ.* 12. *t.* 13. *f.* 11.
myodes lutea luſitanica. *Breyn. cent.* 75. *Moriʃ.*
3. *p.* 495. *ʃ.* 12. *t.* 13. *f.* 15.
s myodes fuſca luſitanica. *Breyn. cent.* 41.
s araneum referens. *Bauh. pin.* 84. *Tournef. inʃt.* adrachnites.
t. 247. *f.* C. *Vaill. pariʃ.* *t.* 30. *f.* 10. 11. 12. 13.
s adrachnitis. *Lob. ic.* 135.
is fucum referens: colore rubiginoſo. *Bauh. pin.*
Vaill. pariʃ. 146. *t.* 31. *f.* 15. 16.
s fucum referens major, foliolis ſuperioribus
didis & purpuraſcentibus. *Bauh. pin.* 83. *Vaill.*
iʃ. 146. *t.* 30. *f.* 9.
s fucum referens, flore ſubvirente. *Bauh. pin.*

s ſcarabæum referens. *Breyn. Moriʃ. hiʃt.* 3. *p.*
ʃ. 12. *t.* 13. *f.* 10.
s cercopithecum epxrimens luſitanica. *Breyn.*
riʃ. hiʃt. 3. *p.* 494. *ʃ.* 12. *t.* 13. *f.* 4.

Habi-

Habitat in Europa *temperatiori.* ♃
Varietates Myodes *α.* & Arachnites *β. fugitivi inspicienti diversissimæ adparent, qui vero has cum congeneribus, omnesque varietates simul in primam originem ex una facile perspiciet, u tes distinguendas obtinebit, quamvis constante stant.*

catholica. 16. OPHRYS bulbis fibrosis, scapo folioso, flori petalis: galea ventricosa magna: labello c *Amæn. acad.* 6. *afr.* 94. *
Orchidi affinis, flore luteo. *Buxb. cent.* 3. *p.* 1
Habitat ad Cap. b. Spei.

circumflexa. 17. OPHRYS bulbis indivisis, floribus tripetal emarginatis, labio trifido: lateralibus circum *Amæn. acad.* 6. *afr.* 95. *
Orchis barba carens, flore luteo viridi. *Bux* 3. *p.* 8. *t.* 13.
Habitat ad Cap. b. Spei.

caffra. 18. OPHRYS bulbis - - - - nectarii labio reniformi tissimo emarginato. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 96.
Habitat ad Cap. b. Spei.

SERAPIAS.

Helleborine 1. SERAPIAS bulbis fibrosis, floribus erectis brevioribus.
Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso petalis breviore. *Act. upſ.* 1740. *p.* 21. *Fl. ſve* 819. *It. æl.* 144. *It. gotl.* 225. 197. 230. *D riſ.* 276.

latifolia. *α.* Serapias caule multifolio multifloro. *Hort. cli Gmel. ſib.* 1. *p.* 8.
Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186.
Epipactis s. Helleborine. *Cam. epit.* 889.
β. Helleborine flore carneo. *Bauh. pin.* 187.
Habitat in Europæ *asperis.* ♃

Lingua. 2. SERAPIAS bulbis subrotundis, nectarii labio acuminato petalis longiore glabro. *Act. upſ p.* 23.
Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso petalo: labello ovato-lanceolato. *Sauv. monſ*

O

his montana italica, flore ferrugineo; lingua oblon-
a. *Bauh. pin.* 84. *prodr.* 29.
his montana italica, lingua oblonga altera. *Bauh.*
n. 84.
his macrophylla. *Col. ecphr.* 2. *p.* 321. *t.* 322.
itat in Italia, Lusitania, Gallia. ♃

RAPIAS bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato maximo basi barbato. cordigera.
his montana italica lingua trifida. *Rudb. elys.* 2. *p.*
04. *f.* 20.
itat in Hispania, Italia, Oriente.
lis S. Linguæ, sed major. Nectarii *labium subcor-*
tum, basi media barbatum, lateribus utrinque auri-
la erecta obtusa.

RAPIAS bulbis fibrosis, floribus erectis bractea longioribus. longifolia.
pias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso brevi-
re, foliis ensiformibus. *It. œl.* 144.
leborine angustifolia palustris s. pratensis. *Bauh. pin.*
7.
leborine palustris s. pratensis nostras. *Raj. hist.* 1231.
lorif. hist. 3. *p.* 487.
leborine flore albo s. Damasonium montanum la-
folium. *Bauh. pin.* 187.
leborine montana angustifolia spicata. *Bauh. pin.*
7.
eborine montana angustifolia purpurascens. *Bauh.*
n. 187.
itat in Europa
is maxime S. Helleborinæ, sed huic petala lanceo-
ta: nec ovata. Spica ante florescentiam nutans:
rolla major coloratior. Bracteæ flore longiores; illi
ro exceptis sibiricis, vix ac ne vix.

LIMODORUM.

IODORUM. *Roy. lugdb.* 16. *Gron. virg.* 138. tuberosum.
ᴚ. upſ. 1740. *p.* 21.
eborine americana, radice tuberosa, foliis longis
gustis, caule nudo, floribus ex rubro pallide pur-
rascentibus. *Mart. cent.* 50. *t.* 50. *Mill. dict. t.* 145.
eborine radice arundinacea, foliis amplissimis ly-
is. *Plum. spec.* 9. *ic.* 189.

 Habi-

Habitat in America *septentrionali.* ♃
Plumierii species americæ australis plurimas non vidi.

ARETHUSA.

bulbosa. 1. ARETHUSA radice globosa, scapo vaginato tha diphylla. *Amœn. acad.* 3. *p.* 15.
Arethusa. *Gron. virg.* 184; 184.
Serapias bulbis subrotundis, caule unifloro. *A* 1740. *p.* 24.
Orchidi affinis aquatica verna exigua. *Gron. vir*
Helleborine mariana monanthos, flore longo rascente liliaceo. *Pluk. mant.* 100. *t.* 348. *f.*
Habitat in Virginiæ, Canadæ *aquosis.* ♃

ophioglossoides. 2. ARETHUSA radice fibrosa, scapi folio ovali lo spathaceo lanceolato. *Gron. virg.* 139.
Cypripedium folio caulino ovato-oblongo, t li lanceolato plano. *Hort. cliff.* 430. *Gro* 1. *p.* 110.
Helleborine virginiana, ophioglossi folio. *Pl* 182. *t.* 93. *f.* 2.
Helleborine virginiana diphylla. *Morif. hist.* 3. *f.* 12. *t.* 11. *f.* 15. *mala.*
Habitat in Virginiæ, Canadæ *aquosis.* ♃

divaricata. 3. ARETHUSA radice subpalmata, scapi folio que spathaceo lanceolatis, petalis exteriori scendentibus. *Gron. virg.* 139.
Serapias radicibus palmato-fibrosis, caule u *Gron. virg.* 1. *p.* 184.
Helleborine lilii folio caulem ambiente, flor hexapetalo: tribus petalis longis angustis purpureis, cæteris brevioribus rosaceis. *Cat* 1. *p.* 58. *t.* 58.
Habitat in Americæ *borealis paludosis.* ♃

capensis. 4. ARETHUSA radice carnosa, scapo foliato, exterioribus longioribus caudatis. *Amœn.* *afr.* 97. *
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

CYPRIPEDIUM.

Calceolus. 1. CYPRIPEDIUM radicibus fibrosis, foliis ov ceolatis caulinis. *Act. upf.* 1740. *p.* 24. *Fl. sv* 820.

›ripedium foliis ovato-lanceolatis. *Fl. lapp.* 318.
ron. virg. 135.
:eolus foliis ovato-lanceolatis. *Gmel. sib.* 1. *p.* 2.
1.
:eolus marianus. *Dod. pempt.* 180. *f.* 1. 2.
.eborine flore rotundo s. Calceolus. *Bauh. pin.*
37.
.leborine Calceolus dicta mariana, caule folioso,
›re luteo minore. *Pluk. mant.* 101. *t.* 418. *f.* 2.
eborine virginiana s. Calceolus flore luteo majo-
. *Moris. hist.* 3. *p.* 488. *f.* 12. *t.* 11. *f.* 15.
ceolus marianus canadensis. *Corn. canad.* 204.
eborine flore majore purpureo. *Moris. hist.* 3. *p.*
8. *s.* 12. *t.* 11. *f.* 17.
:eolus minor, flore vario. *Amm. ruth.* 133. *t.* 22.
eolus foliis ovatis binis. *Gmel. sib.* 1. *p.* 5.
tat in Europae, Asiae, Americae *septentrionalibus.*

PRIPEDIUM bulbo subrotundo, folio subro- bulbosum
ndo radicali. *Act. upf.* 1740. *p.* 25. *Fl. svec.* 736;
1.
:ipedium folio subrotundo. *Fl. lapp.* 319. *t.* 12. *f.* 5.
pias scapo unifloro. *Gmel. sib.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 5.
is lapponensis monofolia. *Rudb. elys.* 2. *p.* 209.
10.
:at in Lapponia, Russia, Sibiria. ♃

EPIDENDRUM.

* *Scandentes.*

DENDRUM scandens, foliis ovato-oblongis Vanilla.
rvosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. *Roy.*
db. 13. *Act. upf.* 1740. *p.* 13. *Mat. med.* 418.
endrum scandens, foliis elliptico-ovatis nitidissi-
s subsessilibus, inferioribus claviculis jugatis, su-
rioribus oppositis. *Brown. jam.* 326.
lla flore viridi & albo, fructu nigricante. *Plum.*
. 25. *ic.* 188.
llas piperis arbori jamaicensis innascens. *Pluk. alm.*
. *t.* 320. *f.* 4.
.le. *Merian. surin.* 25. *t.* 25.
bilis siliquosa, plantaginis folio. *Catesb. car.* 3.
t. 7.
s aromaticus subfuscus terebinthi corniculis si-
lis. Bauh. pin. 404.

Lobus oblongus aromaticus. *Cluf. exot.* 72. *Sloan. ja* 70. *hift.* 1. *p.* 180.

β. Epidendrum caule fcandente tereti fubramofo, fol lanceolatis, petalis lanceolatis. *Act. upf.* 1740. *p.*

Angurek warna. *Kæmpf. amæn.* 867. *t.* 869. *f.* 2.

Habitat in Indiæ *utriusque arboribus*, *parafiticum.*

os aëris. 2. EPIDENDRUM caule fcandente tereti fubramo foliis lanceolatis aveniis, petalis linearibus obtu *Act. upf.* 1740. *p.* 37.

Kotong ging. *Kæmpf. amæn.* 868. *t.* 869. *f.* 1.

Habitat in Java, *parafiticum.*

* * *Caule erecto foliofo.*

uifolium 3. EPIDENDRUM foliis caulinis fubulatis canal latis.

Tfierou-mau-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 11. *t.* 5.

Habitat in India.

tulatum. 4. EPIDENDRUM foliis caulinis oblongis alternis tufis aveniis, nectarii labio bifido divaricato.

Helleborine ampliffimo folio vario. *Plum. fpec.* 180. *f.* 2.

Ponnampou maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 7. *t.* 3. *K elyf.* 2. *p.* 222. *f.* 7.

Habitat in India.

Confer Vifcum caryophylloides, foliis longis in apic cifis, floris labello albo trifido, petalis luteis l anguftiffimis. Catesb. car. 2. *p.* 68. *t.* 68. *bulbo*

vum. 5. EPIDENDRUM caulefcens, foliis imbricatis ceolatis, racemis axillaribus.

Angræcum octavum f. furvum. *Rumph. amb.* 104. *t.* 105. *f.* 1.

Thalia maravara. *Rheed. mal.* 12. *p. t.* 4. *Rudb.* 2. *p.* 122. *f.* 8. *Raj. fuppl.* 590.

Habitat in India.

ccineum. 6. EPIDENDRUM foliis caulinis fubenfiformibus tufis, pedunculis unifloris axillaribus conf *Jacq. amer.* 29. *t.* 135.

Helleborine coccinea multiflora. *Pluk. fpec.* 9. *ic. f.* 1.

Habitat in America.

7. EI

)ENDRUM foliis caulinis oblongis, spicis se- secundum
.dis, nectarii tubo longitudine corollæ. *Jacq.*
r. 29. *t.* 137.
)orine purpurea umbellata. *Plum. spec.* 9. *ic.* 184.
:.
it in America.

)ENDRUM foliis caulinis linearibus obtusis lineare.
irginatis, caule simplici. *Jacq. amer.* 29. *t.* 131.

borine tenuifolia repens. *Plum. spec.* 9. *ic.* 182.
:.
it in America.

)ENDRUM foliis caulinis ovatis acutis nervo- ovatum.
amplexicaulibus, scapis paniculatis.
i supplex major secunda. *Rumph. amb.* 6. *p.* 111.
.1. *f.* 2.
:ali-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 15. *t.* 7. *Rudb.*
: 2. *p.* 223. *f.* 4. *Raj. suppl.* 590.
it in India.

DENDRUM foliis lanceolatis nervosis: vagi- punctatum
imbricatis, scapo paniculato corollisque puncta-

borine ramosissima, cauliculis & floribus macu-
s. *Plum. spec.* 9. *ic.* 187.
it in America.
ita sunt vaginæ foliorum, panicula & petala.

DENDRUM foliis lanceolatis nervosis, scapo caudatum.
iculato, petalis maculatis caudatis, duobus lon-
imis.
)orine ramosissima, caulibus & floribus maculo-
Plum. spec. 9. *ic.* 177.
it in America.

DENDRUM foliis oblongis aveniis, nectarii ciliare.
.o tripartito ciliato: lacinia intermedia lineari,
le bifolio. *Jacq. amer.* 29.
)orine graminea, foliis rigidis carinatis. *Plum.*
:79. *f.* 2.
it in America.

DENDRUM foliis oblongis aveniis, nectarii
Qqqq 3 labio

labio tripartito integerrimo: lacinia intermedia neari, caule multifolio. *Jacq. amer.* 29. *t.* 139.
Viscum caryophylloides, foliis longis in apice i sis, floris labio albo trifido: petalis luteis lo angustis. *Catesb. car.* 2. *p.* 68. *t.* 68.
Habitat in America.

cucullatum. 14. EPIDENDRUM foliis subulatis, scapo unifl nectarii labio ovato ciliato acuminato, petal longatis.
Helleborine floribus albis cucullatis. *Plum. spec.* 179. *f.* 1.
Habitat in America.

* * * *Scapo nudo, foliis radicalibus.*

odosum. 15. EPIDENDRUM folio unico subradicali, sp subquadrifloro. *Jacq. amer.* 29.
Epidendrum foliis radicalibus subulatis acutis: radicatis. *Act. upf.* 1740. *p.* 36. *Jacq. hist. t.* 14
Epidendron foliis subulatis. *Hort. cliff.* 430.
Epidendron curassavicum orchidi affine, folio fulcato. *Herm. parad.* 187. *t.* 187.
Viscum arboreum s. Epidendron, flore albo spec americanum, folio forma siliquarum nerii. *Pluk.* 390. *t.* 117 *f.* 6.
Viscum delphinii flore minus, petalis angustior radice fibrosa. *Sloan. jam.* 120. *hist.* 1. *p.* 251. *t f.* 3.
Habitat in America *meridionali, parasitica.*

arinatum. 16. EPIDENDRUM foliis oblongis obtusis comp articulatis. *Act. upf.* 1740. *p.* 36.
Bontia luzonica, geniculis inferioribus carin *Pet. gaz.* 44. *f.* 10.
Habitat in Insulis Luzonum, *parasiticum.*

loifolium. 17. EPIDENDRUM foliis radicalibus oblongis ob superne latioribus. *Act. upf.* 1740. *p.* 36.
Orchis abortiva, flore majore rubro, folio *Rudb. elys.* 2. *p.* 224.
Kansjiram-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 17. *t.* 8. *suppl* 572
Habitat in Malabariæ *arboribus, parasiticum.*

18. EI

EPIDENDRUM foliis radicalibus lanceolatis canaliculatis, petalis cuneiformibus retusis. *guttatum.*
Epidendrum caule tereti erecto nudo, foliis lanceolatis, petalis cuneiformibus obtusis. *Act. upf.* 1740. *p.* 37.
Viscum, delphinii flore albo guttato, minus, radice fibrosa. *Sloan. jam.* 120. *hist.* 1. *p.* 251. t. 148. *f.* 2.
Helleborine foliis carnosis carinatis & sulcatis. *Plum. spec.* 9. *ic.* 182. *f.* 2?
Habitat in Jamaica, *parasiticum.*

EPIDENDRUM foliis subulatis sulcatis, scapo petalisque punctatis, labio immaculato dilatato. *juncifolium*
Helleborine maculosa, foliis junceis & sulcatis. *Plum. spec.* 9. *ic.* 184. *f.* 2.
Habitat in America.

EPIDENDRUM foliis ovato-oblongis trinerviis, floribus racemosis maculatis. *scriptum.*
Angræcum scriptum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 95. *t.* 42.
Habitat in India.

EPIDENDRUM foliis radicalibus linearibus apice bifariam retusis, floribus racemosis maculatis. *retusum.*
Ansieli-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 1. *t.* 1. *Rudb. elys.* 2. *p.* 220. *t.* 5. *Raj. suppl.* 588.
Habitat in India.

EPIDENDRUM foliis oblongis geminis glabris striatis bulbo innatis, scapo multifloro, nectario cordato. *cochleatum*
Viscum radice bulbosa minus, delphinii flore rubro specioso. *Sloan. jam.* 119. *hist.* 1. *p.* 250. *t.* 121. *f.* 2.
Viscum caryophylloides, lilii albi foliis, floris labello brevi purpureo, cæteris petalis e luteo virescentibus. *Catesb. car.* 2. *p.* 88. *t.* 88.
Helleborine cochleato flore. *Plum. spec.* 9. *ic.* 185. *f.* 2.
Habitat in America.

EPIDENDRUM foliis radicalibus lato-lanceolatis aveniis, petalis lateralibus orbiculatis. *amabile.*
Angræcum album majus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 99. *t.* 43.
Habitat in India. *Osbeck.*
Radices *crassæ, funiformes, supra arbores scandentes.* Folia *Crini s. Scillæ officinalis, lata, lanceolata, carnosa, semipedalia.* Culmus *bipedalis, nudus, cinctus*

aliquot squamis acutis brevissimis. **Flores** *nivei, Orchidis Susannæ æmuli, s. magnitudine narcissi: constantes petalis 5, quorum 2 lateralia orbiculata reliqua ovata.* Cucullus *alter triphyllus: lateralibus oblongis, intermedio hastato, bifido setis duabus subulatis.*

tuberosum. 24. EPIDENDRUM foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis, scapo vaginato, nectario cymbiformi bifido.

Helleborine purpurea, tuberosa radice. *Plum. spec. ic.* 186. *f.* 2.

Angræcum terrestre primum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 11. *t.* 52. *f.* 1.

Habitat in Indiis.

...llum. 25. EPIDENDRUM foliis ensiformibus subcarnosis, scapo paucifloro.

Habitat Surinami. *C. Dahlberg.*

Radix *fibrosa.* Planta *pollicaris tantum.* **Folia** *ensiformia, iridis modo disposita, subcarnosa, lævia, acuta, radicalia omnia.* Scapi *inter singula folia solitarii longitudine foliorum, adspersi 3 s. 4. foliolis minutis.* Flores *terminales 1. s. 2, e gluma trivalvi.* Petala *3 superiora patentia, oblonga: supremo minimo.* Petala *2 interiora dentata.* Labium *trifidum: lobis lateralibus subcordatis: intermedio majore, bifido.*

...sifolium. 26. EPIDENDRUM caule tereti lævi, foliis ensiformibus, petalis lanceolatis glabris, labio recurvato latiore.

Habitat in China. *Osbeck.*

Planta *terrestris nec parasitica.* Folia *angusta, striata, acuta, numerosa, non carnosa.* Scapus *anceps, bipedalis, teres, nudus:* Bracteis *aliquot, alternis, membranaceis, amplexicaulibus, acuminatis.* Flores *alterni, ex alis bractearum solitarii, pedunculati, pedunculis longitudine floris.* Corolla *ex petalis 5, lanceolatis, patentibus, lævibus; sexto latiore recurvato.* Flos *fragrantissimus.*

...nilifor-me. 27. EPIDENDRUM caule tereti articulato striato moniliformi nudo simplicissimo, foliis linearibus acutis. *Act. upsf.* 1740. *p.* 37.

Fu Ran. *Kæmpf. amæn.* 864. *t.* 864.

Habitat in Japoniæ *rupibus & arboribus, parasiticum.*

28. EPI-

ENDRUM caule unifolio, floribus racemo- secundis. *Jacq. amer.* 29. *t.* 133. *f.* 2. orine ophioglosso similis. *Plum. spec.* 9. *ic.* 176. — ophioglossoides.

in America.

ENDRUM caule unifolio, floribus e sinu fo- ggregatis. *Jacq. amer.* 29. *t.* 133. *f.* 3. orine rusci majoris folio. *Plum. spec.* 9. *ic.* 176. — Ruscifolium

in America.

ENDRUM caule unifolio, floribus e sinu fo- eminis. orine graminea repens biflora. *Plum. spec.* 9. *ic.* *f.* 1. — graminifolium.

in America.

totum obscurum charactere, differentiis, synony- cum flores exsiccati vix evolvantur; plantæ in s vix colantur; indigenæ ab authoribus insufficien- lescribantur.

TRIANDRIA.

SISYRINCHIUM.

RINCHIUM caule foliisque ancipitibus. *Hort.* 431. *Hort. upsf.* 278. *Gron. virg.* 140. *Roy. lugdb.* — Bermudiana

chium cæruleum parvum, gladiato caule, vir- inum. *Pluk. alm.* 348. *t.* 61. *f.* 1. diana graminea, flore minore cæruleo. *Dill. elth.* *t.* 41. *f.* 49. ichium bermudiense, floribus parvis ex cæruleo ureo mixtis. *Pluk. alm.* 348. *t.* 61. *f.* 2. diana iridis folio, radice fibrosa. T. *Dill. elth.* *t.* 41. *f.* 48.

t α in Virginia, *β. in* Bermudis. ♃

α, in loco natali, Folia *sæpe* & *scapum fili- ia gerit, at si probe examinetur, tamen ancipi- hæc per gradus ad cultæ staturam adscendere ob- tur.*

FERRARIA.

ARIA. *Burm. act. Mill. ic.* 280. — undulata.

Ferraria foliis nervosis. *E. N. C.* 1761. *p.* 1
f. 1.
Iris stellata, cyclaminis radice, pullo flore.
1216.
Narcissus indicus, flore saturate purpureo. R
2. *p.* 49. *f.* 9.
Flos indicus e violaceo fuscus, radice tuber
cult. 168. *t.* 171. *Moris. hist.* 2. *p.* 344. *f.* 4
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

TETRANDRIA.

NEPENTHES.

distillatoria. 1. NEPENTHES. *Hort. cliff.* 431. * *Fl. zeyl.*
Utricaria vegetabilis zeylanensium. *Pluk. al*
237. *f.* 3.
Cantharifera. *Rumph. amb.* 5. *p.* 121. *t.* 59. *f.*
Bandura zeylanica, in extremo foliorum fo
peniformem expansum habens. *Burm. zeyl.*
Planta mirabilis destillatoria. *Grim. E. N.*
Dec. 2. *p.* 363. *f.* 363.
Habitat in Zeylona.

PENTANDRIA.

AYENIA.

pusilla. 1. AYENIA foliis cordatis glabris. *L. act. stockh.*
p. 23. *t.* 2. *
Ayenia foliis ovatis acutis serratis, germine p
lato, nectario plano stellato. *Læfl. it.* 200.
Dayenia inermis, foliis oblongo-cordatis ma
dentatis, floribus axillaribus. *Mill. dict. t.* 1
Urticæ folio anomala, flore pentaphyllo pu
fructu pentacocco muricato. *Sloan. jam.* 90.
p. 209. *t.* 132. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, Cumana, Peru. ☉

tomentosa. 2. AYENIA foliis ovato-subrotundis tomentosis
it. 200; 257.
Habitat in Cumana.

magna. 3. AYENIA foliis cordatis pubescentibus, floru
mine sessili, nectario concavo. *Læfl. it.* 199.
Habitat in Cumana. ♃

PASSIFLORA.

* *Foliis indivisis.*

SIFLORA foliis indivisis serratis. *Amœn. acad. p.* 217. *f.* 1. * serratifolia.
flora foliis ovato - lanceolatis integris serratis. *ort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 260.
nadilla americana, folio oblongo leviter serrato, talis ex viridi rubescentibus. *Mart. cent.* 36. *t.* 36.
itat Surinami.

SSIFLORA foliis indivisis ovatis integerrimis: petiolis biglandulosis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 218. *f.* 2.* pallida.
natis indica alia, flore minore pallido. *Plum. ner.* 74. *t.* 89.
natis Murucuja pyriformis minor. *Moris. hist.* 3. 7. *f.* 1. *t.* 2. *f.* 4.
itat in Dominica, Brasilia.

SSIFLORA foliis indivisis ovatis integerrimis: tiolis æqualibus. *Amœn. acad.* 1. *p.* 219. *f.* 3. * cuprea.
nadilla flore cupreo, flore oliviformi. *Dill. elth.* 65. *t.* 138. *f.* 165.
nadilla americana, fructu subrotundo, corolla floris erecta, petalis amœne fulvis, foliis integris. *Mart. cent.* 37. *t.* 37.
nadilla foliis sarsaparillæ trinerviis, flore purpureo, fructu olivæformi cæruleo. *Catesb. car.* 2. *p.* 3. *t.* 93.
itat in Providentia, Bahama.

SSIFLORA foliis indivisis cordatis integerrimis: petiolis æqualibus. *Amœn. acad.* 1. *p.* 219. *f.* 4. tiliæfolia.
nadilla pomifera, tiliæ folio. *Few. peruv.* 1. *p.* 0. *t.* 12.
bitat in Peru, Lima.

PASSIFLORA foliis indivisis cordato-oblongis integerrimis: petiolis biglandulosis, involucris integerrimis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 220. *f.* 5. * maliformis.
ssiflora foliis cordato-oblongis integerrimis, floribus solitariis, involucro tripartito integerrimo. *Roy. lugdb.* 261.
matis indica latifolia, flore clavato, fructu maliformi. *Plum. amer.* 67. *t.* 82. *Raj. suppl.* 340.
bitat in Dominica & *de la Tortue.*

6. PAS-

quadrangularis. 6. PASSIFLORA foliis indivisis subcordatis i[...] mis, petiolis sexglandulosis, caule mem[...] tetragono.
Passiflora foliis amplioribus cordatis, petioli[...] lis sex, caule quadrangulo alato. *Brown.* [...] *Jacq. amer. t* 143.
Habitat in Jamaica.

laurifolia. 7. PASSIFLORA foliis indivisis ovatis inte[...] petiolis biglandulosis involucris dentatis *acad.* 1. *p.* 220. *f.* 6. *
Passiflora foliis folitariis oblongis integerrim[...] bus solitariis, involucro tripartito dentat[...] *lugdb.* 532.
Passiflora arborea, laurinis foliis, americana. [...] 282. *t.* 211. *f.* 3.
Clematis indica, fructu citriformi, foliis [...] *Plum. amer.* 64. *t.* 80. *Raj. suppl.* 341.
Marquiaas. *Mer. surin.* 21. *t.* 21.
Habitat in Surinamo.
Bacca ovata sapidissima.

multiflora. 8. PASSIFLORA foliis indivisis oblongis inte[...] floribus confertis. *Amæn. acad.* 1. *p.* 221.
Passiflora, laurinis foliis, polyanthos americа[...] *alm.* 282.
Granadilla, flore minore corymboso. *Plum.*[...]
Clematis indica polyanthos odoratissima. *Pl*[...] 75. *t.* 90. *Raj. suppl.* 343.
Habitat in Dominica.

* * *Foliis bilobis.*

perfoliata. 9. PASSIFLORA foliis bilobis oblongis tra[...] amplexicaulibus petiolatis subtus punctatis *acad.* 1. *p.* 222. *f.* 8. *
Passiflora foliis trilobis: cruribus oblongis obtusi[...] medio obsoleto setula terminato. *Brown. ja*[...]
Flos passionis perfoliatus s. periclymeni perfo[...] lio. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. *p.* 230. *t.* 142. *Raj. suppl.* 342.
Habitat in Jamaicæ *sylvis saxosis.*

rubra. 10. PASSIFLORA foliis bilobis cordatis acu[...] *Amæn. acad.* 1. p. 222. f. 9. *

:a foliis tenuioribus trinerviis bicornibus, luna-
nu anteriore obtuso. *Brown. jam.* 328.
s indica, flore clavato suaverubente, fructu
;ono coccineo, folio bicorni. *Plum. amer.* 68.
Raj. suppl. 341.
ssionis folii media lacinia quasi abscissa, flore
·e carneo. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. *p.* 229.
in Jamaica, Dominica, Martinica, Cayenna.

:FLORA foliis bilobis basi emarginatis: lobis ibus obtusis divaricatis: intermedio obsoleto onato. *Amæn. acad.* 5. *p.* 408. — normalis.
·a foliis trilobis: cruribus angustis oblongis: in-
:dio fere obsoleto. *Brown. jam.* 328.
epilli s. Contrajerva. *Hern. mex.* 301.
in America *meridionali.*

FLORA foliis bilobis obtusis basi indivisis, riis monophyllis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 223. *f.* 10.* — Murucuja.
·a foliis bilobis obtusis, nectariis indivisis. *Roy.* 261.
s indica, flore puniceo, folio lunato. *Plum.* 72. *t.* 87. *Raj. suppl.* 342.
in Dominica.

[FLORA foliis bilobis basi rotundatis glan-isque: lobis acutis divaricatis subtus punctatis. *z. acad.* 1. *p.* 223. *f.* 11 * — vespertilio.
ra foliis obverse lunatis: punctis duobus mel-
s sub basi. *Virid. cliff.* 91. *Hort. cliff.* 431. *Roy.* 260.
llla bicornis, flore candido: filamentis intortis.
elth. 164. *t.* 137. *f.* 164.
illa folio lunato, flore parvo albo, fructu suc-
ito ovato. *Mart. cent.* 52. *t.* 52.
in America. ♄

IFLORA foliis bilobis cordatis oblongis pe-tis. — capsularis.
illa fructu rubente, folio bicorni. *Plum. spec.* 138. *f.* 2. *Barr. obs. præf.* 1. *titul. f.* 1.
in Gallia *æquinoctiali.*

*** *Foliis trilobis.*

FLORA foliis subtrilobis obtusis subrotun- — rotundifol.

Gra-

Granadilla folio hederaceo, flore albo, fructu- so villoso. *Plum. spec. 6. ic. 138. f. 1. Barr.* o 1. *titul. f.* 2.

Habitat in America *australiori.*

punctata. 16. PASSIFLORA foliis trilobis oblongis sub- ctatis: intermedio minore. *Amœn. acad.* 1 *f.* 12. *

Passiflora foliis bilobis obtusis, nectario m *Roy. lugdb.* 260.

Granadilla folio tricuspidi obtuso & oculat *peruv.* 1. *p.* 718. *t.* 11. *Hort. angl.* 25.

Habitat in Peru. ♃

lutea. 17. PASSIFLORA foliis trilobis cordatis a obtusis glabris integerrimis. *Amœn. acad.* 1 *f.* 13. * *Gron. virg.* 140.

Passiflora foliis cordatis trilobis integerrimis lateribus angulatis. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lu*

Passiflora foliis trilobis integerrimis: laciniis tis acutis integerrimis glabris. *Gron. virg.* 1

Clematis passionalis triphyllos, flore luteo. *M* 1. *p.* 7. *f.* 1. *t.* 2. *f.*

Flos passionis minor, folio in tres lacinias m tas minus profundas diviso. *Sloan. jam.* 10 *p.* 231.

Habitat in Virginiæ, Jamaicæ *glareosis, saxosis*

suberosa. 18. PASSIFLORA foliis trilobis subpeltatis, suberoso. *Amœn. acad.* 1. *p.* 226 *f.* 14.

Passiflora foliis trilobis peltatis integris: glandi bus sub dorso basi convexis. *Roy lugdb.* 2

Clematis indica, folio hederaceo, major, fru væformi. *Plum amer.* 70. *t.* 84. *Raj. suppl.*

Passifloræ affinis, hederæ folio, americana. *P* 202. *t.* 210. *f.* 4.

β. Clematis indica, folio angusto trifido, fructu formi. *Plum. amer.* 70. *t.* 85.

Flos passionis minor, foliis in tres lacinias r ratas profundius divisis, flore luteo. *Sloan. j hist.* 1. *p.* 320.

Habitat in Dominica, Antillis. ♄

Caulis *perennis: Cortice suberoso, fisso,* albo. *axillares,* gemini, albi, apetali. Bacca Folia in tenellis adhuc plantis peltata;

o vix ac ne vix; semper nitida glaberrima & fe- lucida.

SSIFLORA foliis trilobis tomentosis: basi u- que denticulo reflexo. *Amœn. acad.* 1. *p.* 226. 5. * — holosericea.

ora foliis cordato-trilobis integerrimis, basi nque denticulo reflexo. *Hort. cliff.* 432. *Roy. lb.* 261.

idilla folio hastato holosericeo, petalis candican- is: fimbriis ex purpureo & luteo variis. *Mart.* : 51. *t.* 51.

at in Vera Cruce. ♄

SSIFLORA foliis trilobis villosis, floribus op- itis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 227. *f.* 16. * — hirsuta.

ora non crenata americana triphylla. *Pluk. alm.* *t.* 212. *f.* 1.

atis indica, flore minimo pallido. *Plum. amer.* *t.* 88.

passionis albus, folio ibisci sericeo trilobato. *rn. par.* 176. *t.* 176.

at in Dominica, Curassao.

SSIFLORA foliis trilobis cordatis pilosis, invo- ris multifido-capillaribus. *Amœn. acad.* 1. *p.* 8. *f.* 17. * *Phil. bot.* 260. * — fœtida.

lora florum involucris triphyllis multifido-ca- laribus. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 261.

passionis albus reticulatus. *Her. par.* 173. *t.* 173.

atis indica hirsuta fœtida. *Plum. amer.* 71. *t.* 86.

flora vesicaria hederacea, foliis lanuginosis, odo- tetro, filamentis florum ex albo & purpureo va- gatis. *Pluk. alm.* 382. *t.* 104. *f.* 1.

tat in Dominica, Martinica, Curassao. ⊙

SSIFLORA foliis trilobis integerrimis: lobis blanceolatis: intermedio productiore. *Amœn. acad.* *p.* 229. *f.* 18. *Læfl. it.* 247. * — minima.

flora f. Flos passionis curassavicus, folio glabro ilobato & angusto, flore flavescente omnium mi- mo. *Pluk. alm.* 282. *t.* 210. *f.* 3.

itat in Curassao.

is senior suberosus evadit.

23. PAS-

incarnata. 23. PASSIFLORA foliis trilobis ferratis. *Am* 1. *p.* 230. * *Hort. upf.* 278. *Gron. virg.*
Paffiflora foliis femitrifidis ferratis: bafi dual dulis convexis: lobis ovatis. *Hort. cliff.* *lugdb.* 260.
Granadilla hifpanis, Flos paffionis italicis. *mex* 888. *t.* 888. *Raj. hift.* 649.
Clematis trifolia, flore rofeo clavato. *Bauh.*
Clematis trifolia, f. Flos Paffionalis, flor *Morif. hift.* 2. *p.* 6. *f.* 1. *t.* 1. *f.* 9.
Balfamina indica repens triphylla; f. folio *Ambr. phyt.* 89. *t.* 90.
Murucuja maliformis alia. *Marcgr. braf.* 71.
Habitat in Virginia, Brafilia, Peru. ♃

**** *Foliis multifidis.*

cærulea. 24. PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis *acad.* 1. *p.* 231. *f.* 20. *Hort. upf.* 278. *Gou* 476.
Paffiflora foliis palmatis quinquepartitis inte involucris cordatis triphyllis. *Hort. cliff.* 4 *lugdb.* 260.
Granadilla polyphyllos, fructu ovato. *Tournef.*
Granadilla pentaphyllos, flore cæruleo magn *lugdb.* 2. *p.* 81. *Duham. arb.* 1. *p.* 272. *t.* 1
Granadilla, indica fcandens & fempervirens, ra pente, foliis palmatis &c. *Mich. flor.* 46.
Clematis quinquefolia americana f. Flos p *Rob. ic.*
Flos paffionis major pentaphyllus. *Sloan. j. hift.* 1. *p.* 229. *Raj. fuppl.* 339.
Habitat in Brafilia. ♄

digitata. 25. PASSIFLORA foliis palmatis ferratis. *Ame* 1. *p.* 232. *f.* 21.
Clematis indica polyphylla major, flore clava ctu colocynthidis. *Plum. amer.* 62. *t.* 79. *R* 340.
Habitat in Martinica.

pedata. 26. PASSIFLORA foliis pedatis ferratis. *Amæn* 1. *p.* 233. *f.* 22. *
Clematis indica polyphylla, flore crifpato. *amer.* 66. *t.* 81. *Raj. fuppl.* 341.
Habitat in Dominica.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

STOLOCHIA foliis bilobis, caule volubili. bilobata.
olochia longa fcandens, foliis ferri equini effigie.
um. fpec. 5. *amer.* 91. *t.* 106. *Raj. fuppl.* 395.
tat in Dominica.

ISTOLOCHIA foliis trilobis, caule volubili, trilobata.
rit us maximis.
olochia folio hederaceo, trifido, maximo flore,
dice repente. *Plum fpec.* 5.
tolochia fcandens, foliis fublobatis obtufis, flori-
is ampliffimis. *Brown. jam.* 328.
tat in America *meridionali.*
es *maximi; ventricofi.*

ISTOLOCHIA foliis cordatis fubtrilobis, caule pentandra.
lubili, bractea cordata amplexicauli.
tolochia floribus pentandris. *Jacq. amer.* 30. *t.* 147.
itat in America. ♄
es *minores, pentandri.*

ISTOLOHIA foliis reniformibus peltatis, caule peltata.
lubili.
tolochia afari folio umbilicato longiffimo, radice
pente. *Plum. fpec.* 5. *ic.* 32. *f.* 2.
itat in America *meridionali.*
lla hirta, extus punctata. Pedunculi uniflori.

ISTOLOCHIA foliis oblongis acuminatis, caule maxima.
olubili, pedunculis multifloris. *Jacq. amer.* 30. *t.*
46.
ftolochia foliis oblongo-ovatis obtufis integerri-
is, caule fcandente, floribus terminalibus, fru-
tibus fexangularibus maximis. *Mill. dict.* 13.
itat in nova Hifpania. ♄
res *curvi.* Fructus *bafi pedunculoque dehifcentes.*

ISTOLOHIA foliis ovato-oblongis trinerviis, bilabiata.
ule volubili, corollis bilabiatis. †
ftolochia fcandens, foliis oblongis, radice repente.
lum. fpec. 5. *ic.* 32. *f.* 1.
itat in America.

erecta. 7. ARISTOLOCHIA foliis lanceolatis sessilibus hirsutis, caule erecto, pedunculis solitariis unifloris, floribus longissimis. *Mill. dict.* 12. †
Habitat in Vera Cruce.

caudata. 8. ARISTOLOCHIA foliis cordatis acuminatis triplinerviis, caule volubili. *Jacq. amer.* 30. *t.* 145.
Habitat in America. ♄
Foliorum Lobi baseos sibi incumbentes. Corollæ la... *in caudam setaceam exiens.*

arborescens. 9. ARISTOLOCHIA foliis cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoso. *Hort. cliff.* 433.
Aristolochia polyrhizos, auriculatis foliis, virginiana. *Pluk. alm.* 50. *t.* 78. *f.* 1. ?
Habitat in America. ♄

odoratissima 10. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule volubili fruticoso, pedunculis solitariis, labio corollæ majore.
Aristolochia scandens odoratissima, floris labello purpureo, semine cordato. *Sloan. jam.* 60. *hist.* 162. *t.* 104. *f.* 1. *Raj. suppl.* 394?
Aristolochia scandens foliis cordatis acuminatis floris flabellis amplis purpureis. *Brown. jam.* 329?
Aristolochia folio cordiformi, flore longissimo purpureo, radice repente. *Plum. spec.* 5. *ic.*
Habitat in America. ♄

indica. 11. ARISTOLOCHIA foliis cordato-oblongis, caule volubili, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 323
Catelæ-vegon. *Rheed. mal.* 8. *p.* 48. *t.* 25. *Raj.* 394.
β. Aristolochia caule volubili, foliis cordato-oblongis, fructu pendulo, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* (*non synonyma*).
Habitat in India. ♃

anguicida. 12. ARISTOLOCHIA foliis cordatis acuminatis, caule volubili fruticoso, pedunculis solitariis, stipulis cordatis. *Jacqu. amer.* 30. *t.* 144.
Aristolochia mexicana, flore acutiore. *Moris. h.* *p.* 509. *f.* 12. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Indiis. ♄
Corollæ rectæ, quasi truncatæ Labio lanceolato.

13.

ARISTOLOCHIA foliis cordatis acutiusculis, caule volubili, pedunculis subternis petiolo longioribus. — *bætica.*

Aristolochia Clematitis serpens. *Bauh. pin.* 307. *Moris. hist.* 3. *p.* 509. *f.* 12. *t.* 17. *f.* 6.
Aristolochia Clematitis bætica. *Clus. hist.* 2. *p.* 71.
Habitat in Hispania, Creta, *arbores scandens.*
Stipulæ ovato-rhombeæ, mucronatæ.

ARISTOLOCHIA foliis hastatis integerrimis, caule infirmo simplici, floribus solitariis recurvatis. *Gron. orient.* 280. — *maurorum.*

Aristolochia orientalis, foliis lanceolatis. *Tournef. cor.* 161.
Aristolochia maurorum. *Bauh. pin.* 307.
Aristolochia longa, foliis angustis acuminatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 510. *f.* 12. *t.* 17. *f.* 11.
Aristolochia peregrina rauwolffii. *Clus. hist.* 2. *p.* 71.
Aristolochia Rhasut & Rumigi. *Rauw. it.* 121. *t.* 23.
Habitat circa Halepum. ♃

ARISTOLOCHIA foliis cordato-oblongis undatis, caule infirmo, floribus solitariis. — *sempervirens.*

Aristolochia caulibus infirmis, foliis cordato-oblongis undulatis, floribus recurvis solitariis pendulis. *Hort. cliff.* 432. *Sauv. monsp.* 111.
Aristolochia cretica. *Bauh. pin.* 307. *Moris. hist.* 3. *p.* 510. *f.* 12. *t.* 17. *f.* 16.
Aristolochia altera. *Clus. hist.* 2. *p.* 260.
Habitat in Creta. ♄
Flores curvi, foliis longiores. Caules angulati.

ARISTOLOCHIA foliis cordato oblongis planis, caulibus infirmis superne flexuosis teretibus, floribus solitariis. *Gron. virg.* 140. — *Serpentaria.*

Aristolochia caulibus infirmis angulosis flexuosis, foliis cordato-oblongis planis, floribus recurvis solitariis. *Mat. med.* 416.
Aristolochia Pistolochia s. Serpentaria virginiana, caule nodoso. *Pluk. alm.* 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. car.* 1. *p.* 29. *t.* 29.
Aristolochia Pistolochia caule nodoso; s. Serpentaria virginiana. *Raj. suppl.* 394.
Aristolochia polyrhizos virginiana, fructu parvo pentangulari. *Moris. hist.* 3. *p.* 510. *f.* 12. *t.* 17. *f.* 14.
Habitat in Virginia. ♃

istolochia. 17. ARISTOLOCHIA foliis cordatis crenulatis sub reticulatis petiolatis, floribus solitariis. *Gouan. mo* 476.

Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis solete dentatis, floribus solitariis erectis. *Hort.* 433. *Sauv. monsp.* 111.

Aristolochia Pistolochia dicta. *Bauh. pin.* 307.

Pistolochia. *Clus. hist.* 2. *p.* 72. *Dod. pempt.* 525.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♃

Corollæ labium incurvum.

rotunda. 18. ARISTOLOCHIA foliis cordatis subsessilibus tusis, caule infirmo, floribus solitariis. *Gouan. mo* 476.

Aristolochia, caule infirmo ramoso, foliis cordatis gerrimis, floribus solitariis erectis. *Hort. cliff.* *Mat. med* 414. *Sauv. monsp.* 111.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh.* 307.

Aristolochia rotunda. 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 70.

Aristolochia. *Cam epit.* 419.

β. Aristolochia rotunda, flore ex albo purpurascen *Bauh. pin.* 307.

Habitat in Italia, Hispania, G. Narbonensi. ♃

Corollæ labium incurvum. Caulis angulatus. Varietas β liis longius petiolatis, α vero vix manifestis.

longa. 19. ARISTOLOCHIA foliis cordatis petiolatis inte rimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solita *Gouan. monsp.* 477.

Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis tegerrimis longe petiolatis, floribus solitariis. *S monsp.* 111.

Aristolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307. *Mill. di* 51.

Aristolochia longa. *Clus. hist.* 2. *p.* 70.

β. Aristolochia longa hispanica. *Bauh. pin.* 307.

Habitat in Hispania, Italia, Gallia. ♃

Præcedenti nimis affinis.

lematis. 20. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule ere floribus axillaribus confertis. *Hort. upf.* 279. *med* 415. *Dalib. paris.* 279.

Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cord petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort.* 432. *Sauv. monsp.* 111.

olochia Clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.
olochia Clematitis vulgaris. *Cluf. hist.* 2. *p.* 71.
olochia rotunda. *Fuchs. hist.* 90.
'at in Austria, Gallia, Tataria. ♃

.ISTOLOCHIA foliis cordatis obtusiusculis hir- , floribus solitariis pendulis recurvatis subtruncatis. olochia longa subhirsuta, folio oblongo, flore ximo. *Tournef. it.* 1. *p.* 147. *t.* 147. *'at in* Chio. ♃ hirta.

.s *striatus*, *hirtus*. Folia *cordata*, *obtusa cum mucro-* Corolla *incurvata*, *recurvata absque labio elon- o.*

PISTIA.

ΓIA foliis obcordatis. *Fl. zeyl.* 322. *Læfl. it.* 281. Stratiotes. *'q. hist. t.* 148.
aquatica villosa, foliis obovatis ab imo venosis, ribus sparsis foliis insidentibus. *Brown. jam.* 329.
la-pail palustris, folio oblongo specioso. *Plum.* t. 30.
la-pail. *Rheed. mal.* 11. *p.* 63. *t.* 32.
tiotes ægyptia. *Bauh. hist.* 3. *p.* 787. *Moris. hist.* *p.* 619. *f.* 15. *t.* 4. *f. infer. Vesl. ægypt.* 44. *t.* 45. *y. hist.* 1324.
iotes Hai-alem maovi. *Alp. ægypt.* 106. *t.* 108.
icula palustris VI, s. ægyptia, s. Stratiotes aqua- a, foliis sedo majore latioribus. *Bauh. pin.* 362. *ian. jam.* 11. *hist.* 1. *p.* 15. *t.* 2. *f.* 2.
tat in Asiæ, Africæ, Americæ *meridionalibus*, *ans.*
es *sicci mihi satis non fecere*, *examinent autoptæ ac- ratius.*

DECANDRIA.

KLEINHOVIA

ΞINHOVIA. Hospita.
-marus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 177. *t.* 113.
tat in India *orientali. Kleinhof horti Bot. cultor in ia.* ♄
r Foliis alternis, *petiolatis*, *cordatis*, acuminatis, *serratis*, *nudis.* Flores *quodammodo affines Aye-*

 niæ,

niæ, Fructus *Cardiospermi* : *e Floris receptaculo* lumna *declinata*, *apice adscendens ultra apicem* *mi petali*, *ferens*. Nectarium *campanulatum*, *mum*, *intra quod Stamina* & *Pistillum*.

HELICTERES.

Isora. 1. HELICTERES foliis cordatis serratis, fructu posito contorto.

Helicteres. *Hort cliff.* 433.

Helicteres arbor indiæ orientalis, siliqua varice funiculi in modum contortuplicata. *Pluk. alm.* *t.* 245. *f.* 2.

Frutex indicus, fructu e styli apice egresso sexti funiculo in spiram convoluto constante. *Raj* 1765.

Isora Murri. *Rheed. mal.* 6. *p.* 55. *t.* 30.

β. Helicteres arbor Indiæ occidentalis, fructu m *Pluk. alm.* 182. *t.* 245. *f.* 3.

Abulito affinis arbor, althææ folio, cujus fruct styli apex acutus quatuor f. quinque siliquis t:s, funis ad instar in spiram convolutis. *Sloan* .97. *hist.* 1. *p.* 22.

Habitat in Malabaria, Jamaica. ♄

carthagi-nensis. 2. HELICTERES foliis cordatis serratis, floribus iva..diis, fructu oblongo recto. *Jacq. amer.* 150.

Habitat in Carthagena. ♄

angustifolia. 3. HELICTERES foliis lanceolatis integerrimis, ctu ovato recto.

Habitat in China *Osbeck.* ♄

Arbor. Folia *lanceolata*, *supra nuda*, *subtus tomen* *petiolata*, *integerrima*, *acuminata*. Flores *peti* *sparsi*. Calyx *tomentosus*. Petala *quinque*, *ad* *laminarum utrinque dente aucta*. Receptaculum *gitudine floris*, *filiforme*, *cujus apici* stamina 10 *va*, & Stylus *unicus*. Capsula *ovata*, *tomen* *minime contorta*, *sed ex Capsulis* 5, *parallelis*, *approximatis composita*.

apetala. 4. HELICTERES foliis quinquelobis, floribus d candris apetalis, siliquis divaricatis. *Jacq. amer.*

Macpalxochi. Hern. mex 383. 459.

Habitat in America *australi*. ♄

POLYANDRIA.

GREWIA.

REWIA foliis subovatis. — occidentali[s]
rewia corollis acutis. *Hort. cliff.* 433. *Duham. arb.* 1. *p.* 276. *t.* 108.
lmifolia arbor africana baccifera, floribus purpureis. *Pluk. alm.* 393. *t.* 237. *f.* 1.
lmi facie arbuscula æthiopica, ramulis alatis, floribus purpurascentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 165. *t.* 85. *Seb. thes.* 1. *p.* 46. *t.* 29. *f.* 3. *Raj. dendr.* 13.
abitat in Æthiopia, Curassao. ♄

REWIA foliis sublanceolatis. *Fl. zeyl.* 324. * — orientalis.
rewia corollis obtusis. *Roy. lugdb.* 476. *Hort. cliff.* 433.
ai-parcea f. Couradi. *Rheed. mal.* 5. *p.* 91. *t.* 46. *Raj. hist.* 1624. *Pluk. phyt.* 50. *f.* 4.
abitat in India. ♄

XYLOPIA.

XYLOPIA pedunculis multifloris, fructibus muricatis. — muricata.
ylopricum fruticosum foliis ovatis acuminatis productis alternis, capsulis punctatis, floribus confertis ad alas. *Brown. jam.* 250. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in America. ♄

XYLOPIA pedunculis subunifloris, fructibus glabris. — glabra.
ylopricum foliis amplioribus nitidis ovatis, petiolis brevibus, fructibus glabris. *Brown. jam.* 251.
ylopricum arbor barbadensibus lignum amarum nominata. *Pluk. alm.* 395. *t.* 238. *f.* 4.
Habitat in America. ♄

ARUM.

* *Acaulia: foliis compositis.*

ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. *Roy. lugdb.* 7. — Dracunculus.
Arum foliis palmatis: foliolis undecim lanceolatis integerrimis: intermediis majoribus, spadice clavato. *Hort. cliff.* 344.

Dracunculus polyphyllus. *Bauh. pin.* 195. *Morif.* 3. *p.* 548. *f.* 13. *t.* 5. *f.* 46.
Dracontium. *Dod. pempt.* 329.
Habitat in Europa *australi.* ♃

Dracontium 2. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integ mis superantibus spatham spadice breviorem. *lugdb.* 7.
Arum polyphyllum minus & humilius. *Herm. l* 60.
β. Arum f. Arifarum virginianum, dracontii folio viridi longo acuminato. *Pluk. alm.* 52. *t.* 271. *f.*
Habitat in America.

pentaphyllum. 3. ARUM acaule, foliis quinatis.
Arum pentaphyllum indicum. *Morif. hist.* 3. *p.* *f.* 13. *t.* 5. *f.* 27. *mal.*
Rhomphal planta indiæ orientalis. *Zan. hist.* 205. *mal.*
Habitat in India.

triphyllum. 4. ARUM acaule, foliis ternatis, floribus monc *Gron. virg.* 142.
Dracunculus f. Serpentaria triphylla brafiliana. *pin.* 195. *prodr.* 101. *Dod. mem.* 81. *f.* 273.
β. Arum minus triphyllum f. Arifarum, pene vi virginianum. *Morif. hist.* 3. *p.* 547. *f.* 13. *t.* 5. *f.*
γ. Arum f. Arifarum triphyllum minus, pene atr bente, virginianum *Pluk. alm.* 52. *t.* 77. *f.* 5.
Arum f. Arifarum minus marianum, flore & pen pallido virefcente. *Pluk. amalth.* 39. *t.* 376. *f.* 3.
Habitat in Virginia, Brafilia. ♃
Planta brafilianæ *α foliola lateralia extrorfum lob* virginiæ *β. autem tantum gibba, eandem tamen fu* Floris *structura monoica.*
Planta *fubcaulefcens fcapo e petiolo orto.* Scapi *mafculi; alii feminei, ex eadem radice.* Spa *mafcula erecta; feminea labio inflexo.*

* * *Acaulia, foliis fimplicibus.*

Colocafia. 5. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis repandis: b femibifidis. *Hort. cliff.* 434. *n.* 4. *Hort. upf.* 2 *Roy. lugdb.* 7. *Haffelq. it.* 485.
Arum maximum ægyptium, quod vulgo Colocaf *Bauh. pin.* 195.

...um ægypticum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 1. *t.* 1. *Rumph. amb.* 5. *p.* 313. *t.* 109.
...locasia. *Cluf. hist.* 2. *p.* 75.
...bitat *in* Cretæ, Cypri, Syriæ, Ægypti *aquosis.* ♃

...RUM acaule, foliis peltatis ovatis integerrimis: basi semibifidis. *Hort. cliff.* 435. *Hort. upf.* 280. *Roy. lugdb.* 7. — esculentum.
...um minus, nymphææ folio, esculentum. *Sloan. jam.* 62. *hist.* 1. *p.* 167. *t.* 106. *f.* 1.
...ssica brasiliana, foliis nymphææ. *Bauh. pin.* 111.
...adium aquatile. *Rumph. amb.* 5. *p.* 318. *t.* 110. *f.* 1.
...bitat *in* America. ♃

...RUM acaule, foliis peltatis cordatis repandis: basi bipartitis. *Fl. zeyl.* 327. *Roy. lugdb.* 7. — macrorrhizon.
...um maximum macrorrhizon zeylanicum. *Herm. par.* 73. *t.* 73. *Raj. suppl.* 574.
...bitat *in* Zeylona. ♃

...RUM acaule, foliis cordatis obtusis mucronatis: angulis rotundatis. *Hort. cliff.* 435. * — peregrinum.
...bitat *in* America. ♃

...RUM acaule, foliis cordato-hastatis divaricatis. — divaricatum
...um acaule, foliis subhastatis. *Fl. zeyl.* 325. *
...enschena major. *Rheed. mal.* 11. *p.* 39. *t.* 20.
...itat *in* India. ♃

...RUM acaule, foliis sagittato trilobis, flore sessi... *Fl. zeyl.* 326. * — trilobatum.
...um trilobato folio, humilius & minus, zeylanicum. *Herm. par.* 79. *t.* 78. *Raj. suppl.* 575.
...um humile zeylanicum latifolium, pistillo coccineo. *Comm. hort.* 1. *p.* 97. *t.* 51. *Mill. dict. t.* 52. *f.* 2.
...sarum amboinicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 320. *t.* 110. *f.* 2.
...bitat *in* Zeylona. ♃
...ne *maxime A. divaricato.*

ARUM acaule, foliis sagittatis triangulis: angulis divaricatis acutis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 8. *Brown. jam.* 332. — sagittæfolium.
...um, amplis foliis, *esculentum. Plum. spec.* 4. *ic.* 35.

Arum minus esculentum, sagittariæ foliis viridi-i cantibus. *Sloan. jam.* 63. *hist.* 1. *p.* 167. *t.* 106. *f.*
Arum minus, sagittariæ foliis. *Pluk. phyt.* 149. *f*
Habitat in Brasilia, Jamaica, Barbados. ♃
Scapi longi, breviores petiolis. Burmann.

maculatum. 12. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis: sp cavato. *Hort. cliff.* 8. *Hort. upf.* 279. *Mat.* 417. *Roy. lugdb.* 8. *Dalib. paris.* 279.
Arum vulgare non maculatum. *Bauh. pin.* 195.
Arum. *Fuchs. hist.* 69. *Lob. ic.* 597.
Arum venis albis. *Bauh. pin.* 195.
β. Arum maculatum, maculis candidis f. nigris. *pin.* 195.
Habitat in Europa *australiore.* ♃

virginicum. 13. ARUM acaule, foliis hastato-cordatis acuti gulis obtusis. *Hort. cliff.* 434.* *Gron. virg.* 142. *it.* 2. *p.* 253.
Habitat in Virginiæ *humidis.* ♃

proboscideum. 14. ARUM acaule, foliis hastatis, spatha declina formi-subulata. †
Arisarum flore in tenuem caudam abeunte. *T inst.* 161.
Arisarum minus proboscideum. *Bocc. mus.* 2. *p.* 50.
Arisarum latifolium minus repens cespitosum. *rar.* 182. *t.* 1150.
β. Arisarum rotundifolium f. potamogeiti folio. *Bo Moris. hist.* 3. *p.* 544. *f.* 13. *t.* 6. *f.* 19.
Habitat in Apenninis.

tenuifolium 15. ARUM acaule, foliis lanceolatis, spadice se declinato. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 8. *monsp.* 16. *Gron. orient.* 286.
Arum angustifolium. *Bauh. pin.* 196. *Clus. hist.* 74. *Moris. hist.* 3. *p.* 545. *f.* 13. *t.* 6. *f.* 21.
Habitat in Dalmatia, Romæ, Monspelii, Orient

Arisarum. 16. ARUM acaule, foliis cordato-oblongis, spat fida, spadice incurvo. *Hort. cliff.* 435. *Roy. lug*
Arisarum latifolium majus. *Bauh. pin.* 196.
Arisarum latifolium alterum. *Bauh. pin.* 196.
Arisarum latifolium. *Clus. hist.* 2. *p.* 73. *Lob. ic.* 598

tat in Mauritaniæ, Italiæ, Lusitaniæ, Hispaniæ, illoprovinciæ *nemoribus.*

.UM acaule foliis ovato-oblongis, spatha scabra. ovatum.
a aquaticum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 312. *t.* 108.
ipola. *Rheed. mal.* 11. *p.* 45. *t.* 23.
tat in India.

* * * *Caulescentia.*

.UM caulescens rectum, foliis sagittatis. arborescens.
a arborescens, sagittariæ foliis. *Plum. amer.* 44.
51. *g.* & 60.
tat in America *meridionali.* ♄

.UM caulescens suberectum, foliis lanceolato- seguinum.
atis. *Jacq. amer.* 31. *t.* 151.
a caulescens, cannæ indicæ foliis. *Plum. amer.*
t. 60, 51. *h. fil.* 195. *h.*
a caule erecto geniculato, inferne nudo, foliis
.ongo ovatis. *Brown. jam.* 331.
a caule geniculato, cannæ indicæ foliis, summis
ris degustantes mutos reddens. *Sloan. jam.* 63.
. 1. *p.* 168.
a indica venenata. *Pluk. alm.* 79.
at in America. ♄

UM caulescens radicans, foliis cordatis oblon- hederaceum
acuminatis, petiolis teretibus. *Jacq. amer.* 31. *t.*
.
acia hederacea sterilis minor, folio cordato.
m. amer. 39. *t.* 55. *fil. t.* 195.
at in America. ♃

UM caulescens radicans, foliis cordato-lanceo- lingulatum.
s, petiolis marginato membranaceis.
a tenue scandens, foliis oblongis, petiolis alatis
plexantibus. *Brown. jam.* 333.
a scandens maximum, flore florescente. *Plum.*
. 4. *ic.* 37.
litidi scandenti minor & major graminifolia, folio
longo acuminato, foliorum pediculis alis extan-
us acutis. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. *p.* 75. *t.* 27. *f.* 2, 1.
at in America. ♃

UM caulescens radicans, foliis ternatis: latera- auritum.
unilobatis.

Arum

Arum hederaceum triphyllum & auritum. *Plum.* 41. *t.* 58, 51. *fil.* 209.
Arum scandens triphyllum, foliis exterioribus petiolis vaginantibus. *Brown. jam.* 331.
Arum maximum scandens geniculatum trifoliatu liis ad basin auritis. *Sloan. jam.* 63. *hist.* 1. *p.*
Habitat in America. ♃

DRACONTIUM.

polyphyllum. 1. DRACONTIUM scapo brevissimo, petiolo to lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinn *Hort. cliff.* 434. * *Roy. lugdb.* 6.
Arum polyphyllum, caule scabro punicante. *par.* 93. *t.* 93.
Arum polyphyllum surinamense, caule atror glabro & eleganter variegato. *Pluk. alm.* 52. *f.* 1.
Habitat Surinami. ♃

spinosum. 2. DRACONTIUM foliis sagittatis, pedunculis lisque aculeatis. *Fl. zeyl.* 328.
Arum zeylanicum spinosum, sagittæ foliis, *He* 75.
Arum minus zeylanicum, sagittariæ foliis. *Ra* 575.
Habitat in Zeylona.

fœtidum. 3. DRACONTIUM foliis subrotundis concavis *noveb.* 214. * *Kalm. it.* 3. *p.* 47. *Gron. virg.* 141.
Calla aquatilis, odore allii vehemente prædita. *virg.* 1. *p.* 186. *
Arum americanum, betæ folio. *Catesb. car.* 2. *t.* 71.
Habitat in Virginiæ, Carolinæ *aquis.* ♃

camtschatcense. 4. DRACONTIUM foliis lanceolatis. *Amæn. a* *p.* 360. *
Habitat in Sibiria.

pertusum. 5. DRACONTIUM foliis pertusis, caule scand
Arum hederaceum, amplis foliis perforatis. *amer.* 40. *t.* 56. 57.
Habitat in America meridionali. ♄

CALLA.

,LA foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, dice superne masculo. *Hort. cliff.* 435. — *aethiopica.*
ı aethiopicum, flore albo odorato moschum olen- *Comm. hort.* 1. *p.* 95. *t.* 50.
ı americanum, ari vulgaris facie, foliis carnosis. *ch. flor.* 9. *t.* 2.
at in Æthiopia.

,LA foliis cordatis, spatha plana. spadice undi- ; hermaphrodito. *Hort. cliff.* 436. *Fl. svec.* 744; — *palustris.*

foliis cordatis. *Fl. lapp.* 320.
ınculus palustris s. radice arundinacea. *Bauh. pin.*

ınculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.
enzalia palustris. *Petit. gen.* 45.
at in Europae *borealis paludibus.*

LA foliis ovatis. *Gron. orient.* 282. † — *orientalis.*
minus orientale, rotundioribus foliis. *Moris.* 3. *p.* 544.
Carsaami. *Rauw. it.* 115.
at Halepi *in montosis.* ♃

POTHOS.

HOS foliis lanceolatis integerrimis trinerviis, ıo apice triquetro. — *lanceolata.*
foliis rigidis angustis & acuminatis. *Plum. amer.* *t.* 62. *fil. t.* 206
it in America. ♃

HOS foliis lanceolatis crenatis. — *crenata.*
amplis foliis acuminatis & pergamaceis. *Plum.* . 4. *ic.* 39.
t in insula S. Thomae. ♃

HOS foliis cordatis. — *cordata.*
acinis amethystinis, flore parvo. *Plum. spec.* 4. 38. *fil. t.* 205.
it in America. ♃
. Major: Dracontium amplis foliis cordatis, ra- ; nodosa rubra. *Plum. amer.* 48. *t.* 63. *fil.* 195.

4. PO-

pinnata. 4. POTHOS foliis pinnatifidis.
Appendix laciniata. *Rumph. amb.* 5. *p.* 489. *t.* 18
Habitat in India. ♄

palmata. 5 POTHOS foliis palmatis.
Dracontium hederaceum polyphyllum. *Plu*
49. *t.* 64. 65.
Dracunculus scandens polyphyllus. *Plum. fil. t.*
Dracunculus scandens maximus. *Plum. spec.* 5.
Habitat in America. ♃

scandens. 6. POTHOS foliis petiolo foliaceo minoribus, radicante.
Pothos. *Fl. zeyl.* 329.
Potha. *Burm. zeyl.* 197.
Appendix duplo folio. *Rumph. amb.* 5. *p.* 49
f. 1, 2, 3.
Ana-parua. *Rheed. mal.* 7. *t.* 40.
Habitat in India. ♄
Spica huic globosa, præcedentibus oblonga.

ZOSTERA.

marina. 1. ZOSTERA. *It. wgoth.* 166. *t.* 4. *f.* 1. *Gron.*
Ruppia foliis linearibus obtusis. *Mœrh. act.*
p. 217.
Alga angustifolia vitriariorum. *Bauh. pin.* 364
1137, 823.
Fucus s. Alga marina graminea angustifolia
ramosior. *Raj. angl.* 3. *p.* 52.
Alga ad mare. *Oed. dan. t.* 15.
Habitat in mari Balthico, Oceano.

C

Classis XXI.

ONOECIA

MONANDRIA.

CYNOMORIUM.

OMORIUM. *Amæn. acad.* 4. *p.* 351. *t.* 2. * coccineum.
t. med. 534.
morium erectum breve cylindricum nudum pri-
ætate squamatum. *Brown. jam.* 334.
morium purpureum officinarum. *Mich. gen.* 17.
2.
is mauritanicus verrucosus ruber. *Pet. gaz. t.* 39.

is typhoides liburnensis. *Til. pis.* 64. *t.* 25.
is typhoides coccineus tuberosus melitensis.
c. mus. 2. *p.* 69. *sic.* 80. *t.* 81.
t in Jamaica, Mauritania, *parcius in* Melita
lia, Gades. *parasiticum radicum.*

ZANNICHELLIA.

NICHELLIA. *Fl. lapp.* 321. *Fl. svec.* 745; palustris.
. *Hort. cliff.* 437. *Roy. lugdb.* 9. *Gron. virg.* 143.
chellia palustris major, foliis gramineis. *Mich.*
71. *t.* 34. *f.* 1. 2.
les vulgaris. *Vaill. act.* 1719. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
ogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis.
h. pin. 193. *prodr.* 101.
ogetoni similis graminifolia ramosa & ad geni-
polyceratos. *Pluk. alm.* 305. *t.* 102. *f.* 7.
t in Europæ, Virginiæ *fossis, fluviis.* ⊙

CERATOCARPUS.

ATOCARPUS. *Amæn. acad.* 1. *p.* 412. *Hort.* arenarius.
281. * *Buxb. act.* 1. *p.* 241.
t in Tatariæ *arenosis.* ⊙

ELATERIUM.

TERIUM. *Jacq. amer.* 31. *t.* 154. † charthagi-
t in America. ⊙ nense.

Pedun

Pedunculi feminei uniflori : masculi multiflori hypocrateriformes.

DIANDRIA.

ANGURIA.

trilobata. 1. ANGURIA foliis trilobis. *Jacq. amer.* 31. *t.*
Anguria fructu parvo, folio tricuspidi. *Plum. ic.* 22.
Habitat in America.

pedata. 2. ANGURIA foliis pedatis. *Jacq. amer.* 31. *t.*
Anguria polyphyllos, parvo fructu. *Plum. sp.* 23.
Habitat in America.

trifoliata. 3. ANGURIA foliis ternatis.
Cucumis triphyllus, flore variegato. *Plum.* [illegible] *t.* 99.
Habitat in Domingo.

LEMNA.

trisulca. 1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. *Fl. lapp.* [illegible] *svec.* 1000; 828. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* [illegible]
Lemna foliis lanceolatis: extremis decussatis [illegible] *monsp.* 91.
Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongi[illegible] culis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* [illegible]
Lenticula aquatica trisulca. *Bauh. pin.* 362.
Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.
Habitat in Europa *sub aquis pigris, puris.*

minor. 2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculi[illegible] cibus solitariis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. svec.* 99[illegible] *Roy. lugdb.* 516. *Gron virg.* 143.
Lenticula minor monorhiza, foliis subrotundi[illegible] que viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 3. [illegible] *app.* 148.
Lens palustris. *Cam. epit.* 852. *Raj. angl.* 3. *p.* 4. *f.* 1. *Vallisn. oper* 2. *p.* 81. *t.* 14, 15.
Habitat in Europæ *aquis quietis.*
Floret apud nos frequens mense julio.

INA foliis sessilibus subtus hemisphæricis, radi-ius solitariis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. svec.* 998: 826. cula palustris major: inferne magis convexa, ctu polyspermo. *Mich. gen.* 15. *t.* 11. *f.* 1. at *in* Europæ *aquis segnibus.* **gibba.**

INA foliis sessilibus radicibus confertis. *Hort.* f. 417. *Fl. svec.* 997; 825. *Roy. lugdb.* 516. cularia major polyrhiza inferne atropurpurea. ich. *gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1. cula palustris major. *Raj. angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. 2. at *in* Europæ *paludibus*, *fossis.* **polyrhiza.**

TRIANDRIA.

OMPHALEA.

HALEA foliis ovatis. † ialandria frutescens diffusa, foliis amplioribus atis petiolis biglandulis, racemis terminalibus. own. *jam.* 334. at *in* Jamaica. ♄ **diandra.**

HALEA foliis oblongis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 3. * ialandria foliis obovatis glabris ad basin biglan-is, floribus triandris. *Brown. jam.* 335. *t.* 22. 4. at *in* Jamaica. ♄ **triandra.**

TYPHA.

HA foliis subensiformibus, spica mascula femi-que approximatis. *It. scan.* 168. *Fl. svec.* 8. *n.*). ia palustris major. *Baub. pin.* 20. *Moris. hist.* 3. 246. *s.* 8. *t.* 13. *f.* 1. at *in paludibus* Europæ. e 2 *deciduæ: altera ad Spicæ masculæ basin, alte-ad ejus medium.* **latifolia.**

HA foliis semicylindricis, spica mascula femi-rque remotis. *It. scan.* 193. ia. *Hort. cliff.* 439. *Fl. svec.* 772; 830 Roy. lugdb. *Gmel. sib.* 1. *p.* 133. *Fuchs. hist.* 822. **angustifolia.**

Typha paluſtris, clava gracili. *Bauh. pin.* 20.
Typha paluſtris media. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.*
13. *f.* 2.
β. Typha paluſtris minor. *Bauh. pin.* 20.
Typha minor. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 540. *Raj. extr.*
Habitat in Europæ *paludibus.* ♃

SPARGANIUM.

erectum. 1. SPARGANIUM foliis erectis triquetris. *Fl.*
345. *Fl. ſvec.* 770; 831. *Hort. cliff.* 439. *Roy. l.*
73. *Gron. virg.* 114. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 133.
Sparganium ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 228.
Platanaria ſ. Butomon. *Dod. pempt.* 601.
β. Sparganium non ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.*
Habitat in Zonæ *frigidæ ſeptentrionalis aquoſis.* ♃

natans. 2. SPARGANIUM foliis decumbentibus planis.
Sparganium foliis natantibus plano-convexis. *Fl.*
345. *Fl. ſvec.* 771; 832.
Sparganium non ramoſum minus. *Dill. giſſ.*
ſpec. 58.
Sparganium minimum. *Raj. hiſt.* 1910. *angl.* 3. *p.*
Habitat in Europæ *borealis lacubus, paludibus.* ♃

ZEA.

Mays. 1. ZEA. *Hort. cliff.* 437. *Hort. upſ.* 281. *Roy. lugd.*
Frumentum indicum Mays dictum. *Bauh. pin.*
theatr. 490.
Frumentum indicum. *Cam. epit.* 186. *Dod. pempt.*
Habitat in America. ⊙
Varietates hujus plurimæ exiſtunt.

COIX.

Lacryma Jobi. 1. COIX ſeminibus ovatis. *Hort. cliff.* 437. *Hort.*
281. *Fl. zeyl.* 330. *Gron. virg.* 143. *Roy. lugdb.*
Lithoſpermum arundinaceum. *Bauh. pin.* 258.
Lacryma Jobi. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 216.
Ova piſcium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 191. *t.* 75.
Habitat in Indiis. ♃

TRIPSACUM.

dactyloides. 1. TRIPSACUM ſpicis androgynis.

c feminibus angulatis. *Hort. cliff.* 438. *Roy. lugdb.*
l. *Gron. virg.* 144.
nen Dactylon maximum americanum. *Pluk. alm.*
18. *t.* 190. *f.* 2.
nen Dactylon indicum efculentum, fpica articula-
. *Ambr. phyt.* 1. *p.* 545. *t.* 546 547. *Morif. hift.* 3.
185. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 11. *Scheuch. gram.* 108.
mum perenne indicum, fpica frumentacea. *Zan.*
ft. 181. *t.* 68.
itat in America. ♃

IPSACUM fpica hermaphrodita. *Linn. dec.* 17.
9. * — hermaphroditum.
chrus fpica oblonga glabra, calycibus rigidis
uadripartitis: incifuris apertis: laciniis acumina-
. *Brown. jam.* 367.
itat in Jamaica. ⊙

OLYRA.

YRA. *Amœn. acad.* 5. *p.* 408. * — latifolia.
men paniceum majus, fpica fimplici lævi, granis
tiolis infidentibus. *Sloan. jam.* 30. *hift.* 1. *p.* 107. *t.*
4. *f.* 2.
itat in Jamaica.

CAREX.

* *Spica unica fimplici.*

REX fpica fimplici dioica. *Hort. cliff.* 438. *Fl. fvec.* — dioica.
46; 833.
peroides parvum, caulibus & foliis tenuiffimis
riangularibus, fpica longiore capfulis oblongis.
Mich. gen. 56. *t.* 32. *f.* 1.
men cyperoides minimum, fpica fimplici craffa.
Morif. hift. 3. *p.* 244. *f.* 8. *t.* 12. *f. ult.* (*mas*). *Scheuch.*
gram. 497. *t.* 11.
amen Cyperoides minus, ranunculi capitulo lon-
giore. *Raj. angl.* 3. *p.* 425.
ibitat in Europæ *pratis humidis.* ♃

AREX fpica fimplici androgyna ovata: fuperne ma- — capitata.
fcula, capfulis imbricato-patulis.
yperoides parvum, caulibus & foliis tenuiffimis
triangularibus, fpica fubrotunda. *Mich. gen.* 56. t.
32. *f.* 2.

Gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitu plici asperiore rotundo. *Moris. hist.* 3. *p.* 24 *t.* 12. *f.* 6.

Habitat in Lapponia, Anglia. ♃

Simillima C. dioicæ, sed Spica exacte ovata: api scula; nec cylindrica dioica.

pulicaris. 3. CAREX spica simplici androgyna: superne m capsulis divaricatis retroflexis.

Carex spica simplici androgyna. *Hort. cliff.* 4 *svec.* 747; 834. *It. gotl.* 240. *Dalib. paris.* 287 *sib.* 1. *p.* 144.

Carex spica unica. *Fl. lapp.* 747.

Carex minima, caulibus & foliis capillaceis, c singulari tenuiori, capsulis oblongis utrinq minatis & deorsum flexis. *Mich. gen.* 66. *t.*

Gramen cyperoides minimum, seminibus deo flexis puliciformibus. *Raj. hist.* 1298. *Pluk.* *f.* 10. *Moris. hist.* 3. *p.* 244. *s.* 8. *t.* 12. *f.*

Habitat in Europæ *paludibus limosis.* ♃

squarrosa. 4. CAREX spica simplici androgyna cylindrica ne mascula, capsulis imbricatis horizontali

Habitat in Canada. *Kalm.*

Spica *oblonga, cylindrica, crassa, constans horizontalibus, imbricatis, apice lineari lo ipsius capsulæ prominentibus; inferne Spic exaridis masculis tegitur. Inter Carices ma meranda*

* * *Spicis androgynis*

baldensis. 5. CAREX spicis androgynis ovatis triquetri congestis terminalibus sessilibus, involucro di *Amœn. acad.* 4. *p.* 331. *

Carex alpina, capitulis albis: squamis triqu pulchre lucentibus. *Segu. ver.* 1. *p.* 125.

Gramen junceum montanum, capite squamoso. *pin.* 6. *prodr.* 13. *t.* 13.

Gramen junceum e monte baldo. *Bauh. hist.* 509.

Habitat in Baldo. *Seguier. Allioni.* ♃

Involucri *altera valvula spicis longior; altera or.* Spicæ 3. s. 4. *in capitulum congestæ, longæ* paleis lanceolatis flosculos masculos di

bus, ad quarum basin flosculi feminei, gibbosi: Stylo ngo, tripartito.

REX spica composita, spiculis androgynis: infe- oribus remotioribus foliolo longiori instructis, ilmo triquetro. *It. æl.* 139. *Fl. svec.* 749; 835. * **arenaria.**
:x maritima humilis, radice repente, caule trique- o, spica spadicea. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 4.
nen Cyperoides e monte ballon simile humilius, arenosis nascens. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 8.
nen cyperoides minus repens, spica divisa. *Læs. uss.* 116. *t.* 31.
itat in Europæ *arena, præsertim mobili.* ♃

REX spica composita, spiculis androgynis: infe- oribus remotioribus foliolo longiori instructis, cul- o tereti. *Fl. svec.* 748; 836. **uliginosa.**
itat in Sveciæ *paludibus sylvaticis.*

REX spica composita, spiculis ovatis sessilibus proximatis alternis androgynis nudis. *Fl. svec.* 1; 837. *Gmel. sib.* 1. *p.* 147. **leporina.**
x spicis ternis sessilibus confertis androgynis. *Fl. p.* 322.
x angustifolia, caule triquetro, spicis pluribus egantibus parum inter se distantibus. *Segu. ver.* 1. 124. *t.* 1. *f.* 2.
nen Cyperoides, spica e pluribus spicis mollibus mposita. *Scheuch. gram.* 456.
nen Cyperoides palustre majus, spica divisa. *Bauh.* 1. 6. *Moris. hist.* 3. *p.* 244. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 29.
itat in Europæ *pratis udis.* ♃
a e spiculis 5 *s.* 6, *approximatis:* Paleis *flosculos stinguentibus, griseis, seminibus ipsis longioribus* :yli *incurvi.*

REX spica composita disticha nuda: spiculis an- rogynis oblongis contiguis, culmo nudo. *Amæn. ad.* 4. *p.* 293. **brizoides.**
x spicis teretibus acutis alternis se contingenti- s. *Hall. helv.* 244.
x, fibrata radice, angustifolia, caule exquisite tri- gulari. *Mich. gen.* 70. *t.* 33. *f.* 17.
nen Cyperoides elegans, spica composita asperio- . *Raj. hist.* 1297. *Moris. hist.* 3. *p.* 245.
itat in Europa.

vulpina. 10. CAREX spica supradecomposita inferne la spiculis androgynis ovatis sessilibus glomerati perne masculis. *Hort. cliff.* 438. *Fl. svec.* 750 *Dalib. paris.* 286. *Roy. lugdb.* 74. *Gmel. sib.* 1. *t.* 32.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule ex triangulari, spica brevi habitiore compacta, *gen.* 69. *t.* 33. *f.* 13. 14.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica con *Bauh. pin.* 6. *Moris. hist.* 3. *p.* 244. *s.* 8. *t.* 12. *f.*

Habitat in Europæ *paludibus nemorosis.*

muricata. 11. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis gynis, capsulis acutis divergentibus spinosi *svec.* 752; 839. *Gmel. sib.* 1. *p.* 148.

Carex spica androgyna, spiculis compactis alternis, culmo nudo compresso. *Guett. stam* 149.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia caule exquisite triangulari, spica brevi int *Mich. gen.* 69. *t.* 33. *f.* 11.

Gramen Cyperoides spicatum minimum, spic sa aculeata. *Scheuch. gram* 485.

Gramen nemorosum, spicis parvis asperis. *B* 7. *Moris. hist.* 3. *p.* 244. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 27.

Habitat in Europæ *nemoribus humentibus.* ♃

axillaris. 12. CAREX spiculis ovatis sessilibus remotis a nis, bracteis culmum æquantibus.

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis par libus in foliorum alis. *Moris. hist.* 3. *p.* 244 12. *f.* 17. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 3. *Scheuc* 483.

Habitat in Europæ udis. ♃

loliacea. 13. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis gynis; capsulis ovatis teretiusculis muticis catis. *Fl. svec.* 2. *n.* 840.

Habitat in Svecia.

Radix *repens.* Folia *graminea*, *tenera*, *levia* mus *levis*, *superne nudus*. Spiculæ 4. *s.* 8, *parvæ*, *ad apicem culmi sparsæ*, *albidæ*. *ovata*, *obtusa*, *mutica* demto pistillo, *subtus data*. Differt a C. muricata, cui *simillima* dimidio minor, quod capsulæ minus divarica

tusæ, nec margine acutæ; ad hanc nostram propius accedunt figuræ. Moris. hist. s. 8. t. 12. f. 26. Pluk. phyt. 34. t. 4. *quam ad alias.*

CAREX spiculis ovatis subsessilibus remotis androgynis, foliis caulinis culmum æquantibus. *Amæn. acad.* 4. *p.* 293. † — remota.

Carex spicis foliorum in alis sessilibus. *Guett. stamp.* 1. *p.* 151.

Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis. *Raj. hist.* 1295. *Moris. hist.* 3. *p.* 243. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 17. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 3. *Scheuch. gram.* 483.

Habitat in Europæ *umbrosis subhumidis.* ♃

CAREX spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. *Fl. svec.* 753; 841. — elongata.

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuch. gram.* 487. *t.* 11. *f.* 4?

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis longis erectis. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 84.

Gramen Cyperoides medium angustifolium, spicis teretibus erectis flavicantibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 242. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 8.

Habitat in Europa. ♃

CAREX spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis, capsulis ovatis obtusiusculis. *Fl. svec.* 754; 842. — canescens

Carex spica androgyna, spiculis compactis obscure alternis, culmo nudo compresso. *Guett. stamp.* 149.

Carex spicis plurimis remotis sessilibus subrotundis turgidis. *Fl. lapp.* 332.

Gramen Cyperoides spicis curtis divulsis. *Læs. pruss.* 117. *t.* 32.

Habitat in Europa *septentrionali.* ♃

CAREX spiculis androgynis, racemo composito. *Amæn. acad.* 4. *p.* 294. — paniculata

Carex spica paniculata. *Hall. helv.* 246.

Cyperus longus inodorus sylvaticus. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 221.

Cyperus alpinus longus inodorus, panicula ferruginea minus sparsa. *Scheuch. prodr.* 7. *t.* 8.

Gramen Cyperoides palustre, spica longiore laxa. *Raj.*

 hist.

hist 1296. *Moris. hist.* 3. *p.* 244. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 1
Scheuch. gram. 499.
Habitat in Europæ *australioris alpinis uliginosis.* ♃

* * * *Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.*

ra. 18. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotund
mascula lineari, capsulis acutis recurvis. *Fl. s*
755; 843. *Dalib. paris.* 284.
Carex spicis ad apicem tribus sessilibus: femineis s
rotundis, capsulis acutis recurvis. *Fl. lapp.* 3
Gramen Cyperoides palustre aculeatum, capitulo l
viore. T. *Scheuch. gram.* 426.
Gramen Cyperoides aculeatum germanicum s. mi
Bauh. pin. 7. *Moris. hist.* 3. *p.* 243. *s.* 8. *t.* 12. *f.*
Habitat in Europæ *paludibus.* ♃

data. 19. CAREX spicis femineis sessilibus oblongis: infer
axillari, foliis subfiliformibus.
Cyperoides spicis ex summo caule pluribus digit
feminis mare nihilo brevioribus. *Hall helv.* 23
Gramen caryophylleum, angustissimis foliis, spicis
silibus brevibus erectis non compactis. *Moris.*
3. *p.* 243.
Gramen caryophyllatum nemorosum, spica multi
Bauh. pin. 4. *theatr.* 47. *prodr.* 22. *Scheuch.* g
450. *Mich gen. t.* 32. *f.* 14.
Habitat in Helvetia, Anglia, Lapponia. ♃
Folia *pedalia, angustissima, rigidiuscula, inferne*
via. Culmus *solidior, læviusculus, hinc rotund*
foliis longior. Spicæ *tres, sessiles:* Mascula *term*
lis, oblonga, feruginea. Femineæ 2, *alternæ,*
les, ovato oblongæ; fusco-ferrugineæ: superiore
que subjecto folio; inferiore ex ala folii, longitu
culmi. Flosculi *minus arcte imbricati:* Cap
obsolete pubescentes.

gitata. 20. CAREX spicis linearibus erectis: mascula brev
inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distanti
Fl. svec. 758; 844. *Hort. cliff.* 438. *Dalib.* p
285. *Roy. lugdb.* 75.
Carex spica mascula terminali, quam feminea su
ma breviore, capsulis distantibus. *Fl. lapp.* 3
Cyperoides montanum nemorosum, caule triqu
compresso, spicis ferugineis tenuioribus inter se
stantibus. *Mich. gen.* 65. *t.* 32. *f.* 9.

Gra

m caryophyllatum montanum, ſpica varia. *Bauh.* 4. *prodr.* 9. *Scheuch. gram.* 448.
m caryophyllatum polycarpon, fructu triangu- *Læſ. pruſſ.* 112. *t.* 27.
t *in* Europæ *nemoribus.* ♃

EX ſpicis femineis ſeſſilibus ſubſolitariis ova- maſculæ approximatis, culmo nudo, capſulis eſcentibus. *Fl. ſvec.* 845. * — montana.
oides montanum, foliis anguſtis parvis, ſpica licea diviſa. *Scheuch. gram.* 419?
oides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule indo triquetro, ſpica ſeminali nigricante plerumunica. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.
t *in* Europæ *montanis apricis.* ♃
mollia, quam congenerum magis flaveſcentia. Spica nea evadit maturitate nigra. Semina vix conſpicue ſunt.

EX ſpica maſcula oblonga, feminea ſeſſili ova- foliolo florali breviori approximata. *Fl. ſvec.* ; 846. — globularis.
: ſpica maſcula a feminea in ala folioli remota. *lapp.* 336.
t in Europa *frigidiore.*

EX ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus ongis, inferiore foliolo proprio breviore. *Fl.* . 760; 847. — filiformis.
roides ſylvaticum tenuifolium, ſpicis parvis te- bus ſpadiceo-viridibus. *Scheuch. gram.* 425. *t.* *f.* 11.
t in Europæ *nemoribus.*

EX ſpicis terminalibus confertis ſubrotundis: ſculina oblonga. *Roy. lugdb.* 75. — pilulifera.
en cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummita- caulis ſeſſilibus globulorum æmulis. *Pluk. alm.* *t.* 91. *f.* 8.
t in Europa.

EX ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis; ma- la oblonga. *Fl. ſvec.* 756; 848. — ſaxatilis.
ſpicis tribus ad apicem ſeſſilibus, femineis ova- tris. *Fl. lapp.* 337.
roides alpinum ſaxatile, caule cubitali rotundo-

 tri-

triquetro nudo, ſpicis brevibus binis ſ. ter
fertim naſcentibus, ſquamis obtuſe mu
Mich. gen. 63. t. 32. f. 4?
Habitat in Europæ *alpibus.*

* * * * *Spicis ſexu diſtinctis: femineis peduncul*

atrata. 26. CAREX ſpicis androgynis terminalibus pe
tis: florentibus erectis; fructiferis penduli
cliff. 438. *Fl. ſvec.* 761, 849. *Gmel. ſib.* 1. p
Carex ſpicis ad apicem culmi pendulis an
Fl. lapp. 324. *Roy. lugdb.* 74.
Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyl
cis atris & tumentibus. *Scheuch. gram.* 481
Gramen Cyperoides alpinum majus, ſpicis a
rimis ſimul junctis. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 55. *t.*
Habitat in Alpibus Europæ.

limoſa. 27. CAREX ſpicis ovatis pendulis: maſcula
erectiore, radice repente. *Hort. cliff.* 439.
ſvec. 762; 850. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 140.
Carex ſpicis verſus apicem pendulis: maſcu
mineis. *Fl. lapp.* 325.
Carex ſpicis feminiferis latis ovalibus pendu
helv. 239.
Cyperoides ſpica pendula breviore: ſquami
ceo ſ. fuſco rutilante viridibus. *Scheuch. gra*
10. *f.* 15.
Habitat in Europæ *frigidæ paludibus ſylvaticis.*

capillaris. 28. CAREX ſpicis pendulis: maſcula erecta,
oblongis diſtichis, capſulis nudis acumin
ſvec. 763, 851. * *It. gotl.* 240.
Carex ſpicis ex apice pendulis: maſculina &
albis. *Fl. lapp.* 326.
Cyperoides alpinum, ſpicis feminiferis pend
nis in ſummo caule. *Segu. veron.* 3. *p.* 83.
Gramen Cyperoides puſillum, ſpica flaveſcent
elyſ. 1. *p.* 58. *t.* 40.
Habitat in Sueciæ *pratis humidis.*

pallefcens. 29. CAREX ſpicis pendulis: maſcula erecta, f
ovatis imbricatis, capſulis confertis obtu
ſvec. 764; 852. * *Gmel. ſib.* 1. *p.* 139.
Carex ſpicis tribus pedunculatis erectis remoti
ſcula & femineis. Fl. lapp. 327. Roy. lug

Cyperoides polystachyon flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 5. *Mich. gen.* 61. *t.* 39. *f.* 13.
Habitat in Europæ *paludibus*. ♃

CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Fl. svec.* 765; 853. *Dalib. paris.* 283. *Gmel. sib.* 1. *p.* 136. — panicea.
Carex spicis remotis sessilibus, capsulis globosis. *Fl. lapp.* 333.
Carex spicis maribus gracilibus, feminis turgidis & erectis. *Hall. helv.* 240.
Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis e rarioribus & tumidioribus vesicis compositis. *Mich. gen.* 61. *t.* 32. *f.* 11. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 7.
Habitat in Europæ *uliginosis*. ♃

CAREX spicis terminalibus pedunculatis: mascula feminea que, capsulis subulatis longitudine spicæ. — folliculata.
Gramen Cyperoides marianum, tamarisci belgarum pericarpiis ad intervallum calami glomeratis. *Pluk. mant.* 96. *t.* 419. *f.* 1.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Culmis *triqueter*, *bipedalis*, *vestitus* Foliis *angustioribus*. Spica *terminalis mascula*, *oblonga*, *pedunculata*. *In eadem ala* Spica feminea *ex Capsulis* 7-8, *conico-subulatis*, *longitudine ipsius spicæ*, *in fundo semine fætis*, *patulis*.

CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. — Pseudo-Cyperus.
Carex spicis pendulis: omnibus femineis: unica androgyna inferne mascula. *Hort. cliff.* 439. *Fl. svec.* 766; 854. *Roy. lugdb.* 75. *Gron. virg.* 114. *Dalib. paris.* 281.
Carex spicis pluribus in summo caule tenuibus viridibus, præter masculam quasi aristatis. *Gmel. sib.* 1. *p.* 81.
Cyperoides spica pendula breviore. *Scheuch. gram.* 440.
Gramen Cyperoides spica pendula breviore. *Bauh. pin.* 6. *Moris. hist.* 3. *p.* 242. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 5.
Pseudo Cyperus. *Dod. pempt.* 339.
Habitat in Europæ *fossis*.

CAREX *spicis remotissimis* subsessilibus bractea *vaginante*, *capsulis* angulatis mucronatis. — distans.

Carex

Carex spicis parvis longe distantibus T. *Raj. hist.* 1
Scheuch. gram. 431.
Gramen cyperoides gracile alterum, glomeratis t
spatio distantibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 243. *f.* 8. *t.* 12.
Cyperoides spicis feminalibus breviter pedunc
& inter se & a mare remotissimis. *Hall. helv.*
Habitat in Europæ *australioris paludibus.* ♃
Differt a C. cæspitosa *Spicis longe distantibus*, *f*
e vagina folii, *breviter pedunculatis*, *nec nutan*
Capsulis acuminatis: *squama calycina acuta.*

cæspitosa. 34. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsess
mascula terminali, culmo triquetro. *Fl. svec*
855. *Gmel. sib.* 1. *p.* 137.
Gramen Cyperoides caryophyllatum, folio lo
& angustiore, spicis sessilibus compactis e
Moris. hist. 3. *p.* 243. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 14. *an potiu*
Habitat in Europæ *paludibus turfosis.* ♃

* * * * * *Spicis sexu distinctis*: *masculis pluribus*

acuta. 35. CAREX spicis masculis pluribus, femineis sub
bus, capsulis obtusiusculis. *Fl. svec.* 769; 85?
lib. paris. 281.
Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis
florali brevioribus: superioribus masculis. *Ho*
439. *Roy. lugdb.* 74.

nigra. α. Carex nigra verna vulgaris. *Fl. lapp.* 330.
Gramen Cyperoides, foliis cariophyllæis, vulgatiss
Raj. hist. 1292.

ruffa. β. Carex spicis masculis superioribus numerosis, fe
inferioribus: intermedia unica androgyna. *Roy.*
75.
Carex maxima, spicis plurimis remotis longis. *F*
329.
Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis habitio
squamis curtis. *Mich. gen.* 62. *t.* 32. *f.* 12.
Cyperoides latifolium, spica ruffa s. caule tria
Scheuch. gram. 458.
Gramen Cyperoides spica, ruffa s. caule tria
Bauh. pin. 6.
Habitat in Europa *ubique*: α. *in siccioribus*, β. *in*
sis. ♃

vesicaria. 36. CAREX spicis masculis pluribus, femineis

atis. capſulis inflatis acuminatis. *Fl. ſvec.* 768;
ſ. *Dalib. pariſ.* 282. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 143.
c ſpicis plurimis: floreſcentibus tenuibus, fructi-
s craſſis. *Fl. lapp.* 331
roides veſicarium, ſpicis viridantibus & ſubfuſcis.
euch. gram. 470.
en Cyperoides anguſtifolium, ſpicis longis ere-
. *Bauh. pin.* 6.
c culmo longiſſimo, ſpicis tenuibus remotis. *Fl.*
). 328. *Roy. lugdb.* 75.
en Cyperoides ſylvarum tenuius ſpicatum. *Raj.*
. 1295. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f* 9.
euch. gram. 418.
c ſpicis femininis oblongis pedunculatis breviori-
: maſculis ſeſſilibus, ultima longiſſima, capſulis
atis acuminatis. *Roy. lugdb.* 76.
en Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis te-
bus flaveſcentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242.
at in Europæ *udis ſylvaticis.*

REX ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis **hirta.**
pedunculatis erectis, capſulis hirtis. *Fl. lapp.* 335.
ſvec. 757; 858.
: piloſa, ſpicis erectis: maſculis tribus ſeſſilibus:
unda minore: femineis duabus remotis. *Hort. cliff.*
.
roides polyſtachyon lanuginoſum. *Moriſ. hiſt.*
p. 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 10. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34.
f.
at in Europæ *ſabuloſis.* ♃
*æ, villoſæ, inflatæ, apice bicornes. Folia extus
umque vaginæ albo-villoſæ.*

• A X Y R I S.

'RIS foliis lanceolatis tomentoſis, floribus fe- **Ceratoides.**
neis lanatis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 24.
a foliis lanceolatis, femininis hirſutis. *Roy. lugdb.*
).
oides orientalis fruticoſa, elæagni folio. *Tournef.*
. 52.
at in Tataria, Moravia. ♄

'RIS foliis ovatis, caule erecto, ſpicis ſimplici- **Amaran-thoides.**
; *Amæn. acad.* 3. *p.* 24.

Atri-

Atriplex montana incanescens, latiusculo folio sinuato, fructu in thyrsulis squarrosis nigricante pilo. *Amm. ruth.* 23?

Habitat in Dauria. ☉

Folia *scabra pilis stellatis.* Rami *fructiferi ad longe nudi.* Spica *minima, subsessilis, simplici ramos terminans.*

hybrida. 3. AXYRIS foliis ovatis, caule erecto, spicis conglomeratis. *Amœn. acad* 3. *p.* 24.

Habitat in Sibiria. ☉

Simillima praecedenti, a qua differt Spica *longe culata, conglomerata f. secunda, torta,* ramis *feris juxta caulem congestis* Foliis, *magisque*

prostrata. 4. AXYRIS foliis obovatis, caule subdiviso, floribus capitatis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 25.

Habitat in Sibiria. ☉

Caulis *ramosissimus, spithamæus, diffusus.* Folia *se ovata, petiolata.* Flores *ad apices ramorum glomerati, immixtis foliolis numerosis.*

TRAGIA.

volubilis. 1. TRAGIA foliis cordato-oblongis, caule volubili. *Læfl. it.* 233.

Tragia scandens, foliis hastatis serratis hispidis. *jam.* 336.

Tragia alia scandens, urticæ folio. *Plum. gen.* 252. *f.* 2.

Urtica racemosa scandens angustifolia, fructu co. *Sloan. jam.* 38. *hist.* 1. *p.* 123. *t.* 82. *f.* 1. *suppl.* 105.

Funis urens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 13. *t.* 9.

β. Tragia scandens, longo betonicæ folio. *Plu* 14. *ic.* 252. *f.* 1.

Habitat in Indiis. ♄

Caulis *volubilis, contra solem scandens.* Folia *c oblongo acuminata, argute serrata, petiolata, gidis adspersa.* Racemi *axillares, solitarii,* Flosculis *viridibus, trifidis:* Antheris 3, *lute* mineus *flos axillaris, solitarius, insidens* Ped *longo, articulato, incurvo.* Capsula *tricocca* rigidis *urentibus tecta, singulo loculo extus* notato *punctis duobus prominentibus.*

.GIA involucris femineis pentaphyllis pinnati- Involucrata.
i.
'pha involucris femineis pentaphyllis pinnatifi-
Fl. zeyl. 34.
n foliis ovato-lanceolatis ferratis hifpidis, cau-
ruticofo. *Roy. lugdb.* 201.
carpos zeylanica hirfuta, foliis lanceolatis fer-
. *Burm. zeyl.* 202. *t.* 92.
geram. *Rheed. mal.* 2. *p.* 73. *t.* 39. *Raj. hift.*

: *in* India. ♄

GIA foliis ovatis. *Fl. zeyl.* 334. *Amæn. acad.* Mercurialis.
. 409.
rialis maderafpatenfis tricoccos acetabulis de-
:a. *Pluk. alm.* 248. *t.* 205. *f.* 4.
pameni. *Rheed. mal.* 10. *t.* 82. *Raj. fuppl.* 205.
n foliis cordatis ferratis petiolatis, floribus fpi-
, *Gron. virg.* 153.
ot minima chamædrifolia. *Plum. fpec.* 20. *ic.*
f. 2.
minor iners fpicata, folio fubrotundo ferrato,
u tricocco. *Sloan. jam.* 38. *hift.* 1. *p.* 125. *t.* 82.

in India.
ma β. parum vel nihil ab α differt.

IA foliis lanceolatis fubdentatis, pedunculis urens.
ifitifoliis.
parvus urens, foliis quercinis, virginianus.
alm. 320. *t.* 107. *f.* 5.
in Virginia. ○

IA foliis lanceolatis obtufis integerrimis. *Fl.* Chamælea.
335. *
ea foliis linearibus, flofculis fpicatis, echina-
ctu. *Burm. zeyl.* 59. *t.* 52.
ranacu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 63. *t.* 34. *Raj. hift.*

in India.

HERNANDIA.

ANDIA foliis peltatis. *Hort. cliff.* 485. t. fonora.
Fl. zeyl. 423. *

Her-

Hernandia amplo hederæ folio umbilicato. gen. 6.
Nux vesicaria oleosa, foliis umbilicatis. 266. t. 208. f. 1.
Arbor Regis. *Rumph. amb.* 2. *p.* 257. *t.* 85.
Balantine. *Pet. gaz. t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Indiis. ♄

ovigera. 2. HERNANDIA foliis ovatis basi petiolatis.
Arbor ovigera. *Rumph. amb.* 3. *p.* 193. *t.* 123.
Habitat in India *orientali.* ♄

PHYLLANTHUS.

grandifolia. 1. PHYLLANTHUS caule arboreo, foliis obtusis integerrimis. *Hort. cliff.* 440.
Habitat in America. ♄

Epiphyllanthus. 2. PHYLLANTHUS foliis lanceolatis serratis floriferis. *Hort. cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 200
Phyllanthus americana planta, flores e singulorum crenis proferens. *Comm. hort.* 1. *p.* 19. *Seb. thes.* 1. *p.* 21. *t.* 13. *f.* 2. *Catesb.* 26. *t.* 26.
Filicifolia hemionitidi affinis americana epiphy. angustiore & longiori folio, ramosa caulesce *alm.* 134. *t.* 247. *f.* 4 & *t.* 36. *f.* 7.
Habitat in America *calidiore*, Surinamo, Carolina, Porto Ricco. ♄
Conf. Xylophyllos ceramica. *Rumph. amb.* 7. 12, sed videtur propriæ speciei, quam e bui.

Niruri. 3. PHYLLANTHUS foliis pinnatis floriferis, pedunculatis caule herbaceo erecto. *Fl.* *Hort. upsf.* 282.
Phyllanthus foliis alternis alternatim pinnatis, dependentibus ex alis foliorum. *Hort. c*
Urinaria indica erecta vulgaris. *Burm. zeyl.* *f.* 2.
Herba mœroris alba. *Rumph. amb.* 6 *p.* 41. *t.*
Fruticulus capsularis hexapetalos. cassiæ poetar brevioribus. *Pluk. alm.* 159. *t.* 183. *f.* 5.
Niruri barbadense, folio ovali subtus glauco, florum brevissimis. *Mart. cent.* 9. *t.* 9.
Kirganeli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 29. *t.* 15. *Raj.*

bitat in Indiis. ⊙
lis hujus glaber; sequentis subpubescens.

YLLANTHUS foliis pinnatis floriferis, floribus Urinaria.
ssilibus, caule herbaceo procumbente. *Fl. zeyl.* 332.
ticulus capsularis hexapetalos, brevioribus foliis
t angustis. *Pluk. alm* 159. *t.* 183. *f.* 6.
rba mœroris rubra. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 17. *f.* 2.
ru - kirganeli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 8. *t.* 16. *Raj.*
endr. 29.
bitat in India. ⊙
lia in hac erecta, nec ut in antecedenti horizontalia.

YLLANTHUS foliolis alternis cuneiformibus maderaspatensis.
ucronatis. *Roy. lugdb.* 200.
ouri maderaspat. sennæ folio longiore. *Pet. gaz.*
bitat in India.

HYLLANTHUS foliis pinnatis floriferis, caule Emblica.
rboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333.
yrobalanus Emblica. *Bauh. pin.* 445. *Rumph. amb.*
p. 1. *t.* 1.
lika. *Zan. hist.* 159. *t.* 61.
li - camarum. *Rheed. mal.* 1. *p.* 69. *t.* 38. *Raj. hist.*
1556.
abitat in India. ♄

TETRANDRIA.

CENTELLA.

ENTELLA foliis cordatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* 99.* villosa.
bitat ad Cap. b. Spei.
tura Dioscoreæ.

ENTELLA foliis lanceolatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* glabrata.
100. *
abitat ad Cap. b. Spei.
eneris hujus species videtur Planta. Pluk. phyt. 236.
f. 6.

BETULA.

ETULA foliis ovatis acuminatis serratis. *Hort. cliff.* alba.
442. *Fl. svec.* 776; 859. *Amæn. acad.* 1. *p.* 2. Roy.
lugdb. 85. *Hall. helv.* 158. *Gmel. sib.* 1. *p.* 166.

Betula foliis cordatis serratis. *Fl. lapp.* 341.
Betula. *Bauh. pin.* 427. *Cam. epit.* 69.
Habitat in Europa *frigidiore.* ♄

nigra. 2. **BETULA** foliis rhombeo-ovatis acuminatis du[illegible]
to-serratis.
Betula foliis ovatis oblongis acuminatis serratis. [illegible]
virg. 188; 146.
Betula nigra virginiana. *Pluk. alm.* 67. *Raj. dend*[illegible]
Habitat in Virginia, Canada. ♄
Folia *ovata*, *serrata*: *serraturis majoribus profu*[illegible]
bus remotioribus & *insuper minimis tenuissimis*
sertis; *basis foliorum ex angulo obtuso integ*[illegible]
Ramuli *pubescentes.* *Petioli villosi.*

lenta. 3. **BETULA** foliis cordatis oblongis acuminatis se[illegible]
Betula julifera, fructu conoide, viminibus lentis.
virg. 115; 146.
Habitat in Virginia, Canada. ♄
Folia *cordato-ovata*, *acuminata*, *tenuissime* & [illegible]
serrata, *glabra.* Amentum *fructus ovatum*, [illegible]
squamis acuminatis, *integris.*

nana. 4. **BETULA** foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp.* [illegible]
6. *f.* 4. *Fl. svec.* 777; 860. *Amæn. acad.* 1. *p.* 4[illegible]
Hort. cliff. 442. *Roy. lugdb.* 85. *Hall. helv.*
Gmel. sib. 1. *p.* 170.
Betula pumila, foliis subrotundis. *Amm. act.* 9. *p*[illegible]
t. 14. *ruth.* 259.
Habitat in Alpibus Lapponicis, *paludibus* Suecia[illegible]
siæ. ♄

alnus. 5. **BETULA** pedunculis ramosis.
Alnus. *Fl. lapp.* 340. *Fl. svec.* 775; 861. *Hort*
441. *Roy. lugdb.* 85. *Gmel. sib.* 171.

glutinosa. α. Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Bauh. pin*
Alnus. *Cam. epit.* 68. *Læs. pruss.* 10. *t.* 1.

incana. β. Alnus folio incano. *Bauh. pin.* 428.
Habitat in Europa *a* Lapponia *in* Gades. ♄
Limites inter Alnum & Betulam *nullos a natu*[illegible]
sitos esse docuere species 2 & 3.

B U X U S.

sempervirens. 1. **BUXUS.** Hort. cliff. 441. Hort. ups. 283. *Mat*
423. Roy. lugdb. 400.

:us arborefcens. *Bauh. pin.* 471. *arb.*
us. *Dod. pempt.* 782.
:us humilis. *Dod. pempt.* 782. *fuf.*
us foliis rotundioribus. *Bauh. pin.* 471.
itat in Europa *auftrali.* ♄

URTICA.

* *Oppofitifoliæ.*

TICA foliis oppofitis ovatis ferratis, amentis fru- *pilu.*
ifferis globofis. *Hort.cliff.* 440. *Hort. upf.* 282. *Roy.*
gdb. 209. *Mat. med.* 420. *Sauv. monfp.* 307.
ca urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.
ca 1. diofcoridis femine lini. *Dod. mem.* 4. *p.* 323.
ca romana. *Lob. ic.* 522.
itat in Europa *auftrali.* ⊙

TICA foliis oppofitis cordatis ferratis, amentis balearica.
uctiferis globofis.
ca pilulifera, foliis cordatis circumferratis. *Hall.*
lv. 27.
itat in India. ⊙
is nimium U. piluliferæ, *fed Folia cordata, rugo-*
, caule & petiolis purpurafcentibus. Forte varietas
l filia prioris.

TICA foliis oppofitis ovatis fubintegerrimis, dodartii.
nentis fructiferis globofis.
ca altera pilulifera, parietariæ foliis. *Dod. mem.*
p. 323.
ca pilulifera, parietariæ facie, femine lini. *Morif.*
ft. 3. *p.* 1 6.
itat - - - - ⊙
is nimium præcedentibus duabus, etiam floribus ma-
ulis inferne locatis, fed Folia vix ferrata.

TICA foliis oppofitis ovatis, racemis bipartitis. pumila.
ca foliis lanceolato ovatis petiolorum longitudine
cemis dichotomis petiolo brevioribus. *Gron. virg.*
:4; 145.
itat in Canadæ *aquofis.*
ix *fibrofa.* Caulis *digiti altitudine, fimplex.* Folia
ppofita, ovata, trinervia, nuda, ferrata, petiolis fe-
longitudine digiti. Racemi *axillares, bipartiti vel*
im dichotomi, longitudine petiolorum.

urens. 5. URTICA foliis oppositis ovalibus.
Urtica androgyna, foliis ovalibus. *Hort. cliff.* 44
svec. 773; 862. *Roy. lugdb.* 210. *Dalib. parif.* 28
Urtica foliis ovatis, amentis cylindraceis androg
Fl. lapp. 375. *Hall. helv.* 178.
Urtica urens minor. *Bauh. pin.* 232.
Urtica urens minima. *Dod. pempt.* 152.
Habitat in Europæ *cultis.* ⊙

dioica. 6. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis gem
Urtica dioica, foliis oblongo-cordatis. *Hort. cliff.*
Fl. svec. 774; 863. *Mat. med.* 419. *Roy. lugdb.*
Hall. helv. 177. *Dalib. parif.* 289.
Urtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, sex
stincta. *Fl. lapp.* 374.
Urtica urens maxima. *Bauh. pin.* 232.
Urtica urens altera. *Dod. pempt.* 151.
β. Urtica ægypti maxima. *Hass. iq. it.* 487.
Habitat in Europæ *ruderatis.* ♃

grandifolia. 7. URTICA foliis oppositis ovatis, stipulis cordat
divisis, racemis paniculatis longitudine foliorū
Urtica erecta, foliis ovatis acuminatis trinerviis
dis, racemis compressis. *Brown. jam.* 337.
Urtica iners racemosa sylvatica, folio nervoso.
jam. 38. *hist.* 1. *p.* 124. *t.* 83. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

cannabina. 8. Urtica foliis oppositis tripartitis incisis. *Hort*
282.
Urtica foliis profunde laciniatis, semine lini.
ruth. 249. *t.* 25. *Tozzet. app.* 185.
Habitat in Sibiria. ♃
Flores inferiores masculi; superiores feminei.

cylindrica. 9. URTICA foliis oppositis oblongis, amentis cyli
cis solitariis indivisis sessilibus.
Urtica foliis oblongis serratis nervosis petiolatis.
virg. 187; 145. *
Urtica racemosa humilior iners. *Sloan. jam.* 38. *h*
p. 124. *t.* 82. *f.* 2.
Habitat in Jamaicæ, Virginiæ, Canadæ *aquosis.* ♃
Stipulæ *subulatæ, caducæ.* Folia *ovato-lanceolata*
rata, trinervia, petiolata.

aris. 10. URTICA foliis oppositis ovatis ciliatis, racem
varicatis.

Parietaria racemosa, foliis ad oras villosis. *Plum. spec.* 10. *ic.* 20. *f.* 2.
Habitat in America.

URTICA foliis oppositis lanceolatis integerrimis: hinc angustioribus. *Roy. lugdb.* 210. — parietaria.
Parietaria foliis ex adverso nascentibus, urticæ racemiferæ flore. *Sloan. jam.* 50. *hist.* 1. *p.* 144. *t.* 93. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

* * *Alternifoliæ.*

URTICA foliis alternis, cordatis, racemis dichotomis, fructibus corymboso-orbiculatis. — æstuans.
Lameum majus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 214. *t.* 79. *f.* 1?
Cnio s. Urtica. *Pis. bras.* 235.
Habitat Surinami. ⊙
Caulis *simplex, pedalis, hirtus aculeis inermibus.* Folia *infima opposita; reliqua alterna; cordata lobis basees approximatis, serrata, trinervia, petiolata, hirta.* Ramus & *Pedunculus e singulis alis.* Racemus *horizontalis, lateralis, patens, dichotomus.* Flores *masculi solitarii e singula dichotomia. Antheris niveis.* *Flores* Feminei *minuti.* Semina *cernua, in orbem digesta Monoica.*

URTICA foliis alternis cordatis, glomerulis spicatis. — capitata.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis *erectus, angulatus, nudus.* Folia *alterna, cordata, acuminata, æqualiter serrata, nuda, petiolis duplo longiora, subtrinervia.* Racemi *glomerati plures in spicam simplicem dispositi, sessilem, solitariam. Differt a sexta Foliis latioribus alternis.*

URTICA foliis alternis ovatis, racemis compositis divaricatis. — divaricata.
Urtica racemosa major virginiana mitior s. minus urens. *Pluk. alm.* 393. *t.* 237. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

URTICA foliis alternis cordato-ovatis, amentis ramosis distichis erectis. *Hort. cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 210. *Gron. virg.* 145. *Gouan. monsp.* 485. — canadensis.
Urtica canadensis racemosa mitior s. minus urens. *Moris. hist.* 3. *p.* 434. *s.* 11. *t.* 25. *f.* 2.
Habitat in Canada, Sibiria. ♃
Dioica est.

angusta. 16. URTICA foliis alternis ovato-cordatis serratis petiolo subbrevioribus, spicis solitariis interruptis. *Zeyl.* 336.

Urtica sativa spicata, foliis floribusque petiolis longissimis donatis. *Burm. Zeyl.* 232. *t.* 110. *f.* 1.

Urtica pilulifera, foliis majoribus longissimis pediculis: minoribus pediculis donatis. *Burm. Zeyl.* *t.* 110. *f.* 1.

Lupulo vulgari similis ind. oriental. floribus in spica ex orgine foliorum prodeuntem. *Pluk. alm.* 22; 201. *f.* 5.

Batti Schorigeram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 75. *t.* 40.

Habitat in India.

nivea. 17. URTICA foliis alternis suborbiculatis utrinque acutis subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 441. *Roy. lugdb.*

Urtica racemifera maxima sinarum, foliis subtus argentea lanugine villosis. *Pluk. amalth.* 212.

Rameum majus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 214. *t.* 79. *f.* 1.

Habitat in Chinæ *muris.* ♃

baccifera 18. URTICA foliis alternis cordatis dentatis aculeatis caule fruticoso, calycibus femineis baccatis.

Urtica frutescens, foliis amplioribus ovatis simpliciter dentatis, nervis petiolis caulibusque aculeatis. *Brown. jam.* 337.

Urtica arborescens baccifera. *Plum. spec.* 11. *ic.*

Habitat in America ♄

MORUS.

alba. 1. MORUS foliis oblique cordatis lævibus. *Hort.* 441. *Hort. upf.* 283. *Roy. lugdb.* 211. *Dalib.* 290.

Morus fructu albo. *Bauh. pin.* 459.

Morus candida. *Dod. pempt.* 810.

Habitat in China. ♄

Folia indivisa, nitentia.

nigra. 2. MORUS foliis cordatis scabris. *Hort. cliff.* 441. *upf.* 283. *Mat. med.* 422. *Roy. lugdb.* 211. *parif.* 290.

Morus fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.

Morus. *Dod. pempt.* 810.

Habitat in Italiæ maritimis. ♄

Folia subquinqueloba, obtusiuscula, scabra. Dioica.

3. M

MORUS foliis palmatis, fructibus hispidis. papyrifera
Morus sativa, foliis urticæ mortuæ, cortice papyrifera. *Kæmpf. amæn.* 471. *t.* 472.
Morus papyrifera sativa japonica. *Seb. thes.* 1. *p.* 44. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in Japonia. ♄

MORUS foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis. rubra.
Morus foliis subtus tomentosis, amentis longis dioicis. *Gron. virg.* 146.
Morus virginiensis arbor, loti arboris instar ramosa, foliis amplissimis. *Pluk. alm.* 253. *t.* 246. *f.* 4.
Habitat in Virginia. ♄
Amenta *longitudine Betulæ albæ.* Folia *recentia subtus maxime tomentosa; sæpe etiam palmata sunt folia, sæpissime triloba, subvillosa.*

MORUS foliis ovato-oblongis utrinque æqualibus inæqualiter serratis. *Fl. zeyl.* 337. * indica.
Morus indica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 8. *t.* 5.
Tinda-parua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 87. *t.* 49.
Habitat in India. ♄

MORUS foliis ovato-oblongis utrinque æqualibus æqualiter serratis. tatarica.
Habitat ad Assoff. ♄
Præcedenti maxime affinis, sed pedunculis petiolisque longioribus, serraturis foliorum magis distinctis; fructus M. nigræ.

MORUS foliis oblongis basi hinc productioribus, spinis axillaribus solitariis. tinctoria.
Morus lactescens, foliis oblongis acutis paginis exterioribus productioribus, ligno citrino. *Brown. jam.* 339.
Morus fructu viridi, ligno sulphureo tinctorio. *Sloan. jam.* 128. *hist.* 2. *p.* 3. *t.* 158. *f.* 1. *Raj. dendr.* 14.
Morus quæ Tata-iba. *Plum. ic.* 199. *t.* 204.
Zanthoxylum aculeatum, carpini foliis, americanum, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 596. *t.* 239. *f.* 3?
Fustick wood. *Raj. dendr.* 666.
Tatai-iba. *Marcgr. bras.* 119.
Habitat in Jamaica, Brasilia. ♄
Millerus distinguit Zanthoxylum Pluk. spinis axillaribus geminis?

Arbor dioica. Folia glabra. Stylus unicus. Calyx baccatus. Læfl. it. 228.

PENTANDRIA.

XANTHIUM.

strumarium. 1. XANTHIUM caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Hort. cliff.* 443. *Hort. upf.* 284. *Fl. svec.* 7. 864. *Fl. zeyl.* 569. *Mat. med.* 424. *Roy. lugdb. Gron. virg.* 188. *Hall. helv.* 161. *Dalib. parif.*
Xanthium. *Fuchf. hift.* 579.
Lappa minor f. Xanthium diofcoridis. *Bauh. pin.*
Habitat in Europa ⊙

orientale. 2. XANTHIUM caule inermi, foliis cuneiformi-ov subtrilobis.
Xanthium elatius majus americanum, fructu spinis aduncis munito. *Morif. hift.* 3. *p.* 604. *f.* 15. *t. f.* 2.
Xanthium majus canadenfe. *Herm. lugdb.* 635.
Lappa canadenfis minori congener fed procerior. *hift.* 165.
Habitat in China, Japonia, Zeylona. ⊙
Facies *X. strumarii, fed* Planta *magis fcabra:* F *ovata, bafi cuneata, obfolete triloba f. quinquel ferrata, trinervia; minime vero cordata aut trin ta.* Fructus *triplo majores & longiores, api duobus diftantibus & uncinatis, uti reliqui fruct culei, bafique pubefcentes.* Flores mafculi *paleis fculo duplo longioribus, recurvatis.* Bracteæ *line integerrimæ adftant fructibus, folitariæ f. binæ, non funt in priore. Synonyma americanæ plant differant?*

spinofum. 3. XANTHIUM fpinis ternatis. *Hort. upf.* 283.
Xanthium fpinis triplicibus. *Hort. cliff.* 443. *lugdb.* 85.
Xanthium fpinofum, atriplicis folio. *Morif. hift.* 604. *f.* 15. *t.* 2. *f.* 3.
Xanthium lufitanicum fpinofum. *Pluk. alm.* 20 239. *f.* 1. *Herm. parad.* 246. *t.* 246. *Magn. hort. t.* 208. *Volk. norib.* 149. *t.* 149.
Habitat in Lufitania, Monfpelii. ⊙
Spinæ trifurcatæ funt ftipulæ, quarum altera fit fp

AMBROSIA.

IROSIA foliis trilobis ferratis. *Hort. upf.* 284. trifida.
ofia foliis palmatis: laciniis lanceolatis ferratis.
t. cliff. 443. *Gron. virg.* 188; 147. *Roy. lugdb.*

ofia virginiana maxima, platini orientalis folio.
rif. hift. 3. *p.* 4. *f.* 6. *t.* 1. *f.* 4.
rofia gigantea inodora, foliis afperis trifidis. *Raj.*
il. 109.
it in Virginia, Canada. ☉
mis in Hortis planta foliis trilobis eft, at varie- major, *foliis inferioribus quinquelobis gaudet, cu-* *fructificationem non vidi.*

IROSIA foliis bipinnatifidis: racemis panicula- elatior.
terminalibus glabris *Hort. upf.* 284. *Brown.*
339. *n.* 1.
ofia foliis compofito-multifidis: internodiis re-
iffimis. *Gron. virg.* 188. *Cold. noveb.* 225.
ofia maritima, foliis artemifiæ inodoris, elatior.
m. lugdb. 32. *Raj. fuppl.* 109.
ofia virginiana elatior & viridior hortenfis facie.
rif. hift. 3. *p.* 4.
it in Virginia, Canada. ☉

IROSIA foliis bipinnatifidis: primoribus ramu- artemifiifolia
um indivifis integerrimis.
ofia maxima inodora, marrubii aquatici foliis
iiter laciniatis, virginiana. *Pluk. alm.* 27. *t.* 10.
mala. Morif. hift. 3. *p.* 4. *Raj. fuppl.* 108.
it in Virginia, Penfylvania. ☉
prima ad exortum ramulorum indivifa, oblonga, *gerrima.* Caulis *primarius vix pede altior, ma-* *diffufus.* Rami *quadripedales, adfcendentes fupra* *mos, ut racemi laterales evadant, nec terminent* *itam, contra in præcedente.*

IROSIA foliis multifidis, fpicis folitariis pilofis maritima.
libus.
ofia foliis multifidis tripartitis. *Hort. cliff.* 443.
, lugdb. 85.
ofia maritima. *Bauh. pin.* 138.
ofia. *Dod. pempt.* 35.
r in Hetruriæ, Cappadociæ *maritimis areno-*

 Folia

Folia *bipinnatifida, mollissima, pubescentia.* Caule*s* *si.* Racemi *densi:* Floribus *masculis subsessilib* *fertis, nec Spica, ut in præcedenti, longo* p*ed* *insidet.*

PARTHENIUM.

Hystero-phorus. 1. PARTHENIUM foliis composito-multifidis. *cliff.* 442. *Hort. upsf.* 285. *Roy. lugdb.* 86. I *jam* 340.
Partheniastrum americanum, ambrosiæ folio. *Ni* 1711. *p.* 423. *t.* 13. *f.* 2.
Absinthium erysimi folio, achoavari alpini qu modo accedens. *Pluk. alm.* 8. *t.* 45. *f.* 3. *mal.*
Habitat in Jamaicæ *glareosis.* ⊙

integrifolium. 2. PARTHENIUM foliis ovatis crenatis. *Hort* 442. *Gron. virg.* 147.
Partheniastrum helenii folio. *Dill. elth.* 302. *t.* 292.
Ptarmica virginiana, scabiosæ austriacæ foliis di *Pluk. alm.* 308. *t.* 53. *f.* 5. & *t.* 219. *f.* 1.
Ptarmica virginiana, folio helenii. *Moris. bl* *hist.* 3. *p.* 41.
Habitat in Virginia. ⊙. ♃
Ingruente nocte comam reflectit.

I V A.

annua. 1. IVA foliis lanceolato-ovatis, caule herbaceo. *upsf.* 285. *Amæn. acad.* 3. *p.* 25.
Tarchonanthos foliis cordatis serratis trinerviis *lugdb.* 538.
Habitat in America *meridionali. D. B. Jussieu.* (

frutescens. 2. IVA foliis lanceolatis, caule fruticoso. *Amæ* 3. *p.* 25.
Parthenium foliis lanceolatis serratis. *Hort. cli* *Gron. virg.* 115. *Roy. lugdb.* 86.
Agerato affinis peruviana frutescens. *Pluk. alm.* 27. *f.* 1.
Elichryso affinis peruviana frutescens. *Herm. lugd*
Pseudo-Helichrysum frutescens peruvianum, longis serratis. *Moris. hist.* 3. *p.* 90.
Habitat in Virginia, Peru. ♄

AMARANTHUS.

** Triandri.*

AMARANTHUS glomeribus triandris pentandrisque, foliis ovatis obtusissimis emarginatis rugosis. **oleraceus.**
...m album majus. *Bauh. pin.* 118?
...itat in India. ⊙
...is magnitudine reliquos triandros superat. Folia *...enti-pallida Betæ albæ, ovata, minime oblonga-..., obtusa, acuto sinu emarginata, secundum venas ...osa, fragiliora.* Glomer *terminalis longior late-...libus, pallidus.* Flores *plerique triandri, pauci ...tandri.*

AMARANTHUS glomerulis diandris subspicatis ...atis, floribus hermaphroditis femineisque, foliis ...ceolatis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 294. * **polygamus.**
...m indicum album. *Rumph. amb.* 5. *p.* 231.
...tat in India. ⊙
...es Hermaphroditi diandri digyni & Feminei trigyni.

AMARANTHUS glomerulis triandris axillaribus ...brotundis amplexicaulibus, foliis lanceolato-ovatis. **tricolor.**
...aranthus capitulis subrotundis lateralibus, foliis ...nceolatis acuminatis. *Hort. cliff.* 444. *Hort. upsf.* ...86. *Roy. lugdb.* 419.
...aranthus folio variegato. *Bauh. pin.* 121.
...aranthus tricolor. *Lob. ic.* 252.
...itat in India. ⊙
...a utrinque viridia: suprema purpurascentia.

AMARANTHUS glomerulis triandris axillaribus ...brotundis sessilibus, foliis lanceolatis acuminatis. **melancholicus.**
...aranthus folio variegato C. B. colore obscuriori f. ...as. *Tournef. inst.* 236.
...aranthus verticillatus melancholicus, macula nigra ...n medio foliorum infectus. *Pluk. alm.* 27.
...itat in India. ⊙
...ert a præcedente: Foliis supra æneis, subtus hepa-...co-purpureis: Summis *utrinque luteo-purpurascenti-...s.* Caule *altiore, duriore, frigoris magis patiente.* ...orum *capitellis neque amplexicaulibus, neque con-...entibus. Serius floret.*

...ARANTHUS glomerulis triandris subspicatis ...vatis, foliis lanceolato-ovatis emarginatis. **gangeticus.**

Habi-

Habitat in India.

Caulis *bipedalis, rufescens.* Folia *petiolis lan-ceolato-ovata, lævia, acutiuscula, emarginata* ... *cæ terminales axillaresque glomeratæ: Differt* ... tristi *Foliis lanceolato-oblongis, viridibus*, ... *tiolatis.*

tristis. 6. AMARANTHUS glomerulis triandris rot... subspicatis, foliis ovato-cordatis emarginatis ... lo brevioribus.

Amaranthus inermis, floribus lateralibus ... confertis, foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 419?

Blitum indicum 2. *Rumph. amb.* 5. *p.* 231. *t.* 82. *f*

Habitat in China. ⊙

Caulis *inferne ramosus. Florum* capitula *sessi... axillas glomerata, nec non plurima glomerata ... cam terminalem laxam.* Flosculi *aristati.* Fol... *va viridia, ovato-cordata, obtusa, longis peti... sidentia, subtus macula livida.*

mangostanus. 7. AMARANTHUS glomerulis triandris sub... rotundatis, foliis rhombeis. *Amæn. acad.* 4...

Habitat in India.

lividus. 8. AMARANTHUS glomerulis triandris sub... rotundatis, foliis rotundato-ovatis retusis.

Amaranthus floribus virentibus densissima spic... gestis, foliis amplis rugosis, caule rubro ... *Gron. virg.* 116.

Amaranthus maximus, paniculis brevibus graci... surrectis obsolete rubris. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 9...

Blitum pulchrum rectum magnum rubrum. *Ba...* 2. *p.* 966. *an?*

Habitat in Virginia. ⊙

Planta *alta utrinque colore hepatico-russo.* Spic... *lares nullæ.* Folia *ovata: inferiora retusa s.* ... *nata; floralia acuta.* Flores *pallidi, nec rubri* ... ctus *major, compressus, obtusus.*

albus. 9. AMARANTHUS glomerulis triandris axillarib... partitis, bracteis mucronatis, foliis obovatis ... ginatis lineatis strictis.

Habitat in Philadelphiæ *maritimis.*

Caulis *erectus*, tetragonus, *lævis* Ramis *simplicib...* lia glabra, emarginata cum setula, subtus ma...

era. Spicæ *axillares*, *breviſſimæ*, *binæ*, *bipartitæ.* Bracteæ *lanceolatæ*, *ſpinoſæ*, *calyce longiores.*

AMARANTHUS glomerulis triandris axillaribus, foliis lanceolatis obtuſis repandis. **græcizans.**
…aranthus floribus lateralibus congeſtis, foliis lan-ceolatis obtuſis. *Gron. virg.* 116; 148.
…*itat in* Virginia. ⊙

AMARANTHUS glomerulis lateralibus trifidis, foliis ovatis retuſis, caule diffuſo. **Blitum.**
…ranthus foliis ovatis emarginatis. *Hort. cliff.* 444. …*L. ſvec.* 779; 865. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. helv.* 176. …*alib. pariſ.* 290.
…ranthus ſylveſtris & vulgaris. *Tournef. pariſ.* 2. … 248.
…um album minus. *Raj. hiſt.* 200. *Cam. epit.* 236. …*uk. phyt.* 212. *f.* 2.
…um rubrum minus. *Bauh. pin.* 118. *Bauh. hiſt.* 2. … 967.
…*itat in* Europa *temperatiore.* ⊙

AMARANTHUS glomerulis triandris: floribus ma-…ulis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. **viridis.**
…um album minus. *Bauh. pin.* 118. *Bauh. hiſt.* 2. … 967.
…um minus album polyſpermum folio ſubrotundo. …*oan. jam.* 49. *hiſt.* 1. *t.* 92. *f.* 1.
…um ſylveſtre ſpicatum. *Tournef. pariſ.* 2. *p.* 273. …ru. *Piſ. braſ.* 241. *t.* 241.
…*at in* Europa, Braſilia. ⊙
…a Caule *erecto*, *rubro ſtriato.* Folia *oblongo-ova-* …*margine membranaceo rubicundo undato.* Spicæ *ex* …*omerulis virides;* Flores *maſculi triphylli.*

AMARANTHUS glomerulis triandris axillaribus, foliis ovatis emarginatis, floribus femineis infundi-buliformibus obtuſis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 409. **polygonoides.**
…um polygonoides viride polyanthos. *Sloan. jam.* … *hiſt.* 1. *p.* 144. *t.* 92. *f.* 2.
…opodium humile multiflorum, foliis maculatis o-…is, floribus racemoſis axillaribus. *Brown. jam.* 184.
…*itat in* Jamaica, Zeylona.
…s *A. Bliti.* Folia *ovata*, *glabra*, *emarginata cum* …*ula minutiſſima*, *baſi cuneata*, *diſco macula alba*,

petio-

petiolis marginatis longitudine foliorum. Flore *scentes : Masculi acutiores Feminei infundi mes, pentaphylli, limbo membranaceo patulo albido.*

*** Pentandri.*

caudatus. 14. AMARANTHUS racemis pentandris deco tis cylindricis pendulis longissimis. *Hort. cli Hort. upf.* 285. *Fl. zeyl.* 563. *Roy. lugdb.*
Amaranthus maximus. *Bauh. pin.* 120.
Blitum majus peruvianum. *Clus. hist.* 2. *p.* 81.
Habitat in Peru, Persia, Zeylona. ☉

hybridus. 15. AMARANTHUS racemis pentandris deco congestis nudis, spiculis conjugatis. *Gron. vi*
Amaranthus sylvestris maximus novæ angliæ viridibus. *Raj. hist.* 201.
Amaranthus major, virentibus spicarum panic mine nigro. *Barr. ic.* 648.
Habitat in Virginia. ☉
Folia tota viridia.

paniculatus. 16. AMARANTHUS racemis pentandris supra positis: partialibus patentibus.
Habitat in America.
Similis A. cruento & sanguineo, sed duplo altio res *magis imbricati;* Panicula *inter flores m nescens.* Folia *viridia, subtus tantum nervi Serius floret.*

cruentus. 17. AMARANTHUS racemis pentandris deo tis remotis patulo nutantibus, foliis lanceolato
Amaranthus sinensis foliis variis. *Mart. cent.*
Habitat in China.
Caulis *demum totus sanguineus, lævis.* Petioli *nervi foliorum subtus purpurascentia.* Spicæ *neæ, patentissimæ, parum curvatæ.* Antheræ

flavus. 18. AMARANTHUS racemis pentandris composit mo infimisque nutantibus, foliis ovatis muc
Amaranthus spicis erectis, pediculis foliorum i mis. *Rand.*
Habitat in India. ☉
Differt a reliquis pentandris, quod *Racemi flav les* rubro-lineati. Folia *subtus costa & ne*

scentibus. Pedicelli *albo subpubescentes interlucente aculo subincarnato.*

ARANTHUS racemis pentandris compositis is: lateralibus patentissimis, foliis ovato-oblon- — sanguineus.

nthus racemis cylindricis: lateralibus cruciatim tis. *Mill. dict. t.* 22.
t *in* Bahama. ☉
nudus. Racemi *terminales*, *erecti*: *laterales pa- s*: *partiales iterum patentes.* Folia *supra lurida, s tota rufa.*

ARANTHUS racemis pentandris compositis ertis erectis, foliis ovatis mucronatis. *Hort.* 444. *Hort. upf.* 286. — hypochondriacus.
nthus sylvestris maximus novæ angliæ, spicis pureis. *Tournef. inst.* 235.
t *in* Virginia. ☉
viridis. Folia *valde acuta*, *disco russo lurida*, *ertim subtus disco purpurascentia.* Spicæ *erectæ dis purpuratissimis.* Stamina 5, *flava.*

ARANTHUS racemis pentandris lateralibus inalibusque, caule flexuoso villoso ramis retro- ratis. — retroflexus.
t *in* Pensylvania. *Kalm.* ☉
bipedalis Caule *firmo*, *subvillosa*, *flexuoso a fo- ad folium.* Rami *inferiores primum recurvi*, *eriguntur* (*sed basi divaricati*) *hinc retroflexi.* a *ovata*, *acuta.* Spicæ *terminales* & *axillares*, *les.* Habitus *A. hybridi.* Spicæ *crassæ*, *erectæ.* *li sub dio minus basi divaricati* & *retroflexi*, *in ollis Hortulanorum.* *Videtur minus affinis hybrido.*

ARANTHUS racemis pentandris cylindricis tis, axillis spinosis. *Hort. cliff.* 444. *Fl. zeyl.* 338. *r. virg.* 148. *Roy. lugdb.* 419. — spinosus.
nthus indicus spinosus, spica herbacea. *Herm.* *b.* 31. *t.* 33.
spinosum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 234. *t.* 83. *f.* 1.
t *in* Indiis. ☉

SOLANDRA.

NDRA. Rich. — capensis.

Ricinocarpos afra. *Bœrh. lugdb.* 2. *p.* 254.
Mercurialis procumbens dicoccos africana, folii- læ tricoloris. *Herm. app.* 10.
Habitat ad Cap. b. Spei. *D. C. Solander.* ♃
Radix *caulescens, ramosa in superficie terræ.* Pl *tota incano-tomentosa.* Caules *pollicares, vix* n *fi.* Folia *alterna, petiolata, cuneiformi-obova* *ciso-septemdentata.* Pedunculi *laterales infra* *foliorum, eorumque longitudine. Florum* Recept *atropurpurea,* Petala *alba.*

HEXANDRIA.

ZIZANIA.

aquatica. 1. ZIZANIA panicula effusa.
Zizania. *Gron. virg.* 189; 148.
Elymus. *Mitch. gen.* 210. *n.* 7.
Arundo alta gracilis, foliis e viridi cæruleis, lo minoribus. *Sloan. jam.* 33. *hist.* 1. *p.* 110. *t.* 67
Habitat in Jamaicæ, Virginiæ *inundatis.*

terrestris. 2. ZIZANIA panicula subracemosa. †
Katou-Tsjolam. *Rheed. mal.* 12. *p.* 113. *t.* 60.
Habitat in Malabariæ *siccis.*

PHARUS.

latifolius. 1. PHARUS. *Amœn. acad.* 5. *p.* 409. *
Pharus foliis nervosis obtusis pagina supina cœl spicientibus. *Brown. jam.* 344. *t.* 38. *f.* 3.
Gramen avenaceum sylvaticum, foliis latissimi stis longis non aristatis, glumis spadiceis. *Slo* 35. *hist.* 1. *p.* 116. *t.* 73. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

HEPTANDRIA.

GUETTARDA.

speciosa. 1. GUETTARDA. *Obs. it.* 275.
Halesia arborescens, foliis subrotundis subtus teis, spicis florum bigeminis, sustentaculis alaribus. Brown. jam. 205. t. 20. f. 1.
Habitat in Java, Jamaica. ♄

bor *habitu Hernandiæ.* Folia *amplissima, ovata s. obovata apice rotundata cum acumine, nuda, integerrima, venis alternis, petiolata: Petiolis folio longe brevioribus, compressis.* Pedunculus *e regione petioli, ut etiam Pedunculi (in summis ramis oppositi), terminatus* Cyma *brevissima, dichotoma.* Flores *masculi sessiles, alterni a latere tantum superiore cymæ.* Calyces *subtomentosi, cylindrici, integerrimi, vix manifeste bilobi.* Corolla *infundibuliformis: Tubo longo, tomentoso, cylindrico. Limbo septempartito: lobis ovali-oblongis, tubo triplo brevioribus.* Stamina 7: *Filamentis brevissimis, in fauce corollæ. Antheris oblongis, linearibus.* Pistilli *germen nullum.* Stylus *filiformis, tubo dimidio brevior.* Stigma *cylindrico-capitatum, obtusum.* Feminei *flores in eadem planta, masculis fere similes.* Drupa *sicca, subrotunda, torosa, ex* Seminibus *sex, magnis, limosis, connexis.*

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

RATOPHYLLUM foliis dichotomo-bigeminis fructibus trispinosis. *Hort. cliff.* 446. *Fl. svec.* 783; 56. *Roy. lugdb.* 214. *Dalib. paris.* 292. **demersum.**
hroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus mato. *Vaill. act.* 1719. *p.* 21. *t.* 2. *f.* 1.
isetum sub aqua repens, foliis bifurcis. *Læs. pruss.* *t.* 12.
tat in Europæ *fossis majoribus sub aqua.*

RATOPHYLLUM foliis dichotomo-trigeminis, fructibus muticis. **submersum.**
roceratophyllum folio lævi octo cornibus armato. *aill. act.* 1719. *p.* 21. *t.* 2. *f.* 2.
tat in Europæ *aquis.*
is nimium præcedenti, ut fere varietas.

MYRIOPHYLLUM.

RIOPHYLLUM floribus masculis interrupte spicatis. *Hort. cliff.* 446. *Fl. svec.* 781; 867. *Roy. lugdb.* 2. *Dalib. paris.* 292. *Sauv. monsp.* 160. **spicatum.**
ophyllum. *Fl. lapp.* 343.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *B*
141. *prodr.* 73. *t.* 73.
Habitat in Europæ *aquis quietis.* ♃
Confer. Potamogeton aquaticum pennatum min
llolis singularibus latiusculis flosculis subjecti
ris. hist. 3. *p.* 622. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 7. *Raj. angl.* 3.

verticillatum. 2. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus vertic
Hort. cliff. 446. *Fl. svec.* 782; 868. *Roy. lugd.*
Dalib. paris. 292. *Sauv. monsp.* 160.
Myriophyllum aquaticum minus. *Clus. hist.* 2. *p.*
Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum
Bauh. pin. 141.
Habitat in Europæ *inundatis.* ♃
Vidi *plantas floribus masculis & femineis distinct*
& rarius floribus hermaphroditis.

SAGITTARIA.

sagittifolia. 1. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. *Fl. lapp*
Fl. svec. 780; 869. *Roy. lugdb.* 493. *Gron. virg*
Hall. helv. 300. *Dalib. paris.* 297.
Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.
Sagitta aquatica minor latifolia. *Bauh. pin.* 194.
β. Sagitta aquatica minor angustifolia. *Bauh. pin.*
γ. Sagitta aquatica major. *Bauh. pin.* 194.
δ. Sagitta aquatica foliis variis. *Læs. pruss.* 234. *t.*
Gramen bulbosum aquaticum. *Bauh. prodr.* 4
Habitat in Europæ, Americæ *fluviis, lacubus*
An sufficienter distincta SAGITTARIA foliis co
quæ a Moris. hist. 3. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 6. *delineat*

obtusifolia. 2. SAGITTARIA foliis sagittatis obtusis, caule
Sagittariæ foliis planta, glomerato fructu monop
coriandri figura. *Pluk. alm.* 326. *t.* 200. *f.* 7.
Culitamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 93. *t.* 45.
Habitat in Asia.
Differt a præcedente, Foliorum *antica parte* d
tiore.

trifolia. 3. SAGITTARIA foliis ternatis.
Sagittaria chinensis, foliis ternis longissimis. P
29. *t.* 19 *f.* 3.
Habitat in China.

ITTARIA foliis lanceolato-ovatis. *Amæn. acad.* lancifolia.
?: 409. *
taria foliis maximis simplicibus oblongis utrinque
ductis. *Brown. jam.* 345.
nculus aquaticus plantaginis folio, flore albo,
yce purpureo. *Plum. spec.* 7. *ic.* 116. *f.* 1.
at in America.

THELIGONUM.

LIGONUM. *Sauv. monsp.* 129. *Gouan. monsp.* Cynocrambe.
1.
ariæ affinis Cynocrambe dicta, floribus musco-
Pluk. alm. 280.
crambe dioscoridis. *Bauh. pin.* 122. *prodr.* 59. *t.*
Magn. char. 150.
crambe alsines foliis. *Barr. ic.* 335. *bona.*
s facie planta nova. *Col. phyt.* 121. *t.* 36.
foetida fabio columnæ dioscoridea. *Bauh. hist.*
). 365. *Raj. hist.* 206.
ut in Italiæ, Monspelii, Siciliæ *umbrosis.* ☉
s *teretes, diffusi, flexuosi, succulenti.* Rami *op-*
ti, divaricati, ex alis foliorum oppositorum. Fo-
ovata, obtusiuscula, lævia, nervosa, sublineata,
acea, margine scabra, inferiora opposita, supe-
a alterna desinentia in Petiolos, *longitudine folio-*
, *connexos utrinque* Stipula *tridentata, membra-*
a, lata, brevi. Flores masculi *bini, oppositifo-*
pedunculis *propriis, brevissimis, unifloris.*
yx masculus *bivalvis, obtusus, revolutus. Anthe-*
13-19, *lineares, rectæ.* Femineus *calyx bival-*
solitarius, sessilis, alaris. Stylus 1, *filiformis,*
us. Stigma simplex. Semen 1, *rotundum, insi-*
receptaculo carnoso, cum quo decidit.

POTERIUM.

RIUM inerme, caulibus subangulosis. *Hort.* Sanguisorba.
446. *Hort. upf.* 288.
um inerme, filamentis longissimis. *Roy. lugdb.*
Dalib. paris. 291.
ella Sanguisorba minor hirsuta. *Bauh. pin.* 160.
ella Sanguisorba. *Camm. epit.* 777.
nella Sanguisorba minor lævis. *Bauh. pin.* 160.
ella *Sanguisorba inodora. Bauh. pin.* 160. prodr. 84.
in Europæ *australioris aspeis.* ♃

Uuuu 4 2. PO-

hybridum. 2. POTERIUM inerme, caulibus teretibus stricti
Poterium inerme filamentis florem vix superant
Roy. lugdb. 280.
Poterium agrimonoides. *Hort. upf.* 288.
Pimpinella agrimonoides. *Morif. blef* 294.
hift. 3. *p.* 264. *f.* 8. *t.* 18. *f.* 9. *Bocc. fic.* 57. *t.* 29
Pimpinella agrimonoides odorata T. *Barr. rar.*
632.
Habitat Monfpelii. ♃

fpinofum. 3. POTERIUM fpinis ramofis. *Hort. cliff.* 445.
lugdb. 240. *Gron. orient.* 290.
Pimpinella fpinofa. *Morif. hift.* 3. *p.* 262. *f.* 8.
f. 5.
Poterio affinis, foliis pimpinellæ, fpinofa. *Bau*
388.
Stœbe legitima diofcoridis. *Cluf. hift.* 2. *p.* 303.
Habitat in Creta, Libano. ♄

QUERCUS.

Phellos. 1. QUERCUS foliis lanceolatis integerrimis g
Gron. virg. 117; 149.
Quercus f. Ilex marilandica, folio longo angu
licis. *Raj. dendr.* 8. *Catesb. car.* 1. *p.* 16. *t.* 1
β. Quercus foliis oblongis non finuatis. *Catesb.*
p. 17. *t.* 17.
γ. Quercus humilis, falicis folio breviore. *Cate*
1. *p.* 22. *t.* 22.
Habitat in America *feptentrionali.* ♄

molucca. 2. QUERCUS foliis lanceolato-ovatis integ
glabris.
Quercus molucca. *Rumph. amb.* 3. p. 85. *t.* 56.
Habitat in Moluccis. ♄

Ilex. 3. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivifis f
que petiolatis fubtus incanis, cortice integro
cliff. 448. *Roy. lugdb* 81. *Gouan. monfp.* 491.
Ilex oblongo ferrato folio. *Bauh. pin.* 424.
Ilex arborea. *Bauh. hift.* 1. *p.* 95.
β. Quercus *Smilax* foliis oblongo ovatis fubtus
tofis integerrimis. *Roy lugdb* 81.
Ilex folio angufto non ferrato. *Bauh. pin.* 42
Smilax dalech. *Bauh. hift.* 2. p. 101. *fig.*
Habitat in Europa auftrali. ♄

...at *foliis integerrimis & serratis, saepius etiam in ea...m arbore; difficile sine cortice distinguitur a Subere.*

...ERCUS foliis oblongo-ovatis sinuato-spinosis ...ilibus subtus tomentosis, glandibus peduncula... *Sauv. monsp.* 96. *Gouan. monsp.* 491. **gramuntia.**
... foliis rotundioribus & spinosis, e luco gramun...o. *Magn. monsp.* 140.
...itat Monspelii. ♄

...ERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratis ...btus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Hort. ...iff.* 448. *Roy. lugdb.* 81. *Mat. med.* 427. *Sauv. ...onsp.* 96. *Gouan. monsp.* 491. **Suber.**
...r Latifolium sempervirens. *Bauh. pin.* 424.
...itat in Europa *australi.* ♄

...ERCUS foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis ...labris. *Roy. lugdb.* 80. *Gron. orient.* 291. *Gouan. ...onsp* 491. **Coccifera.**
...cus foliis ovatis dentato-spinosis, glandibus ses...ibus. *Sauv. monsp.* 96.
... aculeata cocciglandifera. *Bauh. pin.* 425. *Garid.* ... 245. *t.* 53.
... coccifera. *Cam. epit.* 774.
...itat in G. Narbonensi, Hispania, Italia, Sicilia, ...iente. Judaea. ♄

...ERCUS foliis obovatis utrinque acuminatis sinu...o-serratis: denticulis rotundatis uniformibus. ...ort. cliff.* 448. *Gron. virg.* 149. *Roy. lugdb.* 80. **Prinus.**
...rcus, castaneae foliis, procera arbor, virginiana. ...uk. *alm.* 309 *t.* 54. *f.* 3. *Raj. hist.* 1916. *Catesb. ...r.* 1. *p.* 18. *t.* 18.
...itat in America *boreali.* ♄

...ERCUS foliis cuneiformibus obsolete trilobis. ...ron. virg* 117; 149. **nigra.**
...rcus folio non serrato in summitate quasi triangu... *Catesb. car.* 1. *p.* 20. *t.* 20.
...ercus marilandica folio trifido ad sassafras acce...nte. *Raj. Catesb. car.* 19. *t.* 19.
...at in America *septentrionali.* ♄

...ERCUS foliis obtuse sinuatis setaceo-mucronatis. **rubra.**

Quercus foliorum sinubus obtusis: angulis lance seta terminatis integerrimis vix divisis. Gron. 149

Quercus esculi divisura, foliis amplioribus acul Pluk. alm. 309. t. 54. f. 4. Catesb. car. 1. p. 23.

β. Quercus foliorum sinubus obtusis: angulis acutis terminatis. intermedia vix tridentatis margine gerrimo. *Hort. cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 80.

Quercus carolinensis, virentibus venis muricata tesb. car. 1. p. 21 t. 21. f. 1.

Quercus virginiana venis rubra muricata. Pluk 309. t. 54. f 5.

Habitat in Virginia, Carolina. ♄

alba, 10. QUERCUS foliis oblique pinnatifidis: sinub gulisque obtusis. *Kalm. it.* 2. p. 357.

Quercus foliis superne latioribus opposite sinuati nubus angulisque obtusis. *Gron. virg.* 117; 14

Quercus alba virginiana. *Catesb. car.* 1. p. 21. t. 2

Habitat in Virginia. ♄

Esculus, 11. QUERCUS foliis pinnato-sinuatis laevibus, bus sessilibus. *Roy. lugdb.* 80.

Quercus parva s. Fagus graecorum & Esculus. pin. 420.

Habitat in Europa *australi.* ♄

Robur 12. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne ribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis. cliff. 448. *Fl svec.* 784; 870. *Mat. med.* 426. helv. 152. *Roy. lugdb.* 80. *Dalib. parif.* 293. sib 150.

Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.

Quercus. *Fuchs. hist.* 229. *Loes. pruss.* 211. t. 69.

Habitat in Europa ♄

Aegilops, 13. QUERCUS foliis ovato-oblongis glabris se dentatis. *Mill. dict.* t. 215.

Quercus calyce echinato, glande majore. Bauh 420.

Cerri glans Aegilops aspris. *Bauh. hist.* 1. p. 77 ctus.

Habitat in Hispania. ♄

Noscitur calyce maximo.

QUERCUS foliis oblongis lyrato-pinnatifidis: laciniis transversis acutis; subtus subtomentosis. Cerris.
Quercus calyce hispido, glande minore. *Bauh. pin.* 420.
Fagus s. Esculus. *Bauh. hist.* 1. *p.* 74. *fig.*
Habitat in Hispania, Austria. ♄
Amenta multa linearia ex alis foliorum.

JUGLANS.

JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis subaequalibus. *Hort. cliff.* 449 *Hort. upf.* 286. *Mat. med.* 430. *Roy. lugdb.* 81. *Dalib. paris.* 293. regia.
Nux juglans s. regia vulgaris. *Bauh. pin.* 417.
Nux juglans. *Dod. pempt.* 816.
Nux juglans fructu maximo. *Bauh. pin.* 417.
Nux juglans fructu tenero & fragili putamine. *Bauh. pin.* 417.
Nux juglans bifera. *Bauh. pin.* 417.
Nux juglans fructu serotino. *Bauh. pin.* 417.
Habitat - - - - ♄

JUGLANS foliolis septenis lanceolatis serratis: impari sessili. alba.
Juglans alba, fructu ovato compresso profunde insculpto durissimo: cavitate intus minima. *Gron. virg.* 190; 150.
Nux juglans alba virginiensis. *Park. theatr.* 1414. *Catesb. car.* 1. *p.* 38. *t.* 38.
Nux juglans virginiana alba minor, fructu nucis moschatae simili: cortice glabro summo fastigio velut in aculeum producto. *Pluk. alm.* 254. *t.* 309. *f.* 2.
Habitat in Virginia. ♄
Folia *ex foliolis saepius quinis: impari brevissime petiolato.*

JUGLANS foliolis undenis lanceolatis basi altera breviore. cinerea.
Habitat in America *septentrionali.* ♄
Folia ex 11 *foliolis: tenellis etiam supra nudis; basis foliolorum brevior exteriore & quasi abscissa.*

JUGLANS foliolis quindenis lanceolatis serratis; exterioribus minoribus, gemmulis super axillaribus. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 287. Gron. virg. 150. *Roy. lugdb.* 82. nigra.

Nux juglans virginiana nigra. *Herm. lugdb.* 45[illegible] *Catesb. car.* 1. *p.* 67. *t.* 67.
Habitat in Virginia, Marilandia. ♄
Folia *ex foliolis sæpius* 15: *tenellis villosis.* G[illegible] *f. glandula supra alam folii, nec ex ipsa ala.*

baccata. 5. JUGLANS foliolis ternis.
Juglans foliis oblongis obtusis pinnato-ternatis, [illegible] bus singularibus baccatis ad alas. *Brown. jam.* [illegible]
Nux juglans trifolia, fructu magnitudine nucis m[illegible] tæ. *Sloan. jam.* 128. *hist.* 2. *p.* 1. *t.* 157. *f.* [illegible] *dendr.* 6.
Habitat in Jamaica. ♄

FAGUS.

Castanea. 1. FAGUS foliis lanceolatis acuminato-serratis [illegible] nudis *Hort. cliff.* 447. * *Hort. upsf.* 287. *Roy.* [illegible] 79. *Mat. med.* 429. *Dalib. parif.* 294. *Gron. virg.*
Castanea sylvestris. *Bauh. pin.* 419.
Castanea. *Cam. epit.* 118.
β. Castanea sativa. *Bauh. pin.* 418.
Habitat in Italiæ & *australioris* Europæ *montibus.*

pumila. 2. FAGUS foliis lanceolato-ovatis acute serratis [illegible] tomentosis, amentis filiformibus nodosis. *Gro[illegible]* 150. *
Fagus foliis ovato-lanceolatis serratis. *Roy. lugd[illegible]*
Castanea pumila virginiana, racemoso fructu pa[illegible] singulis capsulis echinatis unico. *Pluk. alm.* 9[illegible] *tesb. car.* 1. *p.* 9. *t.* 9.
Castanea americana, foliis aversa parte argente[illegible] gine villosis. *Pluk. alm.* 90. *t.* 156. *f.* 2.
Habitat in America *septentrionali.* ♄

ylvatica. 3. FAGUS foliis ovatis obsolete serratis. *Hort.* 447. *Fl. svec.* 785; 871. *Roy. lugdb.* 79. *Mat* 428. *Dalib. parif.* 294.
Fagus. *Bauh. pin.* 419. *Cam. epit.* 112.
Habitat in Europa. Canada. ♄

CARPINUS.

Betulus. 1. CARPINUS squamis strobilorum planis. *Hort.* 447. *Fl. svec.* 786; 872. *Roy. lugdb.* 79. *It. scan.* *Dalib. parif.* 294.

nus. *Dod. pempt.* 841. *Cam. epit.* 71.
a ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis.
uh pin. 427.
at in Europa, Canada. ♄

LPINUS squamis strobilorum inflatis. *Hort. cliff.* Ostrya.
7. *Roy. lugdb.* 80. *Gron. virg.* 151. *Cold. noveb.* 227.
a ulmo similis, fructu racemoso lupulo simili.
uh. pin. 427.
a italica, carpini folio, fructu longiore s. brevio-
habitiore. *Mich. gen.* 223. *t.* 104. *f.* 1. 2.
ris cognata Ostrya dicta flavescens. *Pluk. alm.* 7.
56. *f.* 1.
at in Italia, Virginia. ♄

CORYLUS.

YLUS stipulis ovatis obtusis. *Hort. cliff.* 448. Avellana.
svec. 787; 873. *Mat. med.* 431. *Hort. upf.* 286.
y. lugdb. 81. *Hall. helv.* 159. *Dalib. paris.* 294.
tel. fib. 1. *p.* 150.
lus sylvestris. *Bauh. pin.* 418.
lana nux sylvestris. *Fuchs. hist.* 398.
ylus sativa, fructu albo majore, s. vulgaris. *Bauh.*
418.
ylus sativa, fructu rotundo maximo. *Bauh. pin.* 418.
ylus sativa, fructu oblongo rubente. *Bauh. pin.* 418.
ylus nucibus in racemum congestis. *Bauh. pin.* 418.
tat in Europæ *sepibus.* ♄

RYLUS stipulis linearibus acutis. *Hort. cliff.* 448. Colurna.
y. lugdb. 81.
ylus byzantina. *Herm. lugdb.* 191. *Seb. muf.* 1. *t.*
f. 2.
llana peregrina humilis. *Bauh. pin.* 418.
llana pumila bizantina. *Clus. hist.* 1. *p.* 11.
tat Byzantii. ♄

PLATANUS.

ATANUS foliis palmatis. *Hort. cliff.* 447. *Roy.* orientalis.
gdb. 78. *Hasselq. it.* 487. *Gron. orient.* 293.
anus. *Bauh. pin.* 431. *Clus. hist.* 1. *p.* 9. *Dalech.*
f. 92. *Bell. itin.* 9.
anus orientalis verus. *Park. theatr.* 1427.

Habitat in Asia, Tauro, Macedonia, Atho, L Creta, *locis riguis.* ♄

occidentalis. 2. PLATANUS foliis lobatis. *Hort. cliff.* 78. *Roy.* 7. *Gron. virg.* 151. *Kalm. it.* 2. *p.* 198.
Platanus occidentalis. *Catesb. car.* 1. *p.* 56. *t.* 5
Platanus occidentalis f. virginiensis. *Park. theatr.*
Habitat in America *septentrionali.* ♄
Confer. Platanus orientalis. *Pock. itin.* 2. *t.* 89

LIQUIDAMBAR.

styraciflua. 1. LIQUIDAMBAR foliis palmato-angulatis. *K* 3. *p.* 102.
Liquidambar. *Bauh. pin.* 502. *Gron. virg.* 151. *Ho* 287. *Mat. med.* 432. *Hort. cliff.* 486. *Roy. lugd* *Cold. noveb.* 228.
Liquidambar arbor f. Styraciflua aceris folio. *Pl* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.* 2. *p.* 65. *t.* 65.
Styrax aceris folio. *Raj. hist.* 1681. 1799.
Habitat in Virginiæ, Mexici *uliginosis.* ♄

asplenifolium. 2. LIQUIDAMBAR foliis oblongis alternatim si *Duham. arb.* 1. *p.* 366.
Myrica foliis oblongis alternatim sinuatis. *Hor* 456. *Gron. virg.* 153. *Cold. noveb.* 224.
Gale mariana, asplenii folio. *Pet. mus.* 773.
Myrti brabanticæ affinis americana, foliorum l asplenii modo divisis. *Pluk. alm.* 250. *t.* 100. *f.*
Habitat in America *septentrionali.* ♄

MONADELPHIA.

PINUS.

* *Foliis pluribus ex eadem basi vaginali.*

sylvestris. 1. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis bris. *Hort. cliff.* 450. *Fl. svec.* 788; 874. *Mat.* 434. *Roy. lugdb.* 89. *Dalib. parif.* 295. *Gmel.* *p* 178.
Pinus sylvestris. *Bauh. pin.* 491. *Fl. lapp.* 346. D *hist* 45
β. Pinus maritima altera. Bauh. pin. 492.
γ. Pinaster latifolius, julis virescentibus f. pallescentibus. Bauh. pin. 492.

δ

Pinaster tenuifolius, julo purpurascente. *Bauh. pin* 492.
Habitat in Europæ *borealis sylvis glareosis.* ♄

PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *Hort. upf.* 288. *Mat. med.* 435. *Roy. lugdb.* 89. *Gouan. monsp.* 494. — Pinea.
Pinus sativa. *Bauh. pin.* 491.
Pinus officulis duris, foliis longis. *Bauh. hist.* 1. *p.* 248.
Pinus. *Cam. epit.* 93.
Habitat in Italia, Hispania, Gallia *australi.* ♄

PINUS foliis trinis. *Gron. virg.* 152. * — Tæda.
Pinus foliis longissimis ex una theca ternis. *Cold. noveb.* 230.
Pinus virginiana tenuifolia tripilis, s. ternis plerumque ex uno folliculo setis, strobilis majoribus. *Pluk. alm.* 297. *Raj. dendr.* 8.
Habitat in Virginiæ, Canadæ *paludosis.* ♄
Species plures foliis trinis sunt, sed limites harum nondum dati, nisi a Strobilis, quos non lubenter in differentia recipio.

PINUS foliis quinis lævibus. *It. scan.* 32. * — Cembra.
Pinus foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli. *Hall. helv.* 150. *Gmel. sib.* 1. *p.* 179. *t.* 39. *Duham. arb.* 2. *t.* 32.
Pinus sativa, cortice fisso, foliis setosis subrigidis ab una vagina quinis. *Amm. ruth.* 178.
Pinus sylvestris montana tertia. *Bauh. pin.* 491.
Pinus sylvestris Cembra. *Cam. epit.* 42.
Pinaster. *Bell. conif.* 19. *Mich. gen.* 223.
Larix sempervirens, foliis quinis, nucleis edulibus. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. *obs.* 2.
Habitat in Alpibus Sibiriæ, Tatariæ, Helvetiæ, Vallesiæ, Baldi, Allobrogum, Tirolensium, Tridentinorum. ♄

PINUS foliis quinis margine scabris, cortice lævi. *Gron. virg.* 152. — Strobus.
Pinus foliis longissimis ex una theca quinis. *Cold. noveb.* 229.
Pinus canadensis quinquefolia, floribus albis, conis oblongis pendulis, squamis abieti fere similibus. *Duham. arb.* 2. *p.* 127.
Pinus *virginiana, conis* longis non ut in vulgari echinatis. *Pluk. alm.* 297.

Larix

Larix canadensis longissimo folio. *Tournef. inst.*
Habitat in Virginia, Canada. ♄
Confer. Pinus foliis quinis ab eodem exortu. *spec.* 17. *ic.* 161.
Cotyledones ... 10. Folia *quina*, *molliora*, *tri... scabra*, *angulis inconspicue serratis.* Strobili ... *maei: apice squamarum crassiore; haec conjungit* ... *& Abietem Authorum.*

Cedrus. 6. PINUS foliis fasciculatis acutis.
Abies foliis fasciculatis acuminatis. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 89. *Gron. orient.* 295.
Cedrus foliis rigidis acuminatis non deciduis, ... subrotundis selectis. *Trew. ehret. t.* 1.
Cedrus conifera, foliis laricis. *Bauh. pin.* 490. *hist.* 1404.
Cedrus libani. *Barr. ic.* 499. *Edward. ornith. t.* 1...
Cedrus phoenicea. *R. neal. spec.* 27.
Cedrus. *Bell. itin.* 162. *Cam. epit.* 57.
Habitat in Syriae Libani, Amani, Tauri *montibus.*
Strobili squamis membranaceis, retrorsum apice in... tis, aqua tepida aperiendi. Cotyledones. VI.

Larix. 7. PINUS foliis fasciculatis obtusis.
Abies foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450. *mat. med.* 437. *Roy. lugdb.* 89. *Gmel. sib.* 1. *p.* 176.
Larix, folio deciduo, conifera. *Bauh. hist.* 1. *p.* ... *Hort. anglic.* 43. *f.* 11.
Larix. *Bauh. pin.* 493. *Dod. pempt.* 668. *Cam.* ... 45. 46.
Habitat in Alpibus Helveticis, Vallesiacis, Sti... Corinthiacis, Tridentinis, Sibiriae. ♄

*** *Foliis solitariis & basi distinctis.*

Picea. 8. PINUS foliis solitariis emarginatis.
Abies foliis solitariis apice emarginatis. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 89. *Gmel. sib.* 1. *p.* 176.
Abies taxi folio, fructu sursum spectante. *T... inst.* 585.
Abies conis sursum spectantibus s. mas. *Bauh. pi...*
Abies femina s. Elate teleja. *Bauh. hist.* 1. *p.* 231
Habitat in Alpibus Helvetiae, Sueviae, Bavariae, ... tiae. ♄

NUS foliis solitariis subemarginatis: subtus linea duplici punctata. *Gron. virg.* 152. **Balsamea.**
ies minor, pectinatis foliis, virginiana, conis parris subrotundis. *Pluk. alm.* 2. *t.* 121. *f.* 1. *Raj. dendr.* 8.
bitat in Virginia, Canada. ♄
bitur antecedentis, sed Folia *latiora, obtusiora, utrinque per ramos pectinatim digesta, at duplici serie, superiore sc. breviore, subtus sunt picta linea duplici glauca: singula ex 8 ordinibus longitudinalibus punctorum alborum.* Apex *foliorum sæpe bifidus.*

INUS foliis solitariis linearibus obtusiusculis submembranaceis. **canadensis.**
ies foliis solitariis confertis obtusis membranaceis. *Gron. virg.* 191.
ies foliis piceæ brevioribus, conis parvis biunciaibus laxis. *Mill. dict. t.* 1.
bitat in America *septentrionali.* ♄

PINUS foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. **Abies.**
ies foliis solitariis apice acuminatis. *Hort. cliff.* 449. *Mat. med.* 436. *Fl. svec.* 789; 875. *Fl. lapp.* 347. *Roy. lugdb.* 88. *Hall. helv.* 147. *Dalib. paris.* 295. *Gmel. sib.* 1. *p.* 175.
cea. *Cam. epit.* 47.
cea major prima s. Abies rubra. *Bauh. pin.* 493.
ies alba s. femina *Bauh. pin.* 505.
ies minor. *Bauh. pin.* 493.
bitat in Europæ, Asiæ *borealibus humidiusculis.* ♄
lia compressa, utrinque sub carinata, supra lucida.

PINUS foliis solitariis tetragonis. **orientalis.**
ies orientalis folio brevi & tetragono, fructu minimo deorsum inflexo. *Tournef. cor.*
bitat in Oriente. ♄

THUJA.

THUJA strobilis lævibus: squamis obtusis. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 289. *Roy. lugdb.* 87. *Gmel. sib.* 1. *p.* 182. *Kalm. it.* 3. *p.* 389. **occidentalis**
uja theophrasti. *Bauh. pin.* 488.
bor vitæ. *Clus. hist.* 1. *p.* 36. *Dod. pempt.* 630.
bitat in Canadæ, Sibiriæ *subhumidis.* ♄

2. THU-

orientalis. 2. THUJA strobilis squarrosis: squamis acumina[ti] flexis. *Hort. upf.* 289.
Thuja strobilis uncinatis: squamis reflexo-acumi[natis]. *Roy. lugdb.* 87.* *Hort. cliff.* 449.
Habitat in China. ♄

aphylla. 3. THUJA strobilis quadrivalvibus, foliis turb[inatis] vaginantibus, hinc mucronatis, frondibus im[bricatis]. *Amœn. acad.* 4 *p.* 295. *
Cypressus fructu quadrivalvi, foliis equiseti in[star ar]ticulatis. *Shaw. afr.* 188. *f.* 188.
Habitat in Ægypto. ♄

CUPRESSUS.

sempervirens. 1. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus qu[adran]gulis. *Gouan. monsp.* 495.
Cupressus foliis imbricatis erectis. *Hort. cliff.* *Hort. upf.* 288. *Mat. med.* 433. *Roy. lugdb.* 8[..] *lib. parif.* 295.
Cupressus meta in fastigium convoluta f. Fe[mina]. *Tournef. inst.* 587.
Cupressus. *Bauh. pin.* 488. *Cam. epit.* 52.
β. Cupressus ramos extra se spargens f. Mas. *T[ournef.] inst.* 587.
Habitat in Creta. ♄

disticha. 2. CUPRESSUS foliis distichis patentibus. *Hor[t. cliff.]* 499. *Hort. upf.* 289. *Gron. virg.* 153. *Roy. lugd[b.]*
Cupressus americana *Catesb. car.* 1. *p.* 11. *t.* 11
Cupressus virginiana, foliis acaciæ deciduis. [..] *hort.* 1. *p.* 113. *t.* 59.
Cupressus virginiana, foliis acaciæ cornigeræ p[aribus] & deciduis. *Pluk. alm.* 125. *t.* 85. *f.* 6.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄

Thyoides. 3. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus an[cipiti]bus. *Kalm. it.* 2. *p.* 175. & 3. *p.* 114. *Mill. d[ict.]*
Cupressus nana marina, fructu cæruleo parvo. [..] *mant.* 61. *t.* 345. *f.* 1.
Habitat in Canadæ *subhumidis.* ♄
Frons f. Rami cum foliis imbricati & compressi exac[te ea]dem modo, quo Thuja, at fructus, magnitudine [bacca]rum juniperi, finditur ut in Cupresso.

[J]uniperoides. 4. CUPRESSUS foliis oppositis decussatis subulatis [pate]ntibus.

essus foliis linearibus simplicibus cruciatim posi-
, *Mill. dict. n. 6.*
at ad Cap. b. Spei. ♄
las biennes tantum possideo & vidi.

PLUKENETIA.

KENETIA.
netia scandens, hederæ foliis serratis, fructu te- volubilis.
gono. *Plum. gen.* 47. *ic.* 226.
volubilis, fructibus corniculatis. *Rumph. amb.*
p. 194. *t.* 79. *f.* 2.
tat in Indiis.
s volubilis. Folia *cordata, serrata, acuta petio-*
laxis. Racemi *compositi e flosculis Masculis nume-*
sis; infimis Femineis paucis. Fructus *similis Evony-*
margaritiferæ Pluk. phyt. 176. *f.* 4. *(qui mihi nun-*
um excrevit), sed tetracoccus.

DALECHAMPIA.

LECHAMPIA. *Hort. cliff.* 485. *Jacq. amer.* 31. *t.* scandens.
2.
champia scandens, lupuli foliis, fructu hispido
cocco. *Plum. gen.* 17.
ilus folio trifido, fructu tricocco hispido. *Plum.*
er. 89. *t.* 101.
volvulo-Tithymalus. *Bœrh. lugdb.* 2. *p.* 268. *
tat in America *meridionali.*

ACALYPHA.

ALYPHA involucris femineis cordatis incisis, virginica.
liis ovato-lanceolatis petiolo longioribus. *Hort.*
f. 290. *Fl. zeyl.* 342. * *Brown. jam.* 346. *n.* 2. *t.*
f. 2.
ypha foliis ovato-lanceolatis, involucris femineis
tusis. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 116; 153.
curialis tricoccos hermaphroditica. *Pluk. phyt.* 99.
4. *Herm. lugdb.* 687.
tat in Zeylona, Virginia. ☉

ALYPHA spicis femineis involucris cordatis ser- virgata.
tis; masculis distinctis aphyllis, foliis lanceola-
-ovatis. *Amæn. acad.* 5. *p.* 410. *
ypha humilior, foliis cordatis crenatis, spicis mix-
tis

tis alaribus & terminalibus. *Brown. jam.* 34[illegible]
f. 1.
Habitat in Jamaica.

indica. 3. ACALYPHA involucris femineis cordatis sub[illegible] tis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Fl. zeyl.*
Mercurialis zeylanica tricoccos cum acetabulis [illegible] *lugdb.* 686. *t.* 687. *Raj. hist.* 1854. *suppl.* 108.
Cupameni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 161. *t.* 81. *Raj.* 107.
β. Urtica minor iners spicata, folio subrotundo [illegible] fructu tricocco. *Sloan. jam.* 38. *hist.* 1. *p.* 12[illegible] *f.* 3.
Wellia-Cupameni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 165. *t.* 8[illegible]
Habitat in Indiis *ad fimeta.* ⊙

australis. 4. ACALYPHA involucris femineis integerrimis, lanceolatis obtusis.
Ricinoides castaneæ folio. *Plum. spec.* 20?
Habitat in America *meridionali.*

CROTON.

castaneifolium. 1. CROTON foliis lanceolatis obtusis serratis p[illegible] tis glabris. *Roy. lugdb.* 201.
Habitat in America *meridionali.*

palustre. 2. CROTON foliis ovato-lanceolatis plicatis [illegible] scabris. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 201.
Ricinoides palustre, foliis oblongis serratis, [illegible] hispido. *Mart. cent.* 38. *t.* 38.
Habitat in Vera Cruce, *locis paludosis.* ⊙

variegatum. 3. CROTON foliis lanceolatis integerrimis glab[illegible] ctis petiolatis.
Codiæum chrysostichum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 65. *t*
Tsiere-maram. *Rheed. mal* 6. *p.* 109. *t.* 61.
β. Codiæum teniosum. *Rumph amb.* 4. *p.* 68. *t.* 26.
γ. Codiæum sylvestre. *Rumph. amb.* 4. *p.* 69. *t.* 27.
Habitat in Amboina.

Cascarilla. 4. CROTON foliis lanceolatis acutis integerrimi[illegible] tiolatis subtus tomentosis, caule arboreo. [illegible] *acad.* 5. *p.* 411. *
Croton erectum glabrum foliis longis angustis [illegible] incanis margine reflexis. Brown. jam. 347.

noides æleagni folio. *Catesb. car. 2. p. 46. t. 46.*
um. spec. 20. ic. 240. f. 1.
no affinis odorifera fruticosa major, rosmarini
lio, fructu tricocco albido. *Sloan. jam. 44. hist. 1.*
133. t. 86. f. 1.
arilla. *Mat. med. 470.*
itat in America. ♄

OTON foliis ovatis obtusiusculis integerrimis læ- glabellum.
bus, fructibus pedunculatis. *Amæn. acad. 5. p.*
?9. *
on fruticosum, foliis subrotundo-ovatis subtus
bincanis alternis, spicillis axillaribus. *Brown. jam.*
18.
i folio arbor artemisiæ odore & flore. *Sloan. jam.*
19. *hist. 2. p. 30. t. 174. f. 3, 4. Raj. dendr. 91.*
itat in Jamaica. ♄

OTON foliis rhombeis repandis, capsulis pendu- tinctorium.
s, caule herbaceo. *Hort. upf. 290* * *Mat. med.*
11. *Gouan. monsp. 495. Gron. orient. 298.*
ton foliis ovatis plicatis scabris, capsulis e pedun-
lo ramoso pendulis. *Roy. lugdb. 532. Sauv. monsp.*
35.
noides ex qua paratur Tournesol ga lorum. T.
issol. act. 1712. p. 337. t. 17.
lotropium tricoccum. *Bauh. pin. 253. Raj. hist.*
55.
itat Monspelii. ☉

OTON foliis oblongis serratis basi biglandulosis, glanduló-
ibus sessilibus *Amæn acad. 5. p. 409.* * sum.
ton minus trichotomum suctum futum, foliis oblon-
is dentatis, spicis ad divaricationes ramorum.
rown jam. 346.
itat in Jamaica.

OTON foliis cordato-ovatis subtus tomentosis argenteum.
itegris subserratis. *Hort. cliff. 444.* * *Roy. lugdb.*
01.
itat in America. ☉

OTON toliis rhombeo-rotundatis utrinque mu- sebiferum.
tonatis integerrimis glabris. *Osb. it. 245.*
inus chinensis sebifera, populi nigræ folio. *Pet.*
z. 53. t. 34. f. 3.

Evonymo affinis finnarum, populi nigræ folio t
fularis, granis nigris candidiffima fubftantia
ctis, febifera. *Pluk. amalth.* 76. *t.* 390. *f.* 2.
Arbor febifera chinenfis kiu yeu. Martin *le* Co
Amm. herb. 375.
Habitat in Chinæ *humidis. Osbeck.* ♄
Glandulæ *duæ fupra bafin foliorum.* Folia *figu*
puli nigræ, fed minora, tenuiora.

Tiglium. 10. CROTON foliis ovatis glabris acuminatis fe
caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. * *Mat. med.* 4
Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro
Tiglia officinis dicto. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90
Pinus indica, nucleo purgante. *Bauh. pin.* 492.
Lignum moluccenfe, foliis malvæ, fructu av
minore cortice molliore & nigricante, pav
colis. *Bauh. pin.* 393.
Granum moluccum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 98. *t.* 4
Cadel-avanacu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 61. *t.* 75. *R*
167. 1855. *fuppl.* 112. 666.
Habitat in India. ♄

lucidum. 11. CROTON foliis oblongis fubferratis glabris
fitis fubterminalibus articulorum. *Amæn. aca*
410. *
Croton erectum glabrum, foliis ovatis oppofi
ternatis, fpicis terminalibus. *Brown. jam.*
Habitat in Jamaica. ♄

Lacciferum. 12. CROTON foliis ovatis tomentofis ferrulatis
tis, calycibus tomentofis. *Fl. zeyl.* 344. *
Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirfu
ribus fpicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91
Ricinus aromaticus fpicatus, folio circææ, fp
imum duplicatis armato, laccam in granis f
Pluk. alm. 320. *Raj. fuppl.* 113.
Habitat in India. ♄

flavens. 13. CROTON foliis cordatis oblongis integerrimi
que tomentofis, ramulis denfius tomentofis.
acad. 5. *p.* 410. *
Croton fruticulofum & villofum, foliis corda
minatis, ramulis craffius tomentofis. *Bro*
347.
Habitat in Jamaica.

14

CROTON foliis cordatis scabris subserratis petiolatis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 345. * — aromaticum
Ricinoides arbor aromatica, circææ foliis, media. *Herm. zeyl.* 202. 11.
Habitat in Zeylona.

CROTON foliis cordatis angulatis scabris subtus tomentosis. *Fl. zeyl.* 346. — moluccanum.
Nux juglans moluccana bifida. *Burm. zeyl.* 170.
Habitat in Zeylona, Moluccis.

CROTON foliis cordatis integerrimis subciliatis scabris, subtus tomentosis, caule fruticoso. *Amœn. acad.* 5. *p.* 410. * — humile.
Croton fruticosum minus, foliis villosis cordatis acuminatis, ramulis gracilibus glabris. *Brown. jam.* 347.
Habitat in Jamaica. ♄

CROTON foliis subcordatis crenatis, pedunculis racemosis oppositifoliis, caule herbaceo. — Ricinocarpos.
Mercurialis androgyna. *Vir. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 203.
Ricinocarpos americana, flore albo spicato, folio circææ acutiori. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 254. *
Habitat Surinami. ⊙
Caulis *pollicaris*: *Ramis alternis.* Folia *alterna, petiolata, subcordata, nuda, crenata.* Pedunculi *oppositifolii, foliis longiores.* Racemus *floribus passim congestis, masculis femineisque mixtis.* Calyx *3phyllus, angustus, albus.*

CROTON foliis trilobo-hastatis lanceolatis dentatis. — hastatum.
Ricinus asperior, alceæ venetæ foliis aliquatenus accedens. *Pluk. alm.* 320. *t.* 220. *f.* 2.
Habitat in India.

CROTON foliis inermi-serratis: inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 201. — lobatum.
Ricinoides herbaceum, foliis trifidis s. quinquefidis & serratis. *Mart. cent.* 46. *t.* 46.
Habitat in Vera Cruce. ⊙

CROTON foliis palmatis quinquelobis trilobisque spinoso-serratis, floribus cauli adspersis subsessilibus. *Fl. zeyl. p.* 238. — spinosum.

Ricinus maderaspatanus, quinquefidis durioribus fi margine spinosis. *Pluk. alm.* 320. *t.* 108. *f.* 3.
Habitat in India.

urens. 21. CROTON foliis ternatis serratis lanceolatis. Ricinus urens, cannabinis foliis, triphyllos. *Pluk.* 320. *t.* 120. *f.* 6.
Habitat in India.

JATROPHA.

* *Calyculati.*

gossypifolia. 1. JATROPHA foliis quinquepartitis: lobis ovatis integris: setis glandulosis ramosis. *Roy. lugdb.*
Jatropha humilior setis ramosis, foliis trilobis f. quinquelobis denticulatis. *Brown. jam.* 348.
Ricinus minor, staphisagriæ folio, flore pentapetalo purpureo. *Sloan. jam.* 41. *hist.* 1. *p.* 129. *t.* 84.
Ricinus americanus perennis, floribus purpureis, staphisagriæ foliis. *Comm. hort.* 1. *p.* 17. *t.* 9. *Mer. surin.* 38. *t.* 38.
Ricinus indicus pilosus trifidus f. quinquefidus, fasciculis atropurpureis. *Pluk. phyt.* 56. *f.* 2. & *t.* 220.
Ricinus americanus, folio staphisagriæ. *Bauh. pin.* 518.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Fructificatio Masculi floris: Perianthium *semiquinquefidum: laciniis lanceolatis, ciliatis, acutis.* Corolla *pentapetala, rosacea: Petalis subrotundis, patentibus convexis, subtus concavis, hinc revolutis.* Nectaria *ex glandulis 5, parvis, receptaculo insertis.* Filamenta 10, *subulata, in medio approximata: quorum alternis corolla brevioribus, erectis;* Antheræ *subrotundæ, versatiles.* Pistilli *rudimentum debile.* Feminei *Flores ex eadem umbella cum masculis:* Calyx & *Corolla ut in masculo.* Germen *subrotundum.* Styli 3, *dichotomi.* Stigmata *simplicia.* Capsula *rotunda, tricocca, trilocularis.* Semina *solitaria rotunda. D. Royenus.*

moluccana. 2. JATROPHA foliis ovatis integerrimis subdentatis. *Fl. zeyl.* 348. *
Nux moluccana, folio instar ricini, semine ...
Herm. zeyl. 34.
Habitat in Moluccis, Zeylona. ♄

JATROPHA foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff.* 445. *Mat. med.* 439. *Roy. lugdb.* 102. — Curcas.
Jatropha assurgens, ficus folio, flore herbaceo. *Brown. jam.* 348.
Ricinus americanus major, semine nigro. *Bauh. pin.* 432.
Ricinus ficus folio, flore pentapetalo viridi, fructu laevi pendulo. *Sloan. jam.* 40.
Pundubignacu. *Marcgr. bras.* 97.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Flos calyce & corolla pentapetala utrisque.

JATROPHA foliis multipartitis laevibus, stipulis setaceis multifidis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 202. — multifida.
Jatropha assurgens, foliis digitatis: laciniis angustis pinnatifidis. *Brown. jam.* 348.
Ricinoides americanus, tenuiter diviso folio. *Breyn. cent.* 116. *t.* 53. *Sloan. jam.* 40. *Raj. hist.* 167. *Morif. hist.* 3. *p.* 348. *f.* 10. *t.* 3. *f. ult.*
Avellana purgatrix. *Bauh. pin.* 418.
Manihot folio tenuiter diviso. *Dill. elth.* 217. *t.* 173. *f.* 213.
Habitat in America *meridionali.* ♄

* * *Acalyculati.*

JATROPHA foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laevibus. — Manihot.
Jatropha foliis palmatis pentadactylis, radice conico-oblonga carne sublactea. *Brown. jam.* 349.
Ricinus minor, viticis obtuso folio, caule verrucoso, flore pentapetalo albido, ex cujus radice tuberosa, succo venenato turgida, americani panem conficiunt. *Sloan. jam.* 41. *hist.* 1. *p.* 130. *t.* 85.
Manihot inodorum s. Yucca foliis cannabinis. *Bauh. pin.* 90. *Pluk. alm.* 241. *t.* 205. *f.* 1.
Manihot theveti, Yucca & Cassavi. *Bauh. hist.* 2. *p.* 794. *Mer. surin.* 4. *f.* 4, 5.
Arbor succo venenato, radice esculenta. *Bauh. pin.* 512.
Habitat in America *australi.* ♄
Corolla nuda. Foliorum lobus intermedius saepe utrinque sinuatus.

JATROPHA *foliis palmatis* dentatis aculeatis. Hort. *cliff.* 445. *Hort. ups.* 290. *Roy. lugdb.* 202. Gron. *virg.* 154. — urens.

Ricinus tithymaloides americanus lactescens & ... floribus albis. *Comm. hort.* 1. *p.* 19. *t.* 10.
Ricinus lactescens, fici foliis: spinulis mordac... matis. *Pluk. alm.* 320. *t.* 220. *f.* 3.
Habitat in Brasilia. ♄
Corolla nuda: masculis monopetala, feminis peta... tala.

herbacea. 7. JATROPHA aculeata, foliis trilobis, caule herba... *Roy. lugdb.* 202.
Jussieuia herbacea spinosissima urens, foliis digitat... laciniatis. *Houst. Amm. herb.* 256.
Habitat in Vera Cruce. ♃

RICINUS.

communis. 1. RICINUS foliis peltatis subpalmatis serratis.
Ricinus foliis peltatis serratis: petiolis glandulis... *Hort. cliff.* 450. *Hort. upf.* 289. *Fl. zeyl.* 339. ... *med.* 438. *Philos. bot.* 256.* *Gron. orient.* 299.
Ricinus vulgaris. *Bauh. pin.* 439.
Ricinus albus *Rumph. amb.* 4. *p.* 92.
Ricinus gallis Palma christi. *Lob. hist.* 392.
β. Ricinus africanus maximus, caule geniculato rutila... *Tournef. inst.* 532.
Ricinus ruber. *Rumph. amb.* 4. *p.* 97.
Habitat in India *utraque*, Africa, Europa *australi.* ...

Tanarius. 2. RICINUS foliis peltatis repandis. †
Tanarius minor. *Rumph. amb.* 3. *p.* 190. *t.* 121.
Habitat in India.

Mappa. 3. RICINUS foliis peltatis indivisis. †
Folium mappæ. *Rumph. amb.* 3. *p.* 172. *t.* 108.
Habitat in Ternateis & Moluccis.

STERCULIA.

Balanghas. 1. STERCULIA foliis ovatis integerrimis alternis pet... latis, floribus paniculatis. *Fl. zeyl.* 350.
Nux malabarica sulcata mucilaginosa fabacea. *Pl... alm.* 266.
Clompanus minor. *Rumph. amb.* 3. *p.* 169. *t.* 107.
Cavalam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 89. *t.* 49. *Raj. hist.* 17...
Habitat in India. ♄
Fructus *nutans*, quinquelobus: lobis reflexis, *more P... niæ dehiscentibus.*

2. STE...

RCULIA foliis digitatis. *Fl. zeyl.* 349. — fœtida.
zeylonica, folio multifido digitato. *Pluk. alm.*
6. *t.* 208. *f.* 3.
ıpanus major. *Rumph. amb.* 3. *p.* 168. *t.* 107.
Rheed. mal. 4. *p.* 75. *t.* 36. *Raj. hist.* 1564.
tat in India. ♄

H U R A.

RA. *Hort. cliff.* 486. *t.* 34. *Roy. lugdb.* 232. — crepitans.
r. americana, abutili indici folio. *Comm. hort.* 2. *p.*
1. *t.* 66. *Ehr. pict.* 12. *Trew. ehret.* 34. 35. *f.* 1.
omane arboreum ramulis ternatis, foliis cordatis
enatis. *Brown. jam.* 351.
u ex pluribus nucibus arboris Huræ. *Bauh. hist.*
p. 333. *Sloan. jam.* 214.
r crepitans. *Hern. mex.* 88.
tat in Mexico, Guayava, Jamaica. ♄

HIPPOMANE.

POMANE foliis ovatis serratis. *Hort. cliff.* 484. — Mancinell
q. hist. t. 159.
omane arboreum lactescens, ramulis ternatis, pe-
lis glandula notatis. *Brown. jam.* 350.
canilla pyri facie. *Plum. gen.* 50. *Catesb. car.*
p. 95. *t.* 95.
ndi affinis arbor julifera lactescens venenata py-
olia. *Sloan. jam.* 129. *hist.* 2. *p.* 3. *t.* 159.
ıs americana, laurocerasi folio, venenata. *Comm.*
rt. 1. *p.* 131. *t.* 68.
r venenata Mancinello dicta. *Raj. hist.* 1646.
k. phyt. 142. *f.* 4.
tat in Caribæis, *sæpius inundatis.* ♄

POMANE foliis ovato oblongis basi biglandu-
lis. — biglandulosa.
um arboreum, foliis ellipticis glabris, petiolis bi-
andulis, floribus spicatis. *Brown. jam.* 338.
ım aucuparium. *Jacq. amer.* 31. *t.* 158.
canilla lauri foliis oblongis. *Plum. gen.* 50. *ic.* 171.
2.
ymalus arbor americana, mali medicæ foliis am-
loribus tenuissime crenatis succo maxime veneno-
. *Pluk. alm.* 3?9. *t.* 229. *f.* 8.
tat in America calidiore. ♄

spinosa. 3. HIPPOMANE foliis subovatis dentato-spinosis.
Mancinella aquifolii foliis. *Plum. gen.* 50. *ic.* 171.
Ilex, agrifolii folio, americana. *Pluk. alm.* 197. *t.* *f.* 3.
Habitat in America *calidiore.* ♄

SYNGENESIA.

TRICHOSANTHES.

Anguina. 1. TRICHOSANTHES pomis teretibus oblong curvis. *Hort. cliff.* 450. *Roy. lugdb.* 262.
Anguina sinensis, flore albo elegantissimo, fruct longo intorto *Mich. gen.* 12. *t.* 9. *Mill. dict. t.*
Cucurbita sinensis, fructu longo anguino vario re candido capillamentis tenuissimis ornato, T 49. *t.* 22.
Habitat in China. ☉

nervifolia. 2. TRICHOSANTHES pomis ovatis acutis, cordatis oblongis trinerviis dentatis.
Tota-pivi. *Rheed. mal.* 8. *p.* 33. *t.* 17. *Raj. suppl*
Habitat in India.

cucumerina 3. TRICHOSANTHES pomis ovatis acutis, cordatis angulatis.
Pacta valam. *Rheed. mal.* 8. *p.* 39. *t.* 15. *Raj. supp*
Habitat in India.

amara. 4. TRICHOSANTHES pomis turbinato-ovatis.
Colocynthis flore albo fimbriato, fructu obl *Plum. amer.* 86. *t.* 101. *Raj. suppl.* 332.
Habitat in Domingo. ☉

punctata. 5. TRICHOSANTHES foliis quinquelobis incisi tusis subtus glanduloso-punctatis.
Trichosanthes foliis palmatis quinquepartitis: trifidis bifidis subtus glanduloso-punctatis. *acad* 3. *p.* 423. *
Habitat in India *orientali.* ♄
Genere *dubia, cum non floruerit, quamvis plures horti alumna; quod simillima T. amaræ, judico chosanthis speciem.* Caules *longitudine totius naculi*, qui quotannis pereunt, *relicta frutescente riore parte.*

MON

MOMORDICA.

MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. *Hort. cliff.* 451. *Hort. upſ.* 293. *Roy. lugdb.* 262. **Balſamina.**

Balſamina rotundifolia repens f. mas. *Bauh. pin.* 306.

Balſamina. *Dod. pempt.* 670.

Habitat in India. ☉

MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis villoſis longitudinaliter palmatis. *Hort. cliff.* 457. *Fl. zeyl.* 351. *Roy. lugdb.* 262. **Charantia.**

Balſamina cucumerina indica, fructu majore flaveſcente. *Comm. hort.* 1. *p.* 103. *t.* 54.

Amara indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 410. *t.* 151.

Pavel. *Rheed. mal.* 8. *p.* 17. *t.* 9.

Pavel. *Rheed. mal.* 8. *p.* 18. *t.* 10.

Habitat in India.

Pedunculum cordatum & amplexicaule urget ſummam affinitatem cum prima; at huic integerrimum, illi dentatum.

MOMORDICA pomis angulato-tuberculatis, apice deciduo operculatis, foliis lobatis. **operculata.**

Momordica americana, fructu reticulato ſicco. *Comm. r.* 22. *t.* 22.

Habitat in America. ☉

Fructus viridis apice maturo deciduo, tamquam operculatus; intus absque pulpa ſiccus, repletus fibris reticulatis, valde implexis, triloculatis. Semina compreſſa, nigra.

MOMORDICA pomis oblongis: ſulcis catenulatis, foliis inciſis. *Hort. cliff.* 451. *Hort. upſ.* 293. *Fl. zeyl.* 352. *Roy. lugdb.* 262. *Haſſelq. it.* 487. **Luffa.**

Cucumis ægyptius reticulatus f. Luffa arabum. *Vesl. ægypt.* 199. *t.* 58. 59. *Moriſ. hiſt.* 1. *p.* 35. *ſ.* 7. *t.* 7. *f.* 1. 2.

Pipola. *Rumph. amb* 5. *p.* 405. *t.* 148.

Habitat in Zeylona. ☉

Flores albidi. Cirrhi apice quaſi umbellati ex plurimis minoribus cirrhis.

MOMORDICA pomis cylindricis longiſſimis. **cylindrica.**

Pepo indicus reticulatus, ſeminibus nigris. *Herm. lugdb.* 482. *Pluk. alm.* 286.

Pepo reticulatus & ſulcatus, ſemine nigro. *Her rad. app.* 11. *Raj. ſuppl.* 332.
Habitat in Zeylona, China. ⊙
Caulis *quinquangulatus.* Folia *cucumerina, an baſi ſerrato-d.ntata, angulis acutis: intermed ductiore, ſinubus non ut in præcedente amplia angulis rectis inſtructis.* Poma *pedolia, ſub cylindrica.* Semina *nigra.* Flores *lutei*; Ci *axillis.*

trifoliata. 6. MOMORDICA pomis ovatis muricatis, fol natis dentatis.
Poppya ſylveſtris. *Rumph. amb.* 5. *p.* 414. *t.* 1
Habitat in India.

pedata. 7. MOMORDICA pomis ſtriatis, foliis peda ratis.
Momordica fructu ſtriato lævi. *Few. peruv.* 1. *t.* 41.
Habitat in Peru.

Elaterium. 8. MOMORDICA pomis hiſpidis, cirrhis nullis.
Momordica absque cirrhis. *Hort. upſ.* 294. *M* 447. *Gron. orient.* 300. *Gouan. monſp.* 497.
Momordica pomis ovalibus hiſpidis, foliis integris plicato-dentatis. *Hort. cliff.* 451 *lugdb.* 262.
Cucumis ſylveſtris aſininus dictus. *Bauh. pin.*
Cucumis ſylveſtris. *Cam. epit.* 946.
Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙

CUCURBITA.

lagenaria. 1. CUCURBITA foliis cordatis denticulatis to ſis baſi ſubtus biglandulofis, pomis lignoſis.
Cucurbita ſeminibus obſolete bicornibus. *H* 451. *Hort. upſ.* 291. *Mat. med.* 442. *Roy. lug Haſſelq. it.* 488.
Cucurbita villoſa foliis ſubangulatis baſi biglar fructu pyriformi minori. *Brown. jam* 354.
Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Ba* 313.
Cucurbita lagenaria, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. 1. *t.* 5. *f.* 3. Rumph. amb. 5. p. 397. *t.* 144
Habitat in Americæ riguis. ⊙

Lagenæ, cochlearia, infundibula, pilei, innumera-alia utensilia.

URBITA foliis lobatis, pomis lævibus. Pepo.
bita seminum margine tumido. *Hort. cliff.* 452.
t. upf. 291. *Roy. lugdb.* 263.
bita major rotunda, flore luteo, folio aspero.
h. pin. 213
bita indica rotunda. *Dalech. hist.* 616.
oblongus. *Bauh. pin.* 311.
t - - - - ⊙

JRBITA foliis lobatis, pomis nodoso-verru- verrucosa.
i.
bita verrucosa. *Bauh. hist.* 2. *p.* 222.
epo verrucosus. *Tournef. inst.* 106.
t - - - - ⊙
, *Flos, Semina &c. C. Peponis. Fructus minor ce duriore fere lignoso.*

IRBITA foliis lobatis, caule erecto, pomis Melopepo.
esso nodosis.
epo clypeiformis. *Bauh. pin.* 312.
ita clypeiformis s. Siciliana. *Bauh. hist.* 2. *p.*

- - - - ⊙
sunt in caule, quamvis non scandat, nec procum-

RBITA foliis multipartitis. *Hort. upf.* 3. *Mat.* Citrullus.
443. *Hasselq. it.* 488.
ita seminum margine basi dilatato. *Hort. cliff.*
Roy. lugdb. 264.
a indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 400. *t.* 46.
a Citrullus dicta. *Bauh. pin.* 312.
is folio colocynthidis secto, semine nigro.
hist. 2. *p.* 235.
in Apulia, Calabria, Sicilia. ⊙

CUCUMIS.

MIS foliis multifidis, pomis globosis glabris. Colocynthis
upf. 293. *Mat. med.* 446. *Roy. lugdb.* 263.
s foliis multifidis. *Roy. lugdb.* 263.
nthis, fructu rotundo, major. *Bauh. pin.* 313.
Colo-

Petola anguina. *Rumph. amb.* 5. *p.* 407. *t.* 148.
Habitat in India. ☉

maderaspatanus. 11. CUCUMIS foliis cordatis integris denticu[...] mis globosis glabris. *Hort. upf.* 293.
Bryonia foliis cordatis oblongis angulatis dent[...] bris. *Fl. zeyl.* 356. *
Cucumis maderaspatensis, fructu minimo. *Pl[...]* 123. *t.* 170 *f.* 2.
Habitat in India. ☉

BRYONIA.

alba. 1. BRYONIA foliis palmatis utrinque callo[...] *Hort. cliff.* 453. *Fl. svec.* 790; 876. *Roy. lu[...]* *Mat. med.* 448. *Dalib. parif.* 296.
Bryonia alba, baccis nigris. *Bauh. pin.* 297.
Vitis alba. baccis nigris. *Fuchs. hist.* 94. *Cam. e[...]*
Habitat in Europa *ad pagos & sepes.* ♃
Hæc apud nos semper monoica; dioicam vidi[...] *vind.* 172.

palmata. 2. BRYONIA foliis palmatis lævibus quinque[...] laciniis lanceolatis repando-serratis. *Fl. zey[...]*
Bryonia zeylanica, folio quinquepartito. *Bu[...]* 353.
Habitat in Zeylona. ♃

cordifolia. 3. BRYONIA foliis cordatis oblongis quinqu[...] bus dentatis scabris basi bidentatis. *Fl. zey[...]*
Vitis alba indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 448. *t.* 16[...]
Habitat in Zeylona.

laciniosa. 4. BRYONIA foliis palmatis scabris: laciniis[...] latis serratis: lateralibus minimis. *Hort. cl[...]* *Fl. zeyl.* 355. *Roy. lugdb.* 264.
Bryonia zeylanica, foliis profunde laciniatis. *lugdb.* 95. *t.* 95.
Bryonia zeylanica, flore luteo, fructu rubro. *parad.* 103. *t.* 107.
Nehoemeka. *Rheed. mal.* 8. *p.* *t.* 19.
Habitat in Zeylona. ♃
Apex petioli dentibus duobus, antea glandulosis.

africana. 5. BRYONIA foliis palmatis quinquepartitis u[...] lævibus: laciniis pinnatifidis.

X

UMIS foliorum angulis rotundatis, pomis Dudaim.
æricis umbilico retuso.
variegatus, aurantii figura, odoratissimus. *Dill.*
, 223. *t.* 177. *f.* 218.
persicus minimus odoratissimus. *Raj. suppl.* 333.
pusillus odoratus, fructu pomiformi cortice
iegato, e persia. *Pluk. alm.* 143.
nis orientalis, fructu citriformi. *Walth. hort.*
. *t.* 21.
at in Oriente. ☉
s magnitudine Pom. vulgaris, odoratissimum sed
'atuum.

UMIS hirsutus, foliorum angulis integris den- Chate.
s, pomis fusiformibus hirtis utrinque attenuatis.
Jelq. it. 491.
nis ægyptius rotundifolius. *Bauh. pin.* 310.
. *Alp. ægypt.* 114. *t.* 116. *Vesl. ægypt.* 47.
at in Ægypto, Arabia. *Hasselquist.* ☉
s decumbentes, cirrhosi, obsolete pentagoni: Pilis
s, pellucidis, erectis adsperfi sunt Caules, Folia,
yces & omnia externa, qui pili valde molles &
ferti; itaque tota planta ejusmodi mollibus pilis ve-
t omnino est, ac germen in Melone *vulgari, qui*
quis partibus hispidus & scaber pilis conicis, ri-
usculis distantibus, ab hac differt. Fructus ventri-
us, pilis albis erectis hirtus, utraque extremitate
ratus.

UMIS foliorum angulis rectis, pomis ovato- sativus.
ongis scabris. *Hort. cliff.* 451. *Hort. upf.* 292.
t. med. 445. *Roy. lugdb.* 263.
nis sativus vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
nis vulgaris. *Dod. pempt.* 66.
at - - - - - ☉

UMIS foliis angulato-sublobatis, pomis cylin- flexuosus.
cis sulcatis curvatis.
nis flexuosus. *Bauh. pin.* 310.
nis oblongus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 247. *Dod. pempt.*
.
at in India? ☉

CUMIS foliis lobatis, pomis cylindricis lon- anguinus.
'mis lævibus contortuplicatis.

Peto-

Glaux procumbens, myrti tarentini folio. *Boc* 2. *p.* 168. *t.* 119.
Habitat in Italia, Græcia, Media. ⊙

fruticosa. 2. ANDRACHNE erecta arborea. *Osb. it.* 228.
Habitat in China.
Caules *fruticosi Ramis alternis, ad ramulos co* Folia *ovata, integerrima, petiolata, glabra, axillares, conferti.*

Classis XXII.

IOECIA

MONANDRIA.

NAJAS.

JAS. *Hort. cliff.* 437. *Fl. svec.* 791; 877. *Roy.* marina.
gdb. 10. *Gouan. monsp.* 500.
vialis vulgaris latifolia. *Vaill. act.* 1719. *p.* 17. *t.* 1.
2.
vialis latifolia (& angustifolia) fructu monosper-
o. *Mich. gen.* 11. *t.* 8. *f.* 1. 2.
imogeton fluviatile sargazo simile lucens, foliis
argine dentatis. *Pluk. alm.* 304. *t.* 216. *f.* 4. *Raj.*
ppl. 121.
vialis species, angusto brevique folio, undequaque
inis infecta. *Raj. suppl.* 132.
vialis species, folio angusto ad margines denticulis
inosis inciso, flagellum Christi dicta. *Raj. suppl.*
11.
itat in Europæ *maribus.*

DIANDRIA.

VALLISNERIA.

LLISNERIA *Fl. lapp.* 371. *Hort. cliff.* 454. *Roy.* spiralis.
gdb. 9. *Dalib. paris.* 296.
llisneria palustris, algæ folio, italica, foliis in sum-
tate denticulatis, flore purpurascente. *Mich. gen.*
. *t.* 10. *f.* 1.
mogeton, algæ folio, pisanum. *Bocc. mus.* 1.
29.
llisnerioides palustre, algæ folio, italicum, foliis in
nmitate tenuissime denticulatis, floribus albis vix
nspicuis. *Mich. gen.* 3. *t.* 10. *f.* 2.
tat in Pisæ *aliisque* Italiæ *fossis.*
tenuia apice tenuissime serrata & natantia. Cl.
Kræmer.

SALIX.

* *Foliis glabris ſerratis.*

hermaphroditica. 1. SALIX foliis ſerratis glabris, floribus hermaphr diandris. *Fl. ſvec. 2. n.* 878.
Habitat Upſaliæ. ♄
Convenit *cum S. pentandra* Foliis *glabris, obtuſ dulis ſerratis, convolutis, ſenis ſæpius ex gemma, flaveſcentibus;* Amentis *villoſis, magn & habitu iisdem.* Differt *vero ab eadem* Ram *lide rufeſcentibus, nec purpuraſcentibus;* Fol *pagina ſuperiore venis exaratis, nec venis el* Glandulis *ad baſin petiolorum extuberantibus;* pore *prius florendi & gallis copioſioribus, q quentis.*

triandra. 2. SALIX foliis ſerratis glabris, floribus triandr
Salix foliis elliptico-lanceolatis utrinque glab ratis appendiculatis. *Hall. helv.* 152. *Gmel. p.* 155. *t.* 34. *f.* 3.
Salix, folio auriculato ſplendente, flexilis. *Raj. hi*
Habitat in Helvetia, Sibiria. ♄
Perquam affinis S. amygdalinæ.

pentandra. 3. SALIX foliis ſerratis glabris, floſculis pent *Hort. cliff.* 454. *Fl. ſvec.* 792; 879. *Gmel. ſi* 153. *t.* 34. *f.* 1.
Salix vulgaris rubens. *Bauh. pin.* 473?
Salix pentandra. *Fl. lapp.* 370. *t.* 8. *f.* 3.
Salix folio laureo ſ. lato glabro odorato. *R* 1420.
Salix ſpontanea, folio amygdalino, fragilis no culata. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 214.
Habitat in Europæ *paludibus montoſis duris.* ♄

phylicifolia. 4. SALIX foliis ſerratis glabris lanceolatis: cre datis. *Fl. lapp.* 351. *t.* 8. *f. D. Fl. ſvec.* 793;
β. Salix foliis ſerratis glabris oblongo-ovatis. *Fl. la t.* 8. *f. C.*
Habitat in Sveciæ *borealibus.* ♄
Variat ſtaminibus 2, 3, *rarius* 4.

vitellina. 5. SALIX foliis ſerratis ovatis acutis glabris: ſ ris cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. upſ. 295.

ix foliis leari-lanceolatis acuminatis. *Guett. stamp.* . *p.* 206.
ix sativa lutea, folio crenato. *Bauh. pin.* 473.
bitat in Europa *temperatiore.* ♄
te sibi permissa, nec culta, nec putata, evadit S. lba. *Hall. goett.* 8.

LIX foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, ipulis trapeziformibus. *Roy. lugdb.* 83. *Fl. svec.* 94; 881. *Dalib. paris.* 297. — amygdalina.
ix foliis serratis glabris acuminatis appendiculatis. *lapp.* 349. γ.
ix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Bauh.* *in.* 473 (*sec. Rajum.*)
bitat in Europæ *sylvis.* ♄
mis nimium Salici triandræ.

LIX foliis serratis glabris subovatis acutis sessilius, stipulis subcordatis. — hastata.
ix foliis serratis glabris subovatis sessilibus appendiculatis. *Fl. lapp.* 354. *t.* 8. *f.* G. *Fl. svec.* 797; 882.
ix foliis glabris ovatis serratis, appendicibus lassimis. *Hall. helv.* 151.
bitat in Lapponia, Helvetiæ. ♄

LIX foliis serratis glabris ovato-lanceolatis petiolis dentato glandulosis. *Fl. lapp.* 349. *t.* 8 *f.* B. *Fl. svec.* 795; 883. — fragilis.
ix foliis serratis glabris lanceolatis acuminatis appendiculatis. *Roy. lugdb.* 83.
ix fragilis. *Bauh. pin.* 474. *prodr.* 159. (*Dill. giss.* 3.)
ix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Bauh.* *in.* 473. (*sec. Hallerum.*)
ix, folio longo latoque splendente, fragilis. *Raj.* *ngl.* 3. *p.* 448. *cantabr.* 143. *It scan.* 200. *
bitat in Europæ *borealibus.* ♄
or procera. Amenta *ad basin pedunculi gerunt fo-* *ola* 2. *f.* 3, *sæpius caduca.* Rami *digito concussi ad* *enicula annotina dissiliunt.*

LIX foliis serratis glabris lineari lanceolatis, ramis pendulis. *Hort. cliff.* 454. *Roy. lugdb.* 84. *Gron. rient.* 307. — babylonica.

Salix orientalis, flagellis deorsum pulchre penden
Tournef. cor. 41.
Salix arabica, foliis atriplicis. *Bauh. pin.* 475.
Garb arabum. *Rauw. itin.* 183. *Dalech. app.*
Habitat in Oriente. ♄
Rami *laxi, læves, juncei, purpurascentes.* Folia *sto-lanceolata, argute serrata, glabra, glauca, albida.* Stipulæ *rarius subrotundæ, minimæ;* *earum loco utrinque Punctum glandulosum.*

urpurea. 10. SALIX foliis serratis glabris lanceolatis: inferio oppositis. *It. scan.* 252. *. *Fl. svec.* 2. n. 8
Salix folio longo subluteo non auriculata, vimi rubris. *Raj. angl.* 3. *p.* 450.
Salix vulgaris nigricans, folio non serrato. *Bau* 473.
Salix rubra minima fragilis, folio longo angusto. *hist.* 1. *p.* 215
Habitat in Europæ *australioribus.* ♄
Rami *sæpe sanguineo-corallini.* Gemmæ *univalve munt* Folia 3, *transversim cauli applicata (com plerisque) ex* 2 *exterioribus transversim positis. mi tenacissimi omnium.*

lelix. 11. SALIX foliis serratis glabris lanceolato-linea superioribus oppositis obliquis. *Roy. lugdb.* 8 *Dalib. paris.* 299.
Salix foliis utrinque lævibus: inferne glaucis, sq & capsulis tomentosis. *Hall. helv.* 153.
Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex ad binis. *Raj. hist.* 1421. *cant.* 144. *angl.* 3. *p.* 44
Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fr *Bauh. hist.* 1. *p.* 213. *f.* 2.
Salix Helice theophrasti. *Dalech. hist.* 277.
Habitat in Europa *australiori ad sepes, locis aquos*
Rami *angulosi.* Folia *adulta subtus glauca, sup opposita.*

egyptiaca. 12. SALIX foliis subserratis lanceolato-ovalibus venosis, petiolis simplicibus exstipulatis. *acad.* 4. *p.* 295. *
Salix syriaca, folio oleagineo argenteo. *Bauh. pin*
Calaf f. Ban. *Alp. ægypt.* 61. *t.* 62.
Habitat in Ægypto. ♄

ALIX foliis ferratis glabris ovatis venofis. *Fl. lapp.* 353. *t.* 8. *f.* *F.* & *t.* 7 *f.* 6. *Fl. fvec.* 799; 885. **myrfinites.**
ix myrtilli folio, fpica craffiffima. *Hall. helv.* 153.
lix alpina pumila myrfinites. *Pont. comp.* 149.
lix alpina, foliis anguftioribus fplendentibus ferratis. *Scheuch. alp.* 340.
lix alpina pumila repens, foliis oblongis exiguis fuperne fplendentibus, inferne cinereis creberrimis & tenuiffimis crenis. *Till. pif.* 151.
bitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Italiæ. ♄

ALIX foliis fubferratis glabris fubdiaphanis fubtus glaucis, caule fuffruticofo. *Fl. fvec.* 798; 886. *Gmel. fib.* 1. *p.* 166. **arbufcula.**
lix foliis ferratis glabris obovatis. *Fl. lapp.* 352. *t.* 8. *f.* *E.*
lix foliis integris glabris ovatis confertis pellucidis. *Fl. lapp.* 356.
lix foliis ferratis glabris lanceolatis utrinque acutis. *Fl. lapp.* 360. *t.* 8. *f.* *M.*
bitat in Lapponiæ *campis arenofis.* ♄
Horto mire mutata, altitudine humana, foliis craffioribus aliena.

ALIX foliis fubferratis glabris obovatis obtufiffimis. **retufa.**
lix foliis lævibus ovatis, fpica rariffima. *Hall. helv.* 154. *opuf.* 301.
lix alpina anguftifolia repens non incana. *Bauh. pin.* 474. *prodr.* 159.
lix alpina, ferpylli folio lucido. *Bocc. muf.* 2. *p.* 18. *t.* 1.
lix pufilla humilis. *Cam. epit.* 104.
bitat in Alpibus Helvetiæ, Auftriæ, Italiæ. ♃
vitate certat cum S. herbacea.

ALIX foliis ferratis glabris orbiculatis. *Fl. lapp.* 355. *t.* 8. *f.* *H.* & *t.* 7. *f.* 3. 4. *Fl. fvec.* 800. 887. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 155. *Jacq. vind.* 296. **herbacea.**
lix faxatilis minima. *Bauh. pin.* 474. *prodr.* 159.
lix alpina lucida repens, alni rotundæ folio. *Bocc. muf* 2. *p.* 19. *t.* 1. *f. ult.* *Raj. fuppl.* 12. *angl.* 3. *p.* 449.
erba facie pyrolæ. *Mart. fpitfb.* 47. *t.* G. *f.* B.
bitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃
lor omnium minima.

* * *Foliis glabris integerrimis.*

reticulata. 17. SALIX foliis integerrimis glabris ovatis ob *Jacq. vind.* 296.
Salix foliis integris glabris ovatis subtus retic *Fl. lapp* 359. *t.* 8. *f.* L. & *t.* 7. *f.* 1. 2. *Fl.* 801; 888.
Salix pumila, folio rotundo. *Bauh. hist.* 1. *p.* 12. *Sel* *alp.* 43. 340. *Raj. hist.* 1423.
Salix pumila, folio rotundo integerrimo, julo gr *Hall. helv.* 154.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. ♃
Gemmæ *premunt* Folia 3, *ovata, obtusa, petiolata* *tegerrima, obsolete pilosa: supra viridia rugosa; tus glauca reticulata: venis primum rubris, d viridibus.* Spica *ex eadem gemma.*

myrtilloides 18. SALIX foliis integris glabris ovatis acutis.
Salix foliis integris glabris ovatis alternis. *Fl.* 357. *t.* 8. *f.* J. K. *Fl. svec.* 804; 889.
Habitat in Suecia *septentrionali.* ♄

glauca. 19. SALIX foliis integerrimis, subtus tenuissime fis ovato oblongis. *Fl. lapp.* 363. *t.* 7. *f.* 5. 8. *f.* P. *Fl. svec.* 802; 890.
Salix alpina pyrenaica. *Bauh. pin.* 474. *prodr.* *burs.* XXIV. 120.
Habitat in Alpibus Lapponicis & Pyrenaicis. *Sat*

* * * *Foliis integerrimis, villosis.*

aurita. 20. SALIX foliis integerrimis utrinque villosis obo appendiculatis. *Fl. lapp.* 369. *t.* 8. *f.* Y. *Fl* 810; 891. *Roy. lugdb.* 84.
Salix folio rotundo minore. *Dill. app.* 37. *Raj* 3. *p.* 450.
Habitat in Europæ *borealis sylvis.* ♄

lanata. 21. SALIX foliis utrinque lanatis subrotundis a *Fl. lapp.* 368. *t.* 8. *f.* X. & *t.* 7. *f.* 7. *Fl* 809; 892.
Salix humilis latifolia erecta. *Bauh. pin.* 474. 159. *Raj. hist.* 1426. *Hall. helv.* 154.
β. Salix *depressa* foliis integris subtus villosis lance ovatis utrinque acutis. Fl. lapp. 361. *t.* 8. *f.* *svec.* 2. *n.* 899.*
Habitat in Alpibus Lapponicis. ♄

Folia conferta, ovata utrinque, lanata, integerrima, subsessilia.
Varietatem β. eandem esse cultura docuit.

SALIX foliis integerrimis hirsutis lanceolatis. *Fl. lapp.* 366. *t.* 8. *f.* T. *Fl. svec.* 808; 893. *Hall. helv.* 155. *t.* 5.
Habitat in Alpibus Lapponiæ *ubique*, Helvetiæ. ♄ — lapponum

SALIX foliis integris ovatis acutis: supra subvillosis, subtus tomentosis. *Fl. svec.* 806; 894. *It. gotl.* 206. — arenaria.
Salix foliis integris subtus villosis ovatis acutis. *Fl. lapp.* 362. *t.* 8. *f.* O. Q.
Salix foliis integris utrinque hirsutis lanceolatis. *Hall. helv.* 155. *t.* 5. *f.* 2.
Salix pumila, foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. *Bauh. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. *p.* 447. *Gmel. fil.* 1. *p.* 164. *t.* 36. *f.* 1.
Habitat in Europæ *paludibus.* ♃. ♄

SALIX foliis integerrimis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. *Fl. svec.* 807; 895. — incubacea
Salix foliis ovato-lanceolatis integerrimis, ramis decumbentibus, radice reptatrice. *Roy. lugdb.* 84. *Dalib. paris.* 299.
Salix foliis integris ovatis aliquot linearum longis, caulibus vix assurgentibus. *Guett. stamp.* 416.
Salix pumila, foliis ellipticis integerrimis, subtus glaucis, spica rotundiore. *Hall. helv.* 153.
Habitat in Europæ *pascuis duriusculis, uliginosis.* ♃. ♄

SALIX foliis integerrimis lanceolatis utrinque subpilosis, caule repente. *Fl. svec.* 814; 896. — repens.
Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne subcinerea. *Bauh. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. *p.* 448.
Salix pumila latifolia 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 85.
Habitat inter montes Sveciæ, *locis humidis.* ♃. ♄
Caulis *crassitie digiti.* Rami *virgati, decumbentes.* Ramuli *adspersi villis albis.* Folia *ovata s. ovato-oblonga, integerrima, utrinque glabra, subtus glauca, petiolata, stipulis nullis: infima opposita transversim & parum pilosa.* Amenta *lateralia.* Feminis *capsulæ ruffescentes.*

SALIX *foliis* integerrimis ovatis: subtus villosis nitidis. — fusca.

tidis. *Fl. lapp.* 364. *t.* 8. *f. R. Fl. svec.* 803; 8
Roy. lugdb. 84. *Jacq. vind.* 297.
Salix pumila, folio utrinque glabro. *Baub. hist.* 217.
Habitat in Europæ *pascuis humidis.* ♃. ♄
Gemma *univalvis, bipartita:* Amentum *absque fol*

osmarini-folia. 27. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibu ctis sessilibus subtus tomentosis. *Roy. lugdb.* 13. *Fl. svec.* 2. *n.* 898.
Salix humilis angustifolia. *Bauh. pin.* 474.
Salix humilis repens angustifolia. *Lob. ic.* 2. *p.* *Bauh. hist.* 1. *p.* 214.
Habitat in Europæ *campis depressis.* ♃. ♄
Folia *subtus nitida, sericea, villosa.*

* * * * *Foliis subserratis, villosis.*

aprea, 28. SALIX foliis ovatis rugosis: subtus tomentosi datis superne denticulatis. *Roy. lugdb.* 83. *Fl.* 811; 900. *Gmel. sib.* 1. *p.* 157. *Dalib. paris.* 2
Salix foliis subcrenatis utrinque villosis ovat longis. *Fl. lapp.* 365. *t.* 8. *f. S. Roy. lugdb.* 83. *lib. paris.* 298.
Salix folio rugoso obiter serrato subtus lanugi julo crassissimo. *Hall. helv.* 155.
Salix latifolia rotunda. *Bauh. pin.* 474. *Raj. angl.* 449.
β. Salix foliis oblongis subtus villosis: inferioribu natis, superioribus integris. *Fl. lapp.* 367. *t.* 8.
γ. Salix foliis elliptico-lanceolatis subtus sericei pendiculatis. *Gmel. sib.* 1. *p.* 169.
Habitat in Europæ *siccis.* ♄
Gemmæ *inferiores* Folia, *superiores* Amenta *m liacea producunt.* ♄

iminalis. 29. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linea longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgati *svec.* 813; 901. *Dalib. paris.* 297.
Salix foliis undulatis lineari-lanceolatis subtus tc tosis. *Roy. lugdb.* 84.
Salix folio longissimo angustissimo utrinque a *Bauh. pin.* 474.
Salix folio longissimo. Raj. angl. 3. p. 450.
Salix foliis angustis & longissimis crispis subt cantibus. Bauh. hist. 1. p. 212.

x foliis ex lineari lanceolatis integris ſubtus inca-
s. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 163.
tat in Europa *ad pagos.* ♄
ex *junceus, altiſſimus.* Gemmæ *foliaceæ* & *flori-
æ diſtinctæ ut in caprea.* Folia *ante explicationem
hac revoluta.*

LIX foliis ſubſerratis oblongo-ovatis: ſubtus ſub- cinerea.
llofis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Fl. ſvec.* 805;
)2.
x foliis integris glabris lanceolato-ovatis. *Fl. lapp.*
8.
tat in Europæ *nemoribus paludoſis ſubhumidis.* ♄
nta *florum fuſca, infra folia collocata, Pedunculo
oliolis aliquot minimis, lanceolatis.* Stipulæ *dimi-
ato-cordatæ, utrinque ſerratæ glandulis tribus.*

LIX foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque alba.
beſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. *Hort.
ff.* 473. *Fl. ſvec.* 812; 903. *Mat. med.* 449.
alib. pariſ. 297. *Roy. lugdb.* 83.
x foliis elliptico-lanceolatis ſerratis ſubtus ſericeis,
mine fragili. *Hall. helv.* 152.
x vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473.
x alba. *It. ſcan.* 200.
itat ad pagos & *urbes* Europæ. ♄
Species maxima cum Salice *fragili*
cies *hujus generis difficillime extricantur.* Solum
*luſtre, arenoſum, alpeſtre, calidum mutavit mira
etamorphoſi ſpecies, ut de iisdem hæſitarint ſæpius Bota-
ci; acceſſit Deſcriptio ubique imperfecta & barba-
i.* Incipienda *itaque harum hiſtoria e novo; quod
r, ſi rejiciantur veterum nomina, ne confundant ſyno-
yma dubia certas plantas,* & *in Floris* & *Hodepo-
cis deſcribantur:* 1. Gemmæ *univalves ſ. multival-
s.* 2. Foliatio *intra gemmas ſitu* & *plicatione.* 3.
menta *ex eadem vel diſtincta gemma, ſupra aut in-
a folia.* 4. Folia *ſerrata aut integerrima:* paginis
dis aut villoſis; 5. Staminum *numerus.* 6. Arbores,
utices, repentes.

CECROPIA.

CROPIA. *Læfl. it.* 272. *Amæn. acad.* 5. *p.* 410. * peltata.
lotapalus *ramis* excavatis, foliis amplis peltatis
batis. Brown. jam. 111.

Ficus surinamensis, multifido folio superna pa
modum scabro, aversa densa lanugine molli.
alm 146. *t.* 243. *f.* 5.
Yaruma oviedi. *Sloan. jam.* 45. *hist.* 1. *p.* 137.
2. & *t.* 89. *Nieremb. nat.* 330.
Ambayba. *Marcgr. bras.* 91. *Pis. bras.* 147. *R*
1373.
Habitat in Jamaicæ *calidioris sylvis.* ♄
Nescio num in ullo Horto Botanico Europæ unqua

TRIANDRIA.

EMPETRUM.

album. 1. EMPETRUM erectum. *Hort. cliff.* 470. *Roy.*
206.
Empetrum lusitanicum, fructu albo. *Tournef. in*
Erica erecta, baccis candidis. *Bauh. pin.* 486.
Erica coris folio X. *Clus. hist.* 1. *p.* 45.
Habitat in Lusitania. ♄
Sequenti nimis affine.

nigrum. 2. EMPETRUM procumbens. *Hort. cliff.* 470. *l*
832, 904. *Roy. lugdb.* 206. *Hall. helv.* 162.
vind. 298.
Empetrum. *Fl. lapp.* 379.
Erica baccifera procumbens nigra. *Bauh. pin.*
Erica baccifera. *Clus. pan.* 29.
Habitat in Europæ *frigidissimæ montosis paludosis.*
Plantas hermaphroditas nuper habuit Jacquin; ego
dam unicam vidi Upsaliæ, nec dein e myriadibu
eis unicam.

OSYRIS.

alba. 1. OSYRIS. *Roy. lugdb.* 202. *Sauv. monsp.* 56. *(*
monsp. 502. *Gron. orient.* 308.
Osyris foliis linearibus acutis. *Læfl. it.* 169.
Osyris frutescens baccifera. *Bauh. pin.* 212.
Casia poëtica monspeliensium. *Cam. epit.* 26. *l*
432.
Casia latinorum. *Alp. exot.* 41.
Casia monspelii dicta. *Gesn. epist.* 50.
Habitat in Italia, Hispania, Monspelii, Libano
Femina potius hermaphrodita, cum staminibus
tamen sine mare sterilis.

EXCOECARIA.

:OECARIA. **Agallocha.**
r excœcans. *Rumph. amb.* 2. *p.* 237. *t.* 79, 80.
at in Amboina. ♄

TETRANDRIA.

TROPHIS.

PHIS. *Amæn. acad.* 5. *p.* 410. **americana.**
his foliis oblongo-ovatis glabris alternis, floribus
fculis fpicatis ad alas. *Brown. jam.* 357. *t.* 37. *f.* 1.
tat in Jamaica. ♄

BATIS.

IS. *Jacq. hift. t.* 40. *f.* 4. **maritima.**
maritima erecta ramofa, foliis fucculentis fubcy-
dricis. *Brown. jam.* 356.
fruticofum coniferum, flore albo. *Sloan. jam.* 50.
. 1. *p.* 144.
tat in Jamaicæ *maritimis falfis.* ♄

VISCUM.

CUM foliis lanceolatis obtufis, caule dichoto- **album.**
, fpicis axillaribus.
um. *Hort. cliff.* 441. *Fl. fvec.* 816; 905. *Mat.*
d. 450. *Roy. lugdb.* 400. *Hall. helv.* 162. *Dalib.*
rif. 300.
um baccis albis. *Bauh. pin.* 423.
um. *Cam. epit.* 555.
tat in Europæ *arboribus parafitica.* ♄

CUM foliis lanceolatis obtufis, fpicis lateralibus. **rubrum.**
um foliis longioribus, baccis rubris. *Catesb. car.*
p. 81. *t.* 81.
tat in Carolina, *parafitica.* ♄

CUM foliis obovatis, racemis lateralibus. **purpureum**
um foliis latioribus, baccis purpureis, pediculis
identibus. *Catesb. car.* 2. *p.* 95. *t.* 95.
um baccis niveis racemofis, foliis buxi luteis.
m. fpec. 17. *ic.* 258. *f.* 3.
tat in Carolina, parafitica. ♄

untioides. 4. VISCUM caule prolifero ramosissimo aphyll... presso.
Viscum geniculatum aphyllum, ramulis com... oppositis. *Brown. jam.* 357.
Viscum aphyllon, baccis aureis umbilicatis. *Spec.* 17. *ic.* 258. *f.* 1.
Viscum opuntioides ramulis compressis. *Sloa...* 168. *hist.* 2. *p.* 93. *t.* 201. *f.* 1. *Raj. dendr.*
Habitat in Jamaica, *parasitica.* ♄

...ticilla-...um. 5. VISCUM caule verticillato, foliis ovatis tri... obtusis.
Viscum parasiticum, ramulis verticillatis, foliol... vatis trinerviis, baccis tridentatis. *Brown. ja...*
Viscum portulacæ foliis, baccis croceis & rac... *Plum. spec.* 17. *ic.* 258. *f.* 2.
Viscum ramulis & foliis longis densissimis stri... radiatis. *Sloan. jam.* 168. *hist.* 2. *p.* 93. *t.* ... 2. *Raj. dendr.* 52.
Habitat in Jamaica, *parasitica.* ♄

...estre. 6. VISCUM caule herbaceo tetragono brachiato... lanceolatis.
Habitat in Philadelphiæ *pratis subhumidis.* *Kal...* 32.
Caulis *herbaceus, pedalis, lævis, brachiatus, tetr...* Folia *lanceolata, petiolata, lævia, integerrim... nia: inferiora minora.* Spicæ *axillares, sessile... nosæ, oblongæ.* Fructificatio *imperfecta: flore... nei a me tantum visi.* Fructus *mihi ignotus; ...nere itaque dubium. An Loranthi species?*

HIPPOPHAE.

...mnoi-es. 1. HIPPOPHAE foliis lanceolatis.
Hippophaës. *Fl. lapp.* 372. *Fl. svec.* 815; 906. *Ho...* 454. *Roy. lugdb.* 207.
Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flave... *Bauh. pin.* 477.
Rhamni species. *Cam. epit.* 81.
Rhamnoides florifera, salicis folio. *Tournef. co...*
Habitat in Europæ *maritimis arenosis.* ♄
Folia *adspersa squamis confertis, peltatis, ciliati... lidis.* Flores *Masculi solitarii, infra folia, ... mum* ☋ Gemmam univalvem, persistentem,

[...]ae *floris.* Feminei *solitarii, sessiles, in ala folio-* [...]um *infimorum.*

[H]IPPOPHAE foliis ovatis. canadensis.

[Hab]itat *in* Canada. *Kalm.* ♄

[Fr]ex *facie antecedentis, sed* Folia *latiora, dimidio* [b]reviora, *ovata s. oblongo-ovata.* Rami *oppositi* Ra[m]i *simplices inter folia prima, erecti, foliis dimi-* [di]o *breviores.* Folia *supra viridia, adspersa pilis fa-* [s]ciculatis, *divergentibus, nudo oculo vix discernendis.* [Su]btus *folia pilis & squamis argentea, adspersa squa-* [m]is *s. punctis ferrugineis.*

MYRICA.

[M]YRICA foliis lanceolatis subserratis, caule suffru- Gale.
[ti]coso.
[My]rica foliis lanceolatis, fructu sicco. *Fl. lapp.* 373.
[M]at. med. 451. *Fl. svec.* 817; 907. *Hort. cliff.* 455.
[R]oy. lugdb. 527. *Dalib. parif.* 300.
[Rh]us myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.
[Cha]mæleagnus. *Dod. pempt.* 780. *app.*
[Ha]bitat in Europæ, Americæ *septentrionalis uligino-* [si]s. ♄

[M]YRICA foliis lanceolatis subserratis, caule arbore- cerifera.
[sc]ente. *Kalm. it.* 2. *p.* 312.
[My]rica foliis lanceolatis subserratis, fructu baccato.
[H]ort. cliff. 455. *Hort. upf.* 295. *Gron. virg.* 120; 153.
[R]oy. lugdb. 527.
[M]yrtus brabanticæ similis caroliniensis baccifera, [fr]uctu racemoso sessili monopyreno. *Pluk. alm.* 250. [t]. 48. *f.* 9. *Catesb. car.* 1. *p.* 69. *t.* 69.
[M]yrtus brabanticæ similis caroliniensis humilior, foliis [l]atioribus & magis serratis. *Catesb. car.* 1. *p.* 13. *t.* 13.
[H]abitat in Carolina, Virginia, Pensylvania. ♄

[M]YRICA foliis ternatis dentatis. *Amæn. acad.* 6. *afr.* trifoliata.
98. *
[H]abitat ad Cap. b. Spei. ♄

[M]YRICA foliis oblongis opposite sinuatis *Hort. cliff.* quercifolia.
456. *Roy. lugdb.* 527.
[Ch]iotragematodendros africana, botryos amplioribus *foliis densis. Pluk. amalth.* 65.

Laurus

Laurus africana minor, folio quercus. *Comm. h* *p.* 161. *t.* 81. *Ray. dendr.* 85.
Habitat in Æthiopia. ♄

cordifolia. 5. MYRICA foliis subcordatis serratis sessilibus. *cliff.* 456. *Roy. lugdb.* 527.
Alaternoides ilicis folio crasso hirsuto. *Walth* 3. *t.* 3.
Tithymali facie planta æthiopica, ilicis aculea lio. *Pluk. alm.* 373. *t.* 319. *f.* 7.
Gale capensis, ilicis cocciferæ folio. *Pet. mus.*
β. Myrica foliis subcordatis integris sessilibus. *Bu* 263. *t.* 98. *f.* 3.
Habitat in Æthiopia. ♄

PENTANDRIA.

PISTACIA.

trifolia. 1. PISTACIA foliis subternatis. *Hort. cliff.* 456. *lugdb* 78. *Sauv. meth.* 219.
Pistacium mas siculum, folio nigricante. *Bocc.* p. 139. *t.* 93.
Terebinthus s. Pistacia trifolia. *Tournef. inst.* 5
Habitat in Sicilia. ♄
Folia *pinnata, ternata, demum simplicia in eodem ubi simplicia, sunt majora ovato-subrotunda; ub nata, sunt foliola lateralia parva.*

narbonensis. 2. PISTACIA foliis pinnatis ternatisque suborbicu *Gron. orient.* 313. *Gouan. monsp.* 503.
Pistacia foliis sæpius quinatis orbiculatis. *Sauv.* 219.
Terebinthus peregrina, fructu majore pistaciis eduli. *Bauh. pin.* 400. *Tournef. inst.* 579.
Terebinthus indica major, fructu rotundo. *Bauh* 1. *p.* 277.
β. Terebinthus major, pistaciæ folio. *Lob. adv.* 41
Habitat Monspelii, *in* Persia, Mesopotamia, A nia. ♄

vera. 3. PISTACIA foliis impari-pinnatis: foliolis subov recurvis. *Mat. med.* 454. *Gron. orient.* 312.
Pistacia peregrina, fructu racemoso s. Terebint indica. Bauh. pin. 401.

la. *Bauh. hist.* 1. *p.* 275.
inthus indica theophrasti, Pistacia dioscoridis.
. adv. 413. *Tournef. inst.* 380.
at in Persia, Arabia, Syria, India. ♄

ACIA foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-ceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Mat. med.* 452. *Hort.* 296. *Roy. lugdb.* 78. *Sauv. monsp.* 219. *Gouan. sp.* 503. *Gron. orient.* 311.
inthus vulgaris. *Bauh. pin.* 400. *Tournef. inst.*
inthus. *Clus. hist.* 1. *p.* 15. *Dod. pempt.* 871.
at in Europa *australi*, Africa *boreali*, India. ♄
. Terebinthus peregrina, fructu minore cæru-eduli. *C. B.* 296.

Terebinthus

ACIA foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceo-s. *Hort. cliff.* 456. *Hort. upf.* 996. *Mat. med.* 453. *y. lugdb.* 79. *Sauv. monsp.* 219. *Gron. orient.* 310. *uan. monsp.* 503.
scus vulgaris. *Bauh. pin.* 399. *Tournef. inst.* 580.
scus. *Clus. hist.* 1. *p.* 14. *Dod. pempt.* 871.
at in Hispania, Lusitania, Italia, Palæstina. ♄
. Lentiscus ex chio, ex qua fluit mastiche. *Tour-it.* 1. *p.* 285.

Lentiscus.

ZANTHOXYLUM.

THOXYLUM foliis pinnatis.
oxylum. *Hort. cliff.* 487. *Brown. jam.* 189. *A-. acad.* 3. *p.* 16.
oxylum spinosum, lentisci longioribus foliis, nymi fructu capsulari. *Catesb. car.* 1. *p.* 26. *t.* 26.
a fraxini folio. *Duham. arb.* 1. *p.* 229. *t.* 97.
at in Jamaica, Virginia, Carolina. ♄

Clava herculis.

THOXYLUM foliis ternatis.
at in China. ♄
x *Aculeo recurvo sub basi & apice petiolorum.* lia *solitaria, ternata; ad flores terna: foliolis o-is obtusis.* Umbellæ *pedunculatæ hemisphæricæ, lices.* Flores *stylis tribus, nec quinque.*

trifoliatum

ANTIDESMA.

IDESMA. Fl. zeyl. 357. *

alexiter

Arbor

Arbor indica, ovali folio, flofculis plurimis in fummo ramulo difpofitis, acinifera. *Pluk.* *alm.* 82. *t.* 339. *f.* 1.
Noelietali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 19. *t.* 56. *Raj. hif*
♂. Baccifera maderafpatana, ribis more floribus fis juli inftar. *Pet. muf.* 621. *Raj. dendr.* 27.
Habitat in India. ♄

ASTRONIUM.

graveolens. 1. ASTRONIUM. *Jacq. amer.* 33. †
Habitat in America. ♄

SPINACIA.

oleracea. 1. SPINACIA fructibus feffilibus. *Hort. cliff.* 457. *upf.* 296. *Mat. med.* 556. *Roy. lugdb.* 220.
Spinacia mas. *Dalech. hift.* 543. ♀
Spinacia femine fpinofo. *Morif. hift.* 2. *p.* 598.
Lapathum hortenfe f. fpinacia femine fpinofo. *pin.* 114.
Spinacia femina. *Dalech. hift.* 543. ♂
β. Lapathum hortenfe f. Spinacia femine non fp *Bauh. pin.* 115.
Habitat - - - - ⊙

fera. 2. SPINACIA fructibus pedunculatis.
Habitat in Sibiria. *Gmelin.*
Caulis *altior*, *lævis.* Folia *deltoideo-ovata*, *quam finuofa*, *obtufa*, *petiolata.* Fructus *ax* 3. *f. plures*, *pedunculis propriis longitudine f* *ovati f. obovati*, *obtufi*, *utrinque fubcarinati*, *obtufiffimi.*

IRESINE.

Celofioides. 1. IRESINE.
Irefine erecta herbacea, caule nodofo, panicul ga affurgente. *Brown. jam.* 358.
Celofia foliis lanceolato-ovatis, panicula diffi formi. *Gron. virg.* 144.
Amaranthus panicula flavicante gracili holof *Sloan. jam.* 49. *hift.* 1. *p.* 142. *t.* 90.
Amaranthus nodofus, pallefcentibus foliis bliti p americanus, multiplici fpeciofa fpica laxa cante. Pluk. alm. 26. t. 261. f. 1.
Habitat in Virginia, Jamaica.

ACNIDA.

IDA. *Mitch. gen.* 28. *Amæn. acad.* 3. p 19. *Gen.* 1091. — cannabina.

abis foliis simplicibus. *Gron. virg.* 192; 153.
abis virginiana. *Bauh. pin.* 320.
at in Virginiæ *paludibus salsis.*

CANNABIS.

INABIS. — sativa.

abis foliis digitatis. *Hort. cliff.* 457. *Hort. upf.* r. *Mat. med.* 457. *Dalib. parij.* 300. *Roy. lugdb.* 1.
abis sativa. *Bauh. pin.* 320. ♀
abis mas. *Dalech. hist.* 497. ♀
abis erratica. *Bauh. pin.* 320. ♂
abis femina. *Dalech. hist.* 497. ♂
at in India. ⊙

HUMULUS.

MULUS. *Hort. cliff.* 458. *Fl. svec.* 818; 9[illegible] *at. med.* 458. *Dalib. parif.* 301. *Roy. lugd.* 222. — Lupulus.
ılus mas. *Bauh. pin.* 298. ♀
ılus salictarius. *Fuchs. hist.* 124.
ılus femina. *Bauh. pin.* 298. *Cam. epit.* 954. ♂
tat in Europæ *sepibus & ad radices montium.* ♃
nur electricum, quasi remotissimum tonitru, vento agitante Humuli palos, quid?

ZANONIA.

NONIA. — indica.

r-valli mascula. *Rheed mal.* 8. *p.* 39. *t.* 49.
r-valli femina. *Rheed. mal.* 8. *p.* 31. *t.* 47. 48.
tat in Malabaria.

FEWILLEA.

WILLEA. — scandens.

illea foliis crassioribus glabris quandoque cordatis, quandoque trilobis. *Brown. jam.* 374.
ndiroba scandens, foliis hederaceis angulosis. *Plum. n.* 20. *ic.* 209.
illea foliis trilobis.
ndiroba s. Nhandiroba. *Marcgr. bras.* 46. *Sloan.* 84. *hist.* 1. *p.* 200. *Raj. hist.* 1875. Plum. ic. 210.
tat in India occidentali.

Varietates α. β. conjunxit Brownius, nec eas se videtur Plumier.

HEXANDRIA.

TAMUS.

ommunis. 1. TAMUS foliis cordatis indivisis. *Hort. cliff. Roy. lugdb.* 228. *Hall. helv.* 165. *Gron. orient.*
Bryonia lævis f. nigra racemosa, cujus baccæ ruf. f. nigrescunt. *Bauh. pin.* 297.
Bryonia sylvestris baccifera. *Bauh. prodr.* 135.
Bryonia lævis f. nigra racemosa. *Bauh. pin.* 297.
Bryonia lævis f. nigra baccifera. *Bauh. pin.* 297.
Vitis sylvestris f. Tamus. *Dod. pempt.* 400.
Habitat in Europæ *australis*, Orientis *sepibus.* ♃

cretica. 2. TAMUS foliis trilobis.
Tamnus cretica, trifido folio. *Tournef. cor.* 3.
Habitat in Creta. ♃

SMILAX.

* *Caule aculeato, angulato.*

aspera. 1. SMILAX caule aculeato angulato, foliis dentato leatis cordatis novemnerviis. *Gouan. monsp. Gron. orient.* 316.
Smilax caule angulato aculeato, foliis cordato-o gis acutis aculeatis. *Hort. cliff.* 458. *Roy. lugd.*
Smilax aspera, fructu rubente. *Bauh. pin.* 296.
Smilax aspera, rutilo fructu. *Clus. hist.* 1. *p.* 112.
β. Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro. *Bauh.* 236.
Smilax aspera, nigro fructu. *Clus. hist.* 1. *p.* 113.
γ. Smilax viticulis asperis, foliis longis angustis natis lævibus: auriculis ad basin rotundioribus. *alm.* 348 *t.* 110 *f.* 3
Habitat in Hispaniæ, Italiæ, Siciliæ, Palæstinæ *bus.* ♄

excelsa. 2. SMILAX caule aculeato angulato, foliis inermibus cordatis novemnerviis.
Smilax caule angulato aculeato alternatim inflex liis sagittatis acutis inermibus. *Roy. lugdb.* 221

[Smi]lax orientalis, farmentis aculeatis excelfas arbores [s]candens, foliis non fpinofis. *Tournef. cor.* 45. *Buxb. [c]ent.* 1. *p.* 18. *t.* 27. *mal.*
[Sm]ilax afpera. *Alp. ægypt.* 140. *t.* 141?
[Hab]itat *in* Oriente, Syria. ♄

[SM]ILAX caule aculeato angulato: foliis inermibus: [c]aulinis cordatis; rameis ovato-oblongis. *Fl. zeyl.* [3]64.   zeylanica.
[Smil]ax indica fpinofa, folio cinnamomi, Pfeudo-Chi[na] quibusdam. *Burm. zeyl.* 22.
[Hab]itat *in* Zeylona. ♄

[SM]ILAX caule aculeato angulato, foliis inermibus [o]vatis retufo-mucronatis trinerviis.   Sarfaparilla.
[Smi]lax caule angulato aculeato, foliis ovatis acutis [in]ermibus. *Roy. lugdb.* 228.
[Sm]ilax caule angulato aculeato; foliis dilatato-cordatis [i]nermibus acutis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120; [t.] 56. *Mat. med.* 460.
[Sm]ilax viticulis afperis virginiana, folio hederaceo le[v]i Zarza nobiliffima. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 2. *Raj. fuppl.* 345.
[Sm]ilax afpera peruviana, f. Sarfaparilla. *Bauh. pin.* 296.
[Hab]itat *in* Peru, Brafilia, Mexico, Virginia. ♄

* * *Caule aculeato, tereti.*

[SM]ILAX caule aculeato teretiufculo, foliis inermi[b]us ovato-cordatis quinquenerviis.   China.
[Sm]ilax caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis inermi[b]us quinquenerviis. *Mat. med.* 461. *Gron. orient.* 317.
[Sm]ilax farmento tereti inferne aculeato, foliis fubro[t]undo-cordatis trinerviis, petiolis clavicula una [a]lterave. *Brown jam.* 359.
[Sm]ilax minus fpinofa, fructu rubicundo, radice virtuofa [C]hina dicta f. Sankiva. *Kæmpf. amæn.* 781. *t.* 782.
[Ch]ina radix. *Bauh. pin.* 896.
[Ch]ina michuacanenlis f. Smilax afpera minor. *Plum. [sp]ec.* 183.
[Vo]lubiculus convolvulaceus fpinofus finicus, floribus [pa]rvis umbellatis. *Pluk. amalth.* 101. *t.* 408. *f.* 1.
[Hab]itat *in* China, Japonia. ♄
[Stip]uli *bidentati. Folia ovato-cordata, obtufa cum acu[m]ine.*

rotundifolia 6. SMILAX caule aculeato tereti, foliis inermibus cordatis acuminatis subseptemnerviis.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♄
Caulis *teres, nudus, flexuosus, aculeis rectis rarioribus.* Folia *cordata, inermia, nuda, quinquenervia, latitudine quam longa acuta, petiolis brevibus innixa; e petiolo* Cirrhi *duo, filiformes.*

laurifolia. 7. SMILAX caule aculeato tereti, foliis inermibus ovato-lanceolatis trinerviis. *Gron. virg.* 193; 156.
Smilax lævis, lauri folio, baccis nigris. *Catesb. car.* 1. *p.* 15. *t.* 15.
China altera aculeata, foliis oblongis cuspidatis. *Pluk. ic.* 85.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄
Folia, *quoad consistentiam, crassissima in suo genere.*

tamnoides. 8. SMILAX caule aculeato tereti, foliis inermibus cordatis oblongis septemnerviis.
Smilax bryoniæ nigræ foliis, caule spinoso, baccis nigris. *Catesb. car.* 1. *p.* 52. *t.* 52.
Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania.

caduca. 9. SMILAX caule aculeato tereti, foliis inermibus ovatis trinerviis.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♄
Caulis *teres, nudus, flexuosus, aculeis rectis rarioribus apice nigris.* Folia *ovata, trinervia, annua, acuta.* Petiolis *brevibus, e quibus* Cirrhi *duo, capillares.* Umbellæ *infra folia pedunculis vix petiolo longioribus insidentes.*

*** *Caule inermi, angulato.*

bona nox. 10. SMILAX caule inermi angulato, foliis ciliato aculeatis.
Smilax aspera indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 296.
Smilax, foliis latis in margine spinosis, caroliniana stipite quadrato. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 1.
β. Smilax caroliniana, stipite quadrato leni, foliis angustis asperis auriculatis ad basin angulosis. *Pluk. alm.* 3 *t.* 111. *f.* 3.
Habitat in Carolina.

herbacea. 11. SMILAX caule inermi angulato, foliis inermibus ovatis septemnerviis. *Gron. virg.* 193; 156.

Smilax lævis marilandica, foliis hederæ nervosis præ-longis pedicu lis insidentibus, flosculis minimis in umbellam parvam congestis. *Raj. suppl.* 345.
Smilax claviculata, hederæ folio, tota lævis, e terra mariana. *Pluk. alm.* 349. 225. *f.* 4.
Habitat in Virginia, Marilandica. ♃

* * * * *Caule inermi, tereti.*

SMILAX caule inermi tereti, foliis inermibus lanceolatis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120. — lanceolata
Smilax non spinosa, baccis rubris. *Catesb. car.* 2. *p.* 84. *t.* 84.
Habitat in Virginia.

SMILAX caule inermi tereti, foliis inermibus: caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis quinquenerviis. — Pseudo China.
Smilax caule tereti inermi, foliis inermibus: caulinis cordatis, ramorum lanceolatis, pedunculis longissimis. *Gron. virg.* 193; 156.
Smilax caule tereti inermi, foliis cordato-ovatis acutis inermibus, petiolis bidentatis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120.
Smilax aspera, foliis trinerviis oblongis, petiolis biclaviculatis. *Brown. jam.* 359.
Smilax virginiana, spinis innocuis armata, latis canellæ foliis, radice arundinacea crassa nodosa & carnosa. *Pluk. alm.* 349. *t.* 110. *f.* 5.
Smilax aspera, fructu nigro, radice nodosa magna lævi farinacea. *Sloan. jam.* 105. *hist.* 1. *p.* 31. *t.* 143. *f.* 1.
Smilax aspera nodosa, radice rubra majore. *Plum. ic.* 82.
China spuria nodosa. *Bauh. pin.* 297.
Habitat in Virginia, Jamaica.

RAJANIA.

RAJANIA foliis hastato-cordatis. *Hort. cliff.* 458.* — hastata.
Jan-Raja scandens, folio oblongo angusto auriculato. *Plum. gen.* 33.
Bryonia fructu alato, foliis auriculatis. *Plum. amer.* 84. *t.* 98. *fil. t.* 178.
Habitat in Domingo.

RAJANIA *foliis cordatis* septemnerviis. — cordata

Jan-Raja scandens, folio tamni. *Plum. gen.* 33. *ic. f.* 1.
Habitat in America *meridionali.*
Folia *cordata, oblonga, acuminata, reticulata.* F *racemosi.*

quinquefolia. 3. RAJANIA foliis quinis ovali-oblongis.
Jan-Raja scandens quinquefolia. *Plum. gen.* 33. *ic. f.* 2.
Habitat in America.
Folia *ad singula genicula quina, ovato-lanceolata, sessilia, petiolata.* Racemi *ex medio internodio non autem ex axillis.*

DIOSCOREA.

pentaphylla 1. DIOSCOREA foliis digitatis. *Hort. cliff.* 459. *Zeyl.* 363.
Ricophora pentaphyllos, caule spinoso, fructu ob go triquetro, malabaraea. *Pluk. alm.* 321.
Nureni kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 67. *t.* 35.
Habitat in India.

triphylla. 2. DIOSCOREA foliis ternatis. *Hort. cliff.* 459.
Tsiageri nuren. *Rheed. mal.* 7. *p.* 63. *t.* 33.
Habitat in Malabaria.
Praecedenti maxime affinis, an satis distincta?

aculeata. 3. DIOSCOREA foliis cordatis, caule aculeato b fero. *Hort. cliff.* 459.
Dioscorea ind. orient. folio tamni longiore, flo spicatis, spicis plurimis ex uno pedunculo e tibus, scapo eorum medio geniculato. *Amm.* 257.
Kattu-kalengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 71. *t.* 37.
Cara. *Francisc. gart. t.* 25. *f.* 8. ♀
Habitat in Malabaria.

alata. 4. DIOSCOREA foliis cordatis, caule alato bulb *Fl. Zeyl.* 260. *
Volubilis rubra, caule membranulis exstantibus a folio cordato nervoso. *Sloan. jam.* 46. *hist.* 1. *p.*
Katsiil-kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 71. *t.* 38. *Raj.* 134.
Habitat in Indiis.

IOSCOREA foliis cordatis, caule lævi bulbifero. *Hort. cliff.* 459. *Fl. zeyl.* 359. * bulbifera.
hizophora zeylanica, ſcammonii folio ſingulari, radice rotunda. *Herm. par.* 217. *t.* 217.
hizophora indic[illegible]ryoniæ nigræ ſimilis, ad foliorum ortum verruco[illegible] *Pluk. alm* 321. *t.* 220. *f.* 6.
atu katſiil. *Rheed. mal.* 7. *p.* 69. *t.* 36.
abitat in Indiis.

DIOSCOREA foliis cordatis alternis, caule lævi tereti. *Hort. cliff.* 459. *t.* 28. *Fl. zeyl.* 358. *Roy. lugdb.* 527. *Brown. jam.* 360. ſativa.
Dioſcorea ſcandens, foliis tamni, fructu racemoſo. *Plum. gen.* 9. *ic.* 117. *f.* 1.
Volubilis nigra, folio cordato nervoſo. *Sloan. jam.* 46. *hiſt.* 1. *p* 14[illegible].
Ku kelengu. *Rheed mal.* 8. *p.* 97. *t.* 51.
Habitat in Indiis. ♃

DIOSCOREA foliis cordatis alternis oppoſitisque, caule lævi. villoſa.
Dioſcorea foliis cordatis acuminatis: nervis lateralibus ad medium folii terminatis. *Gron. virg.* 121; 156.
Polygonum ſcandens altiſſimum, foliis tamni. *Plum. ſpec.* 1. *ic.* 117. *f.* 2?
Bryoniæ ſimilis floridana, muſcoſis floribus quernis, foliis ſubtus lanugine villoſis: medio nervo in ſpinulam abeunte. *Pluk. alm.* 46. *t.* 375 *f.* 5.
Habitat in Virginia, Florida.

DIOSCOREA foliis oppoſitis ovatis acuminatis. *Fl. zeyl.* 361. * oppoſitifol
Inhame maderaſp. foliis binis pulchre venoſis. *Pet. gaz.* 50. *t.* 31. *f.* 6.
Habitat in India. ♃

OCTANDRIA.

POPULUS.

POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis. *Hort. cliff.* 460. *Fl. ſvec.* 820; 910. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 156. *Gmel. ſib.* 1. p. 151. *Dalib. pariſ.* 302. alba.
Populus alba, majoribus foliis. *Bauh. pin.* 429.

Populus alba. *Dod. pempt.* 835.
Habitat in Europa *temperatiori.* ♄
Flores omnino ut in P. tremula.

tremula. 2. POPULUS foliis subrotundis dentato angulatis utrinque glabris. *Hort. cliff.* 46[illegible] *Fl. svec.* 819; [illegible] *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 15[illegible] *Gmel. sib.* 1. *p.* [illegible] *Dalib. paris.* 301.
Populus tremula. *Bauh. pin.* 429.
Populus lybica. *Dod. pempt.* 836.
Habitat in Europæ *frigidioribus.* ♄
Folia *involuta basi interne glandula duplici.*

nigra. 3. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis serra[illegible] *Hort. cliff.* 460. *Fl. svec.* 821; 911. *Mat. med.* 4[illegible] *Roy. lugdb.* 82. *Gron. virg.* 194. *Hall. helv.* 1[illegible] *Gmel. sib.* 1. *p.* 151. *Dalib. paris.* 301.
Populus nigra. *Bauh. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.
Habitat in Europa *temperatiore.* ♄
Folia *involuta absque glandulis ad basin, hinc diversi[illegible] praecedentis.*

[illegible]misera. 4. POPULUS foliis subcordatis denticulatis. *H[illegible] cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82.
Populus foliis cordatis crenatis basi nudis, petio[illegible] teretibus. *Wach. ultr.* 294.
Populus nigra, folio maximo gemmis balsamum o[illegible] ratissimum fundentibus. *Catesb. car.* 1. *p.* 34. *t.* [illegible] *Duham. arb.* 2. *p.* 178. *t.* 38. *f.* 6.
Populus foliis ovatis acutis serratis. *Gmel. sib.* 1. 152. *t.* 33.
Habitat in America *septentrionali.* ♄

[illegible]terophylla. 5. POPULUS foliis cordatis primoribus villosis.
Populus foliis cordatis obsolete serratis: infimis ser[illegible]tis glandulosis, petiolis lateraliter utrinque pla[illegible] *Wach. ultr.* 294?
Populus magna virginiana, foliis amplissimis, ra[illegible] nervosis quasi quadrangulis. *Duham. arb.* 2. *p.* 1[illegible] *t.* 39. *f.* 9.
Populus magna, foliis amplis: aliis cordiformib[illegible] aliis subrotundis: primoribus tomentosis. *Gr[illegible] virg.* 194; 157.
Habitat in Virginia. ♄

RHODIOLA.

)DIOLA. *Fl. lapp.* 378. *Fl. svec.* 831; 912. *Mat.* Rosea.
l. 477. *Hort. cliff.* 470. *Roy. lugdb.* 457.
lia radix. *Bauh. pin.* 286. *Clus. hist.* 2. *p.* 65. *Raj.*
. 690.
phium luteum minus, radice rosam redolente. *Mo-*
hist. 3. *p.* 468 *s.* 12. *t.* 10. *f.* 8.
tat in *Alpibus* Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ,
itanniæ. ♃

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS.

RCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. perennis.
rt. *cliff.* 461. *Fl. svec.* 823; 913. *Roy. lugdb.* 203.
lib. paris. 302.
rcurialis montana testiculata. *Bauh. pin.* 122.
-Crambe mas. *Cam. epit.* 999.
rcurialis montana spicata. *Bauh. pin.* 122.
crambe femina. *Cam. epit.* 999.
at in Europæ *nemoribus.* ♃

ιCURIALIS caule brachiato, foliis glabriuscu- ambigua.
, floribus verticillatis: femineo masculisque.
n. dec. 1. *p.* 15. *t.* 8. *
at in Hispania.
ma M. annuæ.

ιCURIALIS caule brachiato, foliis glabris, flo- annua.
s spicatis. *Hort. cliff.* 461. *Hort. ups.* 298. *Mat.*
l. 464. *Roy. lugdb.* 263. *Dalib. paris.* 302.
urialis testiculata s. mas. *Bauh. pin.* 121. ♀
urialis mas. *Dod. pempt.* 658. ♀
curialis spicata s. femina. *Dod. pempt.* 658.
at in Europæ *temperatæ umbrosis.* ☉

ιCURIALIS caule subfruticoso, foliis tomen- tomentosa.
s *Hort. ups.* 461. *Roy. lugdb.* 203. *Sauv. monsp.*
. *Gouan. monsp.* 507.
on testiculatum *Bauh. pin.* 122. ♀
um marificum. *Clus. hist.* 2. *p.* 48. ♀
lon spicatum. *Bauh. pin.* 122.
on seminificum. *Clus. hist.* 2. *p.* 48.
t in G. Narbonensi, Hispania. ♄

HYDROCHARIS.

Morsus ranæ. 1. HYDROCHARIS. *Hort. cliff.* 460. *Fl. svec.* 914. *Roy. lugdb.* 10. *Hall. helv.* 301. *Dalib. paris.*
Nymphæa alba minima. *Bauh. pin.* 193.
Ranæ morsus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 2. ♂; 1. ♀
β. Morsus ranæ flore pleno odoratissimo. *Raj. cent.* 1c
γ. Nymphæa alba minor. *Bauh. pin.* 193.
Habitat in Europæ *fossis limosis.* ☉. ♃
Gemmifera s. bulbifera est.

DECANDRIA.

CARICA.

Papaya. 1. CARICA foliorum lobis sinuatis. *Hort. cliff.* *Fl. zeyl.* 365. *Roy. lugdb.* 225.
Carica fronde comosa, foliis peltatis: lobis v[illegible] nuatis. *Brown. jam.* 360.
Arbor platani folio, fructu peponis magnitudi[illegible] li. *Bauh. pin.* 131. *Mer. sur.* 40. *t.* 40. & *t.* 62.
Ficus arbor utriusque indiæ, platani foliis, mon[illegible] ches. *Pluk. alm.* 145. *t.* 278. *f.* 1.
Papaya fructu oblongo, melonis effigie. *Treu* *t.* 7.
Papaya-maram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 23. *t.* 13. *f.* 1
♂. Ambapaya. *Rheed. mal.* 1. *p.* 21. *t.* 15. *f.* 2.
Papaya. *Ehret. t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Indiis. ♄

Posoposa. 2. CARICA foliorum lobis integris. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 225.
Carica sylvestris minor, lobis minus divisis spinis inermibus. *Brown. jam.* 360.
Papaya ramosa, fructu pyriformi. *Few. peru* 52 *t.* 39 *f.* 1.
Ficus arbor papaje sylvestris nomine missa. *P[illegible]* 146 *t* 278. *f.* 2?
Platani folio arbor Posoposo philippensis. *Pet.* *t.* 43. *f.* 2?
Habitat Surinami. ♄

KIGGELARIA.

africana. 1. KIGGELARIA. Hort. cliff. 462. t. 29.* Roy.

ns non odorata, fructu globoso, africana. *Sterb.*
-. 245. *t.* 12. *f. B. C. D.*
ıymo affinis æthiopica sempervirens, fructu glo-
o scabro, foliis salicis rigidis serratis. *Herm. lugdb.*
). *Pluk. alm.* 139. *t.* 176. *f.* 3.
at in Æthiopia. ♄

CORIARIA.

IARIA foliis ovato-oblongis. *Hort. upf.* 299. myrtifolia.
v. monsp. 151. *Gouan. monsp.* 508.
ria. *Hort. cliff.* 462. *Roy. lugdb.* 222.
myrtifolia monspeliaca. *Bauh. pin.* 414. *Angl.*
ul. 64. *t.* 20. *f.* 1.
plinii myrtifolia monspeliensium. *Lob. ic.* 2. *p.*

t Monspelii. ♄

IARIA foliis cordato-ovatis sessilibus. ruscifolia.
ia ruscifolia, vulgo Deu. *Few. peruv.* 3. *p.* 17.
2.
it in P[illegible] ♄

SCHINUS.

NUS foliis pinnatis: foliolis serratis impari Molle.
ıssimo, petiolo æquali. *Hort. cliff.* 483.
cus peruviana. *Bauh. pin.* 399.
cus africana. *Seb. mus.* 2. *p.* 7. *t.* 5. *f.* 5.
. *Cluf. cur.* 50. *monard.* 322.
t in Peru. ♄
etiam Stamina gerit, sed sterilia.

NUS foliis pinnatis: foliolis integerrimis æqua- Areira.
s, petiolo æquali.
foliis non serratis. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 43. *t.*

t in Brasilia, Peru. ♄
icatio omnino præcedentis. Alstræmer.

DODE-

DODECANDRIA.

MENISPERMUM.

canadense. 1. MENISPERMUM foliis peltatis cordatis sub- do-angulatis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upf.* 91. *virg.* 153.
Menispermum canadense scandens, umbilicato *Tournef. act.* 1705. *p.* 311.
Hedera monophyllos virginiana, convolvuli *Pluk. alm.* 181. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♄
Caulis *volubilis contra solem, lævis.* Folia *sub- cordata, quinquangula, lævia, acuminata.* Pe- lus *biracemosus, supra axillaris, nutans, petiolo*

virginicum. 2. MENISPERMUM foliis peltatis cordatis l *Gron. virg.* 40.
Menispermum folio hederaceo. *Dill. elth.* 223. *f.* 219.
Habitat in Virginiæ, Carolinæ *mariti*mis. ♄

Carolinum. 3. MENISPERMUM foliis cordatis subtus vill
Habitat in Carolina.

Cocculus. 4. MENISPERMUM foliis cordatis retusis mu- tis, caule lacero. *Mat. med.* 175. *Gron. orien*
Arbor aristolochiæ foliis, maderaspatana, fructu medicæ adinstar convoluto. *Pluk. alm.* 43. *t.* 1
Cocculus officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Pluk. ma t.* 345. *f.* 2.
Tuba baccifera. *Rumph. amb.* 5. *p.* 35. *t.* 22.
Natsiatam. *Rheed. mal.* 7. *p.* 1. *t.* 1?
Habitat in India.

crispum. 5. MENISPERMUM foliis cordatis exquisitis, quadrangulo crispo.
Funis quadrangularis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 83. *t.* 4
Habitat in Bengala. ♄

orbiculatum 5. MENISPERMUM foliis orbiculatis subtus vi
Cocculi orientalis frutex convolvulaceus, orb- tis foliis prona parte villosis. *Pluk. amalth.* 384. *f.* 6.
Habitat in insula Crocodilorum, Asiæ.

6. ME

;NISPERMUM foliis lanceolato-ovatis villosis. hirsutum.
:uli indici altera species minor scandens, vincæ
:rvincæ foliis villosis. *Pluk. amalth.* 61. *t.* 384. *f.* 7.
:tat *in* India.

NISPERMUM foliis lineari-lanceolatis hirsutis. myosotoides.
:uli indici species minima myosotidis hirsutis foliis
facie. *Pluk. phyt.* 384. *f.* 3.
tat in India.

DATISCA.

FISCA caule lævi. Cannabina
iabis foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 457. *Roy. lugdb.*
I.
iabis lutea fertilis *Alp. exot.* 300. *t.* 298. *Moris.*
t. 3. *p.* 432. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 4.
ola herba sterilis. *Bauh. pin.* 100.
iabis lutea cretica. *Alp. exot.* 296. *t.* 295.
iabis lutea sterilis. *Alp. exot.* 301. *t.* 300.
ola herba foliis cannabinis. *Bauh. pin.* 100.
tat in Creta. ♃

FISCA caule hirsuto. hirta.
tat in Pensylvania. *Kalm.*
species major; Caulis *exstantibus pilis undique hir-*
. Folia *pinnata, præcedentis quodammodo similia,*
Foliola *majora, magis alterna & magis basi de-*
rentia ac confluentia.

POLYANDRIA.

CLIFFORTIA.

FFORTIA foliis subcordatis dentatis. ilicifolia.
ortia foliis dentatis. *Hort. cliff.* 463. *t.* 30 *Roy.*
db. 252.
scula afra, folio acuto ilicis caulem amplexo rigi-
Dill elth. 36. *t.* 31. *f.* 35.
at in Æthiopia ♄

FFORTIA foliis lanceolatis integerrimis. *Hort.* ruscifolia.
f. 463. *t.* 31. *Roy. lugdb.* 252.
:x æthiopicus conifer, fructu parvo sparsim intra
ia rusci, feminibus cylindraceis. *Pluk. am.* 159. t.
. *f.* 2.
t in Æthiopia. ♄

3. CLIF-

olygonifolia. 3. CLIFFORTIA foliis linearibus pilosis. *Hort. c* 501. *t.* 32.
Habitat in Æthiopia. ♄

trifoliata. 4. CLIFFORTIA foliis ternatis: intermedio triden *Roy. lugdb.* 253.
Myrica foliis ternatis: intermediis cuneiformibu dentatis. *Hort. cliff.* 456.
Thymelææ? affinis æthiopica, foliis tridentatis omni parte hirsutie pubescentibus. *Pluk. alm.* *t.* 319. *f.* 4.
Arbuscula afra, foliolis trifoliatis sine peduncul caulem natis, semine papposo. *Barh. lugdb.* 2. *p*
Habitat in Æthiopia. ♄

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

communis. 1. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucr bacca longioribus.
Juniperus foliis patentibus. *Hort. cliff.* 465. *Fl.* 824; 915. *Mat. med.* 465 *Hall. helv.* 146. *Gn* 1. *p.* 182. binerviis. *Sauv. monsp.* 169.
Juniperus vulgaris fruticosa, *Bauh. pin.* 488.
β. Juniperus vulgaris arbor *Bauh. pin.* 488.
γ. Juniperus minor montana, folio latiore, fruct giore. *Bauh. pin.* 489.
Habitat in Europæ *frigidioris sylvis frequentissima.*

Oxycedrus. 2. JUNIPERUS foliis ternatis patentibus muc bacca brevioribus. *Gouan. monsp.* 509.
Juniperus foliis quaternis patentibus subulatis t natis. *Sauv. act. monsp.* 1743 *p.* 52.
Juniperus foliis quaternis patentibus subulatis p tibus. *Roy. lugdb.* 90.
Juniperus foliis ternis patentibus subulatis punge trinerviis. *Sauv. monsp.* 169.
Juniperus major, bacca rufescente. *Bauh. pin*
Oxycedrus. *Clus. hist.* 1. *p* 39.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♄
Baccæ magnitudine Avellanæ a, J. *communi differ lima.*

NIPERUS foliis quadrifariam imbricatis acutis. *Roy. lugdb.* 90. — thurifera.
rus hispanica procerior, fructu maximo nigro. *Tournef. inst.* 588.
itat in Hispania. ♄

NIPERUS foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 90. *Mat. med.* 466. *Sauv. monsp.* 9. *Gouan. monsp.* 509. *Gmel. sib.* 1. *p.* 182. *Gron. orient.* 320. — lycia.
rus, folio cupressi, media majoribus baccis. *Bauh. pin.* 487.
rus phœnicea altera plinii & theophrasti. *Lob. ic.* 1.
itat in Gallia, Sibiria. ♄

NIPERUS foliis ternis obliteratis imbricatis obtusis. *Gouan. monsp.* 509. — phœnicea.
rus folio cupressi major, fructu flavescente. *Bauh. pin.* 487.
perus major. *Clus. hist.* 1. *p.* 38.
itat in Europa *australi*, Oriente. ♄
a præcedente vix specie diversam judicat Raj. exot. ; *inquirant populares.*

NIPERUS foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, senioribus acutis. *Roy. lugdb.* 90. — barbadensis.
perus barbadensis, cupressi foliis, ramulis quadratis. *Pluk. alm.* 201. *t.* 197. *f.* 4.
perus bermudiana. *Hort. angl.* 42. *t.* 1. *f.* 1. *ex figura.*
itat in America. ♄

NIPERUS foliis inferioribus ternis: superioribus ternis decurrentibus subulatis patulis acutis. *Roy. lugdb.* 90. *Brown. jam.* 362. — bermudiana
perus bermudiana. *Herm. lugdb.* 345. *t.* 347.
itat in America. ♄

NIPERUS foliis ternis basi adnatis: junioribus imbricatis, senioribus patulis. *Hort. cliff.* 464. * *Roy. lugdb.* 90. *Gron. virg.* 157. *Kalm. it.* 3. *p.* 119. — virginiana.
perus barbadensis, cupressi folio arbor præcelsa tagonophyllos. *Pluk. alm.* 201. *t.* 197. *f.* 4.
perus *major americana. Raj. hist.* 1413. 1414.

Juni-

Juniperus maxima, cupressi folio minimo, corti teriore in tenues philyras spirales ductili. Sloa 128. *hist.* 2. *p.* 2. *t.* 157. *f.* 3. *Raj. dendr.* 12.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄

Sabina. 9. JUNIPERUS foliis oppositis erectis decurre oppositionibus pyxidatis. *Gouan. monsp.* 510.
Juniperus foliis interne adnatis: oppositionibu catenatis. *Hort cliff.* 464. *Hort. upf.* 299. *Mi* 467. *Roy. lugdb.* 90 *Gmel. sib.* 1. *p.* 183.
Sabina folio cupressi. *Bauh. pin.* 487.
Sabina. *Dod. pempt.* 854.
β. Sabina folio tamarisci dioscoridis. *Bauh. pin.* 4
Habitat in Lusitania, Italia, Sibiria, Oriente, po, Ararat. ♄

TAXUS.

baccata. 1. TAXUS foliis approximatis.
Taxus. *Hort. cliff.* 464. *Fl. svec.* 825; 916. *Roy* 87. *Hall. helv.* 146. *Dalib. paris.* 303.
Taxus. *Bauh. pin.* 505. *Cam. epit.* 840. *D...*
Habitat in Europa, Canada. ♄
Dicotyledonis est.

nucifera. 2. TAXUS foliis distantibus. †
Taxus nucifera. *Kæmpf. amæn.* 814. *t.* 815.
Habitat in Japonia ♄

EPHEDRA.

distachya. 1. EPHEDRA pedunculis oppositis: amentis ge *Hort. cliff.* 465. *Gouan. monsp.* 510.
Polygonum bacciferum maritimum minus. *Bauh* 15.
Tragum. *Cam. hort.* 171. *t.* 46.
Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ *saxosis* *marinis.* ♄

monostachya. 2. EPHEDRA pedunculis pluribus: amentis soli *Gmel. sib.* 1. *p.* 171. *t.* 38. *f.* 1.
Ephedra minima, flagellis brevioribus & tenuio *Am.m. ruth.* 254. *t.* 26.
Ephedra monospermos. *Amm. ruth.* 255.
Habitat in Sibiriæ montibus apricis, sterilissimis.

A D E L I A.

ĽLIA foliis oblongis tomentosis serratis. Bernardia.
ırdia fruticosa, foliis tomentosis ovatis serratis
ernis. *Brown. jam.* 361.
at in America. ♄

ĽLIA foliis obovatis integerrimis. *Amæn. acad.* Ricinella.
p. 411. *
ırdia fruticosa, foliis subrotundis nitidis confer-
, floribus associatis. *Brown. jam.* 361.
at in Jamaica. ♄

ĽLIA ramis flexuosis: spinis gemmaceis. *Amæn.* Acidoton.
d. 5. *p.* 411. *
oton frutescens aculeatum diffusum, ramulis gra-
ıbus teretibus, foliolis confertis, flore unico al-
ove. *Brown. jam.* 355.
at in Jamaica. ♄

C I S S A M P E L O S.

ıAMPELOS foliis peltatis cordatis emarginatis. pareira.
t. med. 459.
ıpelos caule erecto suffruticoso simplicissimo.
fl. it. 267. *
atis baccifera glabra & villosa, rotundo & umbi-
ıto folio. *Plum. amer.* 78. *t.* 93. *fil.* 1. *t.* 183. *Sloan.*
ı. 85. *hist.* 1. *p.* 200.
volvulus brasilianus, flore octopetalo, mono-
ccos. *Raj. hist.* 1331.
eba folio orbiculari & umbilicato lævi. *Plum.*
. 33.
eba. *Marcgr. bras.* 24. *Pis. bras.* 94.
mpelos scandens, foliis peltatis orbiculato-cor-
is villosis, floribus masculis racemosis; femineis
catis: spicis foliosis. *Brown. jam.* 557.
eba folio orbiculari umbilicato & tomentoso,
m. gen. 33.
tat in America *meridionali* ♃

ıAMPELOS foliis basi petiolatis integris. Caapeba.
eba folio orbiculari non umbilicato. *Plum. gen.*
. *ic.* 67. *f.* 2.
tat in America *meridionali.* ♃

ıAMPELOS *foliis* cordatis acutis angulatis. Smilacina.
 Smi-

Smilax lenis, folio anguloso hederaceo. *Catesb. car.* 1. *p.* 51. *t.* 51.
Habitat in Carolina.
Fructificationem perfectam non vidi.

SYNGENESIA.

RUSCUS.

aculeatus. 1. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. *Hort.* 463. *Hort. upf.* 300. *Mat. med.* 768. *Dalib.* 304. *Roy. lugdb.* 227. *Hasselq. it.* 492.
Ruscus myrtifolius aculeatus. *Tournef. inst.* 79.
Ruscus. *Bauh. pin.* 470.
Ruscum. *Dod. pempt.* 474.
Habitat in Galliæ, Italiæ *nemorosis asperis.* ♄

Hypophyllum. 2. RUSCUS foliis subtus floriferis nudis. *Hort.* 465. *Hort. upf.* 300. *Roy. lugdb.* 227.
Laurus alexandrina, fructu folio insidente. *Bauh.* 305.
Laurus alexandrina, Chamædaphne. *Col. ecphr.* 164. *t.* 165. *f.* 1.
β. Ruscus latifolius, fructu ex medio foliorum extra dente. *Dill. elth.* 333. *t.* 251. *f.* 303.
Habitat in Italia *ad latera collium.* ♃

Hypoglossum. 3. RUSCUS foliis supra floriferis sub foliolo. *cliff.* 466. *Hort. upf.* 300. *Mat. med.* 469. *Roy.* 227.
Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *pin.* 304.
Hypoglossum dioscoridis; Laurotaxa plinii. *Col.* 1. *p.* 166. *t.* 165. *f.* 2.
Habitat in Hungariæ, Liguriæ, Italiæ *montib brosis.* ♃

Androgynus. 4. RUSCUS foliis margine floriferis. *Hort. cliff.*
Ruscus latifolius e foliorum sinu florifer & b
Dill. elth. 332. *t.* 250. *f.* 332.
Habitat in Canariis. ♄

racemosus. 5. RUSCUS racemo terminali hermaphroditico. *cliff.* 496. Roy. lugdb. 227. Gouan. monsp.

is angustifolius, fructu summis ramulis innascen-
T. *Mich. pis.* 82.

it - - - -

: ℭ Corolla *coalita in unum corpus carnosum,*
iventia; cæterum facies fere R. androgyni.

GYNANDRIA.

CLUTIA.

TIA foliis sessilibus lineari-lanceolatis, floribus alaternoide
:ariis erectis. *Hort. cliff.* 500 *Roy. lugdb.* 203.
a foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 444. ♀.
malus arboreus, æthiopici mezeræi germanici
s, flore pallido. *Pluk. phyt.* 230. *f.* 1.
elea foliis oblongis nervosis, floribus ex folio-
alis. *Burm. afr.* 116. *t.* 43. *f.* 1.
elea foliis latis oblongis, floribus ex alis in spi-
erectis. *Burm. afric.* 118. *t.* 43. *f.* 3. ♂
noides africana, telephii legitimi imperati folio.
m. hort. 2. *p.* 3. *t.* 2.
t in Æthiopia. ♄
nargine scabra. Flores erecti.

TIA foliis lanceolatis, floribus geminis pendu- polygonoides.

elea foliis latis oblongis, floribus ex alis. *Burm.*
118. *t.* 43. *f.* 3.
ellianthemi folio planta. *Pluk. phyt.* 23. *f.* 7.?
t ad Cap. b. Spei. ♄
alterna, lineari-lanceolata, sensim versus apicem
uata, mucronata, integerrima, lævia. Flores
ares, sæpius bini, penduli, parvi.

IA foliis ovatis integerrimis, floribus laterali- pulchella.


foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 500. 431. *Roy. lugdb.*

: æthiopicus, portulacæ folio, flore ex albo vi-
ente. *Comm. hort.* 1. *p.* 177. *t.* 91.
in Æthiopia. ♄

IA foliis ovalibus retusis, floribus racemosis retusa.
ribus. Fl. zeyl. 967. *

Corni f. Sorbi fpecies. *Bont. jav.* 103.
Scherunam-cottam. *Rheed. mal.* 2. *p.* 23. *t.* 18. 1
Raj. hift. 1623.
Habitat in India. ♄

Eluteria. 5. CLUTIA foliis cordato-lanceolatis. *Fl. zeyl.*
Mat. med. 470. *Amœn. acad.* 5. *p.* 411. *
Eluteria. *Hort. cliff.* 486.
Croton fruticulofum erectum fubvillofum, foliis
datis acuminatis, fpicis terminalibus. *Brown.*
347.
Ricinus dulcis arborefcens americanus, populnea
de argentea. *Pluk. alm.* 321. *t.* 220. *f.* 5. *Seb.*
1. *p.* 56. *t.* 35. *f.* 3.
Habitat in Indiis. ♄
Decandra eft; hinc de Genere etiamnum dubium.



Classis XXIII.

POLYGAMIA MONOECIA.

MUSA.

MUSA spadice nutante, floribus masculis persistentibus. paradisiaca
Musa racemo simplicissimo. *Hort. cliff.* 467. *Hort. upf.* 301. *Fl. zeyl.* 368. *Roy. lugdb.* 10. *Hasselq. it.* 492. *Gron. orient.* 324.
Musa cliffortiana. *Linn. mus.* 1. *t.* 1. *Trew. ehret. t.* 18, 19, 20.
Musa. *Clus. exot.* 229. *Sterb. citr. t.* 4. *Rumph. amb.* 5. *p.* 125. *t.* 60.
Ficus indica, fructu racemoso, folio oblongo. *Bauh. pin.* 508.
Palma humilis, longis latisque foliis. *Bauh. pin.* 107.
Bala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 17. *t.* 12, 13, 14.
Habitat in India. ♃
Hybrida planta matre Bihai, patre ignoto.

MUSA spadice nutante, floribus masculis deciduis. sapientum
Musa spadice nutante, fructu breviori oblongo. *Brown. jam.* 363.
Musa spadice nutante, fructu breviore obtuse angulato. *Mill. dict.* 2.
Musa caudice maculato, fructu recto rotundo breviore odorato. *Sloan. jam.* 192. *hist.* 2. *p.* 147. *Trew. ehret.* 4. *t.* 21, 22, 23.
Musæ affinis altera. *Bauh. pin.* 580.
Ficus indica racemosa, foliis venuste venosis, fructu minore. *Pluk. alm.* 145.
Habitat in Indiis. ♃
Planta etjam filia naturalis f. hybrida Matris Bihai.

MUSA spadice erecto, spathis persistentibus. Bihai.
Musa spadice erecto, spatis rigidis amplexantibus distiche & alternatim sitis. *Brown. jam.* 364.
Folium mensarium. Rumph. amb. 5. *p.* 141. *t.* 62. *f.* 2.

Bihai amplissimis foliis, florum vasculis varieg
Plum. gen. 50.
Bihai. *Ovied l.* 8. *c.* 9.
β. Bihai amplissimis foliis, florum vasculis cocci
Plum. gen. 50. *ic.* 59.
γ. Bihai amplissimis foliis, florum vasculis subnig
Plum. gen. 50.
Habitat in America *calidiore.*

Troglodytarum. 4. MUSA spadice erecto, spathis deciduis. †
Musa uranoscopus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 137. *t.* 61.
β. Musa XI. Pissang Batu. *Rumph. amb.* 5. *p.* 132.
Habitat in Moluccis.
Haec gerit semina multa, ideoque ab autoptis fructifi tio attente inquirenda.

OPHIOXYLON.

Serpentinum. 1. OPHIOXYLON. *Fl. zeyl. p.* 239.
Ophioxylon foliis quaternis. *Fl. zeyl.* 398.* *M med.* 474.
Ligustrum foliis ad singula genicula ternis. *Bur. zeyl.* 141. *t.* 64.
Clematis indica, persicae foliis, fructu periclyme
Bauh. pin. 304.
Habitat in Zeylona. ♄

CELTIS.

australis. 1. CELTIS foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 39. *Ro lugdb.* 207. *Dalib. paris.* 304. *Gouan. monsp.* 511.
Lotus fructu cerasi. *Bauh. pin.* 447.
Lotus s. Celtis. *Cam. epit.* 155.
Lotus arbor. *Lob. ic.* 186.
Habitat in Europa *australi* & Africa *citeriore.* ♄

orientalis. 2. CELTIS foliis oblique cordatis serratis; subtus v losis. *Fl. zeyl.* 369. *
Ulmus fructu baccato. *Hort. cliff.* 83.
Salvifolia arbor orientalis, foliis tenuissime crenat
Pluk. alm. 329. *t.* 221. *f.* 4.
Mallam toddali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 83. *t.* 40.
Habitat in Indiis. ♄

occidentalis. 3 CELTIS foliis oblique ovatis serratis acuminat
Celtis fructu obscure purpurascente. *Mill. dict.* t
Ce

ltis procera, foliis ovato-lanceolatis ferratis, fructu pullo. *Gron. virg.* 158.
ɔtus arbor virginiana, fructu rubro. *Raj. hist.* 1917.
ibitat in Virginia. ♄
ɔlia *tenera, ovato lanceolata, parum pubescentia; adulta lato-ovata, acuminata; acumine & basi integerrima, ceterum serrata, nuda, nervoso-venosa, latere postico duplo minore. Maxime affinis primæ.*

VERATRUM.

ERATRUM racemo fupradecompofito, corollis erectis. **album.**
eratrum caule ramofo. *Mat. med.* 471.
eratrum pedunculis corolla erecta patente brevioribus. *Gmel. sib.* 1. *p.* 75.
elleborus albus, flore fubviridi. *Bauh. pin.* 186.
elleborus albus, exalbido flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 274.
Habitat in Ruffiæ, Sibiriæ, Auftriæ, Helvetiæ, Italiæ, Græciæ *montosis.* ♃

ERATRUM racemo compofito, corollis patentiffimis. **nigrum.**
eratrum pedunculis corolla patentiffima longioribus. *Gmel. sib.* 1. *p.* 76.
lelleborus albus, flore atro rubente. *Bauh. pin.* 186. *Moris. hist.* 3. *p.* 485. *s.* 12. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat in Hungariæ, Sibiriæ *apricis siccis.* ♃
Præcedenti maxime affine, diversum loco, colore, pedunculis villosis, corolla patente nec erecta, racemo composito, nec subdiviso in paniculam.

VERATRUM racemo fimpliciffimo, foliis feffilibus. **luteum.**
Veratrum caule fimpliciffimo. *Gron. virg.* 158.
Refeda foliis lanceolatis, caule fimpliciffimo. *Gron. virg.* 59.
Habitat in Virginia, Canada.
Radix *bulbosa.* Folia *radicalia plura, lato-lanceolata, nervosa, firma, glabra.* Caulis *pedalis, simplicissimus.* Folia *caulina nonnulla, inæqualiter posita, angusta, lanceolata, sessilia, nec ut in reliquis vaginantia, parva.* Racemus *terminalis, simplicissimus,* primum ovatus, *demum longitudine caulis, densus, flosculis* parvis flavis.

assurgens, panicula laxa la-
365.
cula minus sparsa, glumis
ductis. *Sloan. jam. 35. hist.*

, rachi lanata, flo- avena.

hist. 1. p. 64. t. 24.
u. ver. 1. p. 361.
osum album.
h. gram. 137.

ata, flo- alopecuroides.

133.
panicula lon-
constante. *Sloan.*
10. f. 1.
aliore.
nis terminalibus, culmo distachyon.

phoron. *Bocc. sicc. 20.*

Folia *plana.* Rami *nulli.*
ongæ, erectiusculæ, culmum
osculis viginti pluribus. Pe-
laniusculi, basi pilosi, super-
rii. Calyces *uniflori: glu-*
gior latiorque apice bifido:
atente. Gluma *calycina in-*

æ spicis conjugatis ovato- Schœnanthus.
te, flosculis sessilibus arista
sub Laguro) *Mat. med. 31.*
. *Bauh. pin. 11. theatr. 163.*
ns aromaticum majus syri-
229. *f. 8. t. 9. f. 25.*
um, multiplici panicula,
andicantibus ex eodem pe-
75. t. 190. f. 1.

ANDROPOGON.

caricosum. 1. ANDROPOGON spica solitaria imbricata, fl[illegible] bus hirsutis: aristis nudis contortis.
Gramen caricosum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 17. *t.* 7. *f.* 1
Habitat in India.
Culmi *filiformes.* Folia *pilis raris adspersa:* [illegible] *basi hirsutis.* Spica *alopecuri imbricata, griseo* [illegible] *suta: aristis contortis nudis.*

contortum 2. ANDROPOGON spica solitaria, floribus infe[illegible] bus muticis.
Ægilops maderaspatana, glumis pilosis aristatis. *Scheuch. gram.* 92.
Gramen secalinum indicum, spica gracili tomen[illegible] longioribus aristis ad se invicem intortis. *Pluk.* 173. *t.* 191. *f.* 5. *Moris. hist.* 3. *p.* 180. *f.* 8. *t.* *ult.*
Habitat in India.

divaricatum 3. ANDROPOGON spica oblonga, floribus la[illegible] remotis divaricatis, arista flexuosa nuda.
Lagurus humilior, panicula conica laxa nutante [illegible] mum terminante. *Gron. virg.* 135.
Habitat in Virginia.

nutans. 4. ANDROPOGON panicula nutante, aristis tort[illegible] sis lævibus, glumis calycinis hirsutis.
Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculis [illegible] teralibus oppositis unifloris; aristis flexuosis. *Gr* *virg.* 133.
Habitat in Virginia, Jamaica.
Pedunculi *nudi; pedicelli biflori:* Flores *ambo arist[illegible]* *altero sessili.*

ryllus. 5. ANDROPOGON paniculæ pedunculis simplicissi[illegible] trifloris, flosculo hermaphrodito aristato ciliato [illegible] barbato. *Amœn. acad.* 4. *p.* 332. * *Gouan. monsp.* [illegible]
Ægilops bromoides, juba purpurascente. *Bauh.* 2. *p.* 436. *Scheuch. gram.* 267.
Gramen sparteum festuceum s. Ægilops spartea vi[illegible] sa. *Barr. ic.* 18. *f.* 2.
Habitat in Rhætia, Helvetia, Veronæ, Monspeli[illegible]

sulare. 6. ANDROPOGON panicula laxa glabra, flosculis [illegible] minis muticis. pedicello altero breviore, calyci[illegible] lanatis. *Amœn. acad.* 5. p. 412. *

ɔpogon avenaceum assurgens, panicula laxa la-
;inosa. *Brown. jam.* 365.
en avenaceum, panicula minus sparsa, glumis
a sericea lanugine obductis. *Sloan. jam.* 35. *hist.*
'. 43. *t.* 14. *f.* 2.
it in Jamaica.

ravenna. ROPOGON panicula laxa, rachi lanata, flo-
lo utroque arista recta.
lo farcta alpium ravennæ. *Zanon. hist.* 1. *p.* 64. *t.* 24.
ris. hist. 3. *p.* 221. *f.* 8. *t.* 8. *f.* 32. *Segu. ver.* 1. *p.* 361.
en arundinaceum ramosum plumosum album.
h. pin. 7. *prodr.* 14. *theatr.* 95. *Scheuch. gram.* 137.
it in Italia.

alopecuroides. ROPOGON panicula laxa, rachi lanata, flo-
o utroque arista tortuosa.
ɔpogon culmo paniculato. *Gron. virg.* 133.
en Dactylon alopecuroides facie, panicula lon-
ma e spicis plurimis tomentosis constante. *Sloan.*
34. *hist.* 1. *p.* 113. *t.* 14. *t.* 70. *f.* 1.
t in America *septentrionaliore.*

distachyon. ROPOGON spicis binis terminalibus, culmo
riso.
n bicorne s. distachyophoron. *Bocc. sicc.* 20.
t in Helvetia. *Burser.*
plus quam pedales. Folia *plana.* Rami *nulli.*
æ *duæ, æquales, oblongæ, erectiusculæ, culmum*
inantes: singulæ *ex flosculis viginti pluribus.* Pe-
lli *arcti, brevissimi, planiusculi, basi pilosi, super-*
tiores. Flores *solitarii.* Calyces *uniflori: glu-*
exterior flore fere longior latiorque apice bifido:
a longa, articulata, patente. Gluma *calycina in-*
r minima.

Schœnanthus. ROPOGON paniculæ spicis conjugatis ovato-
ngis rachi pubescente, flosculis sessilibus arista
iosa. *Fl. zeyl.* 465. (sub Laguro) *Mat. med.* 31.
odoratus aromaticus. *Bauh. pin.* 11. *theatr.* 163.
n ad junceum accedens aromaticum majus syri-
i. *Moris. hist.* 3. *p.* 229. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 25.
n Dactylon aromaticum, multiplici panicula,
s brevibus tomento candicantibus ex eodem pe-
o binis. *Pluk. alm.* 175. *t.* 190. *f.* 1.
in India, Arabia.

virginicum. 11. ANDROPOGON paniculæ ſpicis conjugatis dunculis ſimplicibus, rachi lanata, floſculis m maſculo tabeſcente.

Andropogon paniculæ ſpicis conjugatis, peduncu dio villoſis, ſpicis lana brevioribus. *Roy. lugd* *Gron. virg.* 132.

Andropogon altiſſimum gracile, panicula tenui ore, ſpicis plurimis gradatim naſcentibus, f confertis. *Brown. jam.* 365.

Gramen dactylon bicorne tomentoſum minus *hiſt.* 1. *p.* 110. *t.* 68. *f.* 2.

Habitat in America.

bicorne. 12. ANDROPOGON paniculæ ſpicis conjugati dunculis ramoſiſſimis, rachi lanata, floſculi caduca: maſculo tabeſcente.

Andropogon ſpicis conjugatis, calycibus hirſut *lugdb.* 53.

Andropogon erectum montanum, ſpica multip moſa & lanuginoſa. *Brown. jam.* 365.

Lagurus ſpicis oblongis pedunculatis e ſingula ribus. *Hort. cliff.* 25. *Gron. virg.* 135.

Gramen Dactylon bicorne tomentoſum ma ſpicis numeroſis. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 42. *t.* 15.

Habitat in Braſilia, Jamaica.

hirtum. 13. ANDROPOGON paniculæ ſpicis conjugatis cibus hirſutis. *Roy. lugdb.* 53. *Gron. virg.* 1 *it.* 171. *

Feſtuca junceo folio, ſpica gemina. *Bauh. pin.* 19. *theatr.* 145.

Gramen Dactylon ſpica gemina. *T. Scheuch.* g

Gramen Dactylon ſiculum, multiplici panicul ab eodem exortu geminis. *Pluk. alm.* 175. *t.*

Habitat in Luſitania, Sicilia, Smyrnæ.

Pedunculi hirti, uti etiam rachis & glumæ.

Nardus. 14. ANDROPOGON paniculæ ramis ſupradec tis proliferis. *Fl. zeyl.* 45. * (ſub Lagur *med.* 32.

Calamus odoratus mathioli. *Bauh. pin.* 17. *the*

Habitat in India.

muticum. 15. ANDROPOGON ſpicis digitatis ſubternis lis alternis ſeſſilibus muticis.

tat ad Cap. b. Spei.
ni *spithamæi, multi, subpilosi etiam vaginis & fo-*
r. Folia *convoluto-subulata.* Spicæ *digitatæ* 3. *f.*
lineares, articulatæ, secundæ. Calyces *bivalves,*
uti, ad latera dehiscentes, virides. Petala *contra-*
calyci, colorata, tenera. Aristæ nullæ.

DROPOGON spicis digitatis plurimis, flosculis Ischæmum.
silibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis.
man. monsp. 513.
æmum panicula digitata, spiculis oppositis disjunctis-
, florum serie duplici, culmo tereti. *Guett. stamp.*
r. *Dalib. paris.* 288.
en Dactylon spicis villosis. *Bauh. pin.* 8. *theatr.*
f. *Scheuh. gram.* 94.
en Dactylon spicis aristatis geniculatis. *Barr. ic.*
f. 2.
at in Europæ *australioris aridis, collibus, saxosis.*
ili *in singulo spicæ dente gemini: altero aristato,*
ro mutico masculo.

DROPOGON spicis digitatis plurimis erectiu- fasciculatum.
lis articulatis lævibus: flosculis utrinque aristatis
en Dactylon indicum, spicis villosis subrubescen-
is. *Moris. hist.* 3. *p.* 185. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 15.
pogon majus, panicula sparsa, spicis simplicibus
nque aristatis. *Brown. jam.* 365.
n Dactylon majus panicula longa, spicis pluri-
nudis crassis. *Sloan. jam.* 34. *hist.* 1. *p.* 112. *t.*
f. 2.
in Indiis.
glabræ sunt.

ROPOGON spicis fasciculatis, petalis exte- polydactylon.
bus aristatis: flosculi inferioris ciliato, barbatis.
n. acad. 5. *p.* 412. *
pogon polydactylon assurgens, spicis tenuiori-
hirsutis. *Brown. jam.* 364.
n dactylon elatius, spicis plurimis tomentosis.
l. jam. 33. *hist.* 1. *p.* 111. *t.* 65. *f.* 2.
in Jamaica.

HOLCUS.

US glumis bifloris muticis, floribus geminis spicatus.
illo involucratis, spica ovato-oblonga.

Pani-

Panicum spica simplici æquali, pedunculis
Roy. lugdb. 54.
Panicum indicum, spica obtusa cærulea. *Bau.*
theatr. 522.
Panicum americanum. *Clus. hist.* 2. *p.* 215.
Gramen alopecuroides indicum maximum.
1908.
Gramen paniceum sylvestre maximum indi
Pluk. alm. 164. *t.* 32. *f.* 4.
Habitat in India. ☉
Culmus *bipedalis, crassitie pennæ cygneæ, tect*
foliorum hispidis ut ipse culmus. Folia *se*
latitudine digiti hispida. Spica *crassissima*
brevissimis apice fasciculo setarum, intra qua
2, *sessiles.* Calyx *bivalvis, membranaceus,*
Petalo *exteriore hermaphroditi mucronato;*
obtuso. Stylus *floribus longior, lanatus, lon*
ce bifidus. Antheræ *oblongæ.*

Sorghum. 2. HOLCUS glumis villosis, feminibus aristatis.
upf. 301. *Gron. orient.* 325.
Holcus glumis glabris. *Hort. cliff.* 468.
Milium arundinaceum, subrotundo semine,
nominatum. *Bauh. pin.* 26. *Moris. hist.* 3.
f. 8. *t.* 5. *f.* 7.
Sorghi. *Bauh. hist.* 2. *p.* 447.
Habitat in India. ☉
Arista inferne fusca, superne lævis albida.

saccharatus. 3. HOLCUS glumis glabris, feminibus muticis.
Milium indicum, arundinaceo caule, granis fla
tibus. *Herm. lugdb.* 425. *
Milium indicum sacchariferum altissimum, sem
rugineo. *Breyn. prodr.* 2.
Frumentum indicum quod Milium indicum
Bauh. theatr. 488.
Habitat in India. ♂
Differt ab H. Sorgho Panicula *erecta subvert*
racemis patentissimis, horizontalibus, subpend
panicula parva ovata. Rachis *universalis*
lævis, nec scabra. Glumæ *undique villosæ;*
tum apice. Flores *hermaphroditi Gluma*
altera Arista longa tortili; nec tantum in flori
minoribus.

udo humana. Folia *facie Sacchari lineà longitudi-li alba.* Radices *ex infimis caulis geniculis descen-nt in terram.* Flores *masculi vix se aperiunt.*

LCUS glumis glabris, floribus hermaphroditis halepensis. iticis, femineo aristato.
nen arundinaceum paniculatum, locustis partim iticis, partim aristatis. *Scheuch. gram.* 509.
nen arundinaceum halepense, tragopoginis folio, nicula miliacea. *Pluk. alm.* 176. *t.* 32. *f.* 1.
nen paniculatum arundinaceum syriacum Hulliaun ctum. *Moris. hist.* 3. *p.* 201.
tat in Syria, Mauritania. ♃
lo flori femineo adstant flores duo masculi pedicel-i. Culmus *lævis.* Panicula *patens, purpurascens.* *istæ apice albæ.*

LCUS glumis bifloris villosis: hermaphrodito lanatus. itico, masculo arista recurva.
foliis pubescentibus, panicula contracta: flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata, lyce breviore. *Fl. svec.* 67; 917. *It. æl.* 122.
flosculo masculo aristato, femineo mutico. *Hort. f.* 27. *Roy. lugdb.* 66.
nen pratense paniculatum molle. *Bauh. pin.* 2. *idr.* 3. *theatr.* 27. *Scheuch. gram.* 234.
nen lanatum. *Dalech. hist.* 425.
tat in Europæ *pascuis arenosis.* ♃

LCUS glumis bifloris nudiusculis: flosculo her- mollis. phrodito mutico, masculo arista geniculata. *uan. monsp.* 514.
nen paniculatum molle, radice graminis canini re-nte. *Moris. hist.* 3. *p.* 202.
nen miliaceum aristatum molle. *Raj. angl.* 3. *p.* 4.
nen caninum longius radicatum. *Bauh. pin.* 1.
tat in Europa: *in* Hollandia. *Osbeck.*
limus H. lanato, *sed fere glaber.* Culmi *non in spitem s. fasciculum nati, sed sparsi & fere pro-ati.*

LCUS glumis trifloris muticis glabris: hermaphro- odoratus. o diandro.
ocloe. *Gmel. sib.* 1. *p.* 101.

Aira

Aira foliis planis, floribus trifloris aristatis: flosc... termedio mutico diandro. *Fl. svec.* 70, 918.
Poa spiculis bifloris cordatis. *Fl. lapp.* 53.
Gramen paniculatum odoratum. *Bauh. pin.* 7. 7. *Scheuch. gram.* 236.
Gramen mariæ borussorum. *Læs. pruss.* 111. t.
Habitat in Europæ *frigidioris pascuis humentibus.*
Flosculi *duo laterales masculi triandri: intermedius tius hermaphroditus diandrus.*

laxus. 8. HOLCUS glumis glabris bifloris muticis acu... panicula filiformi debili.
Aira calycibus trivalvibus trifloris. *Gron. virg.*
Habitat in Virginia, Canada.
Habitus *Airæ cæruleæ.* Culmi *bipedales, ang... nutantes.* Folia *plura, lævia, margine scab... piloso.* Panicula *filiformis, parum admodum ... subnutans, debilis;* pedunculi *sæpius biflori.* Flo... *masculo ovato, crasso.*

latifolius. 9. HOLCUS glumis trifloris: flosculo primo ... duobus margine aculeatis, foliis subovatis. ... 247.
Habitat in India. *Osbeck.*
Culmus *lævis, vix pedalis.* Folia *valde lata ... ovata vaginis latiusculis striatis.* Paniculæ *ra... plices, virgati.* Flores *alterni, solitarii pedic... pillaribus.* Flores *ovato-oblongi.* Calyx *brevi... valvis, triflorus: flosculo primo lævi; secundo ... tio margine superiore spinis recurvis armato.*

striatus. 10. HOLCUS glumis striatis bifloris muticis acumi... panicula conferta oblonga.
Aira panicula oblonga, floribus muticis: hermaph... to masculoque, calycibus diphyllis. *Gron. virg.*
Habitat in Virginiæ *paludibus.*
Folia *plana, longa: vaginis crassiusculis, striatis.* ... cula *attenuata: Pedunculis brevissimis confertis, ... sis.* Glumæ *oblongæ, striatæ, acuminatæ.* C... *monophyllus, minimus.*

APLUDA.

mutica. 1. APLUDA foliis lanceolatis, flosculis omnibus ... ticis.
Habitat in India.

mi longiſſimi, debiles, glabri: geniculis tumidis. Fo- *la longa, plana, lanceolata ſ. verſus vaginam attenua- in petiolum.* Panicula *anguſta, parva, e lateribus iens ex vaginis foliorum minorum uti andropogon.* ores *omnes mutici.*

LUDA foliis lanceolatis: floſculis maſculis mu- cis; ſeſſili terminali ariſtato. *Amœn. acad.* 4. *p.* 3. * — ariſtata.

enanthus avenaceus procumbens maderaſpatanus, pleuri folio. *Scheuch. gram.* 119.
tat in India.

UDA foliis ovatis, floſculis maſculis muticis; ili terminali ariſtato. *Amæn. acad.* 6. *p.* 412. * — Zeugites.
ites arundinaceus ramoſus minor rufeſcens, pa- ula ſparſa terminali. *Brown. jam.* 341. *t.* 4. *f.* 3.
tat in Jamaica.

ISCHÆMUM.

HÆMUM ſeminibus muticis. — muticum.
di. *Rheed. mal.* 12. *p.* 91. *t.* 49.
tat in India. ♃
a bipartita, imbricata pedunculis alternis, ſimplici- , bifloris, angulatis, culmo adpreſſis. Flos alter *ulum pedunculum terminat Hermaphroditus ex Ca- e biglumi unifloro; alter vero ſ. inferior* Flos *an- gynus, baſi exteriori unicuique pedunculo ſeſſilis in- tus, ex Calyce bivalvi, duriuſculo, longitudine flo- lorum, continens floſculos duos: alterum Maſculum, erum Femineum.* Piſtillorum *ſtigmata craſſa, bar- a.* Semina *mutica.* Pedunculus *ſpicæ foliis itus.*

HÆMUM ſeminibus ariſtatis. — ariſtatum.
tat in China. *Osbeck.* ♄
ctura *ſpicæ* & *florum omnino eadem cum præce- te, at* Culmus *altior,* Spica *longior* & Peduncu- *ſpicæ nudus.* Semina *ariſta intorta, floſculis lon- re armata.*

CENCHRUS.

CHRUS panicula ſpicata, glumis muricatis ſe- ciliaribus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 188. *Dalib.* pariſ. *Sauv. monſp.* 40. *Gouan. monſp.* 514. — racemoſus.

Gra-

Gramen caninum maritimum, ſpica echinata. *pin.* 2. *Scheuch. gram* 76.
Gramen caninum maritimum aſperum. *Bauh.* 2. *t.* 2.
Gramen caninum maritimum ſpicatum, echinati mis. *Barr. ic.* 718.
Habitat in Europæ *auſtralioris maritimis.*

lappaceus. 2. CENCHRUS paniculæ ramis ſimpliciſſimis, c retrorſum hiſpidis, calycibus trivalvibus bifl
Habitat in India.
Culmus *ramoſus, lævis.* Folia *cordato-lanc margine ſcabra.* Panicula *patentiſſima: Ramul zontalibus, ſimpliciſſimis, capillaribus.* Spicul *næ, pedicellatæ, ovato-oblongæ.* Calyx *tri ut in Panico, oblongus, biflorus:* floſculo *i fertili; ſuperiore ſterili ſ. maſculo.* Corollan *ma exterior lateribus, in ſuperiore ſui parte catis: ſetis rigidis, baſi nodoſis, reflexis, brev*

capitatus. 3. CENCHRUS ſpica ovata ſimplici. *Roy. lug Sauv. monſp.* 40. *Læfl. it.* 172. * *Gouan. mon*
Gramen ſpica ſubrotunda echinata. *Bauh. pin.* 7 16. *Scheuch. gram.* 74.
Gramen montanum echinatum tribuloides cap *Col. ecphr.* 1. *p.* 340. *t.* 338. *f.* 1.
Gramen minimum, ſpica globoſa echinata. *B* 1176. *t.* 28. *f.* 1. & *t.* 862. *f.* 2.
Habitat in G. Narbonenſi, Italia.

echinatus. 4. CENCHRUS ſpica oblonga conglomerata. *lugdb.* 72. *Brown. jam.* 367. *n.* 1.
Panicaſtrella americana major annua, ſpica la puraſcente. *Mich. gen.* 36.
Gramen locuſtis tumidioribus echinatis. *Scheuc* 77.
Gramen americanum, ſpica echinata, majori cuſtis. *Pluk. alm.* 177 *t.* 92. *f.* 3.
Gramen echinatum maximum, ſpica rubra *Sloan. jam.* 30. *hiſt.* 1. *p.* 108. *Raj. ſuppl.* 602
Gramen americanum, ſpica echinata, majori mis. T. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 195.
Habitat in Jamaica, Curaſſao. ⊙

;HRUS spica glomerata: glumis femineis glo- s muricato-spinosis hirsutis. — tribuloides.
rus capitulis spinosis tomentosis. *Gron. virg.* 122.
strella americana minor annua, spica angusta
a albicante. *Mich. gen.* 37.
n maritimum echinatum procumbens, culmo
iori, spicis strigosioribus. *Sloan. jam.* 30. *hist.* 1.
98. *t.* 65. *f.* 1. *Raj. suppl.* 602.
n tribuloides spicatum maximum virginianum.
alm. 177.
ı echinatum spicatum, locustis crassioribus,
iloides virginianum. *Moris. hist.* 3. *p.* 195. *s.*
5. *f.* 4.
in Virginiæ *maritimis.* ☉

HRUS capitulis lateralibus sessilibus, foliis :onatis, caule fruticoso. — frutescens.
) graminea aculeata. *Alp. exot.* 105. *t.* 104.
ı orientale spicatum fruticosum spinosum, spi-
:hinatis in capitulum congestis. *Tournef. cor.* 39.
in Armenia. ♄

ÆGILOPS.

OPS spica aristata: calycibus omnibus triari-. *Gouan. monsp.* 515. — ovata.
ıs spica ovata aristis breviore. *Hort. ups.* 301.
ı. *paris.* 304. *Sauv. monsp.* 40.
ıs. *Roy. lugdb.* 72. *Dod. pempt.* 73. *Cam. epit.*
f. 2.
altera, capitulis duris. *Bauh. pin.* 110. *theatr.*

ı spicatum, durioribus & crassioribus locustis,
brevi. *Scheuch. gram.* 11.
in Europa *australi.* ☉

OPS spica aristata, calycibus omnibus biaristatis. — caudata.
creticum, spica gracili in duas aristas longis-
& asperas arbeunte. *Tournef. cor.* 29.
in Creta.
omnes, excepta ultima, bidentatæ sunt.

)PS spica subulata aristis longiore. — Squarrosa.
in Oriente. *Turnefort.*

)PS *spica aristata*: calycibus inferioribus bi- — triuncialis.
s. *Gouan. monsp.* 515.

Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali. *B. pin.* 10.
Gramen spicatum, durioribus & crassioribus loc[...] spica longissima. *T. Scheuch. gram.* 12.
Habitat in Monspelii, Massiliæ, Smyrnæ *aridis.*

incurvata. 5. ÆGILOPS spica subulata mutica lævi incurva, [...]lycibus unifloris.
Nardus spica subulata disticha. *Roy. lugdb.* 58.
Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis. *T. Sch[...] gram.* 43.
Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. *M[...] hist.* 3. *p.* 182, *s.* 8. *t.* 2. *f.* 8.
Gramen myuros erectum minimum arundina[...] *Bocc. mus.* 70. *t.* 59.
Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italiæ *paludibus* [...]*mis.* ☉
Spica *filiformis, vix scapo crassior, teres.* Caly[...] *valvis, exterus.* Corollæ *valvulæ calyci contra[...]*

VALANTIA.

hispida. 1. VALANTIA floribus masculis trifidis herma[...]ditici germini hispido insidentibus.
Valantia erecta hispida. *Hort. cliff.* 461. *
Galium floribus masculis trifidis, omnibus planta[...]tibus hispidis. *Zinn. gœtt.* 233.
Habitat in Europa *australi.* ☉
Affinis maxime V. murali, *sed major, erecta, hi[...] nec procumbens glabra. Fructus hermaphrodit[...] tundatus, undique hispidus; nec lævis aut rostrat[...]*

muralis. 2. VALANTIA floribus masculis trifidis hermaph[...]tici germini glabro insidentibus. *Hort. ups. Sauv. monsp.* 162.
Valantia procumbens glabra. *Hort. cliff.* 468. *lugdb.* 258.
Valantia annua quadrifolia verticillata, floribu[...] viridi-pallescentibus, fructu echinato. *Mich.* 13. *t.* 7.
Rubeola echinata saxatilis. *Bauh. pin.* 334.
Cruciata muralis minima romana. *Col. ecphr.* 1. *p.* *t.* 297. *Moris. hist.* 3. *p.* 328. *s.* 9. *t.* 21. *f.* 2.
Habitat in G. Narbonensis, Italiæ *muris.* ☉

3. V

ANTIA fructificationibus singulis bractea ova- eflexa obtectis. *Amæn. acad.* 4. *p.* 295. * laria. *Buxb. cent.* 1. *p.* 13. *t.* 19. *f.* 2. *it in* Cappadociæ, Arabiæ *montosis.* ⊙ — Cucullaria.

ANTIA floribus masculis trifidis pedicellatis naphroditici pedunculo insidentibus. *Hort upf.* . * *Dalib. parif.* 305. *Sauv. monfp.* 162. *Gouan.* *fp.* 516.
ıe semine lævi. *Vaill. parif.* 18. *t.* 4. *f.* 3.
t inter Germaniæ, Galliæ, Siciliæ *segetes.* ⊙ — Aparine.
Galii Aparines. Caulis *retrorsum scaber*, *scan-* . Folia *sena*, *margine scabra.* Pedunculi *lon-* *line foliorum*, *apice triflori :* Flosculo *Herma-* *dito sessili; lateralibus Masculis pedicellatis, nunc* *s*, *nunc 4fidis.*

ANTIA floribus masculis quadrifidis, pedun- s dichotomis nudis foliis cordatis. *Hort. upf.* * *Dalib. parif.* 305.
ta orientalis latifolia erecta glabra. *Tournef. cor.* 4.
t in Ægypto, Syria, Mauritania. ⊙ — articulata.

ANTIA floribus masculis quadrifidis, pedun- s diphyllis. *Hort. upf.* 303. *Sauv. monfp.* 163. *b. parif.* 305. *Gouan. monfp.* 516.
ı foliis quaternis, flosculis in alis confertis. *t. cliff.* 34. *Hall. helv.* 462.
ta hirsuta. *Bauh. pin.* 335.
:a. *Dod. pempt.* 257.
t in Germania, Helvetia, Gallia. ♃ — Cruciata.

ANTIA floribus masculis quadrifidis, pedun- s dichotomis, aphyllis, foliis ovalibus ciliatis.
ı floribus polygamis, racemis lateralibus bina- udis, foliis quaternis lanceolatis glabris. *Scop.* 344.
ı latifolium glabrum. *Bauh. prodr.* 145.
:a glabra. *Bauh. pin.* 335.
in Austria, Italia. ♃
nimis V. Cruciatæ. — glabra.

ANTIA floribus omnibus quadrifidis inferis, nculis nudis unifloris. *Amæn. acad.* 5. *p.* 412. * ubhirsuta scandens f. reclinata, foliis cruciatis, ıus singularibus ad alas. *Brown. jam.* 141.
in Jamaica. — hypocarpa.

PARIETARIA.

officinalis. 1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis alternis. *H. cliff.* 496. *Hort. upſ.* 302. *Mat. med.* 472 *Roy. lugdb.* 210. *Dalib. pariſ.* 305. *Gort. gelr.* 554.
Parietaria officinarum & dioſcoridis. *Bauh. pin.* 121.
Helxine. *Cam. epit.* 849.
Habitat in Europæ *temperatioris ruderatis.* ♃

judaica. 2. PARIETARIA foliis ovatis, caulibus erectiuſc calycibus trifloris, corollis hermaphroditis: def tis elongato-cylindricis.
Parietaria minor, ocymi folio: *Bauh. pin.* 121?
Habitat in Palæſtina. ♃
Simillima P. officinali, *ſed* Folia *ovata.* Caulis *nor, erectiuſculus petiolis brevibus.* Florum *a ad ramos, vix vero ulli ad caulem.*

luſitanica. 3. PARIETARIA foliis ovatis obtuſis, caulibus ſt lævibus filiformibus procumbentibus.
Parietaria luſitanica annua minima. *Tournef. inſt.* *Raj. ſuppl.* 129.
Parietaria ſicula, alſines folio. *Bocc. ſic.* 47. *t.* 2
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ☉

cretica. 4. PARIETARIA foliis ſubovatis, involucris fru ris quinquefidis compreſſis: laciniis lateralibu joribus.
Parietaria cretica minor, capſulis ſeminum alatis. *nef. cor.* 38.
Habitat in Creta.

microphylla. 5. PARIETARIA foliis oppoſitis integerrimis obc minoribusque ovatis immixtis. *Amæn. acad.* 5. *p.*
Urtica humilior diſticha compreſſa oblique aſſur foliolis minimis. *Brown. jam.* 336.
Herniana lucida aquatica. *Sloan. jam.* 50. *hiſt.* 1. *p.* *t.* 93. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

zeylanica. 6. PARIETARIA foliis oppoſitis oblongo-ovatis *Zeyl.* 371. *
Habitat in Zeylona.

ATRIPLEX.

Halimus. 1. ATRIPLEX caule fruticoſo, foliis deltoidibus gris. *Hort. cliff.* 469. *Gron. vir.* 195. *Roy. lugdb.*

limus latifolius f. fruticofus. *Bauh. pin.* 120.
limus. *Cluf. hift.* 1. *p.* 53.
bitat in Hifpaniæ, Lufitaniæ, Virginiæ; *fepibus maritimis.* ♄

TRIPLEX caule fruticofo, foliis obovatis. *Fl. fvec.* 829; 919. — Portulacoides.
riplex caule fruticofo, foliis lanceolatis obtufis. *Roy. lugdb.* 218.
limus f. Portulaca marina. *Bauh. pin.* 120.
rtulaca marina. *Dod. pempt.* 771.
bitat in Oceani Europæi *feptentrionalis litoribus.* ♄

TRIPLEX caule fruticofo procumbente, foliis ovatis feffilibus integerrimis: inferioribus fubdentatis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 295. — glauca.
riplex maritima hifpanica frutefcens & procumbens. *Dill. elth.* 46. *t.* 40. *f.* 46.
lygonum incanum rotundifolium halimoides fruticans hifpanicum. *Barr. rar.* 1145. *t.* 733.
bitat in Galliæ *auftralis*, Hifpaniæ *maritimis.* ♄

TRIPLEX caule herbaceo, foliis incanis ferratis, fructibus quadrangularibus dentatis. *Hall. gœtt.* 19.† — rofea.
riplex fylveftris, fructu rofeo compreffo., *Bauh. pin.* 119. *prodr.* 58. *Rupp. jen.* 341.
bitat in Europa *auftraliore.* ⊙

TRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoidibus angulatis, calycibus fructus extus muricatis. — fibirica.
inachia foliis angulofis, caule ramofiffimo. *Hall. gœtt.* 22?
bitat in Sibiria. ⊙
agnitudo A. hortenfis. Fructus bafi tomentofus, extus muricatus.

TRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoidibus finuatis undulatis alternis. *Hort. upf.* 303. * — tatarica.
abitat in Tataria. ⊙

TRIPLEX caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *Hort. upf.* 303 *Mat. med.* 473. *Roy. lugdb.* 217. — hortenfis.
triplex hortenfis alba f. pallide virens. *Bauh. pin.* 119.
triplex hortenfis. Dod. pempt. 615.

β. Atriplex hortenfis rubra. *Bauh. pin.* 119.
Habitat in Tataria. ⊙

laciniata. 8. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoidibus tatis fubtus argenteis. *Hort. cliff.* 469. *Fl. fvec.* 920. *Gron. virg.* 120. *Roy. lugdb.* 218.
Atriplex maritima laciniata. *Bauh. pin.* 120.
Atriplex marina. *Dod. pempt.* 615.
Habitat ad Europæ & Virginiæ *feptentrionalis marina.* ⊙
Planta *tota tecta quafi epidermide fecedente.* Caul *rectius, teres, nudus, virgatus.* Folia *exceptis mis alterna, deltoidea, dentata, argentata* Spicæ *terminales hermaphroditæ antheris late* Flores Feminei *axillares gemini.* Calyx *compreffus, 5-dentatus: dente intermedio majore.*

haftata. 9. ATRIPLEX caule herbaceo: valvulis feminei gnis deltoidibus finuatis. *Fl. fvec.* 827; 921. 88. *Dalib. parif.* 305.
Atriplex fylveftris, folio haftato f. deltoide. *blef.* 237. *Raj hift.* 192.
Atriplex fylveftris annua, folio deltoide trian finuato & mucronato haftæ cufpidis fimili. *hift.* 2. *p.* 607. *f.* 5. *t.* 32. *f.* 14.
Habitat in Europa *frigidiori.* ⊙

patula. 10. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis fubd deo-lanceolatis, calycibus feminum difco d
Atriplex caule herbaceo, valvulis femineis fen difco dentatis. *Fl. fvec.* 828; 922. *Dalib. parif*
Atriplex caule herbaceo, foliis fuperioribus lan tis integerrimis. *Hort. cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 2
Atriplex angufto oblongo folio. *Bauh. pin.* 219
Atriplex fylveftris, polygoni f. helxines foliis *ic.* 257.
Habitat in Europæ *cultis, ruderatis.* ⊙

littoralis. 11. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis om linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 218. 199. * *Fl. fvec.* 2. *n.* 923.
Atriplex anguftiffimo & longiffimo folio. *Herm.* 79.
Habitat in Europæ feptentrionalis litoribus maris.

CLUSIA.

CLUSIA foliis aveniis, corollis hexapetalis. *Jacq. amer.* 34. rosea.
Enchramidia arbor saxis adnascens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi. *Pluk. alm.* 92. *t.* 157. *f.* 2. *Catesb. car.* 2. *p.* 99. *t.* 99.
Habitat in Carolina. ♄

CLUSIA foliis aveniis, corollis pentapetalis. *Jacq. amer.* 34. *t.* 166. alba.
Clusia flore albo, fructu coccineo. *Plum. gen.* 22. *ic.* 87. *f.* 1.
Habitat in America. ♄

CLUSIA foliis aveniis, corollis tetrapetalis. *Jacq. amer.* 34. *t.* 167. flava.
Clusia arborea, foliis crassis nitidis obovato-subrotundis, floribus solitariis. *Brown. jam.* 236.
Terebinthus folio singulari non alato rotundo succulento, flore tetrapetalo pallide luteo, fructu majore monopyreno. *Sloan. jam.* 167. *hist.* 1. *p.* 91. *t.* 200. *f.* 1. *Raj. dendr.* 51.
Habitat in Jamaica. ♄

CLUSIA foliis venosis. venosa.
Clusia, flore roseo, minor, fructu flavescente. *Plum. gen.* 21. *ic.* 87. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali.* ♄

ACER.

ACER foliis cordatis indivisis serratis: lobis obsoletis, floribus racemosis. tataricum.
Acer foliis oblonge cordatis inæqualiter serratis. *Kraschen. act. petr.* 1749. *p.* 285. *t.* 13.
Habitat in Tataria. ♄
Frutex *altus.* Folia *carpini, lobis vix manifestis.* Flores *racemosi, ut in sequente, sed petaloidei, & racemus compositus.*

ACER foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. Pseudo-Platanus.
Acer foliis quinquelobis acutis obtuse serratis, petiolis canaliculatis. *Hort. upf.* 93. *Sauv. monsp.* 212.
Acer *foliis palmatis* obtuse serratis, floribus subapeta-

 lis

lis racemosis. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 457. G
gelr. 78.
Acer montanum candidum. *Bauh. pin.* 430.
Acer majus. *Dod. pempt.* 840.
Habitat in Helvetiæ, Austriæ *montanis.* ♄

brum. 3. ACER foliis quinquelobis subdentatis subtus glau
pedunculis simplicissimis aggregatis. *Kalm. it.*
288.
Acer foliis quinquelobis acuminatis acute serratis
tiolis teretibus. *Hort. upf.* 94.
Acer virginianum, folio subtus incano, flosculis
di-rubentibus. *Herm. par.* 1. *t.* 1.
Acer virginianum, folio majore: subtus argent
pra viridi splendente. *Pluk. alm.* 7. *t.* 2. *f.* 2.
car. 1. *p.* 62 *t.* 62. *Mill. ic.* 6. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in Virginia, Pensylvania. ♄
Arbor dioica est.

ccharinum. 4. ACER foliis quinquepartito-palmatis acuminat
tatis.
Habitat in Pensylvania. *Kalm.* ♄
Folia *in hoc profundius & versus basin divisa,*
nata apicibus & dentibus, venosa etiam &
glauca, a præcedente distinctissima. Flores *n*
noti.

latanoides. 5. ACER foliis quinquelobis acuminatis acute d
glabris, floribus corymbosis. *Fl. svec.* 303;
Acer foliis palmatis acute dentatis, floribus cor
dichotomo-corymbosis. *Hort. cliff.* 143.
Acer montanum, tenuissimis & acutissimis foliis.
pin. 431.
Acer major. *Cam. epit.* 63.
Acer montanum, orientalis platani foliis atrov
bus *Pluk. alm.* 7. *t.* 252. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali: ut in montibus* Stiriæ
baudiæ. ♄
Flores masculi die ultimo mensis frondescentiæ
late sparguntur per terram subjacentem
lutei.

nsylvanicum. 6. ACER foliis trilobis acuminatis serrulatis, fl
racemosis. Duham. arb. 1. p. 28. *t.* 12, 13.
Habitat in Pensylvania. Kalm. ♄

a *in tres lobos integros maxime acuminatos divi-*, *margine tenuissime inaequaliter & argute serrata.* lores *racemosi, penduli.*

ER foliis lobatis obtusis emarginatis. *Fl. svec.* a. *n.* 25. — campestre.

r foliis tripartito-palmatis: laciniis utrinque emarnatis obtusis, cortice sulcato. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 459. *Gort. gelr.* 78.

r foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis. *Hall. lv.* 212.

r campestre & minus. *Bauh. pin.* 431.

r minus. *Dod. pempt.* 840.

r campestre & minus mas f. sterile. *Vaill. parif.*

bitat in Scania *& australiori* Europa.

ER foliis trilobis integerrimis glabris. *Roy. lugdb.* 459. *Gouan. monsp.* 518. — monspessulanum.

r trifolium. *Bauh. pin.* 431. *Pluk. alm.* 7. *t.* 251. *f.* *Duham. arb.* 1. *p.* 28. *t.* 10. *f.* 8.

itat Monspelii. ♄

ER foliis trilobis integerrimis pubescentibus. *Mill. dict.* 10. — creticum.

r orientalis, hederae folio. *Tournef. cor.* 43. *Pocock. orient.* 191. *t.* 85.

r cretica. *Alp. exot.* 9. *t.* 8. *Duham. arb.* 1. *p.* 28. 10. *f.* 9.

tat in Oriente. ♄

ER foliis compositis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 144. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 460. — Negundo.

r maximum, foliis trifidis & quinquefidis, virginianum. *Puk. alm.* 7. *t.* 123. *f.* 45.

bitat in Virginia. ♄

B E G O N I A.

GONIA. — obliqua.

onia nivea maxima, folio aurito. *Plum. spec.* 21. 45. *f.* 1.

nex sylvestris scandens, foliis cordato-angulatis altera parte majoribus. *Brown. jam.* 203.

tis fructu herba anomala, flore tetrapetalo albo. *an. jam.* 83. *hist.* 1. *p.* 199. *t.* 127. *f.* 1. 2.

onia purpurea maxima, folio aurito. *Plum. spec.* 20.

Empetrum acetosum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 457. *f.* 2.

β. Begonia, roseo flore, folio aurito, minor & *Plum. spec.* 20. *ic.* 45. *f.* 3.

γ. Begonia, roseo flore, folio aurito, minor & *Plum. spec.* 20. *ic.* 45. *f.* 2.

δ. Begonia roseo flore, folio orbiculari. *Plum.* *ic.* 45.

ε. Begonia roseo flore, foliis acutioribus auritis crenatis. *Plum. spec.* 20. *ic.* 45. *f.* 3.

ζ. Begonia hirsuta, flore albo, folio aurito, fri nato. *Barr. æquin.* 21.

Habitat in Indiis. ♃

Folia *cordata altero latere obliterato.*

MIMOSA.

* *Foliis simplicibus pinnatis.*

Inga. 1. MIMOSA inermis, foliis pinnatis quinque tiolo articulato marginato.

Mimosa inermis, foliis pinnatis: petiolis me ceis alatis. *Hort. cliff.* 209.

Arbor siliquosa brasiliensis, foliis pinnatis c dia membranulis extantibus. *Sloan. jam.* 15 *p.* 58. *t.* 183. *f.* 1. *Raj. hist.* 1762. *Mer. sur.*

Inga flore albo fimbriato, fructu dulci. *Plum. ic.* 25.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Flores monopetali, monadelphi, polyandri.

fagifolia. 2. MIMOSA inermis, foliis pinnatis bijugis: marginato.

Arbor siliquosa, faginis foliis, americana, flo mosis. *Pluk. alm.* 44. *t.* 141. *f.* 2.

Habitat in Barbados. ♄

Flores Monadelphi, polyandri. Glandula *pinnas.*

nodosa. 3. MIMOSA inermis foliis pinnatis bijugis: fo ferioribus minoribus; petiolo lineari.

Mimosa inermis, foliis pinnatis: foliolis glandula ovata inter infima minora. *Vir.* *Hort. cliff.* 209.

Phaseolus arboreus tetraphyllos zeylanicus. 294. t. 211. f. 5.

Habitat in Zeylona. ♄

* * *Foliis petiolo bipartito, non pinnatis.*

MIMOSA inermis, foliis bigeminis acuminatis. *Fl. zeyl.* 218. * — bigemina.
Tou-conna. *Rheed. mal.* 6. *p.* 21. *t.* *Raj. hist.* 1746.
Habitat in India. ♄
Flores monopetali, monadelphi, polyandri.

MIMOSA inermis, foliis tergeminis. — tergemina.
Acacia frutescens non aculeata, flore purpurascente. *Plum. spec.* 17. *ic.* 10. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Petiolus bifidus: pedicello singulo terminato foliolis duobus; sed insuper Foliola *duo opposita ad divaricationem petioli communis.*

MIMOSA spinosa, foliis bigeminis obtusis. *Hort. cliff.* 207. *Roy. lugdb.* 470. — Unguis cati.
Acacia quadrifolia, siliquis cincinnatis. *Plum. ic.* 4.
Mimosa fruticosa, foliis ovatis binato-binatis, seminibus compressis atro-nitentibus, flosculis rubellis adnatis. *Brown. jam.* 252.
Acaciæ quodammodo accedens s. Ceratiæ & Acaciæ, media jamaicensis spinosa, bigeminatis foliis. *Pluk. phyt.* 1. *f.* 6.
Acacia arborea major spinosa, pinnis quatuor majoribus subrotundis, siliquis varie intortis. *Sloan. jam.* 152. *hist.* 2. *p.* 56?
Habitat in Jamaica, Caribæis. ♄
Flores monopetali, monadelphi, polyandri.

* *Foliis conjugatis s. folia duo pinnata, communi petiolo annexa.*

MIMOSA inermis, foliis conjugatis: pinnis terminalibus oppositis; lateralibus alternis. — latifolia.
Acacia non spinosa, juglandis folio, flore purpurascente. *Plum. spec.* 17. *ic.* 9.
Habitat in America. ♄
Flores polyandri, sessiles.

MIMOSA aculeata, foliis conjugatis pinnatis: pinnis æqualibus, stipulis spinosis. — circinalis.

Mimo-

Mimosa frutescens spinosa & aculeata, siliquis[l]
tis. *Brown. jam.* 253.
Acacia foliis amplioribus, siliquis circinatis.
spec. 17. *ic.* 5. *Catesb. car.* 2. *p.* 97. *t.* 97.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Convenit cum M. ungue cati *spinis stipularibus* [
quis longis spiraliter convolutis; Differt vero
foliis.

purpurea. 9. MIMOSA inermis, foliis conjugatis pinnatis:
lis intimis minoribus.
Acacia frutescens non aculeata, flore purpur
alia. *Plum. ic.* 10. *f.* 2.
Acacia frutescens non aculeata, flore purpura
Plum. spec. 17.
Habitat in America *meridionali.* ♄

cineraria. 10. MIMOSA aculeata, foliis conjugatis pinnati
nis æqualibus aculeis incurvis.
Mimosa fruticosa spinis aduncis undique armat
tice cinereo, foliis minutis pinnatis, spicis g
Brown. jam. 252.
Mimosa maderaspatana spinosa intsiæ acceden
tice cinereo, ramis communi pediculo binis.
alm. 4. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in India. ♄

viva. 11. MIMOSA inermis, foliis conjugatis pinnati
tialibus quadrijugis subrotundis, caule iner
baceo.
Mimosa minima herbacea vix tripollicaris,
monospermibus hirsutis. *Brown. jam.* 254.
Mimosa herbacea non spinosa minima repens.
jam. 153. *hist.* 2. *p.* 58. *t.* 182. *f.* 7. *Raj. supp*
Habitat in Jamaicæ *pratis.* ♃

casta. 12. MIMOSA aculeata, foliis conjugatis pinnat
tialibus trijugis subæqualibus.
Mimosa foliis conjugatis: foliolis pinnatis: p
nis subæqualibus. *Hort. upf.* 145.
Mimosa undique aculeata, foliis geminatis [
foliolis intimis minimis. *Hort. cliff.* 208.
Æschynomene spinosa latifolia s. Herba viva
nosa latifolia, piloso & subrotundo folio
hort. 1. p. 55. t. 28.

tat in India. ♄

es spicæ inferiores decandri steriles; superiores de-ndri fertiles.

MOSA aculeata, foliis conjugatis pinnatis: par-libus bijugis: intimis minimis. sensitiva.
osa caule aculeato, foliis geminatis: partialibus raphyllis, foliolis intimis minimis. *Roy. lugdb.* 471.
osa spinosa prima s. brasiliana latifolia, siliquis diatis. *Breyn. cent.* 31. *t.* 16.
tat in Brasilia. ♄
es pentandri, apetali.

MOSA aculeata, foliis subdigitatis pinnatis, caule pido. pudica.
osa foliis digitatis: foliolis pinnatis, caule aculeato spidoque, foliis pinnato-palmatis: singulis numero-pinnatis. *Hort. cliff.* 208. *Hort. upf.* 144.
osa humilis frutescens & spinosa, siliquis con-batis. *Plum. spec.* 17. *ic.* 202.
osa spinosa 3, siliquis parvis echinatis. *Breyn. cent.* . *t.* 18.
ynomene spinosa, flore globoso albido, siliculis ticulatis echinatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 57. *t.* 29.
itat in Brasilia. ♄
yx infundibuliformis, trifidus: lobo altero latiore. orolla *nulla.* Staminum *filamenta* 4, *calyce sexies giora, erecta, filiformia.* Germen *subrotundum.* tylus *subulatus, staminibus paullo brevior.* Stigma *tum.*

* * * * *Foliis duplicato-pinnatis, inermis.*

MOSA inermis, foliis conjugatis cirrho termi-li; foliolis bijugis. scandens.
lobium scandens claviculatum. *Brown. jam.* 362.
s phaseoloides. *Burm. zeyl.* 139.
seolus maximus perennis, folio decomposito, lobo ximo contorto. *Sloan. jam.* 68
or siliquosa, juglandis folio, brasiliana, lobo lon-ssimo, acaciæ siliquæ instar distincto. *Bauh. pin.* 04.
a marina. *Rumph. amb.* 5. *p.* 5. *t.* 4.
tha. *Fl. zeyl.* 644.
m-Kaku-Valli. Rheed. mal. 8. *p.* 59. *t.* 32, 33, 34.
Habi-

Habitat in Indiis. ♄

Biennis Caulis *teres*, *filiformis*, *lævis*, *debilis*. *alterna*, *conjugata*, *partialibus bijugis;* Pinnæ *oblongæ*, *obtusæ*, *acute emarginatæ cum rudim* *cinulæ*: Petiolus *communis terminatus cirrho* Legumen *maximum*, *perfecte coriaceum*.

Entada. 16. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis cirrho te tis: partialibus quinquejugis. *Fl. zeyl.* 219.

Acacia alia fcandens, fpica multiplici, filiqu *Plum. fpec.* 7. *ic.* 12?

Entada. *Rheed. mal.* 9. *p.* 151. *t.* 67.

Habitat in utraque India. ♄

Nefcio num a M. fcandente fpecie vere differa *alterius tantum biennem impuberem alui.*

plena. 17. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, fpicis dris: inferioribus plenis. *Hort. upf.* 145. * *t.* 182. *f.* 2.

Mimofa herbacea non fpinofa procumbens & pa flore luteo pleno. *Houft. mff. t.* 1.

Habitat in Vera Cruce. ⊙

Senfitiva.

punctata. 18. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, fpicis dris: inferioribus caftratis corollatis, caule tereti.

Mimofa frutefcens inermis filiquis compreffis umbellatis, pedunculo longiffimo. *Brown. ja*

Æfchynomene mitis prima. *Comm. hort.* 1. *p.* 61.

Habitat in America. ♄

Caulis *punctis vagis callofis*. Folia *quadrijuga*, *dula depreffa inter primum par.* Foliola *Pedunculi* Bracteis 2, *alternis*, *dimidiato* - Spicæ *oblongæ*. Flofculi *omnes decandri*: *inf* *bus mafculis*, *caftratis*. Corollæ *pentapetalæ*.

virgata. 19. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, fpicis dris: inferioribus caftratis mafculis, caule angulato. *Fl. zeyl.* 505. *Hort. upf.* 145.

Mimofa inermis, foliis duplicato-pinnatis, filiq nearibus glabris. *Hort. cliff.* 209.

Habitat in India. ♄

pernambucana. 20. MIMOSA inermis decumbens, foliis bipinnatis

cernuis pentandris: inferioribus caſtratis, caule cumbente. *Hort. upſ.* 145. *
oſa inermis, foliis duplicato-pinnatis, ſiliquis earibus glabris. *Hort. cliff.* 209.
oſa americana pigra, ſiliquis longis anguſtis alm olentibus. *Pluk. alm.* 552. *t.* 307. *f.* 3.
tat in America. ♄

MOSA inermis, foliis bipinnatis, pinnis dimitis acutis, caule arboreo. arborea.
oſa arborea, cortice cinereo, ſpica globoſa, ſiqua interne rubente, ſeminibus ſphæricis atro-nintibus. *Brown. jam.* 252.
cia non ſpinoſa jamaicenſis, foliis lata baſi in meformam faſtigiatis. *Pluk. alm.* 6. *t.* 251. *f.* 2.
cia arborea maxima non ſpinoſa, pinnis majoribus, flore albo, ſiliqua contorta coccinea ventrioſa elegantiſſima. *Sloan. jam.* 157. *hiſt.* 2. *p.* 54. *t.* 82. *f.* 1. 2. *Raj. ſuppl.* 477.
tat in Jamaicæ & Caribæarum *humidis.* ♄
hi, *Petioli univerſalis partialesque*, & *Pedunculi hirt.* Folia 7-*juga foliolis* 17-*jugis: infimis minoribus. pra genu foliorum partialium ſquama bipartita. Spi ovata.*

MIMOSA inermis, foliis bipinnatis quadrijugis: innis ovali-oblongis, floribus monadelphis faſciulatis, caule arboreo. Lebbeck.
oſa foliis pinnatis: foliolis oblongo-ellipticis, etiolis obclavatis. *Haſſelq. act. upſ.* 1750. *p.* 9. * *it.* 73. *
cia non ſpinoſa ind. orient. coluteæ foliis, floribus ſtamineis amplis, ſiliqua cruſtacea gemella corata. *Pluk. mant.* 2. *p.* 331. *f.* 1.
itat in Ægypto ſuperiore. ♄
la *eglandulata.* Pinnæ 12-20, *pollicares.* Florum *ſciculi pedunculati.* Legumen *ſpithamæum.*

IMOSA inermis, foliis bipinnatis: pinnis exterioibus majoribus incurvatis pubeſcentibus. *Hort. iff.* 209. vaga.
or ſiliquoſa braſiliana, ſiliqua tortuoſa, frutefcens axinellæ foliis. *Breyn. cent.* 1. *t.* 15. *an?*
bi-pocaca-biba. *Marcgr. braſ.* 111. *Piſ. braſ.* 170.
itat in India. ♄

Foliola

Foliola *læviuſcula.* Petioli *pubeſcentes,* Flores *lati, polyandri.* Calyces *tomentoſi.* Folia bi 4-*juga: partialibus* 4-*jugis.*

latiſiliqua. 24. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus quejugis, ramis flexuoſis, gemmis globoſis. Acacia non ſpinoſa, ſiliquis latis compreſſis, bo. *Plum. ſpec.* 17. *t.* 6.
Habitat in America *calidiore.*
Bracteæ *dimidiato-cordatæ.* Pedunculi *terni; capitati.* Glandula *obſoleta in petiolo commu pinnas partiales.* Gemmæ *globoſæ, bivalves:* 2, *ſubrotundis, concavis ſ. hemiſphæricis:* Fo *berrima.*

peregrina. 25. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partiali decemjugis: propriis quadragintajugis: glandi ſeos petiolari.
Mimoſa inermis, foliis duplicato-pinnatis, gla baſin petiolorum, ſiliquis ovato-oblongis *Hort. cliff.* 209.
Habitat in America. ♄

muricata. 26. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: part quinquejugis: propriis multijugis obtuſis, cau ricato. †
Acacia latifolia alopecuroïdes, flore albo. *Plu* 17. *ic.* 11.
Habitat in America. ♄
Pedunculi longi, polyſtachyi.

glauca. 27. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partiali jugis: pinnis plurimis, glandula inter infima.
Mimoſa inermis, foliis duplicato pinnatis: part utrinque ſenis pluribusque, ſiliquis planis m naceis. *Roy. lugdb.* 472.
Mimoſa arboreſcens non ſpinoſa, pinnis acaci ribus inferne glaucis, flore albo. *Breyn.* *p.* 73.
Acacia non ſpinoſa, flore albo, foliorum pi tiuſculis glabris, ſiliquis longis planis. *M* *t.* 4. *Trew. ehret. t.* 36.
Acacia buxi foliis rotundioribus, floribus albi qua lata compreſſa. *Cateſb. car.* 2. *p.* 42. *t.* 4
Acaciæ ſimilis americana non ſpinoſa, floribus ſis albis ramoſis. Kigg. beaum. 3.

bitat in America. ♄
candra.

* *Foliis duplicato-pinnatis; ſpinæ ſ. aculei gemini ſ. ſolitarii, nec ſparſi.*

cinerea. MIMOSA ſpinis ſolitariis foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Fl. zeyl.* 215. *
Acacia ſpinoſa ex alis ſpicata, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl.* 3. *t.* 2. *bona.*
Acacia maderaſpatana, minutiſſimis foliis, aculeis fe...ocibus alternis frondoſa, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 5.
Habitat in India. ♄

cornigera. MIMOSA ſpinis ſtipularibus geminis connatis, foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 208. *Roy. lugdb.* 470.
Acacia cornuta ind. orientalis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 113. *t.* ... *f.* 13.
Acacia americana, grandibus aculeis ad ramulorum ...ortum cornua bovina referentibus, ſiliqua ro...tata. *Pluk. alm.* 3. *t.* 122. *f.* 1.
Acaciæ ſimilis, ſpinis corniformibus, mexicana. *Comm. hort.* 1. *p.* 209. *t.* 107.
Habitat in Mexico, Cuba. ♄

horrida. MIMOSA ſpinis ſtipularibus longitudine foliorum, foliis bipinnatis: partialibus ſubſejugis, ramis læ...ibus.
Acacia maderaſpatana, foliis parvis, aculeis e regio... binis prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 4.
Habitat in Indiis. ♄
...icanæ capitula globoſa pedunculata, ut in M. tor...oſa, ſed in medio Bractea bivalvi minuta.

tortuoſa. MIMOSA ſpinis ſtipularibus, foliis bipinnatis qua...ijugis glandula inter infima, foliolis ſedecimjugis, ...icis globoſis.
...oſa tortuoſa, aculeis rectis geminatis, foliis te...iſſimis, ſpica globoſa, ſiliquis craſſis. *Brown. jam.* ...1.
...t in Jamaica. ♄
...ma M. horridæ, *ſed ſpinæ paullo breviores; Ra... pubeſcentes; Pinnæ venoſæ. Pedunculus ſub ipſis ...lis ſubbracteatus.*

Senegal. 32. MIMOSA spinis ternis: intermedia reflexa, bipinnatis, floribus spicatis.

Mimosa aculeata, floribus polyandris spicatis, le ne compresso lævi elliptico. *Adanson. ex Jussieu.*

Mimosa spinis geminis distinctis, foliis duplica natis: partialibus utrinque quino pluribus. *Ho* 209. *Hort. upf.* 146. *Roy. lugdb.* 411. *Mat. m*

Acacia. *Bauh. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 15.

Acacia altera vera, filiqua longa villosa, corti dicante donata. *Pluk. alm.* 3. *p.* 251. *f.* 1.

Arbor foliis pinnatis, spica pendula serícea. *car.* 2. *p.* 44. *t.* 44.

Habitat in Arabia. ♄

Cortice *albo distinguitur hæc species primo* *ista* *næ ad folii exortum tres, nec* 2 *ut in M.*

farnesiana. 33. MIMOSA spinis stipularibus distinctis, foli natis, partialibus octojugis, spicis globosis s *Hort. upf.* 146.

Acacia indica farnesiana. *Ald. farnes.* 2. *Raj. h*

Habitat in Domingo. ♄

Flores *polyandri capitulis sessilibus, fragrantissi teis.* Legumina *fusiformia.* Petioli *glandu foliola.*

nilotica. 34. MIMOSA spicis stipularibus patentibus, f pinnatis: partialibus extimis glandula int. spicis globosis pedunculatis. *Hasselq it.* 47

Mimosa spinis geminis approximatis foliis l tis: partialibus bijugis. *Hort. cliff.* 208. *Ro* 470. *Gron. orient* 159.

Acacia foliis scorpioides leguminosæ. *Bauh.*

Acacia vera. *Bauh. hist.* 1. *p.* 429. *Vesl. ægypt.*

Acacia ægyptiaca. *Hern. mex.* 866. *t.* 866.

Acacia vera f. Spina ægyptiaca, subrotundi flore luteo, filiqua paucioribus isthmis glabr cantibus. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.

Habitat in Ægypto, Arabia. ♄

Habitus *M. Farnesianæ & Senegalis; differt ramis absque punctis callosis, ut ab hac co nime albo, sed purpurascente; nec Spinas nas ut Senegal, sed binas easque longiores nesiana.* Rami *purpurascentes, læves.* Fol nata, 5 *circiter parium foliorum partialium*

› *paria partialium exteriorum glandula petiolo communi inserta est.* Legumina *moniliformia, compressa: iculis rhombeo-subrotundis, fusca.* Flores *polyan-capitulis peaunculatis.*

* * * * *Foliis duplicato-pinnatis: aculei sparsi.*

MOSA aculeata, foliis bipinnatis: pinnis ovali-longis oblique acuminatis. *Fl. zeyl.* 217. caesia.
ia spinosa, indiae orientalis, foliis subtus caesiis, ribus globosis luteis. *Pluk. mant.* 1. *t.* 330. *f.* 3.
at in India. ♄

MOSA aculeata, foliis bipinnatis numerosissimis eari-acerosis, panicula aculeata, capitulis globosis. *zeyl.* 216. pennata.
ia aculeata multiflora, foliis pennas avium refe-itibus. *Burm. zeyl.* 2. *t.* 1.
IOSA tenuifolia. *Sp. pl.* 1. *p.* 523.
ia repens aculeata foliis, omnium minimis. *Plum.* 17.
at in Zeylona. ♄

MOSA aculeata laevis, foliis bipinnatis opposite leatis: spina erecta longiore inter singula partia-*Amaen. acad.* 4 *p.* 274. * pigra.
ynomene spinosa quinta. *Comm. hort.* 1. *p.* 59. *t.* 30?
ynomene foliis acaciae latioribus, frondibus lon-imos aculeos habentibus. *Breyn. cent.* 20.
at in America ♄
s *adspersi aculeis geminis, recurvis.* Folia *sub-ga partialibus multijugis.* Aculei *in petiolis uni-salibus, inter singula paria partialia oppositi, re-vati, laterales, at praeterea, inter singulum par par-ium, spina longior, recta, erecta.* Capitula *globosa.* gumina *membranaceo-compressa, articulata, scabra.*

IOSA aculeata hirta, foliis bipinnatis opposite leatis, spina erecta longiore inter singula partialia. asperata.
sa caule fruticoso, foliis bipinnatis aculeatis acule-eminis, siliquis radiatis hirsutis. *Mill. dict. t.* 182. *f.* 3.
sa frutescens spinosa & aculeata, siliquis hirsutis. *wn. jam.* 253.
ynomene spinosa VI. *Breyn. cent.* 43. *t.* 19.
t in Jamaica, Vera cruce. ♄

Planta *tota hirta exceptis pinnis*. Folia *sensitiva*, 14-*juga foliolis multijugis*: Spina *erecta*, *sub* - *inter singulum par partialium*. Aculei 2, *n* *recurvati*, *solitarii*, *oppositi*, *breviores*, *inter* *paria partialium*. Flores *capitati*. Legumin *pressa*, *adspersa pilis rigidulis*, *helvulis*.

Intsia. 39. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis pinnis vis, caule angulato.
Mimosa aculeis undique sparsis solitariis, fol plicato-pinnatis, caule angulato. *Hort. cli* *Gron. virg.* 195.
Acacia maderaspatana spinosa, pinnis veluti tis: nervo pinnularum ad unicum latus ver *Pluk. alm.* 4. *t.* 122. *f.* 2.
Intsia. *Rheed. mal.* 4. p. - - - *t.* 122. *f.*
Habitat in India. ♄

semispinosa 40. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, articul linis superne aculeatis.
Mimosa aculeis ad summitatem internodiorum tis, foliis duplicato-pinnatis. *Hort. cliff.* 2c
Habitat in America. ♄

quadrivalvis. 41. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, cau drangulo: aculeis recurvis, leguminibus qua vibus. *Mill. dict. t.* 182. *f.* 1. *Loefl. it.* 266.
Mimosa undique aculeata, caule angulato, fc plicato-pinnatis: partialibus utrinque terni *lugdb.* 471.
Mimosa herbacea procumbens ac spinosa, cau drangulo, siliquis quadrivalvibus. *Houst.* *bon. Amm. herb.* 586.
Habitat in Vera Cruce. ♃
Aculei *recurvi*, *sparsi in caule*, *petiolis*, *pedunculi* lia *partialia utrinque terna foliolis plurimis.* culi *axillares*, *terminati Capitulo globoso*.

ceratonia. 42. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis quinqu partialibus trijugis: pinnis trinerviis.
Acacia repens aculeata, flore albo, foliis *Plum. spec.* 17. *ic.* 8.
Habitat in America *meridionali*. ♄
Aculei *recurvi in caule* & *petiolis*. Pedunculi *les*, *conferti*, *capitati*. Legumina *obtusa*, *su* *leata*.

MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis quinquejugis, partialibus subdecemjugis, petiolis communibus inermibus. — tamarindifolia.

[Ac]acia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. *Plum. spec.* 17. *ic.* 7.

[Ha]bitat *in* America.

[Sti]pulæ *latissimæ.* Flores *subpaniculati, laterales, capitati.*

[Fo]lia *partialia destituuntur infima interiore pinna.* Species *aliæ flore monopetalo, pentapetalo. Aliæ tetrandræ, pentandræ, decandræ, polyandræ, monadelphæ. Aliæ floribus quibusdam castratis. Aliæ Leguminibus membranaceis, crustaceis, coriaceis, carnosis, baccatis. Fructificationes has diversas attente describant Botanici. Inde affinitas Gleditsiæ. Hinc Ceratonia quasi apetala Mimosa.*

DIOECIA.

GLEDITSIA.

[G]LEDITSIA spinis triplicibus axillaribus. — triacanthos.

[Gl]editsia. *Hort. ups.* 298. *Gron. virg.* 183. *Gouan. monsp.* 520.

[Gle]ditsia spinosa. *Duham. arb.* 1. *p.* 266. *t.* 105.

[Tr]ilobus. *Mitch. gen.* 15.

[Ca]lpinoides foliis pinnatis ac duplicato-pinnatis. *Hort. cliff.* 489.

[Ac]acia americana, abruæ folio, triacanthos. *Pluk. [alm]ant.* 1. *t.* 352. *f.* 1. *Hort. angl. t.* 21.

[Ac]acia, abruæ folio, triacanthos, capsula ovali unicum semen claudente. *Catesb. car.* 1. *p.* 43. *t.* 43.

[Ha]bitat *in* Virginia. ♄

[G]LEDITSIA inermis. *Duham. arb.* 1. *p.* 266. — inermis.

[Ac]acia javanica non spinosa, foliis maximis splendentibus. *Pluk. alm.* 6. *t.* 123. *f.* 3.

[Ac]acia americana non spinosa, flore purpureo, staminibus longissimis, siliquis planis villosis. *Mill. ic. t.* 5.

[Ha]bitat *in* Java. ♄

[Fo]lia *bipinnata : partialia* 4: *infimis minoribus.* Pinnæ *[gl]abræ, acutæ, nitidæ.* Petiolus *communis terminatus spina miti.*

FRAXINUS.

[FRA]XINUS *foliolis* serratis, floribus apetalis. — excelsior.

Fraxinus floribus nudis. *Hort. cliff.* 469. *Fl. suec.* 926. *Mat. med.* 475. *Roy. lugdb.* 396. *Dalib.* 306.
Fraxinus excelsior. *Bauh. pin.* 416.
Fraxinus. *Dod. pempt.* 771.
Habitat in Europæ *sepibus.* ♄
Gemmæ *laterales racemos, terminalis folia promit.*

Ornus. 2. FRAXINUS foliolis serratis, floribus corollatis
Fraxinus floribus completis. *Hort. upf.* 304. *Hor* 470. *Roy. lugdb.* 396. *Mat. med.* 476.
Fraxinus humilior s. altera theophrasti, minore nuiore folio. *Bauh. pin.* 416.
Fraxinus florifera botryoides. *Moris. præl.* 265 *angl.* 33. *t.* 9.
Fraxinus tenuiore & minore folio. *Bauh. hist.* 1.
Habitat in Europa *australi.* ♄
Petioli hujus æquales: foliolis lanceolatis æq Præcedentis marginati: foliolis ovatis: imp jore.

americana. 3. FRAXINUS foliolis integerrimis, petiolis te *Gron. virg.* 122. *Roy. lugdb.* 533.
Fraxinus caroliniensis, foliis angustioribus u acuminatis pendulis. *Catesb. car.* 1. *p.* 80. *t.*
Habitat in Carolina, Virginia. ♄
Fructus ut in F. excelsiore, sed longe minores,

DIOSPYROS.

Lotus. 1. DIOSPYROS foliorum paginis discoloribus. *dist. t.* 116.
Diospyros foliis utrinque bicoloribus. *Roy. lug.*
Diospyros foliis utrinque diverse coloratis. *H* 149.
Lotus africana latifolia. *Bauh. pin.* 447.
Pseudo Lotus. *Cam. epit.* 156.
β. Lotus africana angustifolia s. femina. *Bauh. p*
Lotus africana altera. *Cam. epit.* 157. *bon.*
Habitat in G. Narbonensi, Italia, Mauritania.
Confer. Si s. Kaki *Kæmpf. amæn.* 85. *t.* 86.

virginiana. 2. DIOSPYROS foliorum paginis concoloribus. *it.* 2. *p.* 200, 255, 437.
Diospyros foliis utrinque concoloribus. *Hort. cl* *Roy. lugdb.* 441.

ospyros floribus dioicis. *Gron. virg.* 156.
lajacana loto arbori affinis virginiana Pishamia dicta. *Pluk. alm.* 180. *t.* 244. *f.* 5. *Raj. hist.* 1918.
lajacana. *Catesb. car.* 2. *p.* 76. *t.* 76.
oti africanæ similis indica. *Bauh. pin.* 448.
bitat in America *septentrionali.* ♄

PISONIA.

SONIA spinis axillaribus patentissimis. aculeata.
onia. *Hort. cliff.* 457.
onia assurgens, sarmento valido, foliis ovatis utrinque productis, spinis validis recurvis, racemis lateralibus. *Brown. jam* 258.
onia aculeata, fructu glutinoso & racemoso. *Plum. gen.* 7. *ic.* 227. *f.* 1.
amnus f. Lycium Fringego jamaicensibus dictum. *Pluk. alm* 318. *t.* 108. *f.* 2.
liuro affinis arbor spinosa, flore herbaceo pentapetaloide, fructu sicco nudo canaliculato lappaceo. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. *p.* 25. *t.* 167. *Raj. dendr.* 95.
bitat in America *meridionali.* ♄

SONIA inermis. mitis.
onia malabarica non spinosa. *Amm. herb.* 582.
tu-kava waili. *Rheed. mal.* 7. *p.* 33. *t.* 17.
bitat in India. ♄

NYSSA.

YSSA. aquatica.
yssa foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 462.
yssa pedunculis multifloris. *Gron. virg.* 121.
bor in aqua nascens, foliis latis acuminatis & dentatis, fructu elæagni majore. *Catesb. car.* 1. *p.* 60. *t.* 60
bor in aqua nascens, foliis latis acuminatis & non dentatis, fructu elæagni minore. *Catesb. car.* 1. *p.* 41. *t.* 41.
yssa pedunculis unifloris. *Gron. virg.* 121.
moxylon americanum, folio crassiusculo molli & tenaci. *Pluk. alm.* 127. *t.* 172. *f.* 6.
bitat in Americæ *septentrionalis aquosis.* ♄

ANTHOSPERMUM.

NTHOSPERMUM *foliis lævibus. Hort. cliff.* 455. æthiopic
; 27. * *Roy. lugdb* 208.

Frutex africanus ambaram ſpirans. *Pluk. alm.* 1[illegible]
183. *f.* 1. *Walth. hort.* 24. *t.* 9.
Habitat in Æthiopia. ♄

[illegible]iliare. 2. ANTHOSPERMUM foliis carina margineque [illegible]liatis.
Clinopodium africanum procumbens, pſyllii fo[illegible] capitulis cum calyculo lanugine veſtitis. *Pluk.* [illegible] 5. *t.* 244. *f.* 5.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄
Radix *perennis, lignoſa.* Rami *plures, ſpithamæi* [illegible] *ramoſi.* Folia *anguſta, lanceolata, ciliata etiam* [illegible]*na.* Flores *axillares, ſeſſiles.* Calyces *quadrip*[illegible] Stamina 4. Flores *femineos non vidi.*

ARCTOPUS.

[illegible]chinatus. 1. ARCTOPUS. *Hort. cliff.* 495. *
Valerianoides cortuſæ mathioli facie planta æti[illegible]ca, foliorum ad lacinias ſuperna parte ſpicis [illegible] formiter echinata & ad oras pilis longioribus [illegible]briata. *Pluk. mant.* 155. *t.* 271. *f.* 5.
♂. Arctopus foliis ſuperne ſpinis ſtelliformibus ech[illegible] laciniatis & in cilia diductis, floribus umbe[illegible] *Burm. afr. p.* 1. *t.* 1.
Habitat in Æthiopia. ♃

PANAX.

[illegible]uinquefolium. 1. PANAX foliis ternis quinatis. *Gron. virg.* 147. *m. d.* 116. *Kalm. it.* 3. *p.* 334.
Aureliana canadenſis. *Laſit. ginſ.* 51. *t.* 1. *Cateſ*[illegible] 3. *p.* 16. *t.* 16.
Araliaſtrum, quinquefolii folio, majus Ninſin [illegible]tum. *Vaill. ſex.* 43.
Araliaſtrum foliis ternis quinquepartitis Ginſ[illegible] Ninſin officinarum. *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 1.
Habitat in Canada, Penſylvania, Virginia. ♃
Semina producunt folium ternatum absque cotyledo[illegible] *uti monocotyledones.*

[illegible]ifolium. 2. PANAX foliis ternis ternatis. *Gron. virg.* 35.
Araliaſtrum, fragariæ folio, minus. *Vaill. ſex.* 4[illegible]
Araliaſtrum foliis ternis tripartitis & quadrip[illegible] *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 2.
Naſturtium marianum, anemones ſylvaticæ foliis [illegible]

phyllon, floribus exiguis. *Pluk. mant.* 135. *t.*
f. 7.
t in Virginia. ♃
nti maxime affine & forte varietas s. mas prioris,
longe minus.

AX foliis supradecompositis dentato-ciliatis, fruticosum.
e fruticoso.
laria tertia. *Rumph. amb.* 4. *p.* 78. *t.* 33.
t in Ternateis. ♄
ulæ Folia *bipinnata s. tripinnata foliolis lanceolatis inæqualibus, serrato-ciliatis, lævibus.* Pedunis *inordinate ramosus s. dichotomus s. brachiatus,* bellulæ *subnudæ.* Baccæ *digynæ, dispermæ.* Se-*a nonnihil compressa, sulcata.*

POLYOECIA.

CERATONIA.

ATONIA. *Hort. upf.* 296. *Mat. med.* 455. Siliqua.
elq. it. 492. *Gron. orient.* 315.
a edulis. *Bauh. pin.* 400.
ia. *Cam. epit.* 139.
t in Apulia, Sicilia, Creta, Cypro, Syria, Pa-na, *totoque* Oriente. ♄
Feminamque ex Australi Europa habui; Her-hroditum ex Austriæ hortis misit D. Jacquin.

FICUS.

S foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *Hort. upf.* 305. Carica.
. med. 478. *Amæn. acad.* 1. *p.* 24. *Roy. lugdb.* 211.
an. monsp. 521.
communis. *Bauh. pin.* 457.
Dod. pempt. 812.
ficus. *Bauh. hist.* 1. *p.* 134.
humilis. *Bauh. pin.* 457.
t in Europa *australi,* Asia. ♄

S foliis cordatis subrotundis integerrimis. *Hort.* Sycomorus.
471. * *Roy. lugdb.* 211. *Amæn. acad.* 1. *p.* 26.
elq. it. 495. *Gron. orient.* 329.
folio mori, fructum in caudice ferens. Bauh. pin.

SycoMorus. *Bauh. hist.* 1. *p.* 124. *f.* 1. 2.
SycoMorus, Ficus pharaonis. *Cam. math.* 1
Habitat in Ægypto. ♄
Confer. Ficus indica, tiliæ folio subtus albo & v
polyrhizos. *Pluk. phyt.* 178. *f.* 3.

religiosa. 3. FICUS foliis cordatis oblongis integerrimis acum
Hort. cliff. 471. *Fl. zeyl.* 372. *Amæn. acad.* 1.
Ficus malabariensis, folio cuspidato, fructu ro
parvo gemino. *Pluk. alm.* 144. *t.* 178. *f.* 2.
Arealú. *Rheed. mal.* 1. *p.* 47. *t.* 27.
Habitat in India.
Confer. Arbor conciliorum. *Rumph. amb.* 3. *p.*
91, 92.

benghalensis. 4. FICUS foliis ovatis integerrimis obtusis, caule
ne radicato. *Hort. cliff.* 471. *Amæn. acad.* 1.
Roy. lugdb. 212. *Trew. ehret.* 50.
Ficus americana, latiore folio venoso. *Pluk. phy*
f. 1.
Ficus benghalensis, folio subrotundo, fructu orbi
Comm. hort. 1. *p.* 119. *t.* 62.
Peralu. *Rheed mal* 1. *p.* 49. *t.* 28.
Habitat in India. ♄

indica. 5. FICUS foliis lanceolatis integerrimis petiolat
dunculis aggregatis, ramis radicantibus.
Ficus indica, foliis mali cotoneæ similibus, fruct
bus simili. *Bauh. pin.* 457.
Ficus indica theophrasti. *Tabern. hist.* 1370.
acad. 1. *p.* 2
Katou-alou *Rheed. mal.* 3. *p.* 73. *t.* 57. *Raj. hist*
β. Ficus foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cl*
Roy. lugdb. 212.
Ficus arborea assurgens utrinque brachiata. foli
tis, ramis appendiculas tenues flexiles depe
demittentibus. *Brown jam.* 110.
Ficus indica maxima, folio oblongo, funiculis
mis ramis dimissis radices agentibus se propag
ctu minori sphærico sanguineo. *Sloan. jam.* 1
2. *p.* 140. *t.* 223. *Raj. dendr.* 16.
Ficus americana, arbuti foliis non serratis, fruc
magnitudine. *Pluk. alm.* 144. *t.* 178. *f.* 4.
Ficus citri folio, fructu parvo purpureo. *Cate*
3. p. 18. t. 18.

ga latifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 127. *t.* 84.
a. *Rheed mal.* 3. *p.* 85. *t.* 63.
at in Indiis ♄
sdem esse speciei cum α docuit ramorum proprie- radicandi, flores rubri, Catesbæi & autoptarum æ.

JS foliis ovatis acutis integerrimis, caule arbo- , fructu racemoso. *Amæn. acad.* 1. *p.* 30. racemosa.
ularia domestica. *Rumph. amb.* 3. *p.* 136. *t.* 87. 88.
-alu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 43. *t.* 25. *Raj. hist.* 1434.
at. in India. ♄

JS foliis oblongis acuminatis serratis. maculata.
. castaneæ folio, fructu globoso maculato. *Plum.* c. 21. *ic.* 131 *f.* 1.
at in America. ♄

JS foliis ovatis acutis integerrimis, caule repen- *Amæn. acad.* 1. *p.* 30. pumila.
s sylvestris procumbens, folio simplici. *Kæmpf. æn.* 803. *t.* 804.
nga repens. *Rumph. amb.* 3. *p.* 134. *t.* 85.
tat in China, Japonia. ♃
m *a Cryptogamia ad Polygamiam amandavi, sva- ite fructificationis structura, receptaculi umbilico quibusdam patulo, diffinitate sequentium; monitu- illustriss. D. O. Munchausen L. B. Botanici acu- imi.*

Clas-

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

EQUISETUM.

sylvaticum. 1. EQUISETUM caule spicato, frondibus composi[illegible] *Fl. svec.* 834; 927.

Equisetum seti[illegible] ramosis internodio multoties longio[illegible]bus *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum sylvaticum. *Fl. lapp.* 391. *Tabern. hist.* 5[illegible]

Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis. *Bauh. pin.* [illegible] *theatr.* 245.

Habitat in Europæ *septentrionalis pratis sylvaticis.* ♃

arvense. 2. EQUISETUM scapo fructificante nudo, sterili fro[illegible]doso.

Equisetum scapo fructificante nudo, caule sterili [illegible]mis compositis. *Fl. svec.* 833; 928. *Mat. med.* 4[illegible] *Dalib. paris.* 308.

Equisetum setis quadrangularibus internodio longio[illegible]bus, caulibus reptantibus. *Guett. stamp.* 1. *p.* 201

Equisetum setis simplicibus internodio multoties lo[illegible]gioribus. *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum arvense. *Fl. lapp.* 390. *Hort. cliff.* 4[illegible] *Gron. virg.* 123.

Equisetum arvense, longioribus setis. *Bauh. pin.*[illegible]

Equisetum minus. *Fuchs. hist.* 323.

Habitat in Europæ & Orientis *agris, pratis.* ♃

palustre. 3. EQUISETUM caule angulato, frondibus simp[illegible]bus.

Equisetum setis simplicibus internodia vix supera[illegible]bus. *Roy. lugdb.* 496. *Fl. svec.* 835; 929. *D*[illegible] *paris.* 307.

Equisetum palustre. *Fl. lapp.* 392.

Equisetum palustre brevioribus setis. *Bauh. pin* [illegible] *theatr.* 242.

β. Equisetum palustre minus polystachyon. *Bauh* [illegible] 16. prodr. 24. Raj. angl. 3. p. 131. t. 5. f. 3.

Habitat in Europæ aquosis. ♃

ISETUM caule ſtriato, frondibus ſubſimplici- fluviatile.

etum caule non ſulcato latiſſimo, verticillis denmis. *Hall. helv.* 144. *Fl. ſvec.* 836; 930. *Dalib. iſ.* 307.
etum fluviatile. *Fl. lapp.* 393.
etum paluſtre, longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 15. *tr.* 242.
at in Europa *ad ripas lacuum, fluviorum.* ♃

ISETUM caule ſubnudo lævi. *Fl. ſvec.* 837; limoſum. *Dalib. pariſ.* 308.
etum ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *Roy. lugdb.* 496.
etum nudum lævius noſtras. *Raj. angl.* 3. *p.* 131. *f.* 2.
at in Europæ *paludibus, turfoſis, profundis.* ♃

ISETUM caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo. hyemale. *ſvec.* 838; 931. *Dalib. pariſ.* 308.
etum ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *Roy. lugdb.* 496. *on. virg.* 195.
etum hyemale. *Fl. lapp.* 394.
etum foliis nudum ramoſum. *Bauh. pin.* 16.
etum nudum minus variegatum baſilienſe. *Bauh.* 16. *prodr.* 25.
etum foliis nudum non ramoſum. *Bauh. pin.* 16.
etum. *Cam. epit.* 770. *f. A.*
at in Europæ *ſylvis, aſperis, uliginoſis.* ♃

ISETUM caule ſtriato arboreſcente, frondibus giganteum. plicibus ſtrictis ſpiciferis.
etum altiſſimum ramoſum. *Plum. ſpec.* 11. *ic.* *f.* 2.
at in America.

O N O C L E A.

CLEA. *Gen. nov.* 1093. ſenſibilis.
pteris. *Mich. gen.* 29.
nda frondibus pinnatis: foliolis ſuperioribus baoadunatis: omnibus lanceolatis pinnato-ſubula- *Hort. cliff.* 272. *Gron. virg.* 196.
mariana, oſmundæ facie, racemifera. *Pluk. mant.* *t.* 404. *f.* 2.
podium virginianum majus, oſmundæ facie, te*us. Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 563. *ſ.* 14. *t.* 2. *f.* 10.

Filix

Filix indica, polypodii facie. *Mentz. pug.* 6. *t.* 11
Habitat in Virginia. ♃

OPHIOGLOSSUM.

vulgatum. 1. OPHIOGLOSSUM fronde ovata. *Fl. svec.* 932. *Dalib. paris.* 309.
Ophioglossum folio ovato, spica disticha. *Hort.* 472.
Ophioglossum vulgatum. *Bauh. pin.* 354. *Plum.* XXXVI. *t. B. f.* 5.
Ophioglossum. *Bauh. pin.* 364.
β. Ophioglossum minus, subrotundo folio. *Bauh.* 354. *prodr.* 150.
Habitat in Europæ *pratis sylvaticis.*

lusitanicum 2. OPHIOGLOSSUM fronde lanceolata.
Ophioglossum pumilum autumnale. *Grisl. lusit.*
Ophioglossum angustifolium minimum. *Barr.* 1280. *t.* 252. *f.* 2.
Habitat in Lusitania.

pendulum. 3. OPHIOGLOSSUM frondibus linearibus longi indivisis.
Scolopendra major. *Rumph. amb.* 6. *p.* 84. *t.* 37.
Habitat in Indiæ *arboribus parasiticum, pendulum.*

reticulatum. 4. OPHIOGLOSSUM fronde cordata.
Ophioglossum cordatum & reticulatum. *Plum. fil. t.* 164.
Ophioglossum vulgari facie. *Pet. fil.* 179. *t.* 10.
Habitat in America *meridionali.*

palmatum. 5. OPHIOGLOSSUM fronde palmata basi spici
Ophioglossum palmatum. *Plum. fil.* 139. *t.* 163. *fil.* 178. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali.*

scandens. 6. OPHIOGLOSSUM caule flexuoso tereti, fron conjugatis pinnatis: foliolis utrinque spic *Hort. cliff.* 473. *Fl. zeyl.* 374. *
Filix scandens pulchra brasiliana. *Breyn. cent. t.* 96
Lonchitis scandens brasiliana, pinnulis elegante crenatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 568. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 15.
Adiantum volubile. Rumph. amb. 6. p. 75. t. 32.

:u-valli-panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 65. *t.* 33
tat in Indiis. ♄
e cordato-haſtatæ f. haſtato-lanceolatæ. Frondes
n oppoſitæ ; ſed conjugatæ ad tubercula ramorum.

IIOGLOSSUM caule flexuoſo angulato, fron- **flexuoſum.**
bus diphyllis: pinnis trifido palmatis. *Fl. zeyl.* 375.*
ntum volubile majus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 75. *t.* 38.
i-panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 6. *t.* 32.
tat in India. ♄
edenti nimis affine.

OSMUNDA.

* *Scapis inſidentibus cauli ad baſin folii.*

IUNDA ſcapo caulino ſolitario, frondibus ver- **zeylanica.**
cillatis lanceolatis indiviſis.
ında frondibus lanceolatis indiviſis verticillato-
rminalibus. *Fl. zeyl.* 373. *
iogloſſum laciniatum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 153. *t.*
:. *f.* 3.
tat in Zeylona, Amboina.

IUNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde pinna- **Lunaria.**
ſolitaria. *Fl. ſvec.* 842; 932. *Dalib. pariſ.* 309.
unda fronde pinnata caulina: pinnis lunulatis. *Hort.*
ff. 472.
unda folio pinnatifido: pinnis lunulatis. *Fl. lapp.*
!9.
aria racemoſa minor & vulgaris. *Bauh. pin.* 354.
aria minor. *Cam. epit.* 643.
aria racemoſa ramoſa major. *Bauh. pin.* 355
ariæ rarior ſpecies. *Cam. epit.* 644
aria racemoſa minor, adianti folio. *Breyn. cent.*
3 *t.* 93.
aria minor, rutaceo folio. *Bauh. pin.* 355.
tat in Europa. ♃

IUNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde ſupra- **virginiana.**
compoſita.
unda fronde pinnata caulina, fructificationibus
icatis. *Gron. virg.* 196.
unda aſphodeli radice. *Plum. fil.* 136. *t.* 159. *Pet.*
168. *t.* 9 *f.* 2.
tat in America.

4. OS-

hyllitidis. 4. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde p ta, caule laevi.
Osmunda lanceolata & subtiliter serrata. *Plum* 133. *t.* 156.
Osmunda racemifera, phyllitidis folio vix cre *Pet. fil.* 163. *t.* 8. *f.* 15.
Habitat in America *meridionali.*

hirta. 5. OSMUNDA scapis caulinis geminis, frode pinn caule hirto
Osmunda spicis geminis. *Pet. fil.* 164. *t.* 14. *f.* 5.
Osmunda hirsuta, lonchitidis folio. *Plum. fil.* 11 157.
Lunaria hirsuta, lonchitidis folio, spica gemella. *suppl.* 102.
Lunaria elatior, americana hirsuta, pinnis lonchi integris, duplici spica. *Moris. hist.* 3. *p.* 598.
Lonchitis hirsuta florida. *Plum. amer.* 18. *t.* 26.
Habitat in Martinica.

hirsuta. 6. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde bi nata hirsuta.
Osmunda, spicis geminis, villosa. *Pet. fil.* 165. *f.* 16.
Osmunda molliter hirsuta & profunde laciniata. *fil.* 138. *t.* 162.
Lonchitis hirsuta florida. *Plum. amer.* 28. *t.* 26.
Lunaria elatior, matricariae folio, spica duplici. *jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 71. *t.* 25. *f.* 6. *Moris. hist.* 595. *Raj. suppl.* 101.
Habitat in Americae *meridionalis rupibus.*

adiantifolia. 7. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde supr composita.
Osmunda, filiculae folio, major. *Plum. fil.* 135. *t.*
Osmunda adianti nigri facie. *Pet. fil.* 167. *t.* 9 *f.*
Lunaria elatior, adianti albi folio, duplici *Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 71. *Moris. hist.* 3. *p.* 5
Adiantum saxosum floridum. *Plum. amer.* 29. *t.* *Raj. suppl.* 101.
Habitat in Dominicae, Jamaicae *rupibus.*

* * *Scapis nudis, e radice enatis.*

verticillata. 8. OSMUNDA scapis radicatis: racemis verticill fronde supradecomposita.

OS

nunda verticillata. *Plum. fil.* 137. *t.* 160. *Pet. fil.* 171. *t.* 12. *f.* 4.
bitat in America *meridionali.*

MUNDA fcapo radicato, fronde pinnata: pinnis integerrimis. cervina.
munda linguæ cervinæ folio. *Plum. fil.* 132. *t.* 154.
munda racemifera, phyllidis folio. *Pet. fil.* 162. *t.* 8. *f.* 3.
bitat in America *meridionali.*

SMUNDA fcapo radicato, fronde pinnata: pinnis pinnatifidis. bipinnata.
munda latis crenis incifa. *Plum. fil.* 133. *t.* 155.
bitat in America *meridionali.*

SMUNDA fcapo radicato paniculato, fronde fupradecompofita. filiculifolia.
munda frondibus radicatis quater alternatim pinnatis, fcapo nudo, pedunculis alternis alternatim fpicatis. *Hort. cliff.* 172.
munda, filiculæ folio, altera. *Plum. fil.* 138. *t.* 161.
munda cicutæ folio. *Pet. fil.* 170. *t.* 9. *f.* 3.
bitat in America *meridionali.*

* * * *Fronde ipfa fructificationes ferente.*

SMUNDA frondibus bipinnatis apice racemiferis. regalis.
munda fcapo paniculato polyphyllo. *Fl. fvec.* 840; 933. *Dalib. parif.* 308.
munda frondibus caulinis fimpliciter pinnatis: pinnis lanceolatis. *Hort. cliff.* 472.
munda regalis f. Filix florida. *Plum. fil.* 35. *t. B. f.* 4.
ix ramofa non dentata florida. *Bauh. pin.* 357.
ix paluftris. *Dod. pempt.* 473.
lix florida f. Ofmunda regalis, foliis alternis, furculis feminiferis. *Gron. virg.* 123.
ix non dentata florida, foliis alternis & in fummo caule feminibus occultatis. *Pluk. alm.* 156. *t.* 181. *f.* 4.
ix botrvites f. floridana major virginiana, pinnulis non dentatis alternatim pofitis. *Morif. hift.* 3. *p.* 593.
bitat in Europa, Virginia *ad fluvios.*

SMUNDA *frondibus* pinnatis: pinnis pinnatifidis claytoniana apice coarctato-fructificantibus.

Osmunda frondibus pinnatis ex adverso binis: f oppositis integris decurrentibus, spicis femi e superiore parte caulis ad modum & forma dium binatim egressis. *Clayt.*
Habitat in Virginia.
Conjungit O. regalis *præcedentes cum hac planta & quentes cum præcedenti ut separari nequeant.*

* * * * *Frondibus aliis foliaceis, aliis fructifica*

cinnamomea. 14. OSMUNDA frondibus pinnatis: pinnis pin scapis hirsutis, racemis oppositis composit
Osmunda mariana, dryopteris folio, in medi florifera. *Pet. mus.* 86.
Osmunda non ramosa, tarsis floriferis imo foli infra foliosos adnascentibus. *Raj. suppl.* 86.
Habitat in Marilandia.

Struthiopteris. 15. OSMUNDA frondibus pinnatis: pinnis pin scapo fructificante disticho. *Fl. svec.* 841; !
Filix palustris altera, fusco pulvere hirsuta. *B* 358.
Filicastrum septentrionale & palustre. *Amm. ru act. petrop.* 10. *t.* 18.
Habitat in Svecia, Helvetia, Russia, Norvegi

Spicant. 16. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifi ciniis confluentibus integerrimis parallelis.
Pteris fronde pinnata lanceolata, laciniis paral tegerrimis. *Fl. svec.* 844; 936. *Dalib. paris.*
Pteris fronte pinnata: foliolis linearibus paralle *lugdb.* 497.
Polypodioides vulgaris foliis angustis. *Mich* 163. *Tozzet. it.* 1. *p.* 197.
Lonchitis minor. *Bauh. pin.* 359.
Lonchitis aspera minor. *Cam. epit.* 665.
Habitat in Europa, Svecia, Missnia, Pyrenæ

crispa. 17. OSMUNDA frondibus supradecompositis, alternis subrotundis incisis. *Hudſ. angl* 383.
Adiantum foliis minutim in oblongum scissis, lo viridi. *Bauh. pin.* 755.
Adiantum album tenuifolium, rutæ murariæ ac *Bauh. hist.* 3. *p.* 743. *Raj. hist.* 147.

atum album alpinum crifpum. *Raj. hift.* 47. *angl. p.* 126.
atum album floridum f. Filicula petræa crifpa. *tk. alm.* 9. *t.* 3. *f.* 2.
botryoides f. filicula petræa florida anglica, fo· plurifariam divifis. *Morif. hift.* 3. *p.* 593. *f.* 14. 4. *f.* 4.
at in Anglia, Helvetia, Monfpelii, Pyrenæ- ♃
a quafi media inter Osmundas ultimas & Acro- ha.
Filicula alpina crifpa. *Bauh. pin.* 358. *e Burfero.*

ACROSTICHUM.

* *Fronde fimplici indivifa.*

OSTICHUM frondibus lineari-lanceolatis acu-, furculo fcandente. *Fl. zeyl.* 380.* *Amæn. acad.* p. 268.* — lanceolatum
panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 141. *t.* 33.
at in India.
ificationes funt puncta confertiffima, verfus apicem ndis.

OSTICHUM frondibus lanceolato-ovatis in- gerrimis, furculo fcandente. *Amæn. acad.* 1. *p.* 269. — citrifolium
a cervina fcandens, citrei foliis, minor. *Plum.* 107. *t.* 116.
at in America *meridionali.*

OSTICHUM frondibus integerrimis glabris pe- latis: fterilibus fubrotundis; fertilibus linea- us. *Fl. zeyl.* 378.* *Amæn. acad.* 1. *p.* 268. *t.* 2.* — heterophyllum.
litis repens fcandensve, foliis duplicibus: aliis la- & fubrotundis; aliis longis & anguftis. *Raj.* pl. 13.
malabarica. *Pet. gaz.* 3. *t.* 53. *f.* 12.
tta-mala-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 87. *t.* 29.
at in Malabaria, Zeylona, Africa.

OSTICHUM frondibus ovatis obtufis hirfutis ra crinitis. — crinitum.
is crinita, latiffimo folio. *Pet. fil.* 145. t. 13. f. 14.
at - - - - - -

 5. ACRO-

punctatum. 5. ACROSTICHUM frondibus cordato-lingulatis minatis integerrimis supra punctatis.
Habitat in China. *J. Fothergill.*
Simillimum Aspl. Scolopendrio facie, statura, figura, gnitudine, consistentia. Frondium *pagina sup nuda, adspersa punctis raris minimis; inferior punctis seminalibus confertis luteis; an itaque p* Polypodium *ob puncta distincta, licet confertiss* Stipes *nudus, subquadrangularis. Chinensibus nalis.*

* * *Fronde simplici divisa.*

septentrionale. 6. ACROSTICHUM frondibus nudis linearibus lacini *Fl. lapp.* 380. *Fl. svec.* 856; 937. *Amæn. acad.* 269. *Oed. dan. t.* 60. *Roy. lugdb.* 507. *Hall.* 134. *Dalib. parif.* 314.
Filicula saxatilis corniculata. *Bauh. pin.* 358.
Filix saxatilis tragi. *Lob. ic.* 47.
Habitat in Europæ *fissuris rupium.* ♃

pectinatum. 7. ACROSTICHUM nudum simplicissimum, ovata secunda adscendente reflexa compressa. *A acad.* 1. *p.* 270. *f.* 4. *
Adiantum pectinatum, e capite bonæ spei. *Pet. mus*
Juncus elegantissimus, capitulis pectinatis. *Pluk.* 200. *t.* 95. *f.* 7. *Raj. suppl.* 620.
Juncus africanus, pectinato capite. *Moris. hist.* 233. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 30.
Habitat in Æthiopia.

dichotomum. 8. ACROSTICHUM nudum dichotomum, spic cundis adscendentibus reflexis compressis.
Filix cochine. *Pet. gaz. t.* 70. *f.* 12.
Habitat in China.
Refert A. pectinatum caule & spica, at Caulis e ries dichotomus totidem spicis.

digitatum. 9. ACROSTICHUM stipitibus nudis triquetris, de digitata lineari integerrima æquali. *Fl. zeyl.* *Amæn. acad.* 1. *p.* 269. *f.* 1. *
Planta pluribus foliis triquetris instar graminis c ni summitate foliorum in plurima folia biunci visis. *Herm. zeyl.* 27.
Habitat in Zeylona.

ACROSTICHUM frondibus pinnatifidis: pinnis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis, stipite lævi. ferruginosum.
crostichum acaule, fronde pinnatifida ad nervum divisa, lobis linearibus ad basin adunatis. *Brown. jam.* 105.
licis folio Polypodium ferruginosum minus. *Pluk. phyt.* 89. *f.* 9.
abitat in America.

ACROSTICHUM frondibus pinnatifidis, pinnis linearibus obtusis integerrimis patentibus connatis, stipite squamoso. *Amœn. acad.* 1. *p.* 271. * polypodioides.
crostichum fronde pinnata: foliolis linearibus alternis sessilibus, terminali plerumque trifida. *Gron. virg.* 198.
olypodium minus virginianum: foliis brevibus subtus argenteis. *Moris. hist.* 3. *p.* 563. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 5.
olypodium minus, pinnulis raris subtus cinereis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 79.
lix polypodium dicta minima jamaicensis, foliis aversa parte pulvere asplenii ritu circumquaque respersis. *Pluk. alm.* 153. *t.* 289. *f.* 1.
abitat in Virginia, Jamaica.

* * * *Fronde pinnata.*

ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Hort. cliff.* 477. *Amœn. acad.* 1. *p.* 273. * aureum.
hyllitis ramosa aurea. *Pet. fil.* 142. *t.* 8. *f.* 5.
onchitis palustris maxima. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. *p.* 76.
ingua Cervina aurea. *Plum. fil.* 87. *t.* 104.
lix palustris aurea, foliis linguæ cervinæ. *Plum. amer.* 5. *t.* 7. *Raj. suppl.* 63.
lix simpliciter pinnatis foliis s. Phyllitis ramosa jamaicensis maxima, aversa parte ferruginea lanugine circumquaque obducta. *Pluk. alm.* 154. *t.* 288. *f.* 2.
abitat in Jamaicæ, Dominicæ *humentibus.*

ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubescentibus. rufum.
teris rufa. *Sp. pl.* 1. *p.* 1074.
crostichum *fronde pinnata,* foliolis oblongo-ovatis *cordatis hirsutis* obsolete serratis. *Hort. cliff.* 475.

Filix minor ruffa lanugine tota obducta, in pin tantum divisa raras non crenatas subrotundas. Slo *jam.* 19. *hist.* 1. *p.* 87. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in America.

13. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis longis integris serratis acutis, stipitibus squam
Lonchitis calamifera, pinnis serratis. *Pet. fil.* 153. t *f.* 8.
Filix scandens latifolia serrata. *Plum. amer.* 8. t. 1 *Rai. suppl.* 76.
Filix major, in pinnas tantum divisa raras oblo latasque crenatas. *Sloan. jam.* 18. *hist.* 1. *p.* 84. t.
Filix jamaicensis hirsuta, sorbi aucupariae folia quod modo referens. *Moris. hist.* 3. *p.* 576.
Filix jamaicensis, pinnatis fraxini foliis tenuissime natis mucronatis. *Pluk. alm.* 153. *t.* 286. *f.* 3.
Habitat in Jamaica, Domingo.

marginatum 15. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis longis integerrimis undulatis acuminatis, stipitem
Acrostichum erectum simplex, foliis oblongis m natis & leniter undulatis. *Brown. jam.* 105.
Filix major in pinnas tantum divisa oblongas angus que non crenatas. *Sloan. jam.* 18. *hist.* 1. *p.* 84. t.
Habitat in Jamaica.

sanctum. 16. ACROSTICHUM frondibus pinnatis lanceol pinnis lineari lanceolatis inciso - serratis: serrat infimis majoribus.
Acrostichum erectum minimum simplex, foliolis gustis crenatis & lobatis. *Brown. jam.* 105.
Filix jamaicensis non ramosa ex una radice cespiti star contexta, pediculis numerosis, foliis auric tis profunde secta. *Pluk. alm.* 150. *t.* 283.
Filicula non ramosa minima, surculis crebris, pi lis angustissimis raris. *Sloan. jam.* 20. *hist.* 1. *p.* *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

areolatum. 17. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis al nis linearibus apice serratis. *Gron. virg.* 124. *A acad.* 1. *p.* 274.
Filix mariana, pinnulis seminiferis angustissimis. act. 246. p. 398.
Habitat in Virginia, Marilandia.

18. AC

platyneuron. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis alternis ovatis crenatis sessilibus sursum arcuatis. *Gron. virg.* 123. *Amœn. acad.* 1. *p.* 272. *
Filix polypodium dicta minima virginiana platyneuros. *Pluk. alm.* 153. *t.* 289. *f.* 2. *Raj. suppl.* 58.
Asplenium virginianum polypodii facie. *Raj. suppl.* 59.
Polypodium minus virginianum, foliis brevibus subtus argenteis. *Moris. hist.* 3. *p.* 563. *s.* 14. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Virginia.

trifoliatum. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: foliolis ternatis lanceolatis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 274. *
Acrostichum fronde pinnata; foliolis digitatis: pinnis linearibus: intermedia longiore. *Hort. ups.* 476.
Phyllitis ramosa trifida. *Sloan. jam.* 19. *hist.* 1. *p.* 88. *t.* 45. *f.* 2.
Phyllitis pulverulenta, foliis angustis trifidis. *Pet. fil.* 141. *t.* 8. *f.* 9.
Lingua cervina triphylla angusta & leviter serrata. *Plum. fil.* 12. *t.* 144.
Filix jamaicensis non ramosa trifolia angustifolia, caule lævi. *Moris. hist.* 3. *p.* 572. *Raj. suppl.* 73.
Habitat in Jamaica.

* * * * *Fronde sub-bipinnata.*

siliquosum. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis alternis sursum pinnulatis linearibus: inferioribus bipartitis. *Fl. zeyl.* 376. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 270. *f.* 3.
Acrostichum maderaspatanum, foliis laciniatis. *Pet. mus.* 741.
Millefolium aquaticum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 17. *t.* 74. *f.* 1.
Planta siliquosa bivalvis unicapsularis, siliquis in plurimos ramulos foliatos diffusis, crithmi maritimi segmenta quodammodo mentientibus. *Pluk. alm.* 298. *t.* 215. *f.* 3.
Habitat in Zeylonæ *aquosis.*

thalictroides. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis alternis utrinque pinnatifidis: sterilibus latioribus. *Fl. zeyl.* 377. *t* 4. * *Amœn. acad.* 1. *p.* 275.
Habitat in Zeylonæ *aquosis.*

marantæ. ACROSTICHUM frondibus sub-bipinnatis: pinnis opposito-coadunatis subtus hirsutissimis: basi subdentatis.

Lonchitis folio ceterach. *Bauh. pin.* 359. *Barr. ic.* 857.
Lonchitis aspera marantæ. *Cam. epit.* 666.
Filicula crispa, lanugine hepatici coloris vestita. *Pl. alm.* 150. *t.* 281. *f.* 4.
Habitat in Europa *australi.*
Stipites *spithamæi, atropurpurei.* Frons *ferme bipinnata, lanceolata, subtus dense imbricata squamis paleaceis croceis,* exsiccata *contrahitur & occultat paginam posticam.* Foliola *opposita, fere pinnata.* Pinnæ *... tæ, obtusæ, crassæ, integerrimæ; at inferiores ... sæpe utrinque dentatæ.* Fructificationes *sparsæ in squamis foliaceas per totam paginam posticam.*

ilvense. 23. ACROSTICHUM frondibus sub-bipinnatis: pinnis oppofito-coadunatis obtusis subtus hirsutis: ... integerrimis.
Polypodium fronde duplicato-pinnata: pinnulis coadunatis obtusis subtus hispidis. *Fl. svec.* 850; 9...
Polypodium duplicato-pinnatum: pinnulis obtusis remotis subtus villosum. *Fl. lapp.* 383.
Polypodium lonchitidis marantæ species cambro-britannica. *Pluk. alm.* 150. *t.* 89. *f.* 5.
Filicula alpina tenerior, alis latiusculis brevioribus integris profunde dentatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 576. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 23.
Habitat in Europæ *frigidissimæ rupibus.*
Maxime affine præcedenti, at vix digito longius, nec spithamæum; stipite virescente, nec atropurpureo ut illud. Proximum Polypodiis ob puncta fructificationum, sed valde conferta.

ebeneum. 24. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis sessilibus oblongis sinuatis: summis brevissimis integerrimis. *Amæn. acad.* 1. *p.* 272. *
Filix non ramosa minor (& minima), caule nigro surculis raris, pinnulis angustis raris brevibus acutis subtus niveis. *Sloan. jam.* 20. *hist.* 1. *p.* 92. *t.* 5... *f.* 1. *Raj. suppl.* 83.
Habitat in Jamaicæ *sepibus humidiusculis.*

thelypteris 25. ACROSTICHUM frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis integerrimis. *Fl. svec.* 2. *n.* 939.
Filix mollis s. glabra, vulgari mari non ramosæ accedens. Bauh. hist. 730. t. 731. f. 1.

Th

rpteris paluſtris non ramoſa. *Rupp. jen.* 277.
at in Europæ *ſeptentrionalioris paludibus.*
us Polyp. Filicis maris. Stipes *glaber.* Folia *ſte-*
i latiora, obtuſiora.

ɩOSTICHUM dichotomum: foliolis pinnatis: pin- parallelis lanceolatis approximatis integerrimis. furcatum.
: frondibus dichotomis pinnatis integerrimis.
pl. 1. *p.* 1076.
furcata, pinnulis longiuſculis non dentatis. *Plum.*
r. 13. *t.* 20. *fil.* 22. *t.* 28. *Raj. ſuppl.* 96.
furcata, taxi foliis. *Pet. fil.* 51. *t.* 5. *f.* 4.
femina ramoſa major dichotoma, pinnulis lon-
:idis longis anguſtis non dentatis. *Sloan. jam.* 24.
1. *p.* 102.
jamaicenſis dichotomus ſ. raris [illegible] feminæ
tratis pinnulis ramoſiſſima. *Pluk. alm.* 156.
at in Jamaica.
'um raro reperitur.

* * * * * *Fronde bipinnata.*

ɪOSTICHUM frondibus bipinnatis: foliolis cruciatum.
)oſitis lanceolatis: infimis cruciatim appendicu-
s. *Amœn. acad.* 1. *p.* 275. *
pulverulenta, pinnulis obtuſe dentatis. *Plum.*
26. *t.* 38. *amer.* 25. *t.* 25. *f. B.*
tum pulverulentum, pinnis infra auritis. *Pet. fil.*
. *t.* 9. *f.* 10.
it in America *meridionali.*

ɪOSTICHUM frondibus bipinnatis: foliolis barbarum.
)oſitis: pinnulis lanceolatis obtuſis ſerratis ſeſſi-
is alternis. *Hort. cliff.* 476. *Amœn. acad.* 1. *p.* 274. *
africana floridæ ſimilis, in ambitu foliorum ar-
e denticulata. *Pluk. alm.* 156. *t.* 181. *f.* 5.
it in Africa.

ɩOSTICHUM frondibus bipinnatis: pinnis al- calomelanos.
ɪis lanceolatis acuminatis pinnatifidis.
tichum fronde alternatim duplicato-pinnatum:
nulis lanceolatis ſeſſilibus: inferioribus ſerratis
ſis. *Hort. cliff.* 476. *Amœn. acad.* 1. *p.* 274.
non ramoſa major, caule nigro, ſurculis raris,
nulis anguſtis raris longis dentatis. *Sloan. jam.*
hiſt. 1. *p.* 92. *t.* 30. *f.* 2.

Filix albissimo pulvere conspersa. *Plum. fil.* 30. t. *Pet. fil.* 156. *t.* 9. *f.* 11.
Adiantum nigro simile, albissimo pulvere consp. *Plum. amer.* 30. *t.* 44.
Adiantum calomelanos americanum s. Adiantum grum, foliis prona parte candidissimis. *Pluk. alm.* *t.* 124. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali.*
Stipes ater, at folia subtus nivea.

aculeatum. 30. ACROSTICHUM frondibus supradecompositis: nis bifidis, stipitibus aculeatis.
Filix ramosa major, caule spinoso, foliis s. pin rotundatis profunde laciniatis s. cerefolii folio. S *jam.* 23. *hist.* 1. *p.* 99. *t.* 61.
Filix ramosa jamaicensis, fumariae foliis pedicul rachi medio aculeatis. *Pluk. alm.* 156.
Habitat in Jamaica.

PTERIS.

* *Frondibus simplicissimis.*

piloselloides 1. PTERIS frondibus sterilibus obovatis, fertilibus ceolatis longioribus, surculis reptantibus.
Habitat in India *orientali.*
Surculi *reptantes, filiformes, hispidi.* Frondes *st obovatae s. oblongiusculae, glabrae, integerrimae, sae, petiolatae.* Fertiles *vero duplo longiores, latae, lanceolatae, obtusae, subtus lato margine fructificantes.*

lanceolata. 2. PTERIS frondibus simplicibus lanceolatis sub latis glabris: apice fructificante.
Lingua Cervina foliis acutis & ad oras summit pulverulentis. *Plum. amer.* 28. *t.* 40. *fil.* 116. *t.* *Moris. hist.* 3. *p.* 558. *Raj. suppl.* 52.
Phyllitis lineata hinc inde dentata. *Pet. fil.* 123. *f.* 5.
Habitat in Domingo.

lineata. 3. PTERIS frondibus simplicibus linearibus integ mis longitudinaliter fructificantibus.
Lingua Cervina longissimis & angustissimis foliis. *amer.* 28. t. 41. *fil.* 123. *t.* 143. *Morist. hist.* 558. Raj. suppl. 52.

Phyllitis lineata, graminis folio longiſſimo. *Pet. fil.* 126. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat *in* Domingo.

PTERIS frondibus ſimplicibus linearibus: apice trifido. — *tricuſpidata.*
Lingua Cervina anguſto trifidoque folio. *Plum. fil.* 121. *t.* 140.
Phyllitis lineata apice trifido. *Pet. fil.* 124. *t.* 10. *f.* 6.
Habitat *in* Domingo.

PTERIS frondibus ſimplicibus dichotomis ſubtus hiſpidis: apicibus fructificantibus. — *furcata.*
Lingua Cervina furcata. *Plum. fil.* 122. *t.* 141.
Phyllitis aſpera, furcis lineatis. *Pet. fil.* 125. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat *in* America *meridionali.*

* * *Frondibus ſimpliciter pinnatis ſ. compoſitis oblongis.*

PTERIS fronde quaternata ſobrotunda integerrima, ſurculis repentibus. — *quadrifoliata.*
Filix. *Pluk. phyt.* 401. *f.* 5.
Habitat *in* America *meridionali.*

PTERIS frondibus pinnatis: pinnis oppoſitis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. — *grandifolia.*
Pteris fronde pinnata: pinnis lanceolato-linearibus integerrimis ſeſſilibus erectiuſculis. *Hort. cliff.* 473.
Phyllitis ramoſa ad margines pulverulenta. *Pet. fil.* 127. *t.* 6. *f.* 15.
Lingua Cervina latifolia membrana tenui marginata. *Plum. fil.* 88. *t.* 106.
Filix latifolia ad margines pulverulenta. *Plum. amer.* 6. *t.* 8.
Filix pinnata latifolia ad margines pulverulenta. *Raj. ſuppl.* 64.
Filix americana maxima: lobis oppoſitis acutioribus ad margines pulverulentis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 571.
Habitat *in* Dominicæ, Martinicæ *uliginoſis.*

PTERIS frondibus pinnatis: pinnis linearibus repandis: baſi cordatis. *Hort. cliff.* 473. — *longifolia.*
Lonchitis lineata, pinnis longiſſimis. *Pet. fil.* 129. t. 6. *f.* 12.

Lon-

Lonchitis americana major, alis longissimis non ... tis ad basin auriculatis oppositis ad oras pulve... lentis. *Moris. hist.* 3. *p.* 568.
Lonchitis non ramosa, longis angustis & ad basin ... culatis foliis. *Plum. fil.* 52. *t.* 69. *Raj. suppl.* 65.
Filix non ramosa, longissimis angustis & ad basin ... riculatis foliis. *Plum. amer.* 12. *t.* 18.
Habitat in Dominicæ *sylvis juxta rivulos.*

vittata. 9. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis linearibus re... basi rotundatis. *Osb. it. t.* 4.
Pteris simplex assurgens, foliis longioribus lance... tis, petiolis brevibus. *Brown. jam.* 90.
Lonchitis major, pinnis longis angustissimisque. *S... jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 79. *t.* 34.
Filix odorata luzonica. *Pet. gaz. t.* 63. *f.* 10.
Habitat in China, Jamaica.
Præcedenti valde similis.

stipularis. 10. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis linearibus se... libus, stipulis lanceolatis.
Filix altera longissimis angustis & ad basin foliosis f... liis. *Plum. amer.* 12. *t.* 19. *fil. t.* 70.
Filix lineata ad basin foliosa. *Pet. fil.* 130. *t.* 12. *f.* ...
Habitat in America *meridionali.*

trichomanoides. 11. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis subovatis ob... tusis repandis: subtus hirsutis. *Hort. cliff.* 473.
Trichomanes argenteum ad oras nigrum. *Plum. f...* 57. *t.* 75. *Pet. fil.* 137. *t.* 9. *f.* 16.
Trichomanes majus, pinnis sinuatis subtus nive... *Sloan. jam.* 17. *hist.* 1. *p.* 80. *t.* 35. *f.* 1. *Raj. suppl.* 6...
Filix crispa lanugine hepatini coloris ex insulis fortu... natis. *Pluk. alm.* 150. *t.* 281. *f.* 4.
Habitat in Jamaicæ, Dominicæ *rupibus.*

* * * *Frondibus subbipinnatis s. ramosis.*

pedata. 12. PTERIS frondibus quinquangulis trifoliatis: pinni... pinnatifidis: lateralibus bipartitis.
Pteris fronde simplici quinquangula producta tripartita: intermedia trifida: lateralibus bifidis. *Hort. cliff.* 473.
Hemionitis profunde laciniata ad oras pulverulenta. *Plum. amer.* 24. *t.* 34. *fil.* 130. *t.* 152.
Hemionitis foliis atro-virentibus maxime dissectis; f. Fi... lix geranii robertiani folio. Sloan. jam. 15. hist. 1. p. ...

ix marginifera, geranii folio. *Pet. fil.* 176. *t.* 8. 12.
x Hemionitis americana, petroselini foliis profunde ciniatis. *Pluk. alm.* 155. *t.* 286. *f.* 5. *Raj. suppl.* 55.
ntum monophyllum americanum, foliis profunde ciniatis ad oras pulverulentum. *Morif. hist.* 3. *p.* 592.
iantum monophyllum antegoanum, ad oras pulverulentum platani in modum divisum: lacinia media ongius producta. *Morif. hist.* 3. *p.* 592.
bitat in Jamaicæ, Dominicæ, Sibiriæ *rupibus.*
ta sibirica minor & subtus nivea: margine ferrugineo.

TERIS frondibus supradecompositis: foliolis pinatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; superioribus minoribus. *Hort. cliff.* 473. *Fl. svec.* 843; 940. *Dalib. paris.* 309. — aquilina.
ix ramosa major, pinnulis obtusis non dentata. *Bauh. pin.* 357.
ix femina. *Fuchs. hist.* 596. *Cam. epit.* 992.
bitat in Europæ *sylvis, præsertim cæduis.*

TERIS frondibus supradecompositis: pinnis linealibus: infimis basi pinnato-dentatis; terminalibus longissimis. *Hort. cliff.* 473. — caudata.
ix ramosa, pinnulis longiusculis: partim auriculatis. *Plum. amer.* 14. *t.* 22. *fil.* 23. *t.* 29.
ix femina vulgaris facie. *Pet. fil.* 135. *t.* 3. *f.* 12.
ix femina ramosissima jamaicensis, pinnula alas claudente longissima. *Pluk. alm.* 156.
ix femina s. ramosa major, pinnulis angustis obtusis non dentatis: impari surculum terminante longissima. *Sloan. jam.* 24. *hist.* 1. *p.* 101. *Morif. hist.* 3. *p.* 583.
ilix femina s. ramosa major, pinnulis angustissimis rarissimisque. *Sloan. jam.* 24. *hist.* 1. *p.* 101. *t.* 63.
abitat in Jamaicæ, Dominicæ *saxosis.*

PTERIS frondibus decompositis: foliolis pinnatis: infimis semipinnatifidis; terminalibus baseosque longissimis. — mutilata.
onchitis ramosa, limbo pulverulento. *Plum. amer.* 21. *t.* 30. *fil. t.* 51. *Pet. fil.* 131. *t.* 3. *f.* 10.
bitat in Jamaica, Dominica.

Folia

Folia *lateralia infima longiora ad basin, latere t inferiore pinnata.*

atropurpurea. 16. PTERIS frondibus decompositis pinnata: lanceolatis: terminalibus longioribus.
Pteris adianti facie, caule ramulis petiolisque tiore nitore nigricantibus. *Gron. virg.* 197.
Habitat in Virginia.
Stipes *spithamæus, atropurpureus, nitidus.* Frons *ta: pinnis lanceolatis, lato margine revolutis, q gis inferius eo etiam magis petiolata: inferioribus lis uno alterove pari pinnarum minorum sessilium*

biaurita. 17. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidi fima bipartita.
Filix pinnulis lonchitidis obtusis non dentat oras pulverulentis. *Plum. amer.* 10. *t.* 14 15. *Pluk. phyt.* 401. *f.* 1.
Filix lonchitidis pinnis. *Pet. fil.* 134. *t.* 3. *f.* 11.
Habitat in Domingo, Martinica, Jamaica.

semipinnata 18. PTERIS frondibus subbipinnatis: foliolis la bus loboque infimo semipinnatifidis. *Osb. it. t.*
Habitat in China. *Osbeck.*
Scapus *lævis.* Frondes *lanceolatæ, pinnatæ.* Folio *posita, remota, pinnatifida: apicibus terminalibus gatis; margo foliorum terram spectans sæpius & pinnatifidus, non vero superior, hinc quasi semip evadunt foliola;* Infima *demum lacinia pinnarum ris longior est & similiter semipinnatifida; reliquis bus integris, obtusis.*

heterophylla. 19. PTERIS frondibus bipinnatis: pinnis ovat longis serratis obtusis; fertilibus integerrimis.
Ruta muraria major, foliis variis scilicet oblong tegris & subrotundis serratis. *Sloan. jam.* 21. *p.* 92. *t.* 53. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

BLECHNUM.

occidentale. 1. BLECHNUM frondibus pinnatis pinnis lance oppositis basi emarginatis.
Lonchitis juxta nervum pulverulenta. *Pet. fil.* *t.* 3. *f.* 9. *Moris. hist.* 3. *p.* 568. *f.* 14. *t.* 2.

achitis f. Hemionitis pinnata juxta nervum pulverulenta. *Raj. suppl. 66. Plum. fil. 62. amer. 20. t. 9. f. B.*
x minor in pinnas tantum divisa crebras non crenatas auriculatas, & lineis pulverulentis notatas. *Sloan. jam. 18. hist. 1. p. 87. t. 44. f. 2.*
itat in America *meridionali.*
æ lanceolatæ plurimæ.

ECHNUM frondibus pinnatis. pinnis linearibus alternis. orientale.
bitat in China. *Osbeck.*
ns tripedalis, stipite basi antice setis griseis magnis estito; latus anterius stipitis sulcis 3 longitudinaliter xaratum. Folia *lineari-lanceolata, sessilia, glabra, integerrima, ad angulum acutum striata, digiti longitudine.*

HEMIONITIS.

EMIONITIS frondibus lanceolatis integerrimis. lanceolata.
yllitis angustifolia lineis catenatis. *Pet. fil. 122. t. f. 4.*
gua cervina villosa minor. *Plum. fil. 127. f. 6.*
bitat in America *meridionali.*

EMIONITIS frondibus palmatis hirsutis. palmata.
mionitis fronde palmata, lineis seminalibus reticulatis. *Hort. cliff. 474.*
mionitis aurea hirsuta. *Plum. amer. 23. t. 33. fil. t. 151.*
mionitis folio hirsuto & magis dissecto f. ranunculi olio. *Sloan. jam. 14. hist. 1. p. 72. Moris. hist. 3. p. 560. s. 14. t. 1. f. 5.*
ix, ranunculi folio, prolifera. *Pet. fil. 177. t. 8. f. 11.*
ix hemionitis dicta, saniculæ foliis, villosa. *Pluk. alm. 155. t. 291. f. 4.*
bitat in America *meridionali.*

EMIONITIS frondibus ovatis acuminatis, surculis paleaceis repentibus. parasitica.
mionitis parasitica repens, foliis ovato-acuminatis. *Brown. jam. 95.*
bitat in Jamaica.

LON-

LONCHITIS.

hirsuta. 1. LONCHITIS frondibus pinnatifidis obtusis l rimis, surculis ramosis hirsutis.
Filix ramosa, pinnulis quercinis. *Plum. fil.* 1
Adiantum pinnis quercinis, ramis villosis. *Pet.* *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in America *meridionali.*

aurita. 2. LONCHITIS frondibus pinnatis: pinnis inf partitis, surculis indivisis aculeatis.
Filix latifolia spinulis mollibus & nigris aculeata *fil.* 14. *t.* 17.
Filix spinosa, seminibus lunulatis. *Pet. fil.* 17 *f.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

repens. 3. LONCHITIS frondibus pinnatis: pinnis altern tis, surculis ramosis aculeatis.
Filix aculeata repens. *Plum. fil.* 11. *t.* 12.
Filix ramosa aculeata, repens. *Pet. fil.* 39. *t.* 4
Habitat in America *meridionali.*

pedata. 4. LONCHITIS frondibus pedatis: pinnis pin serrulatis.
Lonchitis erecta tribrachiata: lateralibus bi medio recto simplici. *Brown. jam.* 89. *t.* 1.
Habitat in Jamaica.

ASPLENIUM.

* *Fronde simplici.*

hizophyllum. 1. ASPLENIUM frondibus cordato-ensiformib visis: apice filiformi radicante. *Amœn. aca* 337.
Phyllitis filicifolia parva saxatilis virginiana p mitates foliorum radicosa. *Pluk. alm.* 154. *f.* 3.
Phyllitis non sinuata minor, apice folii radices *Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 71 *t.* 26. *f.* 1.
Phyllitis saxatilis virginiana per summitates fo prolifera. *Moris. hist.* 3. *p.* 557. *f.* 14. *t.* 1. *f.* 1
Habitat in Jamaica, Virginia, Canada, Sibiri

emionitis. 2. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato tis quinquelobis integerrimis, stipitibus læv

emionitis vulgaris. *Bauh. pin.* 353.
mionitis vera. *Cluf hift.* 2. *p.* 214.
bitat in Italia, Hifpania.
xime affine fequenti, at diameter frondis longitudina-
lis vix fuperat transverfalem.

PLENIUM frondibus fimplicibus cordato-lingu- **Scolopendrium.**
latis integerrimis, ftipitibus hirfutis.
plenium frondibus enfiformibus integris: bafi corda-
tis inflexis, petiolis hirfutis. *Vir. cliff.* 103. *Hort. cliff.*
474. *Fl. fvec.* 843; 941. *Mat. med.* 481. *Roy. lugdb.*
498. *Hall. helv.* 134. *Dalib. parif.* 310. *Sauv. monfp.* 27.
ngua Cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353. *Plum.*
fil. 34. *t.* *A.* *f.* 4.
yllitis. *Cam. epit.* 579.
hyllitis crifpa. *Bauh. hift.* 3. *p.* 757.
hyllitis f. Lingua Cervina maxima, undulato folio
auriculato per bafin. *Pluk. phyt.* 243. *f.* 1.
ingua Cervina medio folio nervo in aculeum abe-
unte. *Morif. hift.* 3. *p.* 557. *f.* 14. *t.* 1. *f.* 9.
ngua Cervina multifido folio. *Bauh pin.* 353.
yllitis f. Lingua Cervina crifpa, folio multifido,
ramofa. *Pluk. phyt.* 248. *f.* 2.
bitat in Europæ *umbrofis, nemorofis, faxofis.* ♃

SPLENIUM frondibus fimplicibus lanceolatis in- **nidus.**
tegerrimis glabris.
hyllitis indica maxima, latiffimis foliis planis mufæ
facie. *Morif. hift.* 3. *p.* 558. *f.* 14. *t.* 1. *f.* 15.
olopendria indiæ orientalis, mufæ facie. *Breyn. cent.*
129. *t.* 99.
bitat in Javæ *fummis arboribus. Osbeck.*
lia *bipedalia, latitudine fpithamæa, robufta & con-*
fiftentia, glabra, ad angulum acutum ftriata. Lineæ
fructificantes *inter fingulos nervos f. ftrias parallelas,*
breves, utpote vix ⅛ *latitudinis folii attingentes.* Ra-
dix *infidet fummis arboribus, unde folia exeunt in or-*
bem digefta, erecta, inftar umbellæ, intra cujus cen-
trum Aves plerumque nidos fuos conficiunt.

SPLENIUM frondibus fimplicibus ovato-lanceo- **plantagineum.**
latis fubcrenatis, ftipite fubtetragono.
plenium acaule minus, foliis oblongis, petiolis gla-
bris. *Brown. jam.* 92.
bitat in Jamaica.

serratum. 6. ASPLENIUM frondibus simplicibus lanceo ratis subsessilibus.
Lingua Cervina longo lato serratoque folio *amer.* 27. *t.* 39. *fil. t.* 124.
Phyllitis major margine crenato. *Pet: fil.* 106.
Phyllitis non sinuata, foliorum limbis leviter *Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 72.
Habitat in America *calidiore.*

bifolium. 7. ASPLENIUM frondibus binatis: foliolis l tis subsinuatis connatis.
Lingua Cervina geminato folio. *Plum. fil.* 11
Phyllitis folio geminato dentato. *Pet. fil.* 1 *f.* 11.
Habitat in America *meridionali.*

* * *Fronde pinnatifida.*

Ceterach. 8. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis: lobis confluentibus. *Hort. cliff.* 474. *Mat. med.* 4 *helv.* 135. *Dalib. paris.* 310. *Sauv. monsp.* 2 *angl.* 385.
Asplenium s. Ceterach. *Bauh. hist.* 3. *p.* 479. *hist.* 3. *p.* 561. *s.* 14. *t.* 2. *f.* 1. *Plum. fil.* X *B. f.* 3. *Barr. ic.* 1043. 1044.
Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.
Habitat in Orientis, Monspelii, Walliæ, It *ris rupium humidis.*

obtusifolium. 9. ASPLENIUM frondibus subpinnatis: pinni sinuatis decurrentibus alternis.
Adiantum alis latioribus. *Pet. fil.* 117. *t.* 2. *f.*
Habitat in America.

* * * *Fronde pinnata.*

cultrifolium 10. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis inciso-serratis: basi deorsum a *Hort. cliff.* 474.
Lonchitis latifolia, pediculis lucidis & glabr *fil.* 45. *t.* 59.
Habitat in Martinica.

salicifolium 11. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis crenatis, basi sursum angulatis.

...chitis glabra major. *Plum. amer.* 18. *t.* 27. *fil. t.* ...o. *Raj. suppl.* 67.
...nchitis striata *Pet. fil.* 110. *t.* 3. *f.* 2.
...chitis major, pinnulis latioribus leviter denticu... ...tis: superiore latere auriculatis. *Sloan. jam.* 16. ... 1. *p.* 78.
...*itat in* Antillis.

...SPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis oppositis ...nceolatis integerrimis. — nodosum.
...lenium simplex assurgens, foliis longis oppositis, ...aule geniculato, lineis fructificationum fere conti...uis. *Brown. jam.* 93.
...yllitis pulverulenta nodosa major. *Pet. fil.* 143. *t.* 6. ... 16.
...ngua Cervina nodosa. *Plum. fil. t.* 108. *Raj. suppl.* 63.
...lix latifolia nodosa. *Plum. amer.* 4. *t.* 6.
...ix major in pinnas tantum divisa raras oblongas ...triatas ex adverso sitas & non crenatas. *Sloan. jam.* ...18. *hist.* 1. *p.* 85. *t.* 41. *f.* 1.
...*bitat in* America *meridionali.*

...SPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis oppositis ...ordato-lanceolatis submarginatis integerrimis. — marginatum.
...yllitis ramosa margine membranaceo. *Pet. fil.* 108. ... 12. *f.* 2.
...*itat in* America.

...SPLENIUM frondibus pinnatis, pinnis acumina...s incisis, stipite squamoso. — squamosum.
...nchitis ramosa, caule squamoso. *Pet. fil.* 112. *t.* 5. ... 2.
...*bitat in* America.

...SPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis pinnatifi...is obtusis crenatis: terminali acuminata. — striatum.
...lix striata, pinnis crenatis, major & minor. *Pet. fil.* ...113. 114. *t.* 3. *f.* 3, 4.
...*bitat in* America.

...SPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis trapezio-...blongis striati-erosis basi auctis. — erosum.
...lenium simplex nigrum, foliis oblongis acuminatis ...argine quasi laceratis *Brown. jam.* 94.
...chitis *major, pinnis* angustioribus leviter denticu-

latis superiore latere auriculatis. *Sloan. jam hist.* 1. *p.* 78. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat in India *occidentali.*

rhizophyllum. 17. ASPLENIUM frondibus pinnatis apice radicantibus: pinnis ovatis repando-subauritis: minimis motis integerrimis.
Asplenium simplex minus reflectens, foliis oblongis crenatis subauritis, summitate aphylla radic... *Brown. jam.* 92.
Lonchitis asplenii facie, pinnulis variis s. subrot... ex utroque latere auriculatis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 76. *t.* 29. 30. *f.* 1.
Adiantum s. Filix trichomanoides jamaicensis, ra... las ex nutante apice ad terram demittens. *Phl...* 9. *t.* 253. *f.* 4.
Habitat in India *occidentali.*

pygmeum. 18. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis subr... dis quinis ternisve.
Habitat in Jamaica.

Trichomanes. 19. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis subr... dis crenatis. *Fl. lapp.* 388. *Fl. svec.* 854; 942. *cliff.* 474. *Mat. med.* 483. *Roy. lugdb.* 498. *helv.* 135. *Dalib. paris.* 311.
Trichomanes s. Polytrichum officinarum. *Bauh.* 356. *Plum. fil.* 26. *t.* V. *f.* 1.
Trichomanes. *Fuchs. hist.* 796. *Cam. epit.* 925.
β. Trichomanes foliis eleganter incisis. *Tournef. inst. t.* 315. *f.* J. C.
Adiantum maritimum segmentis subrotundis. *phyt.* 73. *f.* 6.
γ. Trichomanes minus & tenerius. *Bauh. pin.* 35...
Habitat in Europæ *fissuris rupium, inque* Oriente.

Trich. dentatum. 20. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis cu... mibus obtusis crenato-emarginatis.
Polytrichum saxatile dentatum. *Plum. amer.* 35.
Trichomanes latifolium dentatum. *Plum. fil. t.* ...
Trichomanes striatum vulgaris faciei. *Pet. fil.* ... 2. *f.* 15.
Habitat in America *meridionali.*

marinum. 21. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis ob...

serratis superne gibbis obtusis basi cuneatis. *Hort. cliff.* 474. *Hall. helv.* 136.
Hama Filix marina anglica. *Moris. hist.* 3. *p.* 573. *s.* 14. *t.* 3. *f.* 25. *bon.*
Filicula maritima ex insulis stoechadis. *Bauh. pin.* 359. *Burs. XX.* 39.
Asplenium minus assurgens simplex, foliis oblongis margine inaequali crenato. *Brown. jam.* 93.
Adiantum jamaic. pinnulis auriculatis ad basin strictioribus. *Pluk. alm.* 9. *t.* 253. *f.* 5.
Lonchitis minor, pinnis latioribus leviter denticulatis, superiore latere auriculatis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 78. *t.* 33. *f.* 1?
Habitat in Anglia, *insulis* Stoechadum. *Burs.* America.

ASPLENIUM frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. lugdb.* 498. *Fl. svec.* 855; 943. *Mat. med.* 484. *Dalib. paris.* 311. — Ruta muraria.
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.
Paronychia. *Cam. epit.* 785.
Habitat in Europa *ex rupium fissuris.* ♃

ASPLENIUM frondibus subtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciso-serratis. — Adiantum nigrum.
Asplenium frondibus duplicato-pinnatis, foliis inferioribus majoribus: foliolis ovatis superne crenatis. *Roy. lugdb.* 498. *Dalib. paris.* 311.
Adiantum pulcherrimum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 737.
Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. *Bauh. pin.* 355.
Dryopteris nigra. *Dod. pempt.* 466.
Habitat in Italia, Gallia, Harcynia, Anglia.
Pollen crocei est coloris.

ASPLENIUM frondibus duplicato-pinnatis: pinnis obovatis crenatis: foliolis inferioribus minoribus. *Roy. lugdb.* 498. — Trich. ramosum.
Trichomanes ramosum majus & minus. *Bauh. pin.* 356.
Trichomanes ramosum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 747. *Raj. anglic.* 3. *p.* 119.
Habitat in Arvorniae *rupibus.*

POLYPODIUM.

* *Fronde indivisa.*

lanceolatum.

1. POLYPODIUM frondibus lanceolatis integ[ris] glabris, fructificationibus solitariis, surculo [...]
   Phyllitis, folio longo, angustifolia, maculi[s] [...]bus. *Pet. fil.* 8 *t.* 6. *f.* 2.
   Habitat in America meridionali.
   Dicimus fructificationes solitarias, *quæ serie* [...] *nali tantum ab utroque latere disponuntur; seri[es] quæ transversim, simplici serie, inter singulos [...] transversales digeruntur;* sparsas, *quæ inter [...] nervos transversales duobus pluribusque ordini[bus] [...]stæ sunt.*

lycopodioides.

2. POLYPODIUM frondibus lanceolatis integ[ris] glabris, fructificationibus solitariis, surculo [ra]moso repente. *Hort. cliff.* 474.
   Lingua Cervina scandens, caulibus squamosis. [...] *fil.* 104. *t.* 119.
   Phyllitis scandens, caulibus squamosis. *Plu[m].* 29. *t.* 42. *Raj. suppl.* 53.
   Phyllitis minor scandens, foliis angustis. *Sloan. [...] hist.* 1. *p.* 73.
   Filix maculata scandens, caulibus squamosis. [...] 12. *t.* 4. *f.* 15.
   Filix sarmentosa bifrons s. Dryopteris scandens [...]censis inter filicem & lycopodium media. *Pl[...]* 156. *t.* 290. *f.* 3.
   Habitat in America: Martinica, Domingo, Ja[...]
   Confer. Filix maculata scandens, caulibus sq[uamosis] angustifolia. *Pet. fil* 13. *t.* 4. *f.* 16.
   Filix scandens, quercus folio, caulibus [...]podii. *Pet. fil.* 21. *t.* 15. *f.* 2.

nloselloides.

3. POLYPODIUM frondibus lanceolatis integ[ris] hirtis: sterilibus ovatis, fertilibus linearibus[: fru]ctificationibus solitariis.
   Lingua cervina minima repens & hirsuta. *Plu[m.]* 103. *t.* 118.
   Filix foliis ovalibus & longis pilosis. *Pet. fil.* [...] 10 *f.* 5.
   Habitat in America *meridionali.*
   Radix *repens muscosa.* Frondes *hirtæ* [...] *Fructificationes lana fulva barbatæ.*

POLYPODIUM frondibus crenatis glabris: sterilibus subrotundis sessilibus; fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. heterophyllum.

Lingua cervina heterophylla scandens & repens. Plum. fil. 105. t. 120.

Filix maculosa scandens, foliis rotundis & longis glabris. Pet. fil. 174. t. 15. f. 4.

Habitat in America meridionali.

POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus serialibus. crassifolium

Phyllitis maculata, amplissimo folio. *Pet. fil.* 1. *p.* 6. *t.* 8.

Phyllitis maculata, breviori & crassiori folio. *Pet. fil.* 2. *p.* 6. *t.* 1.

Habitat in America meridionali.

POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus sparsis. phyllitidis

Polypodium, linguæ cervinæ folio, majus. *Plum. amer.* 26. *t.* 38. *Raj. suppl.* 52.

Phyllitis folio longo & marginato. *Pet. fil.* 5. *t.* 6. *f.* 10.

Phyllitis folio non sinuato tenuiori, rotundis pulverulentis maculis aversa parte punctato. *Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 72.

Habitat in America meridionali.

Confer. Phyllitis folio longo leviter undulato. *Pet. fil.* 4. *t.* 6. *f.* 9.

Phyllitis, folio longo, angustifolia. *Pet. fil.* 7. *t.* 6. *f.* 3.

POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris integerrimis: apice multifido, fructificationibus sparsis. comosum

Lingua cervina, muldifido cacumine, laciniata. *Plum. fil.* 115. *t.* 131.

Phyllitis folio longo apice palmato. *Plum. fil.* 6. *t.* 6. *f.* 11.

Habitat in America meridionali.

Suspectæ affinitatis est cum præcedenti.

POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris repando sinuatis: apice trilobis. trifurcatum

Lingua Cervina sinuosa in summitate trisulca. Plum. *fil.* 120. *t.* 138.

Polypodium vulgare, ſummo trifido. *Pet. fil.* 15. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali.*
Suſpecta etiam eſt affinitas cum proxime præ[cedenti]bus duobus.

** *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

crispatum. 9. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis gla[bris lo]bis ſemiorbiculatis crenatis.
Polypodium, aſplenii folio criſpo, pendulum. *P[et. fil.]* 25. *t.* 13. *f.* 12.
Habitat in America *meridionali.*

ſuſpenſum. 10. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis glabri[s lo]bis ſemiovatis acutis.
Polypodium pendulum glabrum. *Plum. fil.* 67.
Polypodium, aſplenii folio brevi, pendulum. *P[et. fil.]* 24. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in America *meridionali.*

aſpleniifolium. 11. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis pilo[ſis lo]bis ſemiovatis acutis.
Polypodium aſplenii folio villoſo. *Pet. fil.* 26. *t.* 16.
β. Polypodium pendulum ſubtus villoſum. *Pet. f[il.]* *t.* 14. *f.* 1.
Polypodium pendulum hirſutie rufa pubeſcens. *[Plum.] fil.* 68. *t.* 88.
Habitat in America *meridionali.*
Affinitas hujus cum antecedenti ſuſpecta eſt.

ſcolopendrioides. 12. POLYPODIUM frondibus lanceolatis pinnati[fidis] lobis obtuſiuſculis: infimis remotis.
Polypodium inciſuris aſplenii. *Plum. fil. t.* 91.
Polypodium minus, aſplenii folio. *Pet. fil.* 23. *f.* 14.
Filix non ramoſa ſcolopendrioides. *Plum. amer.* 11.
Filix jamaicenſis ſimpliciter pinnatis aſplenii f[oliis] averſa parte duplici ſerie punctorum notatis. *[Pluk.] alm.* 152. *t.* 290. *f.* 1.
Habitat in Jamaica.

vulgare. 13. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pinnis longis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata.

Pe

olypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis indivisis serrulatis alternis connato sessilibus. *Hort. cliff.* 475. *Fl. svec.* 845; 944. *Roy. lugdb.* 499. *Dalib. paris.* 311. *Mat. med.* 485.
olypodium pinnatum: pinnis lanceolatis integris. *Fl. lapp.* 380.
olypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359. *fil.* 27. *t. A. f.* 2.
olypodium majus. *Dod. pempt.* 464.
olypodium minus. *Bauh. pin.* 359. *Dod. pempt.* 464.
abitat in Europæ *rimis rupium.*

POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice lævi. virginianum.
olypodium minus vulgaris faciei. *Pet. fil.* 22. *t.* 7. *f.* 9.
olypodium radice tenui & repente. *Plum. amer.* 25. *t.* 36. *fil.* 60. *t.* 77. *Raj. suppl.* 56.
olypodium virginiense minus, foliis obtusioribus. *Moris. hist.* 3. *p.* 563. *s.* 14. *t.* 2. *f.* 3.
abitat in Virginia.
ecedenti simillimum, sed minus, & subtus glabrum.

POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: lobis lanceolatis alternis obtusis distantibus. Otites.
olypodium, lonchitidis folio, minus. *Pet. fil.* 32. *t.* 3. *f.* 16.
abitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis lanceolatis: lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda. pectinatum
lypodium lonchitidis folio. *Pet. fil.* 31. *t.* 7. *f.* 14.
lypodium nigrum tenerius sectum. *Plum. amer.* 26. *t.* 37.
abitat in Jamaica.

POLYPODIUM frondibus pinnatis: lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis adscendentibus, radice hirta. taxifolium.
lypodium taxi folio pendulum. *Pet. fil.* 35. *t.* 14. *f.* 1.
lypodium tenue & pendulum. *Plum. fil.* 69. *t.* 89.
abitat in America *meridionali.*

POLYPODIUM frondibus pinnatis: lobis approximatis *ensiformibus repandis* horizontalibus. struthionis

Polypodium fronde pinnata: foliolis lanceolato aribus nudulis acuminatis oppofitis connatis. *cliff.* 475.

Polypodium crifpum ftruthionis pennis. *Pet. fil.* 3. *f.* 8.

Polypodium radice fubcærulea & punctata. *Pl.* 60. *t.* 78.

Habitat in America.

fquamatum. 19. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis fcabris nis lanceolatis diftantibus horizontalibus int mis.

Polypodium longifolium, fquamulis argenteis *fil.* 29. *t.* 7. *f.* 11.

Habitat - - - - - -

loriceum. 20. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis lævib nis lanceolatis diftantibus horizontalibus rep

Polypodium longifolium, radice dulci. *Pet. fil.* *t.* 7. *f.* 10. 12.

Habitat in America.

alatum. 21. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis la pinnis oblongis diftantibus dentatis.

Polypodium ferratum majus cofta alata. *Pet. fil.* 7. *f.* 13.

Habitat in America.

cambricum. 22. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pin ceolatis lacero-pinnatifidis ferratis. *Gouan.* 527. *Hudf. angl.* 387.

Polypodium fronde pinnatifida: foliolis lanceo nuato pinnatifidis. *Hort. cliff.* 475. *Roy. lugd.*

Polypodium cambrobritannicum, lobis foliorum funde dentatis. *Morif. hift.* 3. *p.* 565. *f.* 14. *t.* *bene.*

Polypodium cambro-britannicum, pinnulis ad nes laciniatis. *Raj. hift.* 137. *angl.* 3. *p.* 117

Filix ampliffima, lobis foliorum laciniatis, ca *Pluk. alm.* 153. *t.* 30. *f.* 1.

Habitat in Anglia, Monfpelii.

aureum. 23. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis lævib nis oblongis diftantibus: infimis patulis; te maxima, fructificationibus ferialibus.

Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis

rimis basi connatis patulis: terminali maxima. *Hort. cliff.* 475.
Polypodium majus aureum. *Plum. amer.* 25. *t.* 35. *fil.* 59. *t.* 76. *Raj. suppl.* 56.
Polypodium maximum. *Pet. fil.* 15. *t.* 7. *f.* 8.
Polypodium altissimum. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. *p.* 75.
Polypodium jamaicense majus & elatius, alis longioribus: punctis aureis aversa parte notatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 563.
Habitat in America *ad caudices vetustarum arborum.*

POLYPODIUM frondibus sterilibus brevioribus obtusis sinuatis; fructificantibus alternis pinnatis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 382. *Hill. anat. t.* 10. — quercifolium.
Polypodium exoticum, folio quercus. *Bauh. pin.* 359. *Moris. hist.* 3. *p* 564. *s.* 14. *t.* 1. *f.* 15.
Polypodium malabaricum, foliis biformibus. *Pet. mus.* 794. *Raj. suppl.* 57.
Polypodium indicum. *Clus. exot.* 88. *t.* 89. *Pis. mant.* 195. *Rumph. amb.* 6. *p.* 78. *t.* 36.
Panna kelengo-marava. *Rheed. mal.* 12. *p.* 23. *t.* 11.
Habitat in India.

* * * *Fronde trifoliata: stipite foliolis tribus.*

POLYPODIUM frondibus ternatis sinuato-lobatis: intermedia majore. — trifoliatum
Polypodium fronde ternata sinuata: foliolis lateralibus bifidis; intermedio petiolato trifido majore. *Hort. cliff.* 475.
Polypodium trifoliatum. *Pet. fil.* 18. *t.* 7. *f.* 3.
Lonchitis maxima trifolia americana. *Raj. suppl.* 66.
Hemionitis maxima trifolia. *Plum. amer.* 22. *t.* 32. *fil.* 127. *t.* 148.
Hemionitidi affinis Filix major trifida auriculata: pinnulis latissimis sinuatis. *Sloan. jam.* 18. *hist.* 1. *p.* 85. *t.* 42.
Filix s. Hemionitis dicta caribæorum, amplissimis foliis, trifoliata. *Pluk. alm.* 155. *t.* 291. *f.* 3.
Habitat in Caribæis *insulis.*
Confer. Hemionitis maxima quinquefolia. *Plum. Raj. suppl.* 67. *Pet. fil.* 148. *t.* 7. *f.* 2.
Polypodium auriculatum. *Pet. fil.* 16. *t.* 7. *f.* 5.
Polypodium auriculatum pentaphylloides. *Pet. fil.* 17. *t.* 7. *f.* 6.

Poly-

Polypodium auritum majus: laciniis ci
Pet. fil. 19. *t.* 7. *f.* 7.
Polypodium auritum tricuspidatum: oris p
fis. *Pet. fil.* 20. *t.* 7. *f.* 4.

* * * * *Fronde pinnata simpliciter.*

unitum. 26. POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis ex
mibus serratis: serraturis semiovatis ovato-serr
Filix pyramidalis maderaspatana elegans, pinnulis
ratis. *Pet. muf.* 10. *t.* 1. *f.* 55.
Filix zeylanica denticulata non ramosa. *Burm.*
98. *t.* 44. *f.* 1.
Filix non ramosa major, surculis raris brevior
pinnulis crebris latis brevibus. *Sloan. jam.*
1. *p.* 90. *t.* 48.
Filix bermudiensis non ramosa petraea, pinnis ac
ribus planis hirsutie pubescentibus. *Pluk. phyt.*
f. 1.
Habitat in Indiis.

Lonchitis. 27. POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis lu
tis ciliato serratis declinatis, stipitibus stri
Hort. cliff. 475. *Gron. virg.* 123.
Lonchitis aspera. *Bauh. pin.* 359.
Lonchitis aspera major. *Moris. hist.* 3. *p.* 566. *s.*
2. *f.* 1.
Habitat in Alpinis Helvetiae, Baldi, Arvoniae,
liae, Monspelii, Daliae Sveticae, Virginiae.
Virginicae plantae pinnae magis elongatae & minus
vatae, serraturis minus ciliato-spinosis.

auriculatum 28. POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis fal
lanceolatis serratis: basi truncatis sursum auriti
Zeyl. 383.
Filix zeylanica, lonchitidis facie. *Breyn. cent.* 1
44. *f.* 2. *Raj. suppl.* 69. *Burm. Zeyl* 98. *t.* 44. *f.*
Filix s. Lonchitis aspera maxima indorum. *Pluk.*
152. *t.* 30. *f.* 4.
Lonchitis aspera zeylanica. alis falcatis levissime
ticulatis & superiore latere auriculatis. *Moris.*
3. *p.* 566.
Habitat in India.

exaltatum. 29. POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis e
mibus integris basi inferiore introrsum, su
sursum gibbis.

onchitis glabra minor. *Plum. amer.* 19. *t.* 28.
Lonchitis altissima, pinnulis ex utroque latere auriculatis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 77. *t.* 31.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis triangularibus dentatis. triangulum.
Trichomanes folio triangulo dentato. *Pet. fil.* 76. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis integerrimis distantibus: supremis minoribus, punctis serialibus. simile.
Lonchitis altissima, pinnulis raris non laciniatis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. *p.* 77. *t.* 32.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis subpubescentibus confluentibus: inferioribus distinctis, punctis sparsis. dissimile.
Polypodium simplex, foliis lanceolatis integris distinctis tota basi affixis supremo subhastato, capsulis solitariis. *Brown. jam.* 100.
Filix jamaicensis jaceæ majoris æmula, falcatis foliis integris margine æquali. *Pluk. alm.* 154. *t.* 288. *f.* 1.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis cordatis obtusis integerrimis repandis. cordifolium
Trichomanes folio cordato. *Pet. fil.* 75. *t.* 1. *f.* 11.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus pinnatis oblongis integris: anastomosibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. reticulatum.
Filix latifolia non ramosa nigris tuberculis pulverulenta. *Plum. amer.* 6. *t.* 9.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus ternatis, foliolis bipinnatifidis basi laciniatis obtuse inciso-serratis acuminatis: infimis gibbosioribus. cicutarium.
Polypodium minus triphyllum, foliis profunde divisis: lobis oblongis sublobato-crenatis. *Brown. jam.* 97.

Filix

Filix pumila palustris virginiana. *Pluk. alm.* 28 p. *f.* 1.

Filix virginiana non ramosa, foliis planis. *Plu* 151. *t.* 284. *f.* 2.

Habitat in Virginia, Jamaica.

* * * * * *Fronde sub-bipinnata, cujus pinnæ conflu ut semi-bipinnata potius, quam perfecte c to-pinnata sit.*

Phegopteris 36. POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis: f infimis reflexis: paribus pinnula quadrangul adunatis. *Hort. cliff.* 475. *Fl. svec.* 851; 945

Polypodium pinnatum: pinnis lanceolatis pinn integris: inferioribus nutantibus. *Fl. lapp.* 36; *helv.* 138.

Phyllitis minor hirsuta, pinnis variis. *Act. petr* *t.* 21.

Filix non ramosa minor & sylvestris. *Petit. ep* *t.* 50.

Filix minor britannica, pediculo pallidiore, ali rioribus deorsum spectantibus. *Moris. hist.* 3. *f.* 14. *t.* 4. *f.* 17.

Habitat in Europæ *fagetis & in* Virginia.

retroflexum. 37. POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis: f infimis reflexis: pinnis laceris.

Filicula alis inferioribus pendulis. *Pet. fil.* 7 *f.* 9.

Habitat in America.

fragrans. 38. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis lan tis: foliolis confertis: lobis obtusis serratis, l paleaceo. *Hudf. angl.* 388.

Dryopteris rubum idæum spirans. *Amm. ruth.*

Habitat in Sibiria, Anglia.

Habitus P. F. maris, at longe minus. Foliola c *congesta, lobis lateralibus obtusis, profundius se*

fontanum. 39. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis lanc tis: foliolis subrotundis argute incisis, stipite

Filicula fontana minor. *Bauh. pin.* 258.

Adiantum filicinum durius crispum minimum. ic. 452. f. 1.

Habitat in Sibiria, Galloprovincia.

Habitus P. fragilis, at Foliola arctiora, minus profunde subdivisa, punctis floriferis majoribus, prodeuntibus non ex squama subrotunda, sed ex rima s. valvula lineari, oblonga, alba.

POLYPODIUM frondibus semi-bipinnatis lanceolatis: lobulis rotundatis integerrimis striatis. parasiticum.
Tsjeri-welli-panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 35. *t.* 17.
Habitat in India *supra arbores. Osbeck.* 41.
Stipes lævis. Foliola *lanceolata ad medium pinnatifida, lobis obtusis, non serratis, substriatis, punctis fructificantibus sparsis.*

POLYPODIUM frondibus lateribus bipinnatis: foliolo infimo pinnatifido. varium.
Habitat in China. *Osbeck.*
Stipes *hirtus pilis vagis.* Frons *pinnata:* Foliolis *lateralibus ad basin pinnatifidis:* Pinnæ *omnes sessiles, argute & tenuissime serratæ.* Pinnulæ bases *deorsum spectantes juxta stipitem, longiores & semipinnatifidæ, qua nota facillime innotescit. Sic* Frons *apice simpliciter pinnata, lateribus bipinnata, pinnula baseos elongata, pinnatifida.*

POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute serratis. cristatum.
Polypodium fronde duplicato-pinnata: pinnulis obtusis coadunatis crenatis. *Fl. svec.* 848.
Filix non ramosa major pinnulis latiusculis longioribus in profundos denticulos divisis. *Moris. hist.* 3. *s.* 14. *t.* 3. *f.* 11.
Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. *Pluk. phyt.* 181. *f.* 2.
Habitat in Europa *septentrionali.*
Florent huic foliola superiora, non inferiora.

POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Hort. cliff.* 475. *Fl. svec.* 846; -946. *Mat. med.* 486. *Roy. lugdb.* 499. *Hall. helv.* 139. *Dalib. paris.* 313. F. mas.
Filix mas non ramosa dentata. *Bauh. pin.* 358.
Filix mas. *Fuchs. hist.* 594.
Habitat in Europæ *sylvis.*
POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnulis lanceo- F. femin.

ceo-

ceolatis pinnatifidis acutis. *Fl. lapp.* 386. *Fl. su.* 947. *Roy. lugdb.* 499. *Hall. helv.* 140. *Dalib.* 313.
Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus funde dentatis. *Moris. hist.* 3. *p.* 579. *s.* 14. *t.* *Pluk. phyt.* 180. *f.* 4.
Habitat in Europæ *frigidioris subhumidis.*

aculeatum. 45. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnis latis ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Roy. lugd.* *Dalib. paris.* 314. *Huds. angl.* 389.
Filix aculeata major. *Bauh. pin.* 358. *prodr.* 151.
Filix mas non ramosa, pinnulis latis articulatis fis. *Pluk. alm.* 152. *t.* 179. *f.* 6. & 180. *f.* 1.
Habitat in Europa.

rhæticum. 46. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: foliolis nisque remotis lanceolatis: serraturis acu *Gouan. monsp.* 528. *Huds. angl.* 390.
Filix rhætica tenuissime denticulata. *Bauh. hist.* 740.
Filicula fontana major s. Adiantum album, fili lio. *Bauh. pin.* 358.
Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia.

novebora-cense. 47. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinni longis integerrimis parallelis, stipite lævi.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Habitus & structura omnino P. filicis maris, at magis approximatæ, integerrimæ & punctis minimis copiosissimis; stipes dein lævis est.

pubescens. 48. POLYPODIUM frondibus bipinnatis pilosis nis lanceolato ovatis subincisis acutis: extim fluentibus.
Polypodium minus subhirsutum simpliciter pin foliis distinctis subovatis crenatis, capsulis *Brown. jam.* 101.
Habitat in Jamaica.

marginale. 49. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinni sinuato-repandis, fructificationibus marginalib
Habitat in Canada. *Kalm.*
Habitus P. F. maris, sed pinnæ oblongæ, non at versus basin obtuse serratæ; manifeste dis

*inuis ab utroque margine subtus punctis 2. s. 3. ma-
oribus distinctis, nec pluribus in disco uti F. maris.*

OLYPODIUM frondibus bipinnatis: foliolis re- notis: pinnis oblongis obtusis serratis subtus bulbi- eris. **bulbiferum.**

ypodium fronde duplicato-pinnata, foliolis oblon- is obtusis incisis dorso bulbiferis. *Roy. lugdb.* 500.
ix saxatilis canadensium globulifera. *Pluk. alm.* 150.
ix baccifera. *Corn. canad.* 5. *Moris. hist.* 3. *p.* 579. 14. *t.* 3. *f.* 10.
bitat in Canada.

OLYPODIUM frondibus bipinnatis: foliolis re- notis: pinnis subrotundis incisis. *Fl. lapp.* 384. *Fl. ec.* 849; 948. *Roy. lugdb.* 500. *Dalib. paris.* 312. **fragile.**
ix saxatilis, culiculo tenui fragili. *Pluk. alm.* 150. 180. *f.* 5.
ix pumila saxatilis. 2. *Clus. pon.* 706.
ix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata. *Bauh. pin.* 358?
bitat in collibus Europæ *frigidioris.*

OLYPODIUM frondibus bipinnatis: foliolis sub- oppositis: pinnis laciniatis. *Hort. cliff.* 475. *Roy. ugdb.* 500. *Dalib. paris.* 312. **regium.**
ix regia, fumariæ pinnulis. *Vaill. paris.* 52. *t.* 9. *f.* 1.
bitat in Gallia.
uctificationum pulvilli in hoc majores, quam in affini- bus.

OLYPODIUM? frondibus bipinnatis: sterilibus brevissimis: pinnis cuneiformibus lobatis. *Magn. monsp.* 5. *t.* 5. **leptophyllum.**
lantum minimum, folio vario. *Magn. hort.* 5. *t.* 5.
lantum filicinum leptophyllum elatius hispanicum. *Barr. rar.* 1270. *t.* 431. *opt.*
bitat in Hispania, Lusitania, Galloprovincia.
edium inter Acrosticha, Polypodia, Osmundas.

OLYPODIUM? frondibus bipinnatis: pinnis pin- natifidis lanceolatis serratis, radicibus lanatis. **Barometz.**
bitat in China, *unde habui cum radice.*
dix *decumbens, crassa, vellere mollissimo densissimo intense flavo obvestita.* Stipites *pedales s. sesquipe- dales,*

dales, virides, læves, obsolete angulati. Fro *pinnata :* Poliolis *oblongis : infimis oppositis;* r *alternis, axillis patulis.* Pinnæ *lanceolatæ, acut natifidæ lobis acutis apice serratis. Sunt hæ glabræ, nec fructificationem obtinui, sed ex fa retuii.*

* * * * * * *Spinis sparsis aculeata aut arborescentia.*

rboreum. 55. POLYPODIUM frondibus bipinnatis serrati dice arboreo inermi.
Polypodium arboreum maximum, fronde te caudice durissimo. *Brown. jam.* 104.
Filix arborescens, pinnulis dentatis. *Plum. fi amer.* 1. *t.* 1. 2.
Filix arborescens, pinnis dentatis. *Pet. fil.* 4 1. 2.
Habitat in America *meridionali.* ♄

spinosum. 56. POLYPODIUM frondibus bipinnatis serrat dice arboreo aculeato.
Filix arborea ramosa spinosa caudice non divi nulis latis densis brevibus tenuibus minutim *Sloan. jam.* 24. *hist.* 1. *p.* 95. *t.* 56.
Filix arborescens latifolia aculeata. *Plum. ame fil.* 3. *t.* 3.
Filix arborescens, pinnis latis, caudice spino *fil* 42. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.* ♄

horridum. 57. POLYPODIUM frondibus supradecompos nis semi-sagittatis basi connexis apice serrati ce aculeato.
Filix ramosa, pinnis latis gladiatis, caudice *Pet. fil.* 50. *t.* 5. *f.* 1.
Filix latifolia ramosa, cauliculis nigris & spino *amer.* 3. *t.* 4. *Raj. suppl.* 92.
Habitat in America *meridionali.*
Frondium nervi laterales iterum ramosi. Punctu lia sparsa prope marginem.

pyramidale. 58. POLYPODIUM frondibus supradecomposi nis terminalibus lanceolatis longissimis sen pite inferne aculeato.

Filix ramosa pyramidalis, pinnis parvis. *Pet. fil.* 40. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus supradecompositis: pinnis obtusis apice serratis: terminalibus acuminatis, caudice arboreo aculeato. asperum.
Filix arborescens caudice & caule spinosis. *Pet. fil.* 47. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnis ovatis denticulato-spinosis. muricatum.
Filix pinnis aculeatis. *Pet. fil.* 53. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus bipinnatis hirsutis: pinnis oblongis obtusis: terminalibus acuminatis. villosum.
Filix dentata, caule & costa villosis. *Pet. fil.* 52. *t.* 4. *f.* 10.
Filix ramosa villosa major, crenis rotundis dentata. *Plum. amer.* 15. *t.* 23. *fil.* 21. *t.* 27. *Raj. suppl.* 97.
Filix ramosa major hirsuta, ramulis raris, pinnulis asplenii crebris latis brevibus subrotundis non dentatis. *Sloan. jam.* 23. *hist.* 1. *p.* 100.
Habitat in America.

POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnis horizontalibus integerrimis obtusis: terminalibus lanceolatis. decussatum.
Filix taxi foliis, major & minor. *Pet. fil.* 61. 62. *t.* 2. *f.* 5. 6.
Habitat in India.

******* *Fronde supradecomposita.*

POLYPODIUM frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. *Fl. svec.* 852; 949. *Dalib. paris.* 314. Dryopteris.
Polypodium trifidum, ramis pinnatis: pinnis pinnatifidis. *Fl. lapp.* 387.
Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. *Bauh. pin.* 358 *Act. petr.* 10. *t.* 22. *f.* 2.
Filix pumila saxatilis. *Clus. hist.* 2. *p.* 212.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

POLYPODIUM frondibus supradecompositis pi- speluncæ.

losis: foliatis lanceolatis pinnatis: pinnis oppo[illegible] pinnatifidis. *Fl. zeyl.* 384.
Filix bermudensis elegans ramosa, pinnis vario[illegible] dentatis, cauliculis muscosa lanugine obductis *P*[illegible] *alm.* 155. *t.* 244. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

lusitanicum. 65. POLYPODIUM frondibus supradecompositis: [illegible] liolis alternis: pinnis oblongis longitudinaliter p[illegible] natifidis. *Roy. lugdb.* 500.
Filix lusitanica: polypodii radice. *Magn. hort.* 79. *t.*[illegible]
Habitat in Lusitania.

ADIANTUM.

* *Fronde simplici.*

reniforme. 1. ADIANTUM frondibus reniformibus simplicibus [illegible] divisis stipitatis multifloris.
Adiantum monophyllum, foliis asari rotundis. *M*[illegible] *hist.* 3. *p.* 592.
Filix Hemionitis dicta maderensis, foliis asari rot[illegible] dioribus, crenarum segmentis oblongo quadr[illegible] per ambitum circumcirca reflexis. *Pluk. alm.* 15[illegible] 287. *f.* 5.
Hemionitis asari folio. *Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 15[illegible]
Habitat in Madera.

philippense. 2. ADIANTUM frondibus reniformibus simplicibus [illegible] ternis petiolatis lobatis multifloris.
Adiantum philippense, folio rotundo laciniato. *P*[illegible] *gaz.* 8. *t.* 4. *f.* 4.
Habitat in Philippinis.

* * *Fronde composita.*

radiatum. 3. ADIANTUM fronde digitata: foliolis pinnatis: p[illegible] nis unifloris.
Adiantum alis radiatis. *Pet. fil.* 93. *t.* 14. *f.* 3.
Adiantum ramosum radiatum. *Plum. amer.* 33. *t.* 49[illegible]
Adiantum nigrum majus non ramosum, surculis e p[illegible] dunculi summitate tanquam e centro stellæ in[illegible] dum radiatis. *Sloan. jam.* 22. *hist.* 1. *p.* 95.
Adiantum jamaicense, pinnulis auriculatis, ramos[illegible] quinis ramulis ex eodem caulis puncto expan[illegible] *Pluk. alm.* 11. *t.* 253. *f.* 3.
Lonchitis radiata, polytrichi facie. *Plum. fil.* 53. *t.* 10[illegible]

Tricho-

richomanes americanum radiatum. *Moris. hist.* 3. *p.* 590. *f.* 14. *t.* 4. *f.* 9.
Habitat in Jamaica, Domingo.

ADIANTUM frondibus pedatis: foliolis pinnatis: pinnis antice gibbis incisis fructificantibus. *Kalm. it.* 3. *p.* 338. — pedatum.
Adiantum fronde bifida; foliolis alternis pinnatis: pinnis obtusis recurvis superne incisis multifloris. *Roy. lugdb.* 500.
Adiantum fronde supradecomposita bipartita, foliis partialibus alternis: foliolis trapeziformibus. *Gron. virg.* 123.
Adiantum fruticosum americanum, summis ramulis reflexis & in orbem expansis. *Pluk. alm.* 10. *t.* 124. *f.* 2. *Moris. hist.* 3. *p.* 588. *f.* 14. *t.* 5. *f.* 12.
Adiantum fruticosum brasilianum. *Bauh. pin.* 355. *prodr.* 150.
Adiantum americanum. *Corn. canad.* 7. *t.* 6. *Raj. hist.* 148.
Habitat in Canada, Virginia. ♃

ADIANTUM frondibus pinnatis: pinnis oppositis oblongis: terminalibus triangulari-hastatis. † — lanceа.
Adiantum album maximum americanum. *Seb. thes.* 2. *p.* 65. *t.* 64. *f.* 7, 8.
Habitat Surinami.
Stipes *lævis.* Frons *pinnata: foliolis lateralibus oppositis, brevioribus, sæpe duorum parium: impari longiore.* Pinnæ *recurvatæ, oblongæ, obtusæ: terminales majores cordato-s. hastato-triangulares, oblongæ, acutæ.*

ADIANTUM frondibus compositis: pinnis tripartitis obtusis incisis multifloris. — trilobum.
Adiantum triphyllum repens. *Pet. fil.* 100. *t.* 11. *f.* 9.
Habitat in America.

ADIANTUM frondibus pinnatis: pinnis obtusis obovatis serratis unifloris. — serrulatum
Trichomanes majus nigrum, pinnis leviter dentatis trapezii figura. *Sloan. jam.* 17. *t.* 35. *f.* 2.
Habitat in Jamaica.

* * * *Fronde decomposita.*

ADIANTUM frondibus decompositis: pinnis alter- — flabellulatum.

nis rohmbeis rotundatis multifloris, stipitibus supra pubescentibus.

Adiantum chinense perelegans ramosum, folio flabelliformi cum rubedine perfuso. *Pluk. alm.* 11. t. 4. *f.* 3.

Adiantum. foliis coriandri, ramosum. *Raj. hist.* 1853.

Habitat in China. *Osbeck.*

Stipes rami & pedicelli supra canaliculati & ferrugineo-villosi, statura Ari pedati.

trifoliatum. 9. ADIANTUM frondibus decompositis, foliis alternis ternatis linearibus unifloris.

Adiantum clavatum triphyllum. *Pet. fil.* 99. *t.* 11. *f.* 4.

Habitat in America.

chusanum. 10. ADIANTUM frondibus decompositis: pinnis alternatis pinnatifidis: lobis inæqualibus.

Habitat in China.

Frons *lanceolata, glabra.* Foliola *alterna, lanceolata, alternatim pinnata.* Pinnæ *alternatim pinnatifidæ: lobis lineari-cuneiformibus, incisis.*

cristatum. 11. ADIANTUM frondibus bipinnatis: foliolis infimis bipartitis: pinnis lunatis superne multifloris.

Adiantum ramosum, ramis simplicibus longis alternis reflectentibus, foliis trapeziformibus angustioribus. *Brown. jam.* 87.

Adiantum ramosum, foliis trapeziis dentatis. *Plum. amer.* 31. *t.* 46. *fil.* 97.

Adiantum nigrum maximum non ramosum, pinnis crebris majoribus crassis. *Sloan. jam.* 21. *hist.* 1. *p.* 93. *t.* 55. *f.* 1.

Habitat in America *meridionali.*

Capillus veneris. 12. ADIANTUM frondibus decompositis: foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Hudf. angl.* 391.

Adiantum ramis pinnatis, foliis circuli sectorem referentibus. *Sauv. monsp.* 245.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 356. *Mat. med.* 480.

Adiantum. *Cam. epit.* 924.

Habitat in Europa *australi*, Oriente.

villosum. 13. ADIANTUM frondibus bipinnatis: pinnis rhombeis antice extusque fructificantibus, stipite villoso.

Adian-

Adiantum. *Pluk. phyt.* 253. *f.* 1.
Adiantum ſimpliciter ramoſum, foliis majoribus, caule hirſuto. *Brown. jam.* 87.
Habitat in Jamaica.

ADIANTUM frondibus bipinnatis: pinnis ovalibus antice truncatis unifloris, ſtipite hirto. pulverulentum.
Adiantum mas caule ſquamoſo & pediculo pulverulento. *Pet. fil.* 84. *t.* 5. *f.* 7.
Adiantum nigrum ramoſum pulverulentum & falcatum. *Plum. amer.* 32. *t.* 47. *fil. t.* 55. *Raj. ſuppl.* 100.
Habitat in America.

* * * * *Fronde ſupradecompoſita.*

ADIANTUM frondibus ſupradecompoſitis: foliolis alternis: pinnis cuneiformibus integerrimis alternis unifloris. clavatum.
Adiantum fronde ramoſiſſima diviſa: foliolis linearibus retuſis inferne attenuatis. *Hort. cliff.* 474.
Adiantum clavis ſimplicibus. *Pet. fil.* 95. *t.* 14. *f.* 7.
Adiantum minus, foliis in ſummitate retuſis. *Plum. amer.* 34. *t.* 50. *f. B.*
Filicula pinnis obtuſis. *Plum. fil.* 101. *f. B.*
Habitat in Dominica.

ADIANTUM frondibus ſupradecompoſitis: pinnis palmatis multifloris, ſtipite aculeato. aculeatum
Adiantum caule fruticoſo ſupra-decompoſito aculeato, frondibus palmatis. *Hort. cliff.* 473.
Adiantum fruteſcens ſpinoſum & repens. *Plum. fil.* 77. *t.* 94.
Adiantum repens ſpinoſum. *Pet. fil.* 78. *t.* 11. *f.* 6.
Filix ramoſa, major caule ſpinoſo, pinnulis rotundis profunde laciniatis, cerefolii foliis. *Sloan. jam.* 23. *hiſt.* 1. *p.* 99. *t.* 61.
Habitat in Jamaica, Dominica. ♄

ADIANTUM frondibus ſupradecompoſitis: foliolis alternis: pinnis rhombeis inciſis utrinque fructificationibus. *Hudſ. angl.* 391. trapeziforme.
Adiantum fronde alternatim ſupradecompoſita: foliolis trapeziformibus acuminatis, inciſo-crenatis. *Hort. cliff.* 473. *
Adiantum ramoſius, pediculis lucidis & nigis. *Plum. fil.* 78. *t.* 95.

Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis m... trapezii in modum figuratis. *Sloan. jam.* 23. *hist.* ... *p.* 98. *t.* 59. *bona.*
Adiantum fruticosum, coriandri folio, jamaicense pediculis foliorum politiore nitore nigricantibus. *Pluk. alm.* 10. *t.* 254. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali*, Scotia?

exagonum. 18. ADIANTUM frondibus supradecompositis: pinnis sexangularibus emarginatis integerrimis utrinque unifloris.
Adiantum pinnis hexagonis furcatis. *Pet. fil.* 94. *t.* 1... *f.* 2.
Habitat in America.

thiopicum. 19. ADIANTUM frondibus supradecompositis: pinnis integris rotundatis crenatis, petiolatis capillaribus.
Adiantum fruticosum æthiopicum, pinnulis ampli... subrotundis superne dentatis media pinnarum parte petiolis insidentibus. *Pluk. alm.* 10. *t.* 253. *f.* 2.
Habitat ad Cap. b. Spei.

TRICHOMANES.

* *Fronde simplici.*

embranaceum. 1. TRICHOMANES frondibus simplicibus oblongis laceris.
Darea americana lichenoides. *Pet. mus.* 763.
Phyllitis scandens minima, musci facie, foliis membranaceis subrotundis. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. *p.* 74. *t.* 27. *f.* 1. *Moris. hist.* 13. *p.* 558. *Raj. suppl.* 53.
Adiantum membranaceum lichenoides. *Pet. fil.* 101. *t.* 13. *f.* 5.
Filix Hemionitis Lichenoides americana auricularis cæsalpini æmula, radice repente. *Pluk. phyt.* 285. *f.* 3.
Adiantum muscosum lichenis petræi facie. *Plum. amer.* 34. *t.* 50.
Habitat in America.

...pum 2. TRICHOMANES frondibus pinnatifidis lanceolatis: pinnis parallelis subserratis.
Trichomanes fronde lanceolato-pinnata: pinnis sessilibus parallelis subserratis. *Hort. cliff.* 476.
Polypodium crispum calyciferum. *Plum. fil.* 67. *t.* 86.
Darea filicis maris facie. *Pet. fil.* 103. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in Martinica.

3. TRI-

LICHOMANES frondibus lanceolatis pinnatifidis ... pandis, floribus solitariis terminalibus. polypodioides.
... itat in India.
... ns *digiti longitudine & latitudine, pinnatifida fer-* ... *e ad costam, lobis lanceolatis, obtuse serratis, api-* ... *acutis, & unico flore in singuli lobi apice instru-* ... *is.* Frons *insuper pellucida venis alternis.*

* * *Fronde composita.*

ICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis alter- ... is pinnatifidis pilosis. hirsutum.
... ala digitata. *Pium. spec.* 13. *fil. t.* 50. *t. B.*
... ea americana major pubescens. *Pet. muf.* 762.
... ae affinis digitata. *Pet. fil.* 105. *t.* 15. *f.* 5.
... itat in America.

ICHOMANES frondibus sub-bipinnatis: pinnis ... ternis confertis lobatis linearibus. *Hudf. angl.* 392. pyxidiferum.
... k pyxidifera. *Plum. fil.* 74. *t.* 50.
... k humilis repens. *Raj. angl.* 3. *p.* 127. *t.* 3. *f.* 3, 4.
... ae tunbrigensis facie. *Pet. fil.* 104. *t.* 13. *f.* 13.
... itat in America, Anglia.

ICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis ob- ... ngis dichotomis decurrentibus dentatis. *Hudf.* ... gl. 392. tunbrigense.
... ntum petraeum perpusillum anglicum, foliis bifi- ... s trifidisque. *Raj. angl.* 3. *p.* 123. *suppl.* 77.
... ntum radicosum humisparsum s. Filicula pellu- ... a nostras, coriandri foliis mollicellis, globulife- ... m. *Pluk. alm.* 10. *t.* 3. *f.* 5. & 6.
... a tunbrigensis minor. *Pet. muf.* 761.
... cus montanus italicus, adianthi foliis. *Bocc. muf.* *p.* 24. *t.* 2. *f.* 1.
... tat in Anglia, Italia, Jamaica.
... *ulos seminales profert inter valvulas duas foliaceas.*

ICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis ensi- ... rmibus acuminatis inciso-serratis: serraturis bifi- ... s. *Fl. Zeyl.* 385. adianteides.
... ntum africanum rutae murariae aemulum, segmen- ... longioribus acutis. *Pluk. alm.* 10. *t.* 123. *f.* 6.
... non ramosa zeylanica, foliis adianthi in modum ... ratis. *Burm. zeyl.* 97. *t.* 43.
... tat in India, Africa.

 *** Fron-

**** Fronde supradecomposita.*

scandens. 8. TRICHOMANES frondibus supradecompos[...] liolis alternis: pinnis alternis oblongis serrat[...]
Adiantum ramosum scandens, pinnulis s. foliis [...] gis profunde laciniatis pellucidis. *Sloan. jam.* [...] 1. *p.* 96. *t.* 58.
Adiantum scandens ramosissimum, laciniis ret[...] sectum. *Plum. fil.* 76. *t.* 93.
Darea ramosissima scandens. *Pet. fil.* 102. *t.* 12.
Habitat in America.

chinense. 9. TRICHOMANES frondibus supradecompos[...] liolis pinnisque alternis lanceolatis: pinnis [...] cuneiformibus. *Osb. it.* 222. *t.* 6.
Habitat in China. *Osbeck.*
Radix *vix villosa.* Stipes *lævis, antice subca[...] tus, sed margine obtuso, nec marginato ut in[...] ti.* Frons *lanceolata, pedalis ex foliis altern[...] ceolatis.* Folia *alterna, alternatim pinnata[...] alternatim pinnatifidæ segmentis cuneiformibus[...] nis, sæpius bifloris.*

canariense. 10. TRICHOMANES frondibus supradecompo[...] partitis: foliolis alternis: pinnis alternis pinn[...]
Filix ramosa canariensis, rutæ murariæ pinnu[...] stis altius incisis mediæ costæ alternatim [...] *Pluk. alm.* 156. *t.* 2. 291. *f.* 2.
Habitat in Canariis, Lusitania, *ad latera monti[...]*

capillaceum. 11. TRICHOMANES frondibus supradecompo[...] nis filiformibus linearibus unifloris.
Adiantum capillaceum. *Plum. fil.* 83. *t.* 99. *Pet.* [...] *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in America.

MARSILEA.

natans. 1. MARSILEA foliis oppositis simplicibus.
Salvia vulgaris aquis innatans, foliis subrotun[...] ctatis læte virentibus. *Mich. gen.* 107. *t.* 5[...] *it.* 281.
Lenticula palustris latifolia punctata. *Bauh. p[...]*
Lens palustris patavina. *Bauh. hist.* 3. *p.* 785[...]
Habitat in Italiæ *fossis paludosis stagnantibus l[...] entibus; in* America *meridionali.*

RSILEA foliis quaternis. quadrifolia.
ana. *Juss. act.* 1740. *p.* 263. *Guett. stamp.* 1. *p.* 62.
ticula palustris quadrifolia. *Bauh. pin.* 362. *Mapp.*
at. 166. *t.* 166.
palustris quadrifolia. *Bauh. hist.* 3. *p.* 789 *Moris.*
h. 3. *p.* 619. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 5.
palustris altera. *Cam. epit.* 853.
tat in Indiæ, Sibiriæ, Galliæ, Alsatiæ *fossis.*
distinguam, dum præcedens (1) *fuerit examinata.*

PILULARIA.

ULARIA. *Fl. svec.* 2. *p.* 950. globulifera.
laria palustris juncifolia. *Vaill. paris.* 159. *t.* 15. *f.*
Dill. musc. 538. *t.* 79. *f.* 1. *Juss. act.* 1739. *p.* 240.
11.
minifolia palustris repens, vasculis granorum pipe-
æmulis. *Raj. hist.* 1325. *angl.* 3. *p.* 136. *Moris.*
3. *p.* 608. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 49.
men piperinum. *Pet. herb. t.* 19. *f.* 8.
cus aureus capillaris palustris, inter folia follicu-
rotundis quadripartitis. *Pluk. alm.* 246. *t.* 48. *f.* 1.
tat in Europæ *inundatis.*

ISOETES.

ETES. *It. scan.* 417. *t.* 419. *Fl. svec.* 2. *n.* 951. lacustris.
silea foliis subulatis semicylindricis articulatis. *Fl.*
s. 996.
naria folio longiore & graciliore. *Dill. musc.* 541.
80. *f.* 2.
laria lacustris s. Calamistrum herba aquatica alpi-
Raj. angl. 1. *p.* 210. *t.* 210.
tat in Europæ *frigidæ fundis lacuum.*

MUSCI.

LYCOPODIUM.

COPODIUM foliis alternis remotis lanceolatis, linifolium.
ribus axillaribus.
o linariæ foliis. *Dill. musc.* 440. *t.* 57. *f.* 5.
us maximus, linariæ foliis. *Plum. fil.* 144. *t.* 166. *f.* C.B.
tat in America *meridionali.*

2. LY-

nudum. 2. LYCOPODIUM foliis oppositis, spicis termin[illegible] floribus distantibus.

Lycopodioides frutescens, spicis laxis nudis. [illegible] *musc.* 468. *t.* 64. *f.* 4.

Muscus frutescens, fructu tricapsulari. *Plum.* [illegible] *t.* 170. *f. A. A.*

Habitat in Indiis.

Caulis *erectus*, *fere lignosus*, *tetragonus.* Folia [illegible] *ma*, *acuta*, *remotissima*, *opposita.* Rami *ter*[illegible] *dichotomi*, *triquetri*, *erecti.* Pedunculi *bre*[illegible] *alterni*, *laterales*, *uniflori*, *apice bidentati*, [illegible] *bifurcatura* Anthera *sessilis*, *rotundo-tricocca*, [illegible] *cularis*, *polline farta.*

Phlegmaria. 3. LYCOPODIUM foliis verticillato-quaternis, [illegible] terminalibus dichotomis.

Lycopodium erectum dichotomum, foliis cruc[illegible] spicis gracilioribus. *Dill. musc.* 450. *t.* 61. *f.* 5. *Zeyl.* 386. *

Selago indiæ orientalis s. Phlegmaria admirabilis [illegible] lanica. *Breyn. cent.* 186. *t.* 92. *Raj. hist.* 1582. [illegible] 655.

Tana-pouel paatsia maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* [illegible] 14.

Habitat in Malabaria, Zeylona.

clavatum. 4. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, [illegible] teretibus pedunculatis geminis.

Lycopodium caule repente, foliis patulis, pedun[illegible] spica gemina terminatis. *Fl. lapp.* 418. *Fl. svec.* [illegible] 952. *Hort. cliff.* 476. *Mat. med.* 488. *Roy. lugdb.* [illegible] *Hall. helv.* 92. *Dalib. paris.* 339.

Lycopodium vulgare pilosum anfragosum & re[illegible] *Dill. musc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muscus terestris clavatus. *Bauh. pin.* 360. *Pluk.* [illegible] 47. *f.* 8.

Habitat in Europæ *sylvis muscosis.*

rup[illegible] 5. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, [illegible] terminalibus tetragonis.

Lycopodium spica sessili tetragona, squamis cari[illegible] mucronatis. *Amæn. acad.* 2. *p.* 337.

Lycopodium rupestre pilosum & incanum, spicis [illegible] te quadrangulis. *Dill. musc.* 457. *t.* 63. *f.* 11.

Muscus rupestris repens virginianus, clavis folio[illegible] rect[illegible]

ectis quadratis. *Pluk. alm.* 248. *t.* 100. *f.* 2. *Morif.* *ift.* 3. *p.* 624. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 4. *Raj. fuppl.* 32.
bitat in Virginia, Canada, Sibiria.

YCOPODIUM foliis fparfis ciliatis lanceolatis, picis folitariis terminalibus foliofis. Selaginoides.
copodium fpicis folitariis feffilibus, foliis aculeato-iliatis, capfulis tetrafpermis. *Fl. fvec.* 863; 953. *
opodium caule repente, ramis fpica foliis patula ftructis. *Fl. lapp.* 421.
ginoides foliis fpinofis. *Dill. mufc.* 460. *t.* 68. *f.* 1.
bitat in Europæ *pafcuis mufcofis.*

YCOPODIUM foliis fparfis ciliatis linearibus, fpi-is terminalibus foliofis. alopecuroides.
copodium ramis reflexis, apicibus radicatis: folio-is fubulatis bafi ciliatis. *Hort. cliff.* 476.
copodium terreftre repens, caule rotundo foliis enfe obfito radices ad fummitatem emittens & fe ate propagans. *Gron. virg.* 126.
copodium alopecuroides, flagellorum extremitati-us radicofis. *Dill. mufc.* 464. *t.* 62. *f.* 8.
fcus terreftris repens virginianus humi diffufus, vi-iculis longioribus, foliolis tenuibus veftitis. *Morif.* *ift.* 3. *p.* 624. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 12. *Raj. fuppl.* 32.
bitat in Virginia, Canada.

YCOPODIUM foliis fparfis integerrimis, fpicis erminalibus foliofis. inundatum.
copodium caule repente, fpicis folitariis feffilibus oliofis, foliolis lævibus. *Fl. fvec.* 862; 954. *Dalib. arif.* 340.
copodium paluftre repens, clava fingulari. *Vaill. arif.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. mufc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.
bitat in Europæ *inundatis.*

YCOPODIUM foliis fparfis octifariis, caule di-hotomo erecto faftigiato, floribus fparfis. Selago.
copodium caule erecto dichotomo. *Fl. lapp.* 420. *Fl. fvec.* 857; 955. *Mat. med.* 487. *Hort. cliff.* 476. *Amæn. acad.* 2. *p.* 293.
ago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. mufc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.
fcus erectus ramofus faturate viridis. *Bauh. pin.* 360.

Mufcus

Muscus erectus abietiformis. *Moris. hist.* 3. p. 6.. 5. *t.* 5. *f.* 9.
Habitat in Europæ *borealis sylvis acerosis.*

obscurum. 10. LYCOPODIUM foliis sparsis decurrentibus, ... tis repentibus, surculis erectis dichotomis.
Lycopodioides radiatum dichotomum. *Dill. musc.* ... *t.* 67.
Habitat in Philadelphia.
Sarmenta *erecta, dichotoma at non fastigiata, ra... teralibus scilicet brevioribus.* Folia *sparsa* ... *rariora, situ indeterminata, glabra, rigidiuscula, ... nearia, acuta, basi decurrentia s. adnata cauli, ... tula.* Fructificatio *neque a me visa fuit.*

annotinum. 11. LYCOPODIUM foliis sparsis quinquefariis ... ratis, surculis annotino-articulatis, spicis termin... glabris erectis.
Lycopodium caule erecto, spica glabra terminali. *Fl. lapp.* 419. *Fl. svec.* 858; 956. *Hall. helv.* 9..
Lycopodium elatius juniperinum, clavis singularibus sine pediculis. *Dill. musc.* 455. *t.* 63. *f.* 6.
Muscus clavatus, juniperinis foliis reflexis, cl... singularibus sine pediculis. *Moris. hist.* 3. p. ... *f.* 15. *t.* 5. *f.* 3.
Muscus terrestris repens, clavis singularibus ... *Pluk. alm.* 248. *t.* 205. *f.* 5.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

cernuum. 12. LYCOPODIUM foliis sparsis curvatis, caule ra... sissimo, spicis nutantibus.
Lycopodium erectum ramosissimum, spicis ovatis ... libus nutantibus. *Fl. zeyl.* 387.
Lycopodium frutescens capillaceum crispum, sp... brevibus nutantibus. *Dill. musc.* 456. *t.* 63. *f.* 10.
Lycopodium zeylanicum erectum ramosissimum. B... *zeyl.* 144. *t.* 66.
Muscus zeylanicus erectus perpetuo virens, in arb... proceritatem excrescens. *Pluk. alm.* 247. *t.* 47. *f.* ...
Muscus zeylanicus terrestris clavatus erectus. *M... hist.* 3. *p.* 624. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 6.
Muscus clavatus erectus, crispatis foliolis. *Pluk.* ... 149. *t.* 431. *f.* 3.
Muscus maximus, coridis folio, viticulis late ram... *Plum. fil.* 144. *t.* 165.

Bellon-

.on-patsia. *Rheed. mal.* 12. *p.* 73 *t.* 39.
itat in Indiis.

·COPODIUM foliis sparsis imbricatis, ramulis onvolutis. — Bryopteris.
:opodioides squamosum hispidum: extremitatibus onvolutis. *Dill. musc.* 472. *t.* 66. *f.* 11.
scus erectus indicus platyceros filicem referens. *Moris. hist.* 3. *p.* 62. 8. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 51.
:cus filicinus elegans s. Bryopteris. *Pluk. alm.* 247. 100. *f.* 3. *Raj. suppl.* 32.
itat in India.

·COPODIUM foliis quadrifariis imbricatis, caubus repentibus dichotomis, spicis sessilibus tetraonis. *Amæn. acad.* 3. *p.* 363. *f.* 26.* — sangvinolentum.
itat in Camtschatca.

·COPODIUM foliis quadrifariam imbricatis acus, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus tetibus. — alpinum.
:opodium caule repente, ramis tetragonis. *Fl. lapp.* 17. *t.* 11. *f.* 6.* *Fl. svec.* 861; 957.* *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 506. *Hall. helv.* 93.
:opodium sabinæ facie. *Dill. mus. t.* 58. *f.* 2.
scus clavatus, foliis cupressi. *Raj. hist.* 121.
itat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ.

·COPODIUM foliis bifariis connatis: superficiabus solitariis, spicis geminis pedunculatis. — complanatum.
:opodium caule repente, ramis triquetro-planis. *Fl. lapp.* 416. *Fl. svec.* 860; 958.*
:opodium sabinæ facie. *Dill. musc.* 445. *synonyma.*
scus clavatus, foliis cupressi. *Bauh. pin.* 360.
scus terestris ramosus pulcher. *Bauh. hist.* 3. *p.* 59.
:opodium digitatum, foliis arboris vitæ, spicis biemellis teretibus. *Dill. musc.* 448. *t.* 59. *f.* 3.
itat in Europæ & Americæ *septentrionalis sylvis* *erosis.*
er. Lycopodium altissimum, spicis bigemellis quarangulis. *Dill. musc.* 449. *t.* 60. *f.* 4.

·COPODIUM foliis bifariis patulis: superficiabus solitariis, scapis longissimis monostachyis. — carolinianum

Lyco-

Lycopodium pinnatum repens, ſpicis & pedic[illegible]gularibus longis. *Dill. muſc.* 452. *t.* 62. *f.* 6.
Habitat in Carolina.

helveticum. 18. LYCOPODIUM foliis bifariis patulis: ſuper[illegible]bus diſtichis, ſpicis geminis pedunculatis.
Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, pediculis inſidentibus. *Dill. muſc.* 465. *t.* 64[illegible]
Lycopodioides foliis ellipticis alterne maj[illegible] *Hall. helv.* 93.
Muſcus denticulatus major. *Bauh. pin.* 360.
Muſcus repens, foliis alternis ſubrotundis per[illegible]tem falcatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 626. *ſ.* 15. *t.* 6[illegible]
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Carniolæ.

apodum. 19. LYCOPODIUM foliis bifariis: alternis mino[illegible] caule repente, ſpicis ſeſſilibus.
Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, apodibus. *Dill. muſc.* 467. *t.* 64. *f.* 3.
Habitat in Carolina, Virginia, Penſylvania.

flabellatum. 20. LYCOPODIUM foliis bifariis: ſuperficiali[illegible]ſtichis, caule erecto tereti.
Lycopodioides dentatum erectum filicinum, c[illegible]reti ramoſiſſimo. *Dill. muſc.* 468. *t.* 65. *f.* 5.
Muſcus ſquamoſus erectus. *Plum. amer.* 35. *t.* [illegible] *t.* 43. *Raj. ſuppl.* 31.
Habitat in America *calidiore.*

canaliculatum. 21. LYCOPODIUM foliis bifariis: ſuperficiali[illegible]ſtichis, caule erecto canaliculato.
Lycopodioides erectum filicinum, pinnulis [illegible] caule ſulcato. *Dill. muſc.* 469. *t.* 65. *f.* 6.
Muſcus denticulatus major ex Ceram. *Pluk. app.* *t.* 453. *f.* 8.
Habitat in Amboina.

pulmoſum. 22. LYCOPODIUM foliis bifariis patentibus: [illegible]cialibus ſemiovatis ciliatis, ſurculis erecti[illegible] ſpicis terminalibus tetragonis ſeſſilibus.
Lycopodioides dentatum dichotomum rigidum *Dill. muſc.* 471. *t.* 66. *f.* 10.
Muſcus ſquamoſus repens. *Plum. amer.* 36. *t.* 43. *Raj. ſuppl.* 31.
Planta muſcoſa & plumoſa guyanenſis pereleg[illegible]nor. Breyn. cent. 1. p. 194. t. 101.

t in Indiis.
Lycopodioides dichotomum taxiforme. *Dill.* . 471. *t.* 66. *f.* 9.
podioides dentatum dichotomum rigidum minus. *musc.* 471. *t.* 66. *f.* 10.
podioides Lonchitidis auriculatis foliis. *Dill.* . 470. *t.* 66. *f.* 8.

OPODIUM foliis bifariis patentibus: superficia-s distichis, surculis repentibus, spicis sessilibus. ornithopodioides.
podium procumbens repens, ramis subspicatis, olis distichis alternis ovatis appendiculatis. *Fl.* *l.* 388.
podioides repens, pinnulis ornithopodii. *Dill.* . 464. *t.* 66. *f.* 1. *B.*
us lycopodioides denticulatus scandens repensve, xtremitatibus ramulorum polyspermos. *Raj. suppl.*

t in India.

OPODIUM foliis bifariis: superficialibus im-atis, surculis repentibus, floribus sparsis. denticulatum.
podioides imbricatum repens. *Dill. musc.* 462. *t.* *f.* 1. *A.*
us denticulatus minor. *Bauh. pin.* 360.
us terrestris lusitanicus. *Clus. hist.* 2. *p.* 249.
t in Lusitania, Hispania, Iberia.

PORELLA.

LLA. † pinnata.
la pinnis obtusis. *Dill. musc.* 459. *t.* 68. *f.* 1.
t in Pensylvania.
neque ego vidi, nec eam in solo natali investigare pc- *D. Kalm.*

SPHAGNUM.

AGNUM ramis deflexis. *Fl. lapp.* 415. *Fl. svec.* paluſtre.
. 959.
gnum paluſtre molle deflexum, squamis cymbi-nibus. *Dill. musc.* 240 *t.* 32. *f.* 1.
us paluſtris in ericetis nascens. *Pluk. phyt.* 101.
. *Vaill. paris.* 139. *t.* 23. *f.* 3.
gnum paluſtre molle deflexum, squamis capilla-

 ceis.

ceis. *Dill. musc.* 243. *t.* 32. *f.* 2.
Habitat in Europæ *paludibus profundis sylvaticis.*

alpinum. 2. SPHAGNUM subramosum erectum.
Sphagnum subulatum viridissimum, capsulis o[...]
Dill. musc. 245. *t.* 32. *f.* 3.
Habitat in Angliæ *summis alpium paludibus.*

arboreum. 3. SPHAGNUM ramosum repens, antheris lateral[...]
secundis. *Hudf. angl.* 396.
Sphagnum heteromallum polycephalon. *Dill.* [...]
248. *t.* 32. *f.* 6.
Habitat in Europa *super truncos arborum.*

BUXBAUMIA.

aphylla. 1. BUXBAUMIA. *Hall. helv.* 10. *Amæn. acad.* 5[...]
t. 1. *Schmied. diss. propr.* *
Muscus capillaceus aphyllus, capitulo crasso [...]
vi. *Buxb. cent.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 2. *Dill. musc.*
t. 68. *f.* 5.
Habitat in Svecia, Norvegia, Rutheno, Dani[...]
mania. Italia.

PHASCUM.

acaulon. 1. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis ovat[...]
tis conniventibus. *Fl. svec.* 2. *n.* 960.
Sphagnum acaulon bulbiforme majus. *Dill. musc.*
t. 32. *f.* 11.
Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Pet.*
126. *t.* 95. *f.* 14.
β. Sphagnum acaulon bulbiforme minus. *Dill. musc.*
t. 32. *f.* 12.
Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill.*
128. *t.* 27. *f.* 2.
Habitat in Europæ *agris, hortis & ad fossas.*

subulatum. 2. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis sub[...]
setaceis patulis. *Hudf. angl.* 397.
Sphagnum acaulon trichodes. *Dill. musc.* 251. *t.* 32[...]
Muscus trichodes minor acaulos, capillaceis foli[...]
musf. 87. *Vaill. parif.* 128. *t.* 29. *f.* 4.
Habitat in Europa. *Schreber.*

caulescens. 3. PHASCUM caulescens erectum.

Sp[...]

Sphagnum foliis tenuibus gramineis pellucidis. *Dill. musc.* 550. *t.* 85. *f.* 15.
Habitat in Pensylvania.

PHASCUM caulescens repens. repens.
Sphagnum vermiculare repens, capsulis intra foliorum squamosorum alas minimis. *Dill. musc.* 550. *t.* 85. *f.* 16.
Habitat in arborum truncis.

FONTINALIS.

FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Fl. svec.* 866; 961. antipyretica.
Fontinalis capitulis lateralibus. *Roy. lugdb.* 506.
Fontinalis triangularis major complicata e foliorum alis capsulifera. *Dill. musc.* 254. *t.* 33. *f.* 1.
Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Vaill. paris.* 140. *t.* 33. *f.* 5.
Muscus aquaticus, terrestri vulgari similis, major. *Buxb. cent.* 3. *p.* 39. *t.* 69. *f.* 2.
Muscus aquaticus, viticulis longis minus ramosis lucidis. *Moris. hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 32.
Muscus aquaticus denticulatus. *Læs. pruss.* 173. *t.* 52.
Habitat in Europæ *fluviis.*

FONTINALIS foliis ovato-lanceolatis trifariis acutis, passim geminis, antheris terminalibus. minor.
Fontinalis triangularis minor carinata, e cymis capsulifera. *Dill. musc.* 257. *t.* 33. *f.* 2.
Fontinalis capitulis terminalibus. *Roy. lugdb.* 506.
Habitat in Europæ *fluviis.*
Folia complicato-carinata, in ramis crassioribus gemina.

FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capitulis lateralibus. squamosa.
Fontinalis squamosa tenuis sericea atrovirens. *Dill. musc.* 259. *t.* 33. *f.* 3.
Fontinalis minor lucens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 778.
Habitat in Britannia, Gallia.

FONTINALIS foliis bifariis patentibus, capsulis lateralibus. pennata.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. *t.* 32. *f.* 9.

Sphagnum cauliferum & ramosum, foliis crispis, crebris per caulem capitulis. *Hall. helv.* 96. *t.* 3. *f.* 1.
Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Vaill. parif.* 129. *t.* 27. *f.* 4.
Habitat in Helvetiæ *arboribus.*
Confer. SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. *t.* 32. *f.* 8.
SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina pilosa. *Dill. musc.* 249. *t.* 32. *f.* 7.

SPLACHNUM.

rubrum. 1. SPLACHNUM umbraculo orbiculari hemisphærico. *Amæn. acad.* 2. *p.* 272. *t.* 3. *f.* 2. * *Fl. svec.* 2. *n.* 963.
Muscus norvegicus, umbraculo ruberrimo insignitus. *Pet. musc.* 70. *t.* 1. *f.* 10. *Dill. musc.* 547. *t.* 83. *f.* 9.
Muscus coronatus norvegicus, pediculo longissimo umbraculo amplo. *Moris. hist.* 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Norvegia, Finlandia, Russia, Sibiria.
Affine proximum ultimi.

luteum. 2. SPLACHNUM umbraculo orbiculari plano. *Amæn. acad.* 2. *p.* 277. *t.* 3. *f.* 1. * *Fl. svec.* 2. *n.* 964.
Habitat in Sveciæ *paludibus sylvaticis.*
Affine proximum sequentis.

ampullaceum. 3. SPLACHNUM umbraculo ampullaceo obconico. *Amæn. acad.* 2. *p.* 280. *Fl. svec.* 2. *n.* 965.
Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo strictiore. *Dill. musc.* 343. *t.* 44. *f.* 3.
Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. *Vaill. parif.* 130. *t.* 26. *f.* 4.
Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminis erectis mutuo incubitu adnatis. *Pluk. alm.* 246. *Morif. hist.* 3. *p.* 629. *f.* 15. *t.* 16. *f.* 10.
Habitat in Europæ *paludibus cespitosis* nec nisi stercore conspurcatis; *anne naturæ lusus totum hoc genus an hoc Mnii fontani mera varietas?*

vasculosum. 4. SPLACHNUM umbraculo ampullaceo subgloboso. *Amæn. acad.* 2. *p.* 282.
Muscus capillaceus, capitulis pyriformibus tubulo. *Buxb. cent.* 2. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

Hab.

tat cum præcedenti in Sveciæ borealis paludibus cespi-
is, locis stercoratis.
e præcedenti, sed illi umbraculum magis turbinatum
flavum; huic fere globosum sanguineum. Affine ni-
um Mnnio annotino.

POLYTRICHUM.

.YTRICHUM caule simplici (Fl. lapp. 395.) an-
era parallelepipeda. Fl. svec. 868; 966. Dalib. paris.
6.
trichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ser-
is. Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.
trichum aureum majus. Bauh. pin. 356.
us juniperifolius, capitulo quadrangulo. Vaill.
ris. 131. t. 23. f. 8.
trichum quadrangulare, juniperi foliis breviori-
s & rigidioribus. Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.
trichum aureum medium. Bauh. pin. 356.
us coronatus humilis. Moris. hist. 3. p. 630. f. 15.
7. f. 6. 8.
us erectus, juniperi folio glauco. Vaill. paris.
1. t. 23. f. 6.
ytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pi-
is. Dill. musc. 426. t. 54. f. 3.
tat in Europæ α. uliginosis, β. pascuis, γ sterı-
imis. ♃

communune.

.YTRICHUM caule ramosissimo, pedunculis ter-
nalibus.
trichum alpinum ramosum, capsulis e summitate
ipticis. Dill. musc. 427. t. 55. f. 4.
tat in Alpibus Helvetiæ, Snowdon.

alpinum.

.YTRICHUM caule ramosissimo, pedunculis
illaribus.
trichum caule ramoso, capsulis basi destitutis apo-
ysi. Fl. svec. 870; 967. Dalib. paris. 315.
trichum ramosum, setis ex alis urnigeris. Dill.
sc. 427. t. 55. f. 5.
cus ramosus erectus, calyptra villosa. Vaill. paris.
1. t. 28. f. 13.
tat in Europa, Jamaica.

urnigerum.

MNIUM.

lucidum. 1. MNIUM caule simplici, foliis ovatis. *Fl. svec.* 968.

Mnium serpilli foliis tenuibus pellucidis. *Dill.* 232. *t.* 31. *f.* 2.

Bryum alternans calyptra variegata & scyphulis liosis. *Hall. helv.* 118. *t.* 4. *f.* 8.

Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Vaill. parif.* 130. *t.* 24. *f.* 7.

Habitat in Europæ *pascuis succulentis umbrosis.*

ontanum. 2. MNIUM caule simplici geniculis inflexo. *Fl.* 414. *Fl. svec.* 913; 969.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis gnis subrotundis. *Dill. musc.* 340. *t.* 44. *f.*

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longo purpurascente, capitulo rotundiore T. *Vaill.* 134. *t.* 24. *f.* 10.

Muscus trichodes palustris erectus coronatus, capitulis sphæricis amplioribus. *Moris. hist.* 3. *p.* 628. *t.* 6. *f.* 8.

Muscus parvus stellaris. *Pluk. alm.* 255. *t.* 47. *f.* 6.

Habitat in Europa *ad fontes paludosos frigidos.*

palustre. 3. MNIUM caule dichotomo, foliis subulatis. *Fl.* 413. *Fl. svec.* 912; 970.

Mnium majus. ramis longioribus bifurcatis. *Dill.* 233. *t.* 31. *f.* 3.

Muscus palustris erectus flavescens, capillaceo fol. *Vaill. parif.* 135. *t.* 24. *f.* 1.

Muscus palustris, flagellis erectis luteolis raro divi capitulis oblongis adianti. *Morif. hist.* 3. *p.* 629. 15. *t.* 6. *f.* 9.

Muscus stellaris ramosus palustris, pediculo erecto, capitulo magno sphærico. *Buxh. cent.* *p.* 45. *t.* 65. *f.* 1. 2. 3. 4.

Habitat in Europæ *paludibus.*

ndrogynum. 4. MNIUM, caule ramoso, androgynum. *Fl. svec.* 971.

Mnium perangustis & brevibus foliis. *Dill. musc.* *t.* 3. *f.* 1.

Bryum angustiori folio, capsula longa pyriformi nata. *Hall. helv.* 114.

Musc

les: muscus capillaris minimus, capitulo mini-
ulverulento. *Vaill. parif. t.* 29. *f.* 6.
trichodes parvus, capitulo glomerato s. botry-
Mich. gen. 108. *t.* 59. *f.* 8. H. K.
coronatus humilis minimus, foliolis pediculis
itulis minimis erectis. *Morif. hift.* 3. *p.* 631. *f.*
7. *f.* 20.
in Europæ *fylvis.*

M acaule, anthera nutante, calyptra reflexa **hygrometricum.**
ona.
capsula nutante turbinato-ovata, calyptra re-
quadrangulari. *Fl. fvec.* 903; 972. *Dalib. parif.*

bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari
lis pyriformibus nutantibus. *Dill. mufc.* 407. *t.*
75.
foliis scutellatis, capitulo pyriformi nutante.
parif. 135. *t.* 26. *f.* 16.
coronatus minor, foliolis latiusculis ad cau-
onvolutis, capitulis cernuis & obtusis aureis.
f. hift. 3. *p.* 631. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 17.
in Europæ *fylvis apricis fterilibus.*

M caule dichotomo: axillis pedunculiferis, **purpureum**
ra erecta, foliis carinatis.
capsula erectiuscula oblonga, caulium divisu-
dunculiferis: summitatibus stellatis, foliis ca-
s. *Fl. fvec.* 896; 973. *Dalib. parif.* 325.
tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. mufc.*
t. 49. *f.* 51.
trichodes parvus, foliis musci vulgaris, ca-
s longis acutis. *Morif. hift.* 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6.
16.
in Europæ *pafcuis.*
M antheris erectis, operculis filiformibus lon- **fetaceum.**
ine antherarum. *Fl. fvec.* 2. *n.* 974. *
stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis.
mufc. 381. *t.* 48. *f.* 44.
in Europæ *muris*, *aggeribus*, *fepibus.*
erecti, breviffimi. Pedunculi *atropurpurei, fle-*
Antheræ cylindricæ, lividæ. Opercula & Ca-
æ filiformes, longiores & anguftiores, quam in
is.

cirratum. 8. MNIUM foliis arefactione revolutis. *Fl. svec.* 1 975.
Bryum cirratum & stellatum, tenuioribus foliis. mujc. 379. t. 48. f. 42.
Muscus muralis minimus roseus stellaris. *Vaill.* 130. t. 24 f. 8.
Habitat in Europæ *sylvis & ad sepes.*

annotinum. 9. MNIUM foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedi lis subradicalibus, anthera nutante. *Fl. svec.* 2. n.
Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, ca oblongis pendulis. *Dill. musc.* 399. t. 50. f. 68.
Habitat in Europæ *humidiusculis.*

hornum. 10. MNIUM antheris pendulis, pedunculo cu surculo simplici, foliolis margine scabris. *Fl* 2. n. 977.
Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magn tantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.
Muscus capillaceus major stellatus. *Vaill. paris.* f. 4. 5.
Muscus polytrichoides humilior, foliis brevi raris pallide viridantibus & vix pellucidis. *hist.* 3. p. 630. s. 15. t. 6. f. 3. 4.
Habitat in Europæ *sylvis, aggeribus.*

crudum. 11. MNIUM antheris pendulis, calyptra recurva lis pellucidis.
Bryum capsulis pendulis, calyptra recurvata, subulatis acutis integerrimis, caule simplic *Fl svec.* 907; 979.
Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanc & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 70.
Habitat in Europæ *sylvis & declivitatibus.*

pyriforme. 12. MNIUM antheris pendulis turbinatis, stipi formi, floribus femineis setiferis.
Bryum antheris nutantibus turbinatis, foliis ensi bus nitidis. *Fl. svec.* 902; 980.
Bryum trichodes aureum, capitulis pyriformib tantibus. *Dill. musc.* 391. t. 50. f. 90.
Habitat in Europæ *rupibus.*

olytrichoides. 13 MNIUM calyptra villosa. Fl. svec. 2. n. 983
Polytrichum nanum, capsulis subrotundis g

.loës folio non ferrato. *Dill. musc.* 428. *t.* 55. *f.* 6.
Dalib. *parif.* 315.
Muscus capillaceus minor, calyptra tomentofa. *Vaill.* *parif.* 131. *t.* 26. *f.* 15.
Muscus coronatus rigidus minor & humilior capitulis villosis brevioribus. *Morif. hift.* 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 7.
Polytrichum parvum, aloës folio ferrato, capfulis oblongis. *Dill musc.* 429. *t.* 55. *f.* 7.
Adianthum aureum medium, in ericetis proveniens. *Vaill. parif.* 131. *t.* 29. *f.* 11.
Muscus, adianti aurei facie, humilis, capitulo rotundo turgido, calyptra villofa incana. *Buxb. cent.* . *p.* 43. *t.* 63. *f.* 1.
Polytrichum acaulon capillaceum, capfulis cylindricis. *Dill. musc.* 434. *t.* 55. *f.* 12.
Habitat in Europæ *ericetis fubudis.*
Calyptra villofa patula eft ipfa Anthera major.

MNIUM pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. — *ferpyllifolium*

Mnium pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtufis punctatis. — *punctatum.*
Mnium capfulis nutantibus, foliis fubovatis obtufis pellucidis punctatis, caulibus fterilibus procumbentibus, pedunculis aggregatis. *Fl. fvec.* 901; 982. *Dalib. parif.* 323.
Mnium caule procumbente, foliis alternis ovatis pellucidis. *Fl. lapp.* 404.
Mnium pendulum, ferpilli folio rotundiore pellucido, capfulis ovatis. *Dill. musc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.
Muscus folio lato fubrotundo, capitulo fingulari nutante, pediculo longo fubrubenti infidente. *Vaill. parif.* 136. *t.* 26. *f.* 5.
Muscus polytrichoides paluftris, major ferpilli latioris folio pellucido. *Morif. hift.* 3. *p.* 627. *f.* 15. *t.* 6. 39. 40.

Mnium pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ferratis. — *cuspidatum.*
Mnium pendulum, foliis variis pellucidis, capfulis ovatis. *Dill. musc.* 413. *t.* 53 *f.* 79.
Muscus paluftris, foliis fubrotundis. *Vaill. parif.* 26. 18.
Muscus polytrichoides pellucidus fere, foliis denticulatis ad margines veluti crifpis. *Pluk. alm.* 257. *t.* 98. *f.* 8.

proliferum. γ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis rofaceo-cong lanceolatis acutis.

Bryum ftellare rofeum majus, capfulis ovatis pend *Dill. mufc.* 411. *t.* 52. *f.* 77.

Mufcus ftellaris rofeus. *Bauh. pin.* 361. *prodr.* *Buxb. cent.* 2. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

Mufcus coronatus humilis, foliolis latioribus ftel nafcentibus donatus. *Morif. hift.* 3. *p.* 630. *f.* 7. *f.* 9.

undulatum. δ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis oblongis latis.

Bryum caule adfcendente, foliis ovato-oblongi tulis pellucidis. *Fl. lapp.* 399. *Roy. lugdb.* 502. *ftamp.* 90. *Dalib. parif.* 324.

Bryum dendroides polycephalon, phyllidis foli dulato pellucido, capfulis ovatis pendulis. *mufc.* 410. *t.* 52. *f.* 76.

Mufcus rofeus polycephalus, linariæ foliis und *Vaill. parif.* 135. *t.* 24. *f.* 3. *Mich. gen.* 108. *f.* 5.

Habitat in Europa *fere ubique.*

Varietates has pro diftinctis fpeciebus fumunt varii; ob fuas cauffas ita conjunxi, ut qui diftinguendas facile diftinctas tradat.

triquetrum. 15. MNIUM foliis trifariis patulis fubulato-lance carinatis. *Fl. fvec.* 2. *n.* 978.

Bryum annotinum paluftre, capfulis ventricofis dulis. *Dill. mufc.* 404. *t.* 51. *f.* 72?

Mufcus denticulatus lucens fluviatilis maximus morum apices adianthi capitulis ornatus. *Vai rif.* 135. *t.* 24. *f.* 2. 2?

Habitat in Sveciæ *paludibus turfofis.*

Caules *plurimi, in cæfpitem congefti, digitales & l res, tomentofi.* Folia *trifariam pofita, unde triquetri patuli, recentia pallide viridia; antiqua parva, diftantia, carinata, acuminata.* Pedunc *litarii, longiffimi, terminales purpurei.* Anther *ctæ, obliquæ f. arcuatæ, obtufiffimæ, flavæ.* Cal *fubulata.* Stellæ *femineæ ramos terminant in eade ta cum capfula, fed diftinctis ramis.*

trichomanis. 16. MNIUM foliis diftichis integerrimis. *Fl. fvec.* 985.

Mnit

...m trichomanis facie, foliolis integris. *Dill. musc.* ... *t.* 31. *f.* 5.
...at *in* Sveciæ, Angliæ *udis.*

...IUM foliis distichis bifidis. fissum.
...m trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill. musc.* ... *t.* 31. *f.* 6.
...rmannia terrestris repens, foliis ex rotunditate ...minatis bifidis, apertura pene visibili. *Mich. gen.* ... 5. *f.* 14.
...at *in* Europæ *riguis.*

...IUM foliis distichis, pinnis subtus auriculatis. jungermannia.
...m caule procumbente simplici, foliis imbricatis ...egerrimis alternis antice appendiculatis. *Fl. svec.* ...4; 984. *
...enastrum alpinum purpureum, foliis auritis & ...chleariformibus. *Dill. musc.* 479. *t.* 69. *f.* 1.
...rmannia alpina palustris purpurea cambrica, fo...s rotundioribus auritis tenuissime denticulatis. ...*ich. gen.* 6. *t.* 5. *f.* 16.
...at *in* Europæ *subhumidis.*

BRYUM.

* *Antheris sessilibus.*

...YUM antheris sessilibus terminalibus, calyptra ...nima. apocarpum.
...gnum caulibus ramosis, foliis undique imbricatis ...psulas obtegentibus. *Fl. svec.* 865; 986.
...gnum foliis pilo terminatis. *Roy. lugdb.* 500.
...gnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubel... *Dill. musc.* 245. *t.* 32. *f.* 4.
...cus apocarpos hirsutus, saxis adnascens, capitulis ...scure rubris. *Vaill. paris.* 129. *t.* 21. *f.* 15.
...gnum nodosum hirsutum incanum. *Dill. musc.* ... *t.* 32. *f.* 5.
...cus squamosus saxatilis tortuosus ac nodosus. ...*ill. paris.* 123. *t.* 27. *f.* 18.
...at *in* Europæ *saxis, arboribus.*

...YUM antheris subsessilibus sparsis, calyptris stri... sursumve pilosis. striatum.
...trichum calyptra striata sursumve pilosa. *Fl. svec.* ...9; 987. *Dalib. paris.* 314.

Poly-

Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis [illegible] majus. *Dill. muſc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.
Muſcus apocarpos arboreus ramoſus. *Vaill. pari*ſ. *t.* 25. *f.* 5. 6.

β. Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis, ſeſſili[illegible] nus. *Dill. muſc.* 431. *t.* 55. *f.* 9.
Muſcus capillaceus minimus acaulos, calyptra [illegible] *Vaill. pariſ.* 30. *t.* 27. *f.* 10.
Muſcus humilis tectorum ſubfuſcus, capitulis bus pileolis erectis, pedunculis curtis. *Mo*[illegible] 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 13.

γ. Polytrichum capſulis ſeſſilibus, foliis brevi[illegible] ctis carinatis. *Dill. muſc.* 432. *t.* 55. *f.* 10.

δ. Polytrichum capillaceum criſpum, calyptris piloſiſſimis. *Dill. muſc.* 433. *t.* 55. *f.* 11.
Muſcus capillaceus minimus, calyptra villoſa. *pariſ.* 130. *t.* 26. *f.* 9.
Habitat in Europæ *α. arboribus, β. ſaxis, γ. δ. ſylvis.*
Proximum Polytrichis, ſed absque apophyſi ſub an[illegible]

* * *Antheris pedunculatis erectis.*

pomiforme. 3. BRYUM antheris erectis ſphæricis. *Fl. ſvec.* 8[illegible] *Dalib. pariſ.* 317.
Bryum caule erecto, foliis ſetaceis, capitulis [illegible] *Fl. lapp.* 400.
Bryum capillaceum, capſulis ſphæricis. *Di*[illegible] 339. *t.* 44. *f.* 1.
Muſcus trichodes minimus ſericeus capillace[illegible] tulis ſphæricis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t*[illegible] *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 24. *f.* 9. 12.
Habitat in Europæ *ſcopulis humoſis.*

pyriforme. 4. BRYUM antheris erectis obovatis, calypt[illegible] lata, ſurculis acaulibus, foliis ovatis mutic[illegible]
Bryum antheris erectis turbinato-ovatis: oper[illegible] tuſiuſculo. *Fl. ſvec.* 890; 989. *Dalib. pariſ.* [illegible]
Bryum ſerpillifolium pellucidum, capſulis py[illegible] bus. *Dill muſc.* 345. *t.* 44. *f.* 6.
Muſcus capillaceus minimus, capitulis pyrif[illegible] turgidis. *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 29. *f.* 3.
Muſcus minimus latifolius, capitulis erectis [illegible] *Buxb. cent.* 1. *p.* 44. *t.* 64. *f.* 1.

M

[illegible]us coronatus humilis stellaris, foliis latiusculis, [illegible]pitulis pyriformibus erectis turgidiusculis. *Mo-* [illegible] *hist.* 3. *p.* 631. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 16.
[illegible]at *in* Europæ *pratis ad aggeres.*

[illegible]UM anthera erecta oblonga minori, calyptris la-[illegible] æqualibus. *Fl. svec.* 891; 990. *Dalib. paris.* 325. — extinctorium.
[illegible]m, calyptra extinctorii forma, minus. *Dill. musc.* [illegible]9. *t.* 45. *f.* 8.
[illegible]us capillaceus minimus, calyptra longa conoide [illegible]ida. *T. Vaill. paris.* 137. *t.* 26. *f.* 1.
[illegible]us capillaris minimus cucullatus. *Magn. hort.* [illegible]5. *t.* 82.
[illegible]us coronatus humilis tenuifolius, pileolo magno [illegible]to infra aperto extinctorium referente. *Moris.* [illegible] 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 12.
[illegible]m calyptra extinctorii figura, majus & ramosum. [illegible] *musc.* 350. t. 45. *f.* 9.
[illegible]at *in* Europæ *arenosis.*

[illegible]UM antheris erectis subulatis, surculis acau-[illegible]us. *Fl. svec.* 2. *n.* 991. — subulatum.
[illegible]m capsulis longis subulatis *Dill. musc.* 350. *t.* 45. [illegible]10.
[illegible]us capillaris, corniculis longissimis incurvis R. [illegible]*ill. paris.* 133. *t.* 25. *f.* 8.
[illegible]at *in* Europæ *aggeribus humidiusculis.*

[illegible]UM antheris erectiusculis, foliis piliferis recur-[illegible]. *Fl. svec.* 900; 992. *Dalib. paris.* 320. *It. scan.* 118. — rurale.
[illegible]m caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, [illegible]itulis falcatis. *Fl. lapp.* 397.
[illegible]m rurale ungviculatum hirsutum elatius & ramo-[illegible]. *Dill. musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.
[illegible]us capillaris tectorum, densis cæspitibus nascens, [illegible]itulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinen-[illegible]us. *Vaill. paris.* 133. *t.* 25. *f.* 3.
[illegible]us erectus hirsutus, capitulis longis acutis ungvi-[illegible]is avicularum similibus, vulgatissimus. *Moris.* [illegible] 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 12.
[illegible]at *in* Europæ *muris, rusticorum tectis, arborum* [illegible]*cis.* ♃

[illegible]UM antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, [illegible]culis simplicibus cæspitosis. *Fl. svec.* 2. *n.* 993. — murale.

Bryum

Bryum tegulare humile pilosum & incanum 355. *t.* 45. *f.* 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis, mus, foliis in pilum desinentibus. *Vail.* *t.* 24. *f.* 15.

Muscus vulgaris omnium vulgatissimus no *Vaill. paris.* 133. *t.* 24. *f.* 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis, mus non villosus. *Vaill. paris. t.* 25. *f.* 4.

Habitat in Europæ *saxis, muris, tectis,* teg

scoparium. 9. BRYUM antheris erectiusculis, peduncl gatis, foliis secundis recurvatis, caule *Fl. svec.* 898; 995. *Dalib. paris.* 319.

Bryum caule inclinato, foliis arrectis subul tulis erectiusculis. *Fl. lapp.* 398.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scopa *Dill. musc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Muscus capillaceus major, pediculo & ca nuioribus. *Vaill. paris.* 132. *t.* 28. *f.* 11.

Muscus capillaceus, foliis pallidis, pediculis communi theca egredientibus. *Buxb. cent.* 2. p.

Habitat in Europæ *sylvis arenosis, in truncis* p

undulatum. 10. BRYUM antheris erectiusculis, peduncul tariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis ferratis. *Fl. svec.* 899; 996. *Dalib. paris.* 320

Bryum phyllidis folio rugoso acuto, capsulis *Dill. musc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Muscus erectus, linariæ folio, major. *Vail.* *t.* 26. *f.* 17.

Habitat in Europæ *sylvis, aggeribus, pratis*

glaucum. 11. BRYUM antheris erectiusculis: operculo liis erectis imbricatis, surculis ramosis. *Fl. svec.*

Bryum albidum & glaucum fragile majus, fetis brevibus. *Dill. musc.* 362. *t.* 46. *f.* 20.

Muscus trichodes montanus albidus fragilis. 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 22.

Muscus erectus capillaceus densissimus, gl *Vaill. paris.* 131. *t.* 26. *f.* 13.

Muscus saxatilis ericoides. *Bauh. pin.* 361.

Habitat in Europæ *ericetis apricis.*

Stirps facie Sphagni palustris, foliis albicanti culo admodum subulato.

12.

YUM antheris erectis, foliis lingulatis obtusis albidum. tulis. †
m nanum, larigiuis foliis albis. *Dill. musc.* 364. 46. *f.* 21.
at in Insula Providentiæ.

TUM antheris erectiusculis, foliis recurvis acu- pellucidum , caule hirsuto. *Fl. svec.* 2. *n.* 997.
m palustre pellucidum, capsulis & foliis brevibus urvis. *Dill. musc.* 364. *t.* 46. *f.* 23.
us polytrichodes elatior, foliis angustis pelluci- & fere membranaceis. *Pluk. alm.* 247. *t.* 44. *f.* 7.
us polytrichodes angustifolius pellucidus ramosus. *k. alm.* 247.
im erectis capitulis brevibus, foliis reflexis. *Dill. c.* 365. *t.* 46. *f.* 24.
at in Europæ *paludibus.*

UM antheris erectis: operculo aciformi, foliis aciculare. ctis subsecundis.
n montanum hemiheterophyllum, operculis acu- *Dill. musc.* 366. *t.* 46. *f.* 25.
at in Anglia.

TUM antheris erectis, foliis setaceis, peduncu- flexuosum flexuosis. *Fl. svec.* 892; 998.
n pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 373. 7. *f.* 33.
at in Europæ sylvis.

UM antheris erectis, foliis setaceis secundis. heteromallum. *svec.* 895; 999.
n heteromallum. *Dill. musc.* 375. *t.* 47. *f.* 37.
is capillaceus, foliis unam partem spectantibus. *ll. parif.* 132. *t.* 27. *f.* 7.
is trichodes, foliis capillaceis, capitulis minori- . *Moris. hist.* 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 5. 7.
t in Europæ *ericetis*, *juniperetis.*

UM antheris erectis, foliis setaceis inermibus tortuosum. tate retorquentibus. *Fl. svec.* 897; 1000.
ı alpinum, crinium crisporum simile, capsula ata. *Hall. helv.* 110. *t.* 4. *f.* 2.
ı cirratum, setis & capsulis longioribus. *Dill.* . 377. *t.* 48. *f.* 40.

Muscus

Muscus alpinus cirrhosus s. crinium tortorum h crispatus. *Scheuch. alp.* 65. *t.* 19. *f.* 15.
Muscus helveticus trichodes crispatus. *Pet. gaz.* *t.* 65. *f.* 8.
Habitat in montibus Helvetiæ, Sveciæ, Cambriæ

truncatulum. 18. BRYUM antheris erectis subrotundis: operculi cronato. *Fl. svec.* 889; 1001. *Dalib. paris.* 313.
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dil* 347. *t.* 45. *f.* 7.
Muscus capillaceus, omnium minimus. *Vaill. par* *t.* 26. *f.* 2.
Muscus stellaris minimus, pediculo brevissimo tulis turgidis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 4. *t.* 2. *f.* 1
Muscus coronatus minimus, foliis & capitulis gis in pediculis brevissimis. *Moris. hist.* 3. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 18.
Hyssopus Salomonis. *Hasselquist.*
Habitat in Europa *ad agros, fossas, & sepes.*
Capsulæ *amisso operculo apparent valde truncata tæ & rufæ, quibus manifeste differt a sequente.*

viridulum. 19. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lan acuminatis imbricato-patulis *Fl. svec.* 893;
Bryum capillaceum breve, pallide & læte vir psulis ovatis. *Dill. musc.* 380. *t.* 48. *f.* 43.
Muscus capillaceus omnium minimus, folioli ribus & angustioribus. *Vaill. paris.* 130. *t.*
Habitat in Europæ *agris, aggeribus.*
Folia *viridissima.* Capsulæ *flavescentes, ciliata*

paludosum. 20. BRYUM acaulon, foliolis setaceis, anthe sissimis patulis. *Fl. svec.* 2. *n* 1004.
Bryum trichodes acaulon palustre minimum capsulis brevissimis. *Dill. musc.* 387. *t.* 49.
Habitat in Europæ *humidis.*
Differt a viridulo, capsulis fuscis & foliis sicci me crispis.

Hypnoides. 21. BRYUM antheris erectis, caule erectiuscul lateralibus brevibus fertilibus. *Fl. lapp.* 39 894; 1003. *Dalib. paris.* 326.
Bryum hypnoides polycephalon lanuginosu num. *Dill. musc.* 372. *t.* 47. *f* 32.
Muscus alpinus ramosior erectus, flagellis bre lanuginosus. *Pluk. alm.* 255. *t.* 47. *f.* 5.

Muscus terrestris vulgari similis, lanuginosus. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 7.
Bryum hypnoides hirsutie virescens fasciculare alpinum. *Dill. musc.* 370. *t.* 47. *f.* 28.
Bryum hypnoides, ericæ facie, capsulis barbatis, alpinum. *Dill. musc.* 371. *t.* 47. *f.* 31.
Habitat in Europæ *frigidæ rupibus, saxis, sabulosis.*

verticillatum.

BRYUM antheris erectis, pedunculis siccitate contortis, foliis piliferis, surculis fastigiatis.
Bryum pilosum verticillatum. *Dill. musc.* 374. *t.* 47. *f.* 35.
Habitat *ad latera collium.*

æstivum.

BRYUM antheris erectis subrotundis axillaribus, foliis subulatis distantibus. *Hudſ. angl.* 411.
Bryum palustre æstivum, conservæ facie. *Dill. musc.* 375. *t.* 47. *f.* 36.
Habitat *in* Europæ *paludibus.*

[...]ccisſi.

BRYUM antheris erectiusculis; pedunculis longissimis, foliis setaceis, surculis acaulibus. *Fl. svec.* 2. *n.* 1005.
Bryum trichodes acaulon minimum, setis & capsulis oblongis. *Dill. musc.* 388. *t.* 49. *f.* 54.
Habitat Upsaliæ.

trichodes.

BRYUM antheris erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunculo longissimo. *Fl. svec.* 2. *n.* 1006.
Bryum trichodes aureum, capsulis incurvis obtusis in setis longis. *Dill. musc.* 389. *t.* 49. *f.* 58.
Habitat *in* Svecia, Germania.

squarrosum.

BRYUM antheris obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoso. *Fl. svec.* 2. *n.* 1007.
Muscus palustris, foliis reflexis cauliculos quinquangulos formantibus. *Buxb. cent.* 4. *p.* 36. *t.* 65. *f.* 1.
Habitat *in* Europæ *borealis paludibus apricis. Læſl.*
Muscus *distinctissimus ab Hypno squarroso.* Surculi *plures, conferti, erectiusculi, undique fusco-pubescentes:* Ramo *uno alterove brevi.* Folia *minima, sessilia, ovata, acuminata, subcarinata, læte viridia, imbricata, revoluta, quinquefariam exstantia.* Pedunculus *terminalis, purpureus, longus.* Capsula *oblonga, obliqua.*

* * * *Antheris nutantibus.*

argenteum. 27. BRYUM antheris pendulis, surculis cylindric bricatis lævibus. *Fl. svec.* 909; 1008. *Dalib.* 321.

Bryum pendulum julaceum argenteum & seri *Dill. musc.* 392. *t.* 50. *f.* 62.

Muscus squamosus argenteus, ericæ folio. *Vail.* 134. *t.* 26. *f.* 3.

Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis ob cernuis. *Moris. hist.* 3. *p.* 627. *s.* 15. *t.* 6 *f.* 1

β. Bryum pendulum, surculis teretibus viridibus *musc.* 394. *t.* 50. *f.* 63.

Habitat in Europæ *tectis, muris, rupibus.*

pulvinatum. 28. BRYUM antheris subrotundis, pedunculis re foliis piliferis. *Fl. svec.* 904; 1009. *Dalib. par*

Bryum foliis setaceis, pedunculo reflexo, ca subrotundis. *Fl. lapp.* 401.

Bryum orbiculare pulvinatum hirsutie canesce psulis immersis. *Dill. musc.* 395. *t.* 50. *f.* 65.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. T. *V* *ris.* 133. *t.* 29 *f.* 2.

Muscus, capitulo inflexo, pene acaulos. *P* 127. *t.* 95. *f.* 15.

Habitat in Europæ *muris, rupibus.*

cæspiticium. 29. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolat minato-setaceis, pedunculis longissimis. 905; 1010. *Dalib. paris.* 322.

Bryum foliis subulatis, pedunculo longissimo, lo reflexo. *Fl. lapp.* 402.

Bryum pendulum ovatum cæspiticium & pilosi ta bicolori. *Dill. musc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutan diculo purpureo. *Vaill. paris.* 134. *t.* 29. *f.*

Muscus trichodes, capitulo parvo reflexo, p ima medietate rubro, summa luteo-viridi. *hist.* 3. *p.* 629. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 15.

Habitat in Europæ *muris, tectis, glareosis.*

capillare. 30. BRYUM antheris pendulis, foliis ovatis setif rinatis, pedunculis longissimis. *Fl. svec.* 1. *Dalib. paris.* 322.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis lon tantibus. Dill. musc. 398. t. 50. f. 67. Mu

capillare. *Fl. svec.* 2. *n.* 981.
; capillaceus major, capitulis crassioribus cy-
ıceis nutantibus. *Vaill. parif.* 134. *t.* 24. *f.* 6.
; capillaris, foliis latiusculis congestis, capitulis
s reflexis. *Moris. hist.* 3. *p.* 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 19.
; capillaris, folio longiore. *Magn. hort.* 138. *t.*

in Europæ *siccis*, *muris*, *glareosis*.
nti valde affine. Forte potius Mnii *species ob*
las femineas, *ut in Fl. svec.* 2. *n.* 981.

UM antheris pendulis subglobosis, foliis acu- carneum.
lternis. *Fl. svec.* 908; 1011.
lanceolatum pellucidum, capsulis subrotundis,
nculis carneis. *Dill. musc.* 400. *t.* 50. *f.* 69.
s stellaris humilis, capitulis pendulis. *Buxb.*
2. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 6.
in Europæ *udis*.

UM antheris oblongis nutantibus, foliis subula- simplex.
surculo simplicissimo medio pedunculifero.
: *angl.* 413.
trichoides, capsulis rubris cernuis. *Dill. musc.*
t. 50. *f.* 59.
: *in pascuis* Europæ.

H Y P N U M.

* *Frondibus pinnatis.*

NUM fronde simplicissima: foliolis patentibus spiniforme.
latis, pedunculis radicalibus.
ım erectum non ramosum spinarum halecum æ-
ım. *Dill. musc.* 332. *t.* 43. *f.* 68.
um s. Polytrichum aureum medium, capitulo
orio pediculo insidente. *Sloan. jam.* 12. *hist.* 1. *p.*
t. 25. *f.* 4.
t *in* Jamaica.

NUM fronde simplicissima pinnata lanceolata taxifolium.
pedunculifera. *Fl. svec.* 2. *n.* 1013.
ım foliis pinnatis contiguis linearibus, pedun-
; radicalibus, capitulo subrotundo erecto. *Roy.*
. 504.
ım taxiforme minus: basi capsulifera. *Dill. musc.*
t. 34. *f.* 2.

Mufcus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. parif.* *t.* 24. *f.* 11.
Habitat in Europæ *umbrofis*.

denticulatum. 3. HYPNUM fronde pinnata fimplici: pinnis du tis bafi pedunculifera. *Fl. fvec.* 2. *n.* 1014.
Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis dupl recurvis. *Dill. mufc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.
Mufcus pennatus denticulatus minor. *Vaill. parif* *t.* 29. *f.* 8.
Mufcus pennatus, capitulis adianti. *Morif. hift.* 626. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 36.
Habitat in Europa *fupra terram umbrofam.*

bryoides. 4. HYPNUM fronde fimpliciffima pinnata lanc apice pedunculifera. *Fl. fvec.* 2. *n.* 1012.
Hypnum taxiforme exiguum verfus fummitate pfuliferum. *Dill. mufc.* 262. *t.* 34. *f.* 1.
Mufcus polytrichoides, exiguis capitulis in fumm culis, f. foliis fubrotundis erectis. *Vaill. pari* *t.* 24. *f.* 13. *Morif. hift.* 3. *p.* 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.*
Mufcus terreftris minimus, foliis pennatim dif *Buxb. cent.* 1. *p.* 44. *t.* 64. *f.* 3.
Habitat in Europæ *umbrofis.*
Mufcus minimus, capituli ora magna ciliis rubri ftabilis.

acacioides. 5. HYPNUM fronde pinnata ramofa apice pedunc
Hypnum pinnulis acaciæ, fetis breviffimis. *Dil* 265. *t.* 34. *f.* 4.
Habitat in Patagonia.

adiantoides. 6. HYPNUM fronde pinnata ramofa erecta me dunculifera.
Hypnum taxiforme paluftre ramofum majus ctum. *Dill. mufc.* 264. *t.* 34. *f.* 3.
Mufcus taxiformis ramofus. *Vaill. parif.* 136. *f.* 5.
Mufcus filicifolius f. pennatus minor, pinnulis mis ad mediam coftam adnexis. *Buxb. cent.* *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in Europæ *paludofis.* ♃

complanatum. 7. HYPNUM fronde pinnata ramofa: foliolis in tis acutis complicatis compreffis. *Fl. fvec.* 2. *n.*

Hypı

Hypnum pennatum compressum & splendens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 268. *t.* 34. *f.* 7.
Muscus trichomanoides filicifolius splendens. *Vaill. paris.* 139. *t.* 23. *f.* 4.
Muscus terrestris repens primæ speciei similis. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Europa *ad truncos arborum.*
Var. Hypnum pennatum trichomanoides splendens ramosum. *Dill. musc.* 269. *t.* 34. *f.* 8.

HYPNUM fronde pinnata ramosa, foliolis patentissimis ovatis carinatis mucronatis. — ornithopodioides.
Hypnum pennatum, ornithopodii pinnulis pellucidis. *Dill. musc.* 270. *t.* 34. *f.* 9.
Habitat in Patagonia.

** *Surculis vagis.*

HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis punctatis. — lucens.
Hypnum pennatum aquaticum lucens, longis latisque foliis. *Dill. musc.* 270. *t.* 34. *f.* 10.
Habitat in Europæ *paludosis.*

HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis complicatis. — undulatum.
Hypnum pennatum undulatum, lycopodii instar sparsum. *Dill. musc.* 271. *t.* 36. *f.* 11.
Hypnum repens crispum, ramulis compressis filicinorum more dispositis. D. *Hall. helv.* 105. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Anglia, Hibernia, Helvetia.
Calyptræ apice fusco distinctum. Dill.

HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis. — crispum.
Hypnum pennatum undulatum crispum, setis & capsulis brevibus. *Dill. elth.* 237. *t.* 36. *f.* 12.
Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 10.
Habitat in Europæ *locis saxosis.*

HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Fl. svec.* 881; 1016. — triquetrum.
Hypnum ramis inæqualibus, foliis laxe imbricatis triangularibus acutis. *Fl. lapp.* 409.

Hypnum vulgare triangulum maximum & pa
Dill. musc. 293. *t.* 38. *f.* 28.
Muscus ramosus major spermatophorus. *Vaill.*
137. *t.* 28. *f.* 9.
Habitat in Europae *pratis*, *sylvis*, *sepibus.*

rutabulum. 13. HYPNUM ramis vagis subrepentibus, folioli
tis mucronatis imbricatis.
Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis o
Dill. musc. 295. *t.* 38. *f.* 29.
Muscus myosuroides, rutabuli fructu. *Vaill.* p
t. 27. *f.* 8. & *t.* 23. *f.* 2.
Muscus denticulatus minor sericeus nostras, ca
adianti. *Moris. hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 3
Habitat in Europae *sepibus*, *sylvis*, *ad arborum*
ces.

* * * *Surculis pinnatis.*

filicinum. 14. HYPNUM surculis pinnatis: ramulis dista
foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *I*
875; 1017.
Hypnum repens filicinum crispum. *Dill. musc.*
36. *f.* 19.
Muscus filicinus palustris. *Vaill. paris.* 138. *t.* 2
Habitat in Europae *humidiusculis.*

proliferum. 15. HYPNUM surculis proliferis plano-pinnatis,
culis aggregatis. *Fl. lapp.* 405. *Fl. svec.* 872;
Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribu
splendentibus. *Dill. musc.* 276. *t.* 35. *f.* 14.
Muscus filicinus major. *Moris. hist.* 3. *p.* 625.
t. 5. *f.* 20. *Tournef. inst.* 556. *t.* 326. *f.* C. *Vaill.*
140. *t.* 25. *f.* 1.
Habitat in Europae *pratis*, *sylvis.*

delicatulum 16. HYPNUM surculis subproliferis plano-pinna
spidatis, pedunculis aggregatis. *Fl. svec.* 2. *n.*
Hypnum filicinum, tamarisci foliis minimis non
dentibus, setis capsulis brevioribus. *Dill. musc.*
t. 83. *f.* 6.
Habitat in America, Europa *septentrionali.*
Praecedenti simillimum, *sed longe tenerius* & *fort.*
varietas; antheras non vidi.

parietinum 17. HYPNUM surculis plano-pinnatis continuatis,
du

dunculis aggregatis. *Fl. lapp.* 406. *Fl. svec.* 873; 1020.
Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus splendentibus. *Dill. musc.* 274. *t.* 35. *f.* 13.
Muscus filicinus major. *Buxb. cent.* 2. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2. & *p.* 3. *t.* 2. *f.* 1. & 4. *t.* 28. *f.* 1. & *t.* 29. *f.* 1.
Habitat in Europa *frequens.*

HYPNUM surculis subbipinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1021. — prælongum
Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis foliis, prælongum. *Dill. musc.* 278. *t.* 35. *f.* 15.
Muscus terrestris minor, foliis crispis. *Buxb. cent.* 4. *p.* 37. *t.* 63. *f.* 3.
Habitat in Europæ *terris, truncis, lignis.*
Hæc species difficilius determinatur, quam dignoscitur.

HYPNUM surculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Fl. svec.* 871; 1022. — crista castrensis.
Hypnum ramulis plano-pinnatis: pinnis contiguis apicibus deflexis. *Fl. lapp.* 407.
Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsentans. *Dill. musc.* 284. *t.* 36. *f.* 20.
Muscus cristam castrensem repræsentans flavescens nemorosus ramosus cassubicus. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 8.
Muscus terrestris repens subflavus, foliolis crispis minoribus, ramulisque densius confertis. *Vaill. paris.* 141. *t.* 27. *f.* 14.
Muscus pennatus major, caulibus ramosis in summitate veluti pinnatus. *Læs. pruss.* 167. *t.* 42.
Habitat in Europa, Pensylvania, *ad radices Abietis.*

HYPNUM surculis pinnatis teretiusculis remotis inæqualibus. *Fl. lapp.* 408. *Fl. svec.* 874; 1023. — abietinum
Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. *Dill. musc.* 280. *t.* 35. *f.* 17.
Muscus pennatus minor, caulibus ramosis, in summitate veluti spicatus. *Læs. pruss.* 167. *t.* 43. *Vaill. paris. t.* 29. *f.* 12.
Muscus terrestris, surculis filamentosis tenacibus abietinis semel tantum divisis. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 22.
Habitat in Europæ *sylvis abietinis.*

Pedunculi *e media rachi surculi, solitarii, perpendiculariter recti, longitudine surculi; Calyptra erecta, subulata, pallida.* Anthera *russa, recurvata magis quam in ullo alio, margine oris integro, intra quem Cilia brevia, patula.*

lumosum. 21. HYPNUM surculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis subulatis, antheris erectis. *Hudf. angl.* 423.

Hypnum repens filicinum plumosum. *Dill. musc.* [illegible] *t.* 35. *f.* 16.

Habitat in Europa *ad radices arborum.*

* * * * *Foliis reflexis.*

ipressiforme. 22. HYPNUM surculis subpinnatis, foliis secundis incurvis apice subulatis. *Fl. svec.* 880; 1024.

Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis. *Dill. musc.* 287. *t.* 37. *f.* 23.

Muscus squamosus ramosus minor & crispus. *Vaill. paris.* 139. *t* 27. *f.* 13.

Muscus terrestris aureus minor, flagellis clavisque brevioribus. *Moris. hist.* 3. *p.* 624. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 8.

Habitat in Europæ *sylvis ad arborum radices.*

luncum. 23. HYPNUM surculis erectiusculis subramosis, foliis secundis recurvatis subulatis, ramis recurvatis. *Fl. svec* 879; 1025.

Hypnum paluftre erectum summitatibus aduncis. *Dill. musc.* 292. *t.* 37. *f.* 26.

Habitat in Europæ *uliginosis.*

corpioides. 24. HYPNUM ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis secundis acuminatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1026.

Hypnum scorpioides paluftre magnum, lycopodii instar sparsum. *Dill musc.* 290. *t.* 37. *f.* 25.

Habitat in Anglia, Sveciæ *paludibus profundis.*

Muscus *procumbens, ramis vagis fuscis, apicibus acutis flavis.*

ticulosum. 25. HYPNUM surculis repentibus, ramis vagis teretibus foliis patulis acuminatis.

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. *Dill. musc.* 307. *t.* 39. *f.* 43.

Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris. *Vaill. paris.* 137. *t.* 23. *f.* 1.

Musc-

Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupressinis ut plurimum indivisis. *Moris. hist.* 3. *p.* 624. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 7.
Muscus montanus gracilis ramosus, viticulis longioribus glabris. *Pluk. alm.* 255. *t.* 47. *f.* 4.
Muscus densis foliis juniperinis in cespitem aggestis. *Loes. pruss.* 49. *t.* 49.
Habitat *in* Europæ *montosis aridis ad arbores.*

HYPNUM ramis vagis, foliis ovatis apice subulatis undique reflexis. *Fl. svec.* 878; 1027. * — squarrosum.
Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. musc.* 303. *t.* 39. *f.* 38.
Muscus terrestris erectior, foliis reflexis. *Moris. hist.* 3. *p.* 524. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 2.
Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. musc.* 304. *t.* 39. *f.* 39.
Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. paris.* 139. *t.* 27. *f.* 5.
Habitat *in* Europæ *subhumidis.*

HYPNUM furculis repentibus, ramis confertis erectis, foliolis ovatis secundis, antheris erectiusculis. *Hudf. angl.* 429. — palustre.
Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. musc.* 293. *t.* 37. *f.* 27.
Habitat *in* Europæ *udis.*

HYPNUM furculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. — loreum.
Hypnum loreum montanum, capsulis subrotundis. *Dill. musc.* 305. *t.* 39. *f.* 40.
Muscus squamosus major, foliis angustioribus acutissimis. *Vaill. paris.* 138. *t.* 25. *f.* 2.
Muscus repens major, foliis & flagellis longis & tenuibus donatus. *Moris. hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 24.
Muscus montanus. *Tabern. ic.* 809.
Musco denticulato similis. *Bauh. pin.* 360.
Habitat *in* Europæ *montosis.*

* * * * * *Surculis dendroidibus s. fasciculatis.*

HYPNUM furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Fl. svec.* 886. 1028. — dendroides.

Serpens. 38. HYPNUM surculis repentibus, ramis filiformib[us] foliis obliteratis.

Hypnum trichodes serpens, setis & capsulis longis[...] ctis. *Dill. musc.* 329. *t.* 42. *f.* 64.

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis [...] sculis oblongis erectis. *Moris. hist.* 3. *p.* 625. *f.* 15. 5. *f.* 14. 21. *Vaill. paris.* 138. *t.* 28. *f.* 2. 6. 7. 8.

Habitat in Europa, Virginia, *ad caudices, ligna,* [...]

sciuroides. 39. HYPNUM surculis erectis ramosis incurvatis.

Hypnum arboreum sciuroides. *Dill. musc.* 319. *t.* [...] *f.* 54.

Muscus arboreus splendens myosuroides. *Vaill. par.* *t.* 27. *f.* 12.

Muscus repens, serici modo lucens, viticulis long[...] ribus erectis. *Moris. hist.* 3. *p.* 626. *f.* 15. *t.* 5. *f.* [...]

Habitat in Europæ *truncis arborum.*

Pedunculi *maturi funis instar torti; feminæ surcul[...] stincti crescunt.*

myosuroides. 40. HYPNUM surculis ramosissimis: ramis sub[...] utrinque att[e]nuatis teretibus.

Hypnum myosuroides tenuius, capsulis nutanti[bus]. *Dill. musc.* 317. *t.* 41. *f.* 51.

Muscus trichodes humilis ramosus, capitulis oblo[ngis] tumidiusculis donatum. *Moris. hist.* 3. *p.* 628. *f.* [...] *t.* 6. *f.* 3.

Muscus squamosus minor myosuroides, capitulis in[-] curvis. *Vaill. paris.* 137. *t.* 27. *f.* 6.

Habitat in Europa *supra lapides arborumque radices.*

[c]lavellatum. 41. HYPNUM repens, ramulis erectis confertissimis; antheris incurvis: operculis inflexis.

Hyp[n]um clavellatum parvum repens, setis brevib[us]. *Dill. musc.* 551. *t.* 35. *f.* 17.

Habitat in Europæ *lignis putridis.*

[ju]laceum. 42. HYPNUM ramis erectis teretibus imbricatis obtu[sis] perichætiis longitudine fere pedunculorum.

Hypnum julaceum, perichætio setas æquante. *Dill. musc.* 321. *t.* 41. *f.* 56.

Hypnum sabinæ foliis, capitulis atro-fuscis pedicu[lis] brevibus. *Gron. virg.* 125.

Habitat in America *septentrionali.*

ALGÆ.

A L G Æ.

JUNGERMANNIA.

* *Frondibus pinnatis secundis.*

NGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis: aspleniodes.
oliolis ovatis subciliatis.
germannia major, foliis brevioribus & obtusioribus non dentatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 3. o. o.
henastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. musc.* 482. *t.* 69. *f.* 5.
scus bifolius procumbens, foliis subrotundis. *Læs. russ.* 167. *t.* 47.
germannia caule ramoso repente, foliis imbricatis vato-crenulatis: alternis minoribus. *Roy. lugdb.* 508.
germannia major, foliis subrotundis tenuissime denticulatis. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 1. 2.
henastrum asplenii facie, pinnis confertioribus. *Dill. musc.* 483. *t.* 69. *f.* 6.
aticoides polytriche facie. *Vaill. paris.* 99. *t.* 19. *f.* 7.
scus trichomanoides, foliis rotundioribus pellucidis squamatim conjuncte sibi incumbentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 627. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 42.
itat in Europæ, Indiæ *udis umbrosis.*

NGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis: viticulosa.
liolis subulatis.
germannia terrestris, viticulis longis, foliis perexilis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 4.
enastrum trichomanis facie, e basi & medio floris. *Dill. musc.* 484. *t.* 69. *f.* 7.
tat in Europæ *udis umbrosis sylvis.*

NGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis: polyanthos.
liolis integerrimis imbricatis convexis.
ermannia palustris repens, foliis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 5.
enastrum trichomanes facie, polyanthemum breve repens. *Dill. musc.* 486. *t.* 70. *f.* 9.
tat in Europæ *palustribus.*

GERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis lanceolata.
nceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis.

Jun-

Jungermannia paluſtris minima repens, foliis [illegible]tundis denſiſſimis læte virentibus. *Mich. gen.* 5. *f.* 67.
Lichenaſtrum trichomanis facie minus, ab extre[illegible]te florens. *Dill. muſc.* 486. *t.* 70. *f.* 10.
Habitat in Europæ *humidis umbroſis.*

bidentata. 5. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter p[illegible] apice floriferis, foliolis bidentatis.
Jungermannia major repens, foliis bifidis. *Mich.* 8. *t.* 5. *f.* 12.
Lichenaſtrum, pinnulis acutioribus & concavis [illegible] majus. *Dill. muſc.* 487. *t.* 70. *f.* 11.
Hepaticoides, polytrichi facie, foliis bifidis, [illegible] *Vaill. pariſ.* 99. *t.* 19. *f.* 8.
Muſcus lichenoides, foliis pennatis bifidis, [illegible] *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 47.
Habitat in Europæ *ericetis umbroſis.*

bicuſpidata. 6. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter p[illegible] medio floriferis, foliolis bidentatis.
Jungermannia minima repens, foliis bifidis, [illegible] florum cylindracea. *Mich. gen.* 9. *t.* 6. *f.* 17.
Lichenaſtrum, pinnulis acutiſſime bifidis, mini[illegible] *Dill. muſc.* 288. *t.* 70. *f.* 13.
Habitat in Europæ *umbroſis humidis.*

quinque-dentata. 7. JUNGERMANNIA fronde pinnata ramoſa florifera, foliolis quinquedentatis. *Hudſ. ang[illegible]*
Lichenaſtrum multifidum majus ab extremita[illegible]rens. *Dill. muſc.* 494. *t.* 71. *f.* 23.
Habitat in Europa.

* * *Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis ſuperne [illegible]*

undulata. 8. JUNGERMANNIA frondibus ſupra bipinnati[illegible]ce floriferis, foliolis ſubrotundis integerrimi[illegible]
Lichenaſtrum pinnulis auriculatis majoribus [illegible] crenatis. *Dill. muſc.* 490. *t.* 71. *f.* 17.
Hepatica ſaxatilis undulata ſeminifera. *Vaill. pa[illegible]* *t.* 19. *f.* 6.
Habitat in Europa.

nemoroſa. 9. JUNGERMANNIA frondibus ſupra bipinnat[illegible]ce floriferis, foliolis ciliatis.

ɔrmannia nemorosa, foliis acutioribus auritis te-
ſſime denticulatis, flore insidente pediculo bre-
ɪre. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 8.
ɜnaſtrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis.
ll. muſc. 490. *t.* 71. *f.* 18.
at in Europæ *ſylvis.*

ɪGERMANNIA frondibus ſupra bipinnatis in- refupinata.
ɔe floriferis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis.
ɜrmannia ſurculoſa reſupinata, foliolis pinnato-
ɔricatis deflexis rotundis integris: auricula late-
. *Fl. ſvec.* 926; 1038.
ɜnaſtrum imbricatum, pinnulis rotundis, criſpum.
ll. muſc. 491. *t.* 71. *f.* 19.
at in Europæ *rupibus.*

ɪGERMANNIA frondibus ſupra bipinnatis api- albicans.
floriferis, foliolis linearibus recurvatis.
ɜrmannia ſurculis pinnatis: foliolis recurvis pla-
auriculatis. *Fl. ſvec.* 916; 1039.
ɜnaſtrum auriculatum: pinnulis anguſtis planis re-
vis. *Dill. muſc.* 492. *t.* 71. *f.* 20.
ticoides albeſcens, foliis pinnatis. *Vaill. pariſ.*
. *t.* 19. *f.* 5.
at in Europæ *umbroſis.*

ɪGERMANNIA frondibus ſubtus bipinnatis, trilobata.
olis quadratis obſolete trilobis.
rmannia ſurculis planis pinnatis: foliolis obſolete
obis auriculatis. *Fl. ſvec.* 917; 1040.
rmannia foliis latiuſculis obtuſis undulatis & ve-
angulosis. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 10.
ɜnaſtrum pinnulis obtuſe trifidis nervo genicula-
Dill. muſc. 493. *t.* 71. *f.* 22.
at in Svecia, Anglia, Italia.

ɪGERMANNIA frondibus ſubtus bipinnatis a- reptans.
e reptantibus, foliolis quadridentatis.
ɜnaſtrum multifidum exiguum ad baſin florens
ſiccitatem imbricatum. *Dill. muſc.* 494. *t.* 71.
14.
at in Europæ *ericetis udis.*

* * * *Frondibus imbricatis.*

ɪGERMANNIA ſurculis repentibus: foliolis complanata
infer-

inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis
libus. *Fl. svec.* 922; 1041.
Jungermannia foliis circinatis imbricatim dispof
viridi flavescentibus. *Mich. gen.* 7 *t.* 5. *f.* 11
Lichenastrum imbricatum majus, squamis con
& planis. *Dill. musc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.
Habitat in Europa *ad arborum truncos.*

dilatata. 15. JUNGERMANNIA surculis repentibus, foli
ferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis
latioribus. *Fl. svec.* 919; 1042.
Lichenastrum imbricatum minus, squamis con
concavis. *Dill. musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.
Hepaticoides, surculis & foliolis thuyæ instar co
sis minor. *Vaill. parif.* 99. *t.* 19. *f.* 10.
Muscoides minimum, foliis alternis: superioribu
cinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo l
carente. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Europa, America, *ad arborum trun*

tamarisci. 16. JUNGERMANNIA foliis imbricatis serie du
superioribus subrotundis convexis obtusis qu
plo-majoribus. *Fl. lapp.* 425. *Fl. svec.* 923; 1
Roy. lugdb. 508.
Lichenastrum imbricatum, tamarisci narbonensis l
Dill. musc. 499. *t.* 72. *f.* 31.
Hepaticoides quæ Muscus trichomanoides ter
minor floridus. *Vaill. parif.* 100. *t.* 23. *f.* 10.
Muscoides squamosum saxatile nigro-purpureu
culis angustioribus, foliis circinatis minoribus.
gen. 10. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat in Europa *ad truncos arborum, rupes.*

platyphylla. 17. JUNGERMANNIA surculis procumbentibu
tus imbricatis, foliolis cordatis acutis.
Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis minus rot
Dill. musc. 501. *t.* 72. *f.* 32.
Hepaticoides, surculis & foliolis thuyæ instar
pressis, major. *Vaill. parif.* *t.* 19 *f.* 9.
Muscoides squamosum atrovirens, foliis subrot
Mich. gen. 9. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Muscus muralis floridus, foliis subrotundis crebr
imbricatim dispositis. *Morif. hist.* 3. *p.* 627. *t.*
6. *f.* 44.
Habitat in Europæ & Americæ *septentrionalis sy*

18. JU

JUNGERMANNIA surculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Fl. svec.* 918; 1044. * — ciliaris.
Jungermannia caule ramoso, surculis compressis, foliis imbricatis serie duplici ovato-acutis ciliatis. *Fl. lapp.* 426
Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill. musc.* 503. *t.* 73. *f.* 35.
Muscus palustris, absinthii folio. *Vaill. paris.* 140. *t.* 26. *f.* 11?
Habitat in Europa *passim.*
Folia superiora sæpe bifida sunt.

JUNGERMANNIA surculis erectiusculis bifariam imbricatis, foliolis bipartitis. — varia.
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 9.
Lichenastrum foliis variis. *Dill. musc.* 505. *t.* 73. *f.* 36.
Habitat in Europæ *sylvis*, *ericetis.*

**** *Surculis undique imbricatis foliolis sparsis.*

JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis undique imbricatis, floribus pedunculatis. — julacea.
Lichenastrum alpinum, bryi julacei argentei facie. *Dill. musc.* 506. *t.* 73. *f.* 38.
Habitat in Alpibus Britanniæ.

JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis subulatis secundis. — rupestris.
Jungermannia surculosa erectiuscula, foliolis undique imbricatis acuminatis hinc reflexis. *Fl. svec.* 920; 1045. *
Lichenastrum alpinum nigricans, foliis capillaceis reflexis. *Dill. musc.* 507. *t.* 73. *f.* 40.
Habitat in Europæ *frigidis rupibus humentibus.*

JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis capillaceis æqualibus. — trichophylla
Jungermannia surculis erectiusculis, foliolis imbricatis acuminatis undique erectis. *Fl. svec.* 921; 1046.
Lichenastrum trichodes minimum in extremitate florens. *Dill. musc.* 505. *t.* 73. *f.* 37.
Habitat in Europæ *frigidis rupibus.*

JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis ovalis patentibus, calycibus imbricatis. — alpina.

Lichenastrum alpinum atrorubens teres, calycibus sq mosis. *Dill. musc.* 506. *t.* 73. *f.* 39.
Habitat in Alpibus Britanniæ, *inque rupibus* Sveci

* * * * * *Acaules frondibus simplicibus.*

piphylla. 24. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi in to. *Fl. svec.* 930; 1047.
Jungermannia hypophylla. *It. w-goth.* 213.
Marsilea major atrovirens, floribus albicantibus e foliorum medio egredientibus. *Mich. gen.* 5. *t.* 4. *f.*
Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio e scentibus. *Dill. musc.* 508. *t.* 74. *f.* 41.
Lichen petræus, caliculo calceato. *Bauh. pin.* 362.
Lichen alter minor, folio calceato. *Col. ecphr.* 1. 331. *t.* 332.
Habitat in Europæ *ripis elatioribus umbrosis udis.*

inguis. 25. JUNGERMANNIA acaulis, fronde oblonga sim ta pingui. *Fl. svec.* 929; 1048.
Marsilea media pinguis pallide virens, floribus majo bus nigricantibus ad foliorum latera egredientib *Mich. gen.* 5. *t.* 4. *f.* 2.
Lichenastrum capitulis oblongis juxta foliorum di suras enascentibus. *Dill. musc.* 509. *t.* 74. *f.* 42.
Lichen parvus erectus, foliis profunde laciniatis. *Fl alm.* 216. *t.* 42. *f.* 2.
Habitat in Europæ *paludibus.*

nultifida. 26. JUNGERMANNIA acaulis, fronde bipinnatifi *Fl. svec.* 2. *n.* 1049.
Lichenastrum ambrosiæ divisura. *Dill. musc.* 511. *t.* *f.* 43.
Habitat in Angliæ *ericetis.*

urcata. 27. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ra sa extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Fl. svec.* 9
Marsilia minima angustifolia, floribus nigricantibus inferiori foliorum parte e subhirsuta & turbinata gina. *Mich. gen.* 5. *t.* 4. *f.* 4.
Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis globo pilosis. *Dill. musc.* 512. *t.* 74. *f.* 45.
Hepatica arborea globulifera. *Vaill. paris.* 98. *t.* 23. 11.
Habitat in Europa *ad truncos, rupes & e terra.*

usilla. 28. JUNGERMANNIA acaulis, fronde subpinnati da:

fida: lobis imbricatis, perichætio plicato. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1050.

Lichenaſtrum exiguum, capitulis nigris lucidis e cotylis parvis naſcentibus. *Dill. muſc.* 513. *t.* 74. *f.* 46.

Habitat in Europæ *rupibus, ericetis, humentibus.*

TARGIONIA.

TARGIONIA. hypophyl

Targionia minima & vulgaris. *Mich. gen.* 3. *t.* 3.

Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Bauh. pin.* 362. *Dill. muſc.* 532. *t.* 78. *f.* 9.

Lichen alter acaulos hypophyllocarpos. *Col. ecphr.* 1. *p.* 331. *f.* 333.

Lichen terreſtris minor ſeminifer. *Buxb. cent.* 1. *p.* 41. *t.* 61. *f.* 4.

Habitat in Italia, Hiſpania, Conſtantinopoli.

MARCHANTIA.

MARCHANTIA calyce communi decemfido. *Fl. ſvec.* 931; 1057. *Fl. lapp.* 422. *Roy. lugdb.* 507. polymorp

Marchantia major, capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

Lichen fontanus major ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.

Lichen petræus latifolius, ſ. Hepatica fontana. *Bauh. pin.* 362.

Lichen. *Fuchſ. hiſt.* 179. *Cam. epit.* 782.

Marchantia ſtellata. *March. act. pariſ.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.

Marchantia capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

Lichen domeſticus minor ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.

Lichen petræus ſtellatus. *Bauh. pin.* 362.

Hepatica ſecunda. *Tabern. ic.* 815.

Marchantia calyce communi octopartito: laciniis e plano convexis. *Fl. lapp.* 423. *Roy. lugdb.* 507.

Marchantia capitulo non diſſecto. *Mich. gen.* 1. *t.* 1. *f.* 5.

Lichen petræus umbellatus. *Bauh. pin.* 362.

Hepatica tertia. *Tabern. ic.* 815.

Habitat in Europa *juxta aquas, locis umbroſis.*

MARCHANTIA calyce communi dimidiato palmato quadrifido. chenopoda

Lichen anapodocarpos. *Plum. fil.* 143. *t.* 142. *Dill. musc.* 531. *t.* 77. *f.* 8.
Habitat in Martinica.

uciata. 3. MARCHANTIA calyce communi quadripartito laciniis tubulosis. *Hort. cliff.* 477.
Marchantia floribus masculis cruciformibus, feminis sessilibus lunatis. *Sauv. monsp.* 270.
Lichen seminifer lunulatus, florifer pileatus tandem cruciatus. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.
Lichen hepaticus, capitulis quadrifidis. *Buxb. cent.* 4. *t.* 62. *f.* 2.
Lunaria vulgaris. *Mich. gen.* 4. *t.* 4.
Habitat in Europæ *umbrosis.*

nella. 4. MARCHANTIA calyce communi hemisphærico apiculato: margine radiato.
Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fimbriatis. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 4.
Habitat in Virginia. *D. Gronovius.*

emisphærica. 5. MARCHANTIA calyce communi quinquefido hemisphærico, perichætio nullo. *Fl. svec.* 932; 10... *Fl. lapp.* 424. *Roy. lugdb.* 507.
Hepatica media, capitulo hemisphærico. *Mich. gen.* ... *t.* 2. *f.* 2.
Lichen pileatus parvus, foliis crenatis. *Dill. musc.* 5... *t.* 75. *f.* 2.
Lichen petræus, capitulis stellatis crassis, pediculis brevibus insidentibus. *Buxb. cent.* 2. *p.* 5. *t.* 5. *f.* ...
Habitat in Europæ *paludosis.*
Perichætia in hac specie nulla, nec Calyces seminiferi.

onica. 6. MARCHANTIA calyce communi quinquelocul... subovato.
Lichen vulgaris major pileatus & verrucosus. *Dill. musc.* 516. *t.* 75. *f.* 1.
Lichen petræus, caliculo pileolum sustinente. *Bauh. pin.* 362.
Lichen plinii primus & pileatus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 33... *t.* 331.
Hepatica vulgaris major s. officinarum italiæ. *Mich. gen.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Europæ *locis umbrosis, ripis elevatis.*

7. MAR-

MARCHANTIA calyce communi integro hemisphærico. androgyna.
Lichen pileatus angustifolius dichotomus. *Dill. musc.* 520. *t.* 75. *f.* 3.
Hepatica minor angustifolia, capitulo hemisphærico. *Mich. gen.* 3 *t.* 2. *f.* 3.
Habitat *in* Italia, Jamaica, *inter saxorum crepidines.*
Monoica *s.* *Androgyna est hæc species.*

BLASIA.

BLASIA *Fl. svec.* 933; 1053. *Schmied. diss. propr.* pusilla.
Blasia pusilla, lichenis pyxidati facie. *Mich. gen.* 14. *t.* 7. *Oed. dan. t.* 45.
Bryum lichenis facie. *Dill. musc.* 237. *t.* 31. *f.* 7.
Habitat *in* Europa *ad latera fossarum, solo ex arena sterili.*

RICCIA.

RICCIA frondibus superficie papillosis. cristallina.
Riccia foliis aspergine crystalina perfusis, margine incrassatis. *Fl. svec.* 935; 1055. *It. œl.* 154.
Riccia minima & minor pinguis aspergine crystallina perfusa. *Mich. gen.* 107. *t.* 57. *f.* 7. 3.
Hepatica palustris, lobis inflatis. *Vaill. paris.* 98. *t.* 19. *f.* 2.
Lichen palustris, rutæ folio. *Cels. ups.* 28. *Dill. musc.* 355. *t.* 78. *b.* 12.
Habitat *in* Europæ *locis subhumidis.*

RICCIA frondibus glabris bipartitis acutis. *Fl. svec.* 934; 1054. minima.
Riccia minima nitida, segmentis angustioribus acutis. *Mich. gen.* 107. *t.* 57. *f.* 6.
Lichen omnium minimus, foliolis fissis super terram expansis. *Dill. musc.* 534. *t.* 78. *f.* 11.
Habitat *in* Europæ *inundatis.*

RICCIA frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis glauca.
Riccia minima pinguis, foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virescentibus. *Mich. gen.* 107. *t.* 57. *f.* 4.
Hepatica palustris bifurca, locis brevioribus carinatis. *Vaill. paris.* 98. *t.* 19. *f.* 1.
Lichen minimus, foliis venosis bifariam vel trifariam

ſe dividendo progredientibus. B. *Dill. muſc.* 533. t. 78. *f.* 10.
Lichen terreſtris minor, foliis rutæ. *Buxb. cent.* 2. p. 10. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Anglia, Italia, Gallia.

fluitans. 4. RICCIA frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Fl. ſcan.* 241. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1056.
Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. *Dill. muſc.* 231. *t.* 74. *f.* 47.
Hepatica paluſtris dichotoma, ſegmentis anguſtioribus. *Vaill pariſ.* 98. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Europæ *foſſis, piſcinis, ad ripas ſupra aquam extenſa.*

ANTHOCEROS.

punctatus. 1. ANTHOCEROS frondibus indiviſis, ſinuatis punctatis.
Anthoceros foliis minoribus magis laciniatis. *Dill. muſc.* 476. *t.* 68. *f.* 1.
Anthoceros minor, foliis magis carinatis atque eleganter crenatis, ſubtus incurvatis. *Mich. gen.* 11. t. 7. *f.* 2.
Habitat in Angliæ, Italiæ *uliginoſis, umbroſis.*

lævis. 2. ANTHOCEROS frondibus indiviſis ſinuatis lævibus.
Anthoceros. *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 507.
Anthoceros foliis mojoribus minus laciniatis. *Dill. muſc.* 476. *t.* 68. *f.* 2.
Anthoceros major. *Mich. gen.* 11. *t.* 7. *f.* 1.
Lichen hepaticus, pediculis gramineis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 40. *t.* 61. *f.* 1.
Habitat in Europa & America *boreali.*

multifidus. 3. ANTHOCEROS frondibus bipinnatifidis linearibus.
Anthoceros folio tenuiſſimo multifido. *Dill. muſc.* 477. *t.* 88. *f.* 4.
Habitat in Germania.

LICHEN.

* *Leproſi tuberculati.*

ſcriptus. 1. LICHEN leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis characteriformibus. *Fl. ſvec.* 940; 1057.

ɜnoides crusta tenuissima, peregrinis veluti literis cripta. *Dill. musc.* 128. *t.* 18. *f.* 1.
at in Europæ *corticibus arborum.*

IEN leprosus flavescens, lineolis nigris map- geographicus.
ı referens. *Fl. svec.* 940; 1058.
ıoides nigro-flavum tabulæ geographicæ instar tum. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.
at in Europæ *rupibus altis.*

ɜn leprosus albicans, lineolis simplicibus pun- rugosus.
que nigris confertis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1059.
ɜnoides punctatum & rugosum nigrum. *Dill. musc.*
;. *t.* 18. *f.* 2.
at in Europæ *sylvis supra arborum truncos.*

IEN leprosus cinereo virescens, tuberculis atris. sanguinarius.
svec. 938; 1060.
noides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuculis integerrimis. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.
t in Europæ *rupibus truncisque arborum.*
cula majuscula, gibba, atra, at diffracta intus ru-sunt.

IEN leprosus fuscus, tuberculis atris. *Fl. svec.* fusco-ater.
1063.
t in Europæ *rupibus.*

IEN leprosus candidus, tuberculis atris. *Fl. svec.* calcareus.
; 1061. *It. w-goth.* 29. 211. *It. gotl.* 183.
ɜnoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis s. *Dill. musc.* 128. *t.* 18. *f.* 8.
t in Europæ *rupibus marmoreis.*

IEN leprosus ater, tuberculis viridibus confer- atro-virens.
Fl. svec. 939; 1062.
t in Europæ *rupibus.*
cula parva, flavo-virescentia, conferta, ut tota flavo-virens conspiciatur, quam cingit margo niger.

EN leprosus niger, tuberculis albis. *Fl. svec.* atro-albus.
. 1064.
t in Alpium *rupibus.*

IEN leprosus flavus, tuberculis rubris. *Fl. svec.* ventosus.
. 1065.
t in Alpium *rupibus.*

agineus. 10. LICHEN leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *It. scan.* 59.
Habitat in Europa, *vestiens truncos Fagi.*

Carpineus. 11. LICHEN leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1067.
Lichen geographicus. *It. scan.* 48.
Habitat in Carpini *truncis, ramis.*

icetorum. 12. LICHEN leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Fl. svec.* 936; 1068. *It. scan.* 34.
Lichen crustaceus, calyce convexo foliis majore. *Fl. lapp.* 455.
Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill. musc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.
Fungus omnium minimus turbinatus croceus. *Bocc. mus.* 2. *p.* 150. *t.* 10.
Fungilli incarnati coloris minuti musco insidentes *Mentz. pug. t.* 6.
Habitat in Europæ *sylvis sterilissimis, glareosis, subnudis uliginosis.*

* * *Leprosi scutellati.*

ndelarius. 13. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1069.
Byssus farinacea flava. *It. æl.* 30. *It. w-goth.* 159.
Habitat in Europæ *parietibus, muris, truncis arborum præsertim Quercus.*

rtareus. 14. LICHEN crustaceus ex albido virescens, scutellis flavescentibus: margine albo.
Lichen leprosus candidus, scutellis fuscis: margine albo. *Fl. svec.* 942; 1070.
Lichen tinctorius ruber. *It. æl.* 29. *It. w-goth.* 146.
Lichenoides tartareum farinaceum, scutellarum umbone fusco. *Dill. musc.* 131. *t.* 18. *f.* 12.
Lichen crustaceus saxatilis farinaceus verrucosus candidus omnium crassissimus, receptaculis florum nigricantibus. *Mich. gen.* 96. *t.* 52. *f.* 6.
Habitat in Europa *ad parietes rupium.*

llescens. 15. LICHEN crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Fl. svec.* 944; 1071.
Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill. musc.* 135 *t.* 18. *f.* 17.
Habitat in Europæ corticibus arborum.

16. LI-

CHEN crustaceus albicans, scutellis subfuscis: subfuscus.
argine cinereo subcrenato. *Fl. svec.* 943; 1072.
enoides crustaceum & leprosum, scutellis subfu-
s. *Dill. musc.* 134. *t.* 18. *f.* 16.
tat in Europa, *arboribus & rupibus innascens.*

CHEN crustaceus, foliis subulatis striatis. *Fl. svec.* upsaliensis.
n. 1073.
tat in summis Jugis *supra terram sterilissimam cam-
polonici, Upsaliæ, nec alibi nobis visus.*
*titudo Lichenis saxatilis, cinereo-albus, constans
tis rectis, albis, emarcidis, prostratis, inæqualibus,
effusis, simplicissimis, longitudine unguis, fragilissi-
s, sæpe pluribus basi coalitis.* Scutella *alba mar-
e obtuso, majuscula, radicalia, nec setis insidentia.*

*** *Imbricati.*

CHEN imbricatus, foliolis multifidis obsolete centrifugus.
vibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis.
svec. 945; 1074.
en foliis planis multifidis obtusis: laciniis lineari-
s, calycibus concavis. *Fl. lapp.* 448. *t.* 11. *f.* 2.
en imbricatus viridans, scutellis badiis. *Dill. musc.*
o. *t.* 24. *f.* 75.
tat in Europæ *frigidæ rupibus.* *rupestris.*

CHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacu- saxatilis.
sis, scutellis folio concoloribus. *Fl. svec.* 946;
75. *Mat. med.* 494.
en foliis planis acute laciniatis rubiginoso-albidis.
lapp 447. *Roy. lugdb.* 507.
en tinctorius. *It. scan.* 409. *
en opere phrygio ornatus. *Vaill. paris. t.* 21. *f.* 5.
enoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacuno-
m & cirrhosum. *Dill. musc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
co-fungus Lichenoides minor cinereus vulgatissi-
us. *Moris. hist.* 3. *p.* 634. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 6.
itat in Europæ *rupibus.* *rupestris.*

CHEN imbricatus, foliolis multifidis glabris ob- omphalodes
sis incanis, punctis vagis eminentibus. *Fl. svec.*
7; 1076.
en nigricans omphalodes. *Vaill. paris.* 116. *t.* 20.
10.

Lichenoides saxatile tinctorium, foliis pilosis purp
Dill. musc. 185. *t.* 24. *f.* 80.
Habitat in Europæ *rupibus.* *rupestris & ari*

olivaceus. 21. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis lin
Fl. svec. 948; 1077.
Lichen foliis planis multifidis obtusis: laciniis latioribus. *Fl. lapp.* 449. *Roy. lugdb.* 511.
Lichen crustæ modo arboribus adnascens, oliva
Vaill. paris. t. 20. *f.* 8.
Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus ver sis. *Dill. musc.* 184. *t.* 24. *f.* 78.
Habitat in Europæ *rupibus.* *arboreus & rup*

fahlunensis. 22. LICHEN imbricatus: foliolis linearibus dichot planiusculis acutis nigris, scutellis atris. *Fl.* 1040; 1078.
Lichenoides tinctorium atrum, foliis minimis c
Dill. musc. 188. *t.* 24. *f.* 81.
Habitat in Europæ *rupibus nudis.* *rup*

stygius. 23. LICHEN imbricatus, foliolis palmatis inc atris. *Fl. svec.* 949; 1079.
Habitat in Svecia, *imprimis in* Insula Baltici kulla. *rup*

cristatus. 24. LICHEN foliis imbricatis dentato-ciliatis, sc folio majoribus.
Lichenoides gelatinosum, foliis imbricatis & cri
Dill. musc. 140. *t.* 19. *f.* 26.
Habitat in Europa *australi.*

parietinus. 25. LICHEN imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis coloribus fulvis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1080.
Lichenoides vulgare sinuosum, foliis & scutellis
Dill. musf. 180. *t.* 24. *f.* 76.
Habitat in Europæ *parietibus*, *rupibus*, *lignis.*

physodes. 26. LICHEN imbricatus: laciniis obtusis subinflatis
Lichen foliaceus subdepressus lævis, laciniis integ mis truncatis: subtus concavis lacunosis atris. *Fl.* 951; 1081.
Lichen saxeus. *It. scan.* 409.
Lichen crustæ modo arboribus adnascens tenuiter sus. Buxb. cent. 3. p. 272. t. 14. f. 1.

;n pulmonarius arboribus adnascens: desuper cine-
is, subtus anthracinus: segmentis teretibus tubulosis.
ch. gen. 91. *t.* 50. *f.* 1. 2.
:noides ceratophyllum obtusius & minus ramosum.
ll. musc. 154. *t.* 20. *f.* 49.
at in Europæ *corticibus* Betulæ, *&* Saxis *ac*
ibus.
scitur a reliquis apicibus foliorum tumidis, & si
nsversim secentur, inflatis.

HEN imbricatus: foliolis oblongis laciniatis an- stellaris.
tis cinereis, scutellis pullis. *Fl. svec.* 950; 1082.
:n foliis laciniatis cinereis: laciniis obtusiusculis
ius apice trifidis. *Roy. lugdb.* 510.
:n pulmonarius vulgatissimus superne albo-cinere-
inferne nigricans, segmentis angustis, receptaculis
ricantibus. *Mich. gen.* 91. *t.* 43. *f.* 2.
:noides cinereum, segmentis argutis stellatis, scu-
is nigris. *Dill. musc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.
at in Europæ *ramis arborum.* *arboreus.*

* * * * *Foliacei.*

HEN foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliaris.
atis, scutellis pedunculatis crenatis. *Fl. svec.* 952;
3.
:n foliis laciniatis cinereis: laciniis linearibus apice
sis. *Roy. lugdb.* 509.
:n cinereus arboreus, marginibus pilosis, major.
ll. paris. 115. *t.* 20. *f.* 4.
noides hispidum majus & rigidius, scutellis nigris.
l. musc. 150. *t.* 20. *f.* 45.
o-fungus arboreus cinereus scutellatus; margini-
pilosis. *Moris. hist.* 3. *p.* 634. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 6.
us arboreus pyxoides pilosus. *Læs. pruss.* 171.
o.
at in Europæ *arboribus.* *arboreus.*

HEN foliaceus adscendens laciniatus; margini- islandicus.
elevatis ciliatis. *Fl. svec.* 959; 1085. *Mat. med.*
.
:n foliis oblongis laciniatis: marginibus conniven-
us ciliatis. *Fl. lapp.* 445. *Roy. lugdb.* 508. Hall.
. 75.

Lichen

Lichen terrestris, foliis eryngii. *Buxb. cent.* 2. t. 6. f. 1. 2.
Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. *Dill.* 209. t. 28. f. 111.
Muscus islandicus purgans. *Borrich. act. Hafn.* p. 126.
β. Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus crispioribus foliis. *Dill. musc.* 212. t. 28. f. 112.

tenuissimus. γ. Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muli instar textum. *Dill. musc.* 113. t. 17. f. 32.
Habitat in Europæ *sylvis sterilissimis, Pinetis,* terr
Varietas γ. *habitat frequens in sterilissimis collibus* cia, *Ramulis omnino teretibus, intus cavis,* ... *liatis, adeoque diversissimus; at color luridus,* rubra. *Varia specimina & gradus, unam eandem speciem esse evincunt.*

nivalis. 30. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus crispus ber lacunosus albus margine elevato. *Fl. svec.* 1086.
Lichen niveus sinubus dædaleis laciniatus, ramis ctis calyce orbiculato. *Fl. lapp.* 446. t. 11. f.
Lichenoides lacunosum candidum glabrum, en crispæ facie. *Dill. musc.* 162. t. 21. f. 56.
Habitat in Lapponiæ, Upsaliæ, Gronlandiæ al *apricis, siccis, glareosis.* terr

pulmonarius. 31. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber: l lacunosus; subtus tomentosus. *Fl. svec.* 960; 1 *Mat. med.* 490. *It. w.goth.* 215.
Lichen foliis oblongis divisis, superficie reticul punctata. *Fl. lapp.* 444. *Roy. lugdb.* 509.
Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, ... nibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 29. f. 113.
Muscus pulmonarius. *Bauh. pin.* 361.
Pulmonaria. *Fuchs. hist.* 631. *Cam. epit.* 783.
Habitat in Europæ *sylvis umbrosis super arbores* a*quas, præsertim in Fagis & Quercubus.* arbor

furfuraceus. 32. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: laci acutis: subtus lacunosis atris. *Fl. svec.* 953; 1
Lichen foliis planis laxis flaccidis inæqualiter laci tis: supra albis, subtus atris. *Fl. lapp.* 45..
Lichen arboreus leucomelanus: ramulis alter

itracinis, altera candidissimis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 12. 7. *f.* 1.
henoides cornutum amarum: desuper cinereum; ferne nigrum. *Dill. musc.* 157. *t.* 21. *f.* 52.
scus amarus, absinthii folio. *Bauh. hist.* 3. *p.* 764.
itat in Europæ *arboribus.* *arboreus.*

CHEN foliaceus planiusculus lobatus crenatus, eltis globosis inflatis. ampullaceus.
hen foliis laciniatis, marginibus convolutis in vesicam abeuntibus. *Roy. lugdb.* 509.
henoides tinctorum glabrum vesiculosum. *Dill. usc.* 188. *t.* 24. *f.* 82.
itat in Lancastria Angliæ.

CHEN foliaceus linearis ramosus nigro-subciliatis, peltis subpedunculatis radiatis. leucomelos.
itat in America *meridionali.*
a basi ramosa, linearia lineæ unius diametro, palaria, patentia, inæqualia, lactea, supra glabra, subus subfarinosa, margine rarius ciliata pilis longioribus atris, subramosis. Peltæ *hemisphæricæ albæ, conavæ, pedunculatæ, margine subradiatæ: dentibus sulatis, albis.*

CHEN foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus: lateribus verrucosis. *Fl. svec.* 957; 1089. farinaceus.
hen foliis multifidis, calycibus in margine foliorum ssilibus. *Roy. lugdb.* 510.
en cinereus angustior, scutis in marginibus segmentorum. *Vaill. paris.* 115. *t.* 20. *f.* 14. 15. 13.
enoides segmentis angustioribus ad margines verrucosis & pulverulentis. *Dill. musc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.
tat in Europæ *arboribus, præsertim Quercetis, Fraxinetis.* *arboreus.*

CHEN foliaceus erectus linearis ramosus lacunos convexus mucronatus. *Fl. svec.* 956; 1090. calicaris.
en cinereus latifolius ramosus. *Vaill. paris.* 115. *t.* - *f.* 6.
enoides coralliforme rostratum & canaliculatum. *Dill. musc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.
co-fungus arboreus capitulis rostratis. *Moris. hist.* *p.* 634. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 5.
tat in Europæ *arboribus, rupibus.*

37. LI-

fraxineus. 37. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolat laciniatus lacunosus glaber, scutellis subped tis. *Fl. svec.* 955; 1091.
Lichen foliis oblongis planis rugosis sinuatis, bus orbiculatis petiolatis. *Roy. lugdb.* 509.
Lichen pulmonarius cinereus mollior in ampl nias divisus. *Tournef. inst.* 549. *t.* 325. *f.* A
Lichenoides longifolium rugosum rigidum. D 165. *t.* 22. *f.* 59.
Musco-fungus quernus latifolius cinereus. M 3. *p.* 634. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 14. 3. 4.
Habitat in Europæ *Arboribus, præsertim* I

fuciformis. 38. LICHEN foliaceus rectiusculus lævis subto ramosus: laciniis lanceolatis.
Lichenoides fuciforme tinctorium, corniculis ribus & acutioribus. *Dill. musc.* 168. *t.* 22. *f.*
Fucus verrucosus tinctorius Roccella. *Bauh.* Bauh. *hist.* 3. *p.* 797.
Alga cornu cervi divisura. *Bauh. pin.* 367.
Habitat in India, Canariis.

prunastri. 39. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunosus tomentosus albus. *Fl. svec.* 954; 1092.
Lichen foliis mollibus candicantibus dichotom cibus orbiculatis sessilibus. *Roy. lugdb.* 570
Lichen cinereus vulgatissimus cornua damæ I *Vaill. parif.* 115. *t.* 20. *f.* 11. 12.
Lichenoides cornutum, bronchiale molle subt num. *Dill. musc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.
Habitat in Europæ *arboribus, præsertim in Pr nosa.*

juniperinus. 40. LICHEN foliaceus laciniatus crispus fulvus lividis. *Fl. svec.* 967; 1093.
Lichen fulvus sinubus dædaleis laciniatus. *Fl. la* *Roy. lugdb.* 510.
Habitat in Europæ *juniperetis.*
Differt a L. parietino colore pallide flavo; foli erectiusculis; peltis disco brunneis.

caperatus. 41. LICHEN pallide viridis rugosus margine un *Roy. lugdb.* 510. *Guett. stamp.* 1. *p.* 31.
Lichenoides caperatum rosacee expansum. Di 193. *t.* 25. *f.* 97.

fungus lichenoides, crustæ modo adnascens
: cinereus. *Moris. hist.* 3. *p.* 633. *s.* 15. *t.* 7.

in Europa & America *ad saxa & arbores.*

EN foliaceus depressus lobatus glaber: mar- **glaucus.**
crispo farinaceo. *Fl. svec.* 966; 1094.
oides endiviæ foliis crispis splendentibus subtus
cantibus. *Dill. musc.* 192. *t.* 25. *f.* 96.
Fungus lichenoides arborum crispus cinereus
is nigricans. *Moris. hist.* 3. *p.* 633. *s.* 15. *t.* 7.

in Europæ *frigidæ, præsertim* Sveciæ, *truncis*
linis. *arboreus*

* * * * * *Coriacei.*

IEN foliaceus repens lobatus obtusus, peltis **aquaticus.**
sphæricis maximis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1095.
oides scutellis amplis. *Dill. musc.* 150. *t.* 20. *f.*

in Svecia *sub aqua, in plaudibus.* *terrestris.*
diversa a Lichene crinito. Dill. musc. t. 84. *f.* 8.
a lobata, pallide viridia, margine integerrima.
æ subsessiles, primum planæ, demum dilatatæ, fo-
majores, incarnato-fuscæ, margine reflexo, supra
m folii positæ.

EN foliaceus repens lobatus, peltis margina- **resupinatus.**
s posticis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1096.
pulmonarius major f. minor ex obscuro cine-
: inferne ex albo rufescens, receptaculis florum
is ad latera oblongis. *Mich. gen.* 86. *t.* 44. *f.*
1.
ioides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill.*
. 206. *t.* 28. *f.* 105.
t in Europæ *sylvis.* *terrestris.*

IEN foliaceus repens ovatus planus subtus ve- **venosus.**
is villosus, peltis marginalibus horizontalibus.
svec. 964; 1097.
ioides parvum virescens, peltis nigricantibus pla-
Dill. musc. 208. *t.* 28. *f.* 109.
t in Europa *ad margines scrobiculorum in syl-*
terrestris.

46. LI-

aphtosus. 46. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus pla[...] verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. [...] *svec.* 953; 1098. *Mat. med* 422. *Amœn. acad.* 2, [...]
Lichenoides digitatum læte virens, verrucis [...] notatum. *Dill. musc.* 207. *t.* 28. *f.* 106.
Habitat in Europæ *sylvis acerosis sterilibus sub* [...] *ris.* [...]

arcticus. 47. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus p[...] lævis: subtus avenius villosus. *Fl. svec.* 962; [...]
Lichen foliis planis subrotundis lobatis obtusis, c[...] ce plano ovali lacinulæ propriæ adnato, [...] *Fl. lapp.* 442.
Habitat in Svecia *boreali*, *sub juniperis.* [...]
Folia *lata*, *integra*, *albida*, *subtus nivea.* Pelta [...] *tus versus marginem*, *magna*, *livido-incarnata*, [...] *gnitudine pollicis*, *adeoque inter omnes Lichenes* [...] *tissima. Supra læve est folium.*

caninus. 48. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus p[...] subtus venosus villosus, pelta marginali adscen[...] te. *Fl. svec.* 961; 1100. *Mat. med.* 491.
Lichen foliis planis subrotundis lobatis obtusis c[...] plano laciniæ propriæ adnato. *Fl. lapp.* 441. [...] *lugdb.* 508.
Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill.* p[...] 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis [...] sis. *Dill. musc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
Musco-Fungus terrestris latifolius cinereus, hepati[...] facie. *Moris. hist.* 3. *p.* 632. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in Europæ *sylvis*, *juxta lapides*, *in terra* [...]

saccatus. 49. LICHEN foliaceus repens subrotundus: peltis [...] pressis subtus saccatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1102. [...] *angl.* 453. *n.* 49.
Lichenoides lichenis facie, peltis acetabulis imme[...] *Dill. musc.* 223. *t.* 30. *f.* 121.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Austriacis. [...]

[...]oceus. 50. LICHEN foliaceus repens subrotundus planus su[...] tus venosus villosus croceus, peltis sparsis ad[...] Fl. svec. 965; 1101.
Lichen foliis subrotundis planis levissime incisis, [...]

lycibus orbiculatis disco folii adnatis. *Fl. lapp.* 443. t. 11. *f.* 3. *Roy. lugdb.* 509.
chen alpinus viridis subtus aurantius, scutis magnis nigris planissimis. *Hall. helv.* 74.
chenoides subtus croceum, peltis appressis. *Dill. musc.* 221. *t.* 30. *f.* 120.
bitat in Lapponia, Helvetia, Grœnlandia. *terrestris.*

* * * * * * *Umbilicati, squalentes quasi fuligine.*

ICHEN foliaceus gibbus punctatus: subtus fulvus. **miniatus.**
chen pulmonarius alpinus cinereus punctatus. *Hall. helv.* 75 *t.* 2. *f.* 2.
chenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum subtus fulvum *Dill. musc.* 223. *t.* 30. *f.* 127.
bitat in Angliæ, Helvetiæ, Italiæ *rupibus alpinis.*

ICHEN foliaceus umbilicatus: subtus hirsutissimus. **velleus.**
Fl. svec. 968; 1103.
chen folio subrotundo peltato: margine fere integro, subtus maxime hirsutus *Fl. lapp.* 454. *Roy. lugdb.* 511.
chenoides coriaceum, latissimo folio umbilicato & verrucoso. *Dill. musc.* 545. *t.* 82. *f.* 5.
bitat in alpinis Lapponiæ, Sveciæ, Angliæ. *rupestris.*

ICHEN foliaceus umbilicatus: subtus lacunosus. **pustulatus.**
Fl. svec. 969; 1107.
chen folio orbiculato margine integriusculo, superficie subtus pustulata. *Fl lapp.* 453. *Roy. lugdb.* 511.
chenoides crustæ modo saxis adnascens verrucosus cinereus & veluti deustus. *Vaill. paris.* 116. *t.* 20. *f.* 9.
chenoides pustulatum cinereum & veluti ambustum. *Dill. musc.* 227. *t.* 30. *f.* 131.
bitat in Europæ *rupibus apricis. rupestris.*

ICHEN foliaceus umbilicatus, peltis turbinatis truncatis perforatis *Fl svec.* 2. *n.* 1106 **proboscideus.**
chen *cylindricus* foliaceus ciliatus, peltis cylindricis rectis ipa[illegible] perforatis truncatis circulo duplici. *Amœn. acad.* 2 *p.* 264.
chenoid[illegible] foliorum laciniis crinitis. Dill. musc. 149. t. 20. *f.* 42.

Habitat in Svecia, Lapponia, Penſylvania.
Folium *magnitudine pollicis, ſubrotundum, orbicula[tum], margine inæqualiter & obtuſe lobatum, centro [umbili]catum, ſubtus læve, hinc inde & rarius fibram [radi]cantem exſerens; Pagina ſuperior planiuſcula vel [parum] nihil contorta, cinerea, punctis fuſcis elevatis [exaſpe]rata.* Peltæ *per diſcum ſparſæ, atræ, minimæ, [ſæpe] binatæ, truncatæ, poro pertuſæ usque ad folium, [mar]gine lato plano.*

deuſtus. 55. LICHEN foliaceus umbilicatus undique lævis. *Fl. ſvec.* 970; 1105. *It. w goth.* 217.
Lichen folio orbiculato peltato margine integriuſculo undique glaber. *Fl. lapp.* 452. *Roy. lugdb.* 511.
Lichen pulmonarius ſaxatilis e cinereo fuſcus [mini]mus. *Vaill. pariſ.* 116. *t.* 21. *f.* 14.
Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compreſſis. *Vaill. pariſ.* 219. *t.* 20. *f.* 117.
Habitat in Sveciæ, Galliæ *rupibus ſ. cautibus elatis apricis.*

polyphyllus 56. LICHEN foliaceus polyphyllus utrinque lævis [...]natus. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1104.
Lichenoides tenue pullum, foliis utrinque glabris. *Dill. muſc.* 225. *t.* 30. *f.* 129.
Habitat in Europæ *rupibus elatis apricis.*

polyrhizos. 57. LICHEN foliaceus polyphyllus utrinque lævis polyrhizos. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1108.
Lichenoides pullum ſuperne & glabrum, inferne nigrum & cirrhoſum. *Dill muſc.* 226. *t.* 30. *f.* 130.
Habitat in Arvoniæ, Sveciæ *rupibus apricis.*

* * * * * * * *Scyphiferi.*

cocciferus. 58. LICHEN ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. ſvec.* 972; 110[9]. *Mat. med.* 496.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato margine canoſo colorato prolifero. *Fl. lapp.* 429. *Roy. lugdb.* 51[1].
Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 4. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 3.
Coralloides ſcyphiforme, tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 82. t. 14. f. 7.
Habitat in Europæ *ſylvis ſterilibus, ericetis,* [...]

LICHEN ſcyphifer ſimplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Fl. ſvec.* 974; 1110. — cornucopioides.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato: centro multipliciter prolifero. *Fl. lapp.* 432. *Gron. virg.* 204. 128.
Coralloides ſcyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. muſc.* 85. *t.* 14. *f.* 9.
Muſcus pyxoides. *Barr. rar.* 1284. *t.* 1268. *f.* 2.
Habitat in Lapponiæ, Sveciæ, Angliæ *ſylvis glareoſis.*

LICHEN ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *Fl. ſvec.* 971; 1111. — pyxidatus.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato: margine tenui. *Fl. lapp.* 428. *Gron. virg.* 203. *Roy. lugdb.* 512.
Lichen pyxidatus major. *Tournef. inſt.* 549 *t.* 325. *f.* D. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 8. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 1.
Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc.* 79. *t.* 14 *f* 6.
Fungus terreſtris pyxidatus. *Magn. hort.* 83. *t.* 83.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato: centro ſimpliciter prolifero. *Fl. lapp.* 431. *Roy. lugdb.* 512.
Lichen pyxidatus prolifer. T. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 5. 9. 11.
Lichen pyxidatus major alpinus, receptaculis copioſioribus & rufeſcentibus. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 2. 7. 9.
Habitat in Europæ *ſylvis.*

LICHEN ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *Fl. ſvec.* 973; 1112. — fimbriatus.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato: margine acuto prolifero. *Fl. lapp.* 430.
Lichen pyxidatus minor. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 6. *Mich. gen.* 83. *t.* 41. *f.* 45.
Coralloides ſcyphiforme gracile, marginibus ſerratis. *Dill. muſc.* 84. *t.* 14. *f.* 8.
Habitat in Europæ *ſylvis ſterilibus.*

LICHEN ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis. *Fl. ſvec.* 975; 1113. — gracilis.
Lichen pyxidatus & corniculatus ramoſus alpinus e fuſco cinereus, pyxidulis crenatis. *Mich. gen.* 81. *t.* 41. *f.* 5.
Coralloides ſcyphiforme ſerratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. muſc.* 88. *t.* 14. *f.* 13.

Muſco fungus pyxidatus gracilior ramoſus, calycibus ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 362. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat in Europæ *ericetis*, *montoſis*, *ſylvaticis.*

ligitatus. 63. LICHEN ſcyphifer ramoſiſſimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis. *Fl. ſvec.* 978; 1114
Lichen caule inordinate ramoſo, ramis in calyces turbinatos margine carnoſos deſinentibus. *Fl. lapp.* 436.
Coralloides ramuloſum, tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 96. *t.* 15. *f.* 19.
Habitat in Europæ *ſylvis ſterilibus.*

cornutus. 64. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris. *Fl. ſvec.* 976; 1115.
Lichen caule ſimplici ſubulato, rarius bifido. *Fl. lapp.* 434. *Roy. lugdb.* 512.
Coralloides vix ramoſum, ſcyphis obſcuris. *Dill. muſc.* 90. *t.* 15. *f.* 14.
Muſcus fiſtuloſus corniculatus. *Barr. rar.* 1286. *t.* 1271. *f.* 1. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 149. *t.* 107.
Habitat in Europæ *ericetis.*

ieformis. 65. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. *Fl. ſvec.* 977; 1116.
Lichen caule ſimplici, apice acuto ſ. calyce turbinato terminato. *Fl. lapp.* 433. *t.* 11. *f.* 3.
Lichen pyxoides teres, acetabulis minoribus repandis. *Mich. gen.* 80. *t.* 41. *f.* 1.
Coralloides craſſius ſubincanum, calycibus dentatis. *Dill. muſc.* 95. *t.* 15. *f.* 18. *mala.*
Habitat in Europæ *ericetis.*

******** *Fruticuloſi.*

rangiferinus 66. LICHEN fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *Fl. ſvec.* 980; 1117.
alpeſtris. Lichen caule erecto tereti ramoſiſſimo, alis perforatis. *Fl. lapp.* 437. *Gron. virg.* 203. 127. *Roy. lugdb.* 511.
Coralloides montanum, fruticuli ſpecie ubique candicans. *Dill. muſc.* 107. *t* 16. *f.* 29.
Muſco-fungus coralloides montanus ramoſiſſimus cinereus vulgaris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 9.
Muſcus coralloides ſ. cornutus montanus. *Bauh. pin.* 361.
Muſcus corallinus ſ. Corallina montana. *Bauh. hiſt.* 1198.

ı caule ramoſo, alis perforatis, ramis capitatis. *ſylvaticus.*
. *lugdb.* 511.
oides fruticuli ſpecie candicans, corniculis rufe-
tibus. *Dill. muſc.* 110. *t.* 16. *f.* 30.
s terreſtris coralloides erectus, corniculis rufe-
tibus. *Bauh. pin.* 361. *prodr.* 152.
t in Alpibus & Europæ frigidæ ſylvis ſterilisſimis.
ris *differt* a ſylvatico, *ut flos plenus a ſimplici.*

IEN fruticuloſus perforatus, ramulis breviſſi- *uncialis.*
acutis. *Fl. ſvec.* 979; 1118.
ı caule ramoſo, alis perforatis, ramis breviſſi-
acutis. *Fl. lapp.* 438. *Roy. lugdb.* 511.
oides perforatum minus molle & tenue. *Dill.*
. 99. *t.* 16. *f.* 22.
t in Europæ *ericetis.*

IEN fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimpli- *ſubulatus.*
s ſubulatis. *Fl. ſvec.* 981; 1119.
ı caule erecto dichotomo, ramis ſubulatis. *Fl.*
435. *Roy. lugdb.* 512.
oides corniculis longioribus & rarioribus. *Dill.*
. 102. *t.* 16. *f.* 26.
s corniculatus. *Tabern. ic.* 809. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.
in Europæ *ſylvis, ericetis.*

IEN fruticuloſus ſolidus tectus foliolis cruſta- *paſchalis.*
Fl. ſvec. 982; 1120.
. caule ramoſo ſolido foliolis cruſtaceis tecto.
app. 439. *Roy. lugdb.* 512.
ı alpinus glaucus ramoſus botryoides. *Scheuch.*
137. *t.* 19. *f.* 4.
oides criſpum & botryoides alpinum. *Dill. muſc.*
t. 17. *f.* 33.
ina alpina valde criſpa. *Pet muſ. t.* 65. *f.* 7.
-fungus coralloides terreſtris denſe ramificatus
reus & veluti incruſtatus norvegicus. *Moriſ. hiſt.*
633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 12.
s cupreſſiformis ramoſus. *Læſ. pruſſ.* 168. *t.* 48.
t in Helvetiæ, Italiæ, Cambriæ, Lapponiæ,
iiæ, Grœnlandiæ, Penſylvaniæ *alpeſtribus.*

FN fruticuloſus ſolidus, ramulis teretibus ob- *fragilis.*
. *Fl. ſvec.* 983; 1121.
erectus ramoſiſſimus, ramulis teretibus nudis
mibus obtuſis. Fl. lapp. 440. t. 11. f. 4.

Coralloides alpinum, corallinæ minoris facie. musc. 116. t. 17. f. 34.
Habitat in Europæ *alpibus alpinisque, per* Sveci *rupibus.*

Roccella. 71. LICHEN fruticulosus solidus aphyllus [illegible] tuberculis alternis.
Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium teretis facie. *Dill. musc.* 120.
Muscus ceranoides palmensis, comis digitatis dictus. *Pet. gaz. t.* 7. *f.* 12.
Muscus ceranoides albus fungosus apicibus *Pluk. alm* 255. *t.* 205. *f.* 6.
Fucus marinus Roccella tinctorum. *Bauh. pin.*
Fucus capillaceus Roccella. *Bauh. pin.* 365.
Habitat in insulis Archipelagi, Canariis, *ad* [illegible] *rinas.*

* * * * * * * * * * *Filamentosi.*

plicatus. 72. LICHEN filamentosus pendulus, ramis [illegible] scutellis radiatis. *Fl svec.* 984; 1122. *Mat. m*
Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis [illegible] *Fl. lapp.* 457. *Gron. virg.* 203. 127.
Usnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill.* [illegible] *t.* 11. *f.* 1.
Muscus arboreus, Usnea officinarum. *Bauh. pi*
Habitat in Europæ & Americæ *borealis sylvi umbrosisque fagetis.*

barbatus. 73. LICHEN filamentosus pendulus subarticulat[illegible] mis patentibus. *Fl. svec.* 985; 1123.
Lichen caule tereti coriaceo, ramulis tenuissimi[illegible] reis. *Roy. lugdb.* 513.
Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill.* [illegible] *t.* 12. *f.* 6.
Muscus capillaceus longissimus. *Bauh. pin.* 36
Habitat in Europæ & Americæ *septentrionalis fagetis.*

jubatus. 74. LICHEN filamentosus pendulus: axillis com[illegible] *Fl. svec.* 986; 1124.
Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis, ali[illegible] pressis. *Fl. lapp.* 456.
Usnea jubata nigricans. *Dill. musc.* 64. *t.* 12. *f.*

Mu

Muſcus arboreus niger & tenuior. *Dod. pempt.* 471.
Habitat in Europæ *ſylvis & rupibus.*

LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implicatus opacus. *Fl. ſvec.* 987; 1125. **lanatus.**
Uſnea lanæ nigræ inſtar ſaxis adhærens. *Dill. muſc.* 66. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat in Europæ *frigidæ rupibus.*

LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implexus nitidus. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1126. **pubeſcens.**
Uſnea cæſpitoſa exilis capillacea atra. *Dill. muſc.* 66. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat in Europa *ſeptentrionali*, Lapponia, Svecia.

LICHEN filamentoſus ſubramoſus decumbens implicato-flexuoſus. *Fl. ſvec.* 988; 1127. **chalybeiformis.**
Uſnea rigida horſum vorſum extenſa. *Dill. muſc.* 66. *t.* 13. *f.* 10.
Muſcus caule rigido inſtar fili chalybei. *Raj. angl.* 3. *p.* 65.
Habitat in Europa *ſupra rupes & ſepimenta.*

LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Fl. ſvec.* 989; 1128. **hirtus.**
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior ſine orbiculis. *Dill. muſc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.
Muſcus ramoſus. *Tabern. ic.* 807.
Habitat in Europæ *arboribus, ſepimentis.*

9. LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus erectus faſtigiatus inæquali-anguloſus. *Fl. ſvec.* 990; 1129. **vulpinus.**
Uſnea capillacea citrina, fruticuli ſpecie. *Dill. muſc.* 73. *t.* 13. *f.* 16.
Habitat in Europæ *tectis ligneis, muris.*

LICHEN filamentoſus articulatus, ramulis tenuiſſimis punctatis. *Roy. lugdb.* 513. *n.* 29. **articulatus**
Uſnea capillacea & nodoſa. *Dill. muſc.* 60. *t.* 11. *f.* 4.
Muſcus arboreus nodoſus. *Bauh. pin.* 361.
Muſco-fungus arborum nodoſus ſ. geniculatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11.
Dendrobryon geniculatum ſ. nodoſum. *Col. ecphr.* 84. *t.* 83. *f.* 2.
Habitat in Europæ *auſtralis ſylvis.*

floridus. 81. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scut radiatis. *Fl. svec.* 991; 1130.*
Lichen caule ramoso solido, foliis setaceis, rece culis maximis orbiculatis peltatis ciliato-radi *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 513.
Usnea vulgatissima tenuior & brevior cum orbic *Dill. musc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.
Musco-Fungus arborum capillaceus, scutellis an per ambitum pilis radiatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 63 15. *t.* 7. *f.* 14.
Muscus arboreus cum orbiculis. *Bauh. pin.* 361.
Muscus ramosus floridus. *Tabern. ic.* 808.
Habitat in Europæ *fagetis.*

CHARA.

omentosa. 1. CHARA aculeis caulinis ovatis. *Fl. svec.* 993; 1
Equisetum fragile majus subcinereum aquis imme *Morif. hist.* 3. *p.* 621. *f.* 15 *t.* 4. *f.* 9.
Equisetum s. Hippuris lacustris, foliis mansu are *Pluk. alm.* 135. *t.* 29. *f.* 4.
Habitat in Europæ *stagnis, mari, lacubus.*

ulgaris. 2. CHARA caulibus lævibus, frondibus interne den
Chara vulgaris. *Fl. lapp.* 469. *Fl. svec.* 992; 113
Chara caulibus lævibus. *Roy. lugdb.* 533.
Chara vulgaris fœtida. *Vaill. act.* 1719. *p.* 23. *t.* 3
Equisetum fœtidum sub aqua repens. *Bauh. pi prodr.* 25. *theatr.* 251. *Bauh. hist.* 3. *p.* 731.
Habitat in Europæ *aquis pigris.*

ispida. 3. CHARA aculeis caulinis capillaribus confertis *svec.* 994. 1133.*
Chara caulibus aculeatis. *Hort. cliff.* 477. *Roy.* 214.
Chara major, caulibus spinosis. *Vaill. act.* 1719. *t.* 3. *f.* 3.
Equisetum s. Hippuris muscosus sub aqua repens. *alm.* 135. *t.* 193. *f.* 6.
Habitat in Europæ *maritimis.*

exilis. 4. CHARA caulium articulis inermibus diaphanis f ne latioribus. *It. gotl.* 215. *Fl. svec.* 995; 11
Chara transfluens minor flexilis. *Raj. angl.* 3. *p.*
Habitat in Europæ *maritimis.*

TR

TREMELLA.

MELLA sessilis membranacea auriformis fulva. juniperina.
vec. 1017; 1135.
gelatinosa fugax, junipero innascens. *Fl. lapp.* 531.
t in Juniperetis *primo vere.*

MELLA plicata undulata. *Fl. svec.* 1018; 1136. Nostoc.
lla terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc.*
. 10. *f.* 14.
gelatinosa fugax terrestris. *Fl. lapp.* 530.
terrestris gelatinosa membranacea vulgatissima.
h. *gen.* 126. *t.* 67. *f.* 1.
: paracelsi. *Act. parif.* 1708. *p.* 228.
t *in* Pratis *post pluvias.*

MELLA sessilis membranacea auriformis cine- Auricula.
Fl. svec. 1119; 1137.
la cyathiformis: labro altero inflexo repando.
med. 498.
um auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. *t.* 66. *f.* 1.
s membranaceus, auriculam judæ referens f.
ucinus. *Bauh. pin.* 372.
rum perniciorum genus 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 276.
ad Arbores *putridas.*

MELLA frondibus erectis planis: margine cri- Lichenoides
acinulato. *Fl. svec.* 1020; 1138.
oides pellucidum, endiviæ foliis tenuibus crispis.
musc. 143. *t.* 19. *f.* 31.
terrestris membranaceus mollior fuscus. *Mich.*
26. *t.* 38.
fungus terrestris minor fuscus, foliis e latitu-
crenatis musco innascens. *Moris. hist.* 3. *p.* 632.
t 7. *f.* 4.
in Muscis, *locis umbrosis ad montes.*

IELLA tuberculosa solida rugosa. *Fl. svec.* 1021; verrucosa.
. *It. gotl.* 181.
la subrotunda sinuosa difformis gelatinosa. *It.*
h. 193.
la fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill. musc.*
10. *f.* 6.
palustris gelatinosa saxis adnascens ex obscuro
& concava vesicam referens. *Mich. gen.* 126.
f. 2.
supra Lapides *in rivulis.*

hemisphærica. 6. TREMELLA hemisphærica sparsa. *Fl. svec.* 1141. *It. w-goth.* 193. *
Habitat in Rupibus & Confervis *submarinis.*

purpurea. 7. TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glab *svec.* 1022; 1142.
Lichenoides tuberculosum amœne purpureum. *musc.* 127. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat in Arborum *ramis moribundis & emortuis.*

difformis. 8. TREMELLA subrotunda sinuosa difformis gel sa. *Fl. svec.* 2. *n.* 1140. *It. w-goth.* 193.
Habitat in Oceani *Confervis.*

adnata. 9. TREMELLA rotunda imbricata livida. *Fl. sv* *n.* 1143. *It. scan.* 323.
Habitat in Oceani *rupibus submarinis.*

FUCUS.

* *Dichotomi frondescentes.*

serratus. 1. FUCUS fronde plana dichotoma serrata ad apic berculata. *Hort. cliff.* 478. *Fl. svec.* 1001; 11
Fucus folio dichotomo plano serrato laciniato. *stamp.* 2. *p.* 402. *Fl. lapp.* 462.
Fucus s. Alga latifolia major dentata. *Moris. hi* 648. *s.* 15. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Oceano.

vesiculosus. 2. FUCUS fronde dichotoma integra, caule i folium transcurrente, vesiculis verrucosis te bus. *Fl. lapp.* 466. *Fl. svec.* 1002; 1145. *It.* 168. *It. œl.* 83. *Roy. lugdb.* 514. *Guett. sta* 401.
Fucus marinus s. Quercus maritima vesiculas *Bauh. pin.* 365.
Quercus marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 255.
β. Fucus maritimus s. Quercus maritima foliorum mis tumidis. *Bauh. pin.* 365.
Habitat in Mari *atlantico.*

ceranoides. 3. FUCUS fronde dichotoma plana integra: api fidis vesiculosis. *Fl. lapp.* 465. *Fl. svec.* 100
Fucus humilis dichotomus ceranoides, latio liis ut plurimum verrucosis. *Moris. hist.* 3 *s.* 15. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat in Oceano.

FUCUS fronde dichotoma plana margine lacero. lacerus.
Fucus membranaceus ceranoides varie diſſectus. *Raj. angl.* 3. *p.* 44.
Habitat in Oceano *Anglico.*
Differt a F. ceranoide, *cui affinis, marginibus lateralibus (nec tantum apicibus) ciliato-laceris.*

FUCUS fronde ſpirali: margine dilatato repando-dentato. volubilis.
Spalica ſpiralis minor. *Ginan. adriat.* 1. *p.* 26. *t.* 27.
Alga ſpiralis maritima. *Bocc. ſic.* 70. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in Mari Mediterraneo.

FUCUS fronde dichotoma integra, caule folium percurrente: inferne nudo, veſiculis verrucoſis terminalibus. *Fl. lapp.* 467. *Fl. ſvec.* 1003; 1147. *Roy. lugdb.* 514. ſpiralis.
Fucus ſpiralis maritimus major. *Raj. angl.* 3. *p.* 41.
Habitat in Oceano.

FUCUS fronde bifida: laciniis ovato-lanceolatis inflatis apice diviſis. *Fl. lapp.* 468. *Fl. ſvec.* 1004; 1148. inflatus.
Habitat in Oceano Atlantico.

FUCUS fronde mambranacea lineari dichotoma divaricata integra: ramificationibus veſiculoſis. divaricatus.
Fucus bullatus fruticeſcens, caule nudo, foliis rectis compreſſis bifidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 647. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Anglia, Luſitania.

* * *Dichotomi caulescentes.*

FUCUS fronde filiformi compreſſa dichotoma recta. elongatus.
Fucus caule lineari aphyllo dichotomo. *Roy. lugdb.* 514.
Fucus ſpongioſus teres ramoſus viridis erectus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 647. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat inter Angliam & Hiſpaniam.

FUCUS dichotomus linearis: axillis divaricatis. excifus.
Fucus pumilus dichotomus: ſegmentis ex una parte gibboſis, ex altera excavatis. *Raj. angl.* 3. *p.* 43.
Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flaveſcens ceranoides, angulos rotundiuſculos efformans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat in Oceano *Europæo.*

11. FU-

nodosus. 11. FUCUS caule compresso dichotomo medio ram rum in vesiculam dilatato. *Roy. lugdb.* 514. *Fl. su* 1006; 1149.
Fucus caule tereti compresso dichotomo, vesicula m dio ramorum innata, vesiculis axillaribus laxis. *Ha cliff.* 479.
Fucus caule tereti compresso dichotomo, foliis oppo sitis minimis, vesicula in medio singuli rami. *F lapp.* 464. *Guett. stamp.* 2. *p.* 401.
Fucus maritimus, vesiculis majoribus singularibus p intervalla dispositis. *Moris. hist.* 3. *p.* 647. *s.* 15. 8. *f.* 2.
Fucus maritimus nodosus. *Dod. pempt.* 781.
Habitat in Mari *Atlantico.*

concatenatus. 12. FUCUS caule tereti ramosissimo, fructificationibu oblongis concatenatis. *Roy. lugdb.* 514.
Habitat in Oceano.

*** *Ramosi foliis distinctis.*

natans. 13. FUCUS caule tereti ramosissimo, foliis lanceolato-serratis, fructificationibus globosis pedunculatis sub-aristatis. *Fl. zeyl.* 389. *Roy. lugdb.* 513.
Fucus folliculaceus, serrato folio. *Bauh. pin.* 365.
Lenticula marina, serratis foliis. *Dalech. hist.* 1397.
Sargazo. *Pis. bras.* 2. *p.* 266.
Habitat in Pelago *libere natans, nec radicatus.*
Vegetabile ni fallor, inter omnia in orbe, numerosissimum

acinarius. 14. FUCUS caule tereti ramoso, foliis linearibus inte gerrimis, fructificationibus globosis pedunculatis.
Fucus folliculaceus, linariæ folio. *Bauh. pin.* 365.
Lenticula marina serapionis. *Lob. ic.* 2. *p.* 256.
Acinaria imperati *Donat. marin.* 35. *t.* 4. *f.* 1.*
Habitat in Italia & Oceano *australiori.*

lendigerus. 15. FUCUS caule tereti corymboso, foliis lanceola denticulatis alternis, fructificationibus cymosis.
Habitat ad Insulam Adscensionis. *Osbeck.*
Caulis *filiformis, fuscus, spithamæus, foliis alter quæ decidunt.* Rami *ex singulis alis simplices, le longiores, filiformes, laxi.* Folia *alterna, lan lata, dentata, pellucida.* Cyma *pedunculata ex gulis alis superioribus, continens plurimas fructi tiones subulatas, foliis breviores, fuscas, nodo sessiles.*

*****

* * * * *Ramosi fronde unita.*

FUCUS ramosus teres, fructificationibus turbinatis membrana cinctis. *Hort. cliff.* 478. — turbinatus.
Fucus marinus vesiculas habens membranis extantibus alatas. *Sloan. jam.* 4. *hist.* 2. *p.* 58. *t.* 20. *f.* 6.
Habitat in Americæ *rupibus marinis.*

FUCUS caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis vesiculis oblongis acuminatis. *Fl. lapp.* 463. *Fl. svec.* 1007; 1150. *Guett. stamp.* 2. *p.* 403. — filiquosus.
Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. *Bauh. pin.* 365.
Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.
Habitat in Oceano.

FUCUS fronde varicosa: ramis filiformibus ramulosis, vesiculis ovatis nodulosis mucronatis. — granulatus.
Habitat in Oceano Indico.
Fucus spithamæus. Caulis *erectus, crassiusculus, inæqualis.* Rami *Ramulique numerosi, alterni, varie jubramosi, filiformes, inæquales, terminati* Vesiculis *subovatis, nodulosis, terminatis mucrone.*

FUCUS vesiculis oblongis pedunculatis: terminatis foliolis linearibus. — barbatus.
Fucus maritimus: foliis tumidis barbatis. *Bauh. pin.* 365.
Quercus maritima barbata. *Bauh. prodr.* 154.
Habitat in Oceano.

FUCUS vesiculis ovatis alternis pedunculatis: terminatis foliis linearibus. — fœniculaceus.
Fucus folliculaceus, fœniculi foliis brevioribus. *Bauh. pin.* 365.
Habitat in Oceano.
Caulis *filiformis cui adnatæ alternatim Vesiculæ oblongæ, pedunculatæ, proferentes* Foliola *solitaria, plurave, linearia, interdumque vesicularia.*

FUCUS fronde bipinnata subfiliformi: apicibus vesiculosis dilatatis. *Læfl. epist.* 1. 4. — abrotanifolius.
Habitat in mari Anglico.

* * * * * *Fructificationibus non vesicariis.*

FUCUS subdichotomus teres filiformis ramosissimus: ramis inæqualibus setaceis. — confervoides.

Fu-

Fucus teres rubens ramosissimus. *Raj. angl.* 3. p.
Habitat in Mari Anglico.

Muscoides. 23. FUCUS caule tereti ramosissimo, ramis spars nis mollibus alternis.
Fucus folliculaceus fuscus f. nigricans ex insul pro. *Pet. mus.* 219? *Raj. suppl.* 13.
Habitat ad Insulam Adscensionis. *Osbeck.*
Refert ita Muscum, *ut exsiccatus nequeat a musc stingui. Madidus constat substantia coriacea fusci phana: caulibus ramisque confertis, filiformibus dique adspersis rudimentis ramulorum; spinis subst substantia & colore totius, brevissimis, inermibus.*

cartilagineus. 24. FUCUS cartilagineus, caule teretiusculo com so: frondibus supradecompositis pinnatis: la linearibus coloratis. *Roy. lugdb.* 515. *Guett.* 2. p. 404.
Fucoides rubens varie dissectum. *Raj. angl.* 3.
Muscus marinus tenuissime dissectus ruber. *Bau* 363.
Habitat in Oceano *australiore.*

saccharinus. 25. FUCUS caule tereti brevissimo, folio maxim siformi subsimplici. *Fl. lapp.* 460. *Fl. svec.* 1151. *It. w-goth.* 169.
Fucus longissimo latissimo crassoque folio. *Bauh.* 154. *Raj. hist.* 74. *E. N. C.* 1748. p. 450. t. 9. f.
Fucus alatus f. phasnagoides. *Bauh. pin.* 364.
Fucus scoticus latissimus edulis dulcis. *Sibb. Sco*
Habitat in Mari *Atlantico.*

palmatus. 26. FUCUS frondibus planis palmatis. *Roy. lugdb.*
Fucus membranaceus ceranoides. *Bauh. prodr.*
Fucus foliaceus humilis palmam humanam ref *Moris. hist.* 3. *p.* 646. *f.* 15. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in Oceano.

rubens. 27. FUCUS caule tereti ramoso, frondibus obl undulatis sinuatis. *Roy. lugdb.* 514.
Alga minor suave rubens varie divisa. *Mart. c* t. 32.
Habitat in Oceano.

pavonius. 28. FUCUS fronde sessili reniformi decussatim stri Fu

ucus maritimus gallopavonis pennas referens. *Bauh. prodr.* 155. *Morif. hift.* 3. *p.* 645. *f.* 15. *t.* 8. *f.* 7. *Ellif. cor.* 88. *t.* 33. *f. C.*
lga marina gallopavonis plumas referens. *Bauh. pin.* 364
ungus auricularis. *Bauh. pin.* 368.
Habitat in Mari Europæ *auftralis.*

FUCUS dichotomus ramofiffimus teres uniformis faftigiatus. *It. œl.* 120. *Fl. fvec.* 1008; 1152. — fastigiatus.
ucus caule lineari dichotomo. *Roy. lugdb.* 514.
ucus palmaris tenuis in orbem expanfus, in fegmenta bifida breviora teretia divifus. *Morif. hift.* 3. *p.* 649. *f.* 15. *t.* 9. *f.* 9.
ucus marinus polyfchides. *Læf. pruff.* 77. *t.* 15.
abitat in Oceano Baltico.

FUCUS fuperne dichotomus ramofiffimus teres faftigiatus: apicibus acuminatis. — furcellatus.
ucus parvus, fegmentis prælongis teretibus acutis. *Morif. hift.* 3. *p.* 648. *f.* 15. *t.* 9. *f.* 4.
abitat in Oceano *Anglico.*
faftigiato proxime accedit, fed altior, ramis craffioribus apice acuminatis.

FUCUS filiformis fimplex fubfragilis opacus. *Amœn. acad.* 4. *p.* 259. *t.* 3. *f.* 2. — Filum.
ucus filiformis fimplex. *Fl. lapp.* 459. *Fl. fvec.* 1009; 1153. *Roy. lugdb.* 513. *It. w-goth.* 168. *Guett. ftamp.* 2. *p.* 395.
ucus f. Filum maritimum germanicum. *Bocc. muf.* 2. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
lga nigro capillaceo folio. *Bauh. pin.* 364.
ilum maritimum germanicum. *Bauh. prodr.* 155.
unum marinum. *Bart. act.* 1671. *p.* 118. *f.* 8.
abitat in Oceano *Atlantico.*

FUCUS filiformis fimplex tenuiffimus fubdiaphanus. — Tendo.
ucus indicus teres, fetam pifcatoriam referens, longiffimus. *Pluk. alm.* 160. *t.* 184. *f.* 3.
ramen fparteum fetas equinas referens. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 11.
abitat in China.

FUCUS filiformis ramofiffimus hirtus. — ericoides.
ucus foliis ericæ f. tamarifci. *Raj. angl.* 3. *p.* 49.
amarifco fimilis maritima. *Bauh. pin.* 365.

Erica

Erica marina quibusdam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 799.
Habitat in Oceano Europæo.

aculeatus. 34. FUCUS ramosissimus lineari-filiformis comp marginibus lateralibus denticulis alternis erect
Fucus angustifolius, foliis dentatis. *Raj. angl.* 3.
Fucus tenuifolius, foliis dentatis. *Moris. hist.* 3.
f. 15. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat inter Angliam & Galliam.

U L V A.

intestinalis. 1. ULVA tubulosa simplex. *Fl. lapp.* 458. *Fl. svec.* 1154. *It. æl.* 33. *Hort. cliff.* 478. *Roy. lugdb.* *Gron. virg.* 204. 128.
Tremella marina tubulosa intestinorum figura *musc.* 47. *t.* 9. *f.* 7.
Fucus cavus. *Bauh. pin.* 364.
Habitat in Mari *omni.*

compressa. 2. ULVA tubulosa ramosa compressa. *It. gotl.* 16 *svec.* 1014; 1155.
Tremella marina tenuissima & compressa. *Dill.* 48. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat in Europæ *mari & tectis maritimis.*

confervoides. 3. ULVA filiformis articulata: articulis alternatim pressis. *Hort. cliff.* 478. *
Conferva marina fistulosa. *Dill. musc.* 34. *t.* 6. *f.*
Habitat in Mari.

latissima. 4. ULVA oblonga plana undulata membranacea vi *Fl. svec.* 2. *n.* 1156. *It. w-gotl.* 160.
Fucus longissimo latissimo tenuique folio. *Bauh* 364. *prodr.* 154.
Habitat in Mari Europæ.

Lactuca. 5. ULVA palmata prolifera membranacea: rament ferme angustatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1157.
Ulva marina lactucæ similis. *Raj. angl.* 3. *p.* 62.
Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. *Dill.* 42. *t.* 8. *f.* 1.
Muscus marinus lactucæ similis. *Bauh. pin.* 364.
Habitat in Oceano.
Frondes *aggregatæ*, *membranaceæ*, *pallidæ*, *pal segmentis singulis iterum in frondes palmatas* *undatis*, *obovatis*, *obtusis*, *pellucidis.*

6. U

ULVA cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. labyrinthiformis.
Ulva thermalis valvulosa erecta simplex, capitulo subrotundo. *Vandell.*
Habitat in Thermis Patavinis *gradu caloris* 49, *pulchre æri incisa cum descriptione a Vandellio.* Membranæ *binæ, horizontales, distantes: superiore tenuiore, intertexta parietibus numerosis, variisque formantibus cellulas labyrinthiformes. E superficie exsurgunt Mucrones, multiplici basi, trunci clavati, obtusi, ex 7. membranis conflati, intus cavi. In membranis & cavitatibus dispersa sunt* Grana *plurima, concava.*

ULVA fronde dilatata subsinuata, centro radicata. umbilicalis.
Tremella marina umbilicata. *Dill. musc.* 45. *t.* 8. *f.* 3.
Fucus umbilicus marinus dictus. *Bauh. pin.* 364.
Habitat in Oceano.

ULVA fronde oblonga bullata. *Fl. svec.* 2. *n.* 1158. Linza.
Tremella marina fasciata. *Dill. musc.* 46. *t.* 9. *f.* 6.
Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ similis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 81.
Muscus lactucæ marinæ similis. *Bauh. pin.* 364.
Habitat in Oceano.

ULVA subglobosa solitaria. *Fl. svec.* 1015; 1159.* pruniformis.
Fucus globosus sessilis mollis. *Gleditsch. monogr.*
Habitat in lacubus Speciæ, Borussiæ.

ULVA sphærica aggregata. *Fl. svec.* 1016; 1160.* granulata.
Tremella palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus. *Dill. musc.* 55. *t.* 10. *f.* 17.
Habitat in Europa *ad ripas fluviorum.*

CONFERVA.

* *Filamentis simplicibus, æqualibus, geniculis destitutis.*

CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. *Fl. svec.* 1023; 1161. rivularis.
Conferva capillaris simplicissima enodis. *Roy. lugdb.* 511. *Guett. stamp.* 1. *p.* 45.
Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans. *Dill. musc.* 12. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in Europæ *rivulis fluviisque pacatioribus.*

CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus. *Fl. svec.* 2. *n.* 1163. fontinalis.

Conferva minima, byssi facie. *Dill. musc.* 14. t. 1.
Habitat in Europæ *fontibus.*

* * *Filamentis ramosis, æqualibus.*

bullosa. 3. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, bu aëreas includens.
Conferva filis ramosis æqualibus radicatis. *Fl.* 1024; 1166.
Conferva palustris bombycina. *Dill. musc.* 18. t. 3. f
Alge bombycina. *Bauh. pin.* 363.
Muscus aquaticus bombycinus, tenuissimis fila *Læs. pruss.* 173. t. 55.
Habitat in Europæ aquis *stagnantibus.*

canaliculatis. 4. CONFERVA filamentis æqualibus basin versu mosioribus. *Fl. svec.* 2. *n.* 1162.
Conferva rivulorum capillacea, densissime con ramulis. *Dill. musc.* 21 *t.* 4 *f.* 15.
Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Bau* 364.
Habitat in Europæ *rivulis, tubulis, canalibus mol nariis.*

amphibia. 5. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, exsi tione coëuntibus in aculeos. *Fl. svec.* 2. *n.* 116
Conferva amphibia fibrillosa & spongiosa. *Dill.* 22. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Europæ *udis, fossis, umbrosis, ubi aqu cissitudines servant.*

littoralis. 6. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis e gatis scabriusculis.
Conferva maritima filiformis longissima fusca, r alternis simplicibus brevioribus pallidis. *Fl.* 1028; 1170. *It. goth.* 261. *n.* 3.
Conferva marina capillacea longa ramosissima. *musc.* 23. *t.* 4. *f.* 19.
Habitat in Europæ *marinis rupibus.*

æruginosa. 7. CONFERVA filamentis ramosis mollibus digito vioribus viridissimis.
Conferva marina capillacea brevis viridissima m *Dill. musc.* 23. *t.* 4. *f.* 20.

CONFERVA filamentis æqualibus dichotomis. *dichotoma*
Conferva dichotoma, setis porcinis similis. *Dill. musc.* 17. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat in Angliæ *fossis pratorum.*

CONFERVA filamentis proliferis fastigiatis hirtis. *scoparia.*
Conferva marina pennata. *Dill. musc.* 24. *f.* 23.
Habitat in mari Europæo.

CONFERVA filis ramosis: filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1171. *cancellata.*
Conferva marina cancellata. *Dill. musc.* 24. *t.* 4. *f.* 22.
Habitat in mari Europæo.
Filamenta *lateralia quasi intra totidem vesiculas aërem recondunt.*

* * * *Filamentis anastomosantibus.*

CONFERVA filamentis reticulatim coadunatis. *reticulata.*
Conferva reticulata. *Dill. musc.* 20. *t.* 4. *f.* 14. *Fl. svec.* 1025; 1167. *Guett. stamp.* 1. *p.* 45.
Conferva reticulata crispa. *Pluk. alm.* 113. *t.* 24. *f.* 2. *Moris. hist.* 3. *p.* 644. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 4.
Muscus aquaticus bombycinus retiformis. *Læs. pruss.* 173. *t.* 54.
Habitat in Europæ *fluviis ad eorum litora.*

* * * * *Filamentis nodosis.*

CONFERVA filis simplicissimis setiformibus rectis: geniculis crassioribus angulatis. *fluviatilis.*
Conferva filis simplicissimis setiformibus rectis, tuberculis sparsis. *Fl. svec.* 1025; 1168.
Conferva fluviatilis lubrica setosa, equiseti facie. *Dill. musc.* 39. *t.* 7. *f.* 47.
Habitat in Europæ *fluviis confragosis.*

13. CONFERVA filis ramosis moniliformibus: articulis globosis gelatinosis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1165. *gelatinosa*
Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major & fusca. *Dill. musc.* 36. *t.* 7. *f.* 42. *Guett. stamp.* 1. *p.* 46.
Conferva fontalis geniculata lubrica major. E. N. C. *cent.* 5. 6. *app.* 60. *t.* 13. *f.* 3.
Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor & viridis. *Dill. musc.* 37. *t.* 7. *f.* 43.
Corallina pingvis ramosa viridis. *Vaill. paris.* 40. *t.* 7. *f.* 6.

Habitat in Europæ *fontibus præstantissimis limpidissimis.*

Confer. Conferva stagnalis, globulis virescentibus muscosis. *Dill. musc.* 38. *t.* 7. *f.* 44.

Conferva alpina lubrica, filamentis nodosis cæruleis. *Dill. musc.* 38. *t.* 7. *f.* 45.

Conferva fontana nodosa lubrica, filamentis tenuissimis nigris. *Dill. musc.* 39. *t.* 7. *f.* 46.

* * * * * *Filamentis geniculatis.*

capillaris. 14. **CONFERVA** filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis.

Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. *Dill. musc.* 25. *t.* 5. *f.* 25.

Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.* 113. *t.* 84. *f.* 9. *Moris. hist.* 3. *p.* 644. *f.* 15. *t.* 4. *f.* 3.

Habitat in Europæ *lacubus, stagnis, vadis, fossis.*

corallinoides. 15. CONFERVA filis geniculatis dichotomis.

Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata crassior. *Dill. musc.* 33. *t.* 6. *f.* 36.

Habitat in Mari Europæo, *colore albo & rubenti.*

Confer. Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata tenuior. *Dill. musc.* 33. *t.* 6. *f.* 37.

catenata. 16. CONFERVA filis geniculatis: articulis cylindricis.

Conferva ramosa, geniculis longioribus cateniformibus. *Dill. musc.* 27. *t.* 5. *f.* 27.

Habitat in Mari Europam *australem &* Americam *meridionalem alluente.*

polymorpha. 17. CONFERVA filamentis geniculatis, ramis fasciculatis.

Conferva marina articulata capillacea ramosissima viridis. *It. goth.* 261. *n.* 2. *Fl. svec.* 1031; 1174.

Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. musc.* 32. *t.* 6. *f.* 35.

Corallinæ affinis s. Muscus coralloides, multifido capillaceo folio, palmites pelagica nigra. *Pluk. alm.* 119. *t.* 47. *f.* 10.

Muscus tridactylites capillaceus maritimus multifidus niger, radice fibrosa. *Bocc. mus.* 1. *p.* 268. *t.* 5. *f.*

Muscus marinus crispus pachycaulos loricatus niger. *Bocc. musc.* 315. *t.* 7. *n.* 1.

Fucu

Fucus crispus loricatus nigricans. *Barr. rar.* 1323. *t.* 1301.
Habitat in Mari Europæo.

CONFERVA filamentis geniculatis flexuosis, ramis ramulisque brevioribus. *Fl. svec.* 2. *n.* 1177. vagabunda.
Conferva marina trichodes, lanæ instar expansa. *Dill. musc.* 30. *t.* 5. *f.* 32.
Habitat in Mari Europæo, *libera vagatur in aquarum medio.*

CONFERVA filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. glomerata.
Conferva fontinalis ramosissima glomeratim congesta. *Dill. musc.* 28. *t.* 5. *f.* 31.
Conferva viridis capillacea, brevioribus setis, ramosior s. Conferva minor ramosa. *Moris. hist.* 3. *p.* 644. *f.* 15. *t.* 4. *f.* 2.
Alga fontalis tricodes. *Bauh. pin.* 364.
Habitat in Europæ *fontibus, fossis, rivulis.*

CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis viridibus. *Fl. svec.* 2. *n.* 1176. rupestris.
Conferva marina trichodes ramosior. *Dill. musc.* 28. *t.* 5. *f.* 29.
Conferva marina trichodes s. Muscus marinus virens tenuifolius. *Plük. mant.* 53. *t.* 182. *f.* 6.
Habitat in Europæ *marinis rupibus copiosissima.*

CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis e centro confertissimis globum constituentibus. ægragropila.
Conferva globosa, filamentis articulatis ramosissimis e centro prodeuntibus rectis. *Fl. svec.* 1027; 1169. *
Habitat in Sveciæ *lacubus*, Dannemoræ, Stockholmiæ. &c.

BYSSUS.

* *Filamentosæ.*

BYSSUS filamentis plumosis natantibus. Flos aquæ.
Byssus farinacea virescens aquæ inspersa. *Fl. lapp.* 532. *Fl. svec.* 1128; 1182. *Guett. stamp.* 1. *p.* 3. *Roy. lugdb.* 520.
Byssus membranacea aquatica. *Fl. lapp.* 529.
Byssus latissima, papyri instar supra aquam expansa. *Dill. musc.* 2.

Habitat in Mari & *omni aqua, prima æstate; ascendit parum, die natat fere.*

Constat farina, cujus moleculæ, Confervæ instar, laues, ramosæ, plumæ similes, niveæ. P. Bergiu

phosphorea. 2. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adnascens. *musc.* 4. *t.* 1. *f.* 6 *Fl. svec.* 1130; 1186.
Habitat in Europæ *lignis putrescentibus.*

velutina. 3. BYSSUS filamentosa viridis. *Fl. svec.* 2. *n.* 118
Byssus tenerrima viridis velutum referens. *Dill.* 7. *t.* 1. *f.* 14.
Byssus terrestris viridis herbacea & mollissima, mentis ramosis & non ramosis. *Mich. gen.* 89. *f.* 5.
Habitat in Terra.

aurea. 4. BYSSUS capillacea pulverulenta, fructificationi sparsis, filamentis simplicibus ramosisque. *Gled. fung.* 1.
Byssus petræa crocea, glomerulis lanuginosis. *musc.* 8. *t.* 1. *f.* 16.
Byssus aurea derbensis humifusa. *Pet. gaz.* 1. *t. f.* 3.
Byssus minima saxatilis inodora, filamentis partim plicibus partim ramosis. *Mich. gen.* 210. *t.* 89. *f.* 1.
Habitat in rupibus Arvoniæ, Italiæ.

cryptarum. 5. BYSSUS capillacea perennis cinerea tenax rupi ta. *Fl. lapp.* 527. *Fl. svec.* 1127; 1181.
Habitat in spelunca rupestri Medelpadiæ.

* * *Pulverulentæ.*

antiquitatis. 6. BYSSUS pulverulenta atra. *It. gotl.* 298. *Fl.* 1126; 1180.
Habitat in ædium *muris antiquissimis.*

saxatilis. 7. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. *svec.* 2. *n.* 1179.
Habitat in Saxo *omni, diutius aëri exposito. quod omni cinereo colore obducit, ipsa vix manifesta.*

Jolithus. 8. BYSSUS pulverulenta sangvinea saxis innascens
Byssus perennis pulverulenta rubra lapidibus innasc *Fl. lapp.* 528. *Fl svec.* 1125; 1178. * *Guett.* 1. p. 3. Roy. lugdb. 520.

Byssi

Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem spirans. *Mich. gen.* 210. *t.* 89 *f.* 3.
Violithus s. lapis violaceus. *Swenck. foss.* 382. *It. w:got.* 9. 250. * 254. 263.
Habitat in Europæ *frigidæ sylvis opacis, supra saxa ante unum alterumve annum eversa & supinata.*

BYSSUS pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. musc.* 3. *t.* 1. *f.* 4. *Fl. svec.* 2. *n.* 1185. candelaris.
Byssus farinacea flava. *It. w-goth.* 159. 52. *It. œl.* 30.
Habitat per omnes quatuor mundi plagas in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis diutius vento humido expositis.

BYSSUS pulverulenta viridis. *Fl. svec.* 2. *n.* 1187. botryoides.
Byssus botryoides saturate virens. *Raj. angl.* 3. *p.* 5. 6. *Dill. musc.* 3. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in terra diutius humida, umbrosa, ut in ollis Hortulanorum.

BYSSUS pulverulenta incana, farinæ instar strata, *Dill. musc.* 3 *t.* 1. *f.* 3. *Fl. svec.* 1131; 1188. incana.
Habitat solo glareoso, ad latera fossularum, juxta vias publicas.

BYSSUS pulverulento-crustacea albissima. *Fl. svec.* 2. *n.* 1189. lactea.
Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat in Muscis & *arborum corticibus.*

FUNGI.

AGARICUS.

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Fl. svec.* 1049; 1207. * *It. w. goth.* 215. *Dalib. paris.* 364. Cantharellus.
Agaricus caulescens fulvus, pileo concavo: margine reflexo, lamellis erectis, stipite brevissimo. *Fl. lapp.* 493.
Elvela pediculata pileata, pileo subtus reticulato. *Guett. stamp.* 1. *p.* 12.

Fungus minimus flavescens infundibuliformis. *Bauh. pin.* 373. *Vaill. paris. t.* 11. *f.* 9. 10.

β. Fungus pileo per maturitatem instar agarici intybacei. *Vaill. paris. t.* 11. *f.* 11. 12. 13.

γ. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus. *Vaill. paris. t.* 11. *f.* 14. 15.

Habitat in pratis.

Variat mire ex Agarico *in* Pezizam Acetabulum.

Pilei lamellæ crassæ, ab ipsa substantia fungi non distinctæ.

quinquepartitus. 2. AGARICUS stipitatus, pileo subflavescente partito, lamellis albidioribus interne dentato-connexis.

Agaricus caulescens, pileo cinereo quinquepartito, lamellis albis. *Fl. svec.* 1063; 1222. *

Habitat in Pratis.

integer. 3. AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus. *Fl. svec.* 1071; 1230. *

Agaricus caulescens, pileo plano-concavo purpureo, lamellis stipiteque albis. *Fl. lapp.* 486.

Agaricus major, pediculo longo modice crasso, lamellis albis creberrimis superne ad margines apparentibus. *Raj. suppl.* 18. *Buxb. cent.* 4. *p.* 12. *t.* 19.

β. Agaricus caulescens, petiolo crassiusculo albo, pileo plano sangvineo, lamellis albis. *Fl. lapp.* 487.

Habitat in Sylvis.

muscarius. 4. AGARICUS stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato: apice dilatato, basi ovato. *Fl. svec.* 1076; 1235. *

Agaricus caulescens, pileo sangvineo: verrucis lamellisque albis, stipite albo basi globoso. *Fl. lapp.* 50[illegible].

Fungus pileo sanguineo verrucoso, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulboso. *Hall. helv.* 39.

Fungorum perniciosorum genus 12. n. 4. *Clus. hist.* 2. *p.* 280.

Habitat in Pratis.

Cimices necat & eradicat promtissime. It. scan. 430.

dentatus. 5. AGARICUS stipitatus, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis.

Agaricus caulescens, pileo flavo lævi margine inflexo, lamellis pallidioribus basi angulatis. *Fl. svec.* 104[illegible]. 1206. *

Habi-

abitat in Sylvis.
leus *flavescens, lævis, subviscidus.* Lamellæ *basi a Stipite discedentes, ubi denticulo acuminato instructæ.* Stipes *fistulosus, angustus, cylindricus, nudus, versus pileum striatus, confertim natus.*

GARICUS stipitatus, pileo testaceo: succo lu- escente. *Fl. svec.* 2. *n.* 1211. — deliciosus.
nanita lateritii coloris, croceo [illegible]co turgens. *Dill. giss.* 179.
ngus perniciosus, lateritio colore varians, succum acrem & croceum fundens. *Mich. gen.* 141. *Hall. helv.* 49.
bitat in Montibus, sterilibus, sylvosis.

GARIÇUS stipitatus, pileo plano carneo lactescen- e, lamellis ruffis, stipite longo carneo. *Fl. lapp.* 484. — lactifluus.
ngus flavo-ruffus in medio depressus, lacte non acri manans. *Hall. helv.* 50.
bitat in Sylvis.

GARICUS stipitatus, pileo planiusculo lactescen- te: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Fl. svec.* 1036; 1195. * — piperatus.
ngus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens. *Mich. gen.* 141. *Hall. helv.* 34. *n.* 1.
ngus albus acris. *Bauh. pin.* 371.
bitat in Pascuis, Sylvis.

GARICUS stipitatus, pileo convexo squamato al- bido, lamellis ruffis. *Fl. svec.* 1045; 1203. * — campestris.
aricus caulescens, pileolo sordido lacero, pileo albo membranaceo, lamellis rufescentibus. *Fl. lapp.* 482.
garicus pediculo annulato, pileo superne albus, inferne rubens. *Guett. stamp.* 1. *p.* 22.
ngus campestris albus superne, inferne rubens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 824. *Mich. gen.* 174. *Hall. helv.* 50.
bitat in Pratis.

AGARICUS stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite cærulescente lana ferruginea. *Fl. svec.* 1066; 1226. * *Dalib. parif.* 371. — violaceus.
ungus esculentus bulbosus dilute purpureus. *Mich. gen.* 149. *t.* 49. *f.* 1.
ungus cæruleus major. *Buxb. cent.* 4. *p.* 7. *t.* 11.
bitat ad margines Sylvarum.

cinnamomeus. 11. AGARICUS stipitatus, pileo sordide flavo, la-
lis luteo ruffis. *Fl. svec.* 1047; 1205. *
Agaricus caulescens flavus, pileo plano. *Fl. lapp.*
Habitat in Sylvis.

viscidus. 12. AGARICUS stipitatus, pileo purpurascente
viscido, lamellis fusco-purpurascentibus.
Agaricus caulescens, pileo convexo purpura-
lamellis ruffis, stipite brevi crassiusculo albo. *Fl.*
485. *Fl. svec.* 1070; 1229. *
Habitat in Sylvis.

equestris. 13. AGARICUS stipitatus, pileo pallido: disco
tim luteo, lamellis sulphureis. *Fl. svec.* 1060;
Agaricus caulescens, pileo convexo sordido:
inflexo, lamellis pallidis: basi remotis, stipi-
lindraceo. *Fl. lapp.* 502.
Habitat in Pascuis, Sylvis.

georgii. 14. AGARICUS stipitatus, pileo flavo convex-
mellis albis. *Fl. svec.* 1052; 1210.
Agaricus caulescens, pileo plano sulphureo, la-
albis, stipite crassiusculo. *Fl. lapp.* 496.
Fungus orbicularis exalbida pratensis. *Bauh. pin.*
Hall. helv. 38.
Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pa-
vitie, esculenti pratensis 1. *Bauh. hist.* 3. *p.* 82
Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. *t.* 11. *f.*
Habitat in Sylvis.

mammosus. 15. AGARICUS stipitatus, pileo convexo acumina-
seo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite
Agaricus caulescens, pileo convexo sordido:
co prominente, lamellis pallidis, stipite cylindr-
Fl. lapp. 501. *Fl. svec.* 1059; 1218. *
Fungus minor, capitulo pileum nauticum refe-
pediculo longiore. *Buxb. cent.* 4. *p.* 13. *t.* 21. *f.*
Habitat in Sylvis.

clypeatus. 16. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphaerico
acuminato, lamellis albis, stipite longo cylin-
albo. *Fl. lapp.* 506. *Fl. svec.* 1057; 1216. *
paris. 373.
Fungus viscidus papillaris striatus terreus, fubtus
Hall. helv. 41.
Habitat in pratis sylvaticis.

ARICUS ftipitatus, pileo campaniformi albido la- o; lamellis niveis, ftipite fubbulbofo fubulato nudo. *extinctorius*
icus caulefcens albus. pileo conico, ftipite cylin- ceo. *Fl. lapp.* 481. *Fl. fvec.* 1037. 1044; 1196. *
icus caulefcens albus, petiolo longiffimo, pileo iico. *Fl. lapp.* 480.
at in fimetis & ad pagos.

ARICUS ftipitatus, pileo campanulato lacero, iellis nigris lateraliter flexuofis, ftipite fiftulofo. *fimetarius.*
cus caulefcens, pileo conico cinereo, lamellis ris: margine lacero, ftipite longiffimo albo. *Fl.* p. 503. *Fl. fvec.* 1056; 1215. *
us comatus. *Sterb. fung.* 218. *t.* 22. *f. J. K. L.*
us albus ovum referens. *Buxb. cent.* 4. *p.* 16. *t.* *f.* 1.
orum pernicioforum genus 14. fpec. 3. *Cluf. hift.* ?. 282.
at in fimetis.

ARICUS ftipitatus, pileo campanulato ftriato lucido, lamellis adfcendentibus, ftipite nudo. *campanulatus.*
cus caulefcens, pileo conico cinereo, lamellis al- , ftipite longo. *Fl. lapp.* 507. *Fl. fvec.* 1054; 1213. *
us multiplex obtufe conicus, colore grifeo muri- *Vaill. parif.* 71. *t.* 12. *f.* 1. 2.
at in pratis.

RICUS ftipitatus, pileo lævi livido, lamellis icantibus feparatis, ftipite bulbofo volvato. *Fl.* . 2. *n.* 1220. *feparatus.*
at in ftercoratis.

RICUS ftipitatus, pileo convexo vifcido pellu- o lamellisque luteis, ftipite nudo. *fragilis.*
is pileo crocei fplendoris participe. *Vaill. parif.* t. *f.* 16. 17. 18.
at ad ambulacra.

RICUS ftipitatus, pileo plicato membranaceo, ellis bafi latioribus. *Fl. fvec.* 1033; 1192. *umbellifer.*
cus caulefcens albus parvus, ftipite longo, pileo io pellucido: margine multifido. *Fl. lapp.* 471.
cus minimus, capitulo turbinato plano albo, la- lis margine fufcis. *It. æl.* 38.

Fun-

Fungus minimus totus albus, pileo hemisph utrinque striato, lamellis rarioribus. *Mich. ge t.* 80. *f.* 11.
Habitat inter Folia congesta, semiputrida.

Androsaceus. 23. AGARICUS stipitatus albus, pileo plicato me naceo, stipite nigro. *Fl. svec.* 1034; 1193. *goth.* 215. *Dalib. paris.* 374.
Agaricus caulescens albus minimus, petiolo an pileo plano verrucoso: margine octofido. *Fl.* 472.
Fungus caule nigro capillari, androsaces capitulo. *mus.* 143. *t.* 104.
Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pedicu sco splendente. *Vaill. paris.* 69. *t.* 11. *f.* 21. 22.
Habitat in foliis dejectis Pini.
Stipes capillaris. Lamellæ tenuissimæ.

clavus. 24. AGARICUS stipitatus, pileo luteo convexo la lamellis stipiteque albis. *Fl. svec.* 1053; 1212.
Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill.* 76. *t.* 11. *f.* 19. 20. *Hall. helv.* 38.
Habitat in Nemoribus, inter folia decidua.

crinitus. 25. AGARICUS stipitatus, pileo infundibuliformi loso, lamellis æqualibus, stipite filiformi.
Pocellaria lanuginosa, superne cava obverse co externe lamellata. *Brown. jam.* 78. *t.* 15. *f.* 1.
Fungoides cyathiforme purpureum intus villo *Plum. spec.* 16. *filic. t.* 227. *f. B.*
Habitat in America *meridionali. Rolander.*
Stipes *lævis, crassitie pennæ.* Pileus *turbinatus, instar coni inversi s. campanæ marginibus replic superficie undique tecta pilis tenuissimis, adscendent longitudine pilei.* Lamellæ *tenuissimæ, æquales.*

* * *Parasitici, acaules, dimidiati.*

Quercinus. 26. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformi *Fl. svec.* 1082; 1241.
Agaricus villosus, lamellis sinuosis & invicem im xis. *Buxb. cent.* 5. *p. t.* 4. *f.* 1.
Agarico-fungus lamellis crassissimis rigidis. *Hall.* 57.
Habitat in Quercubus.

27. AGA

.GARICUS acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Fl. svec.* 1085. 1244. *Betulinus.*
bitat in Betulis.

.GARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *Fl. svec.* 1083.; 1242. *Alneus.*
arico-Fungus lamellis bifidis pulverulentis. *Hall. helv.* 58.
bitat in Alno.
ucas species Fungorum recenseo, ut evitem varietates, quæ plures sunt, quam vulgo creditur, & quidem sæpe aliena genera constituentes, adeoque in his etiam-num valde deficit Res herbaria.

BOLETUS.

* *Acaules, parasitici.*

LETUS acaulis pulvitanus albus lævis, poris acu-is difformibus. *tuberosus.*
letus acaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris difformibus rotundis flexuosisque. *Fl. svec.* 1093; 1253.
bitat in Betulis.

LETUS acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis. *Fl. svec.* 1092; 1252. * *fomentarius*
bitat in Betulis.

LETUS acaulis pulvitanus lævis, poris tenuissi-mis. *Fl. svec.* 1096; 1256. *Fl. lapp.* 382. *igniarius.*
aricus pedis equini facie. *Tournef. inst.* 562.
ngus in caudicibus nascens, unguis equini figura. *Bauh. pin.* 372.
bitat in Betulis *aliisque arboribus.*

LETUS acaulis: fasciis dicoloribus poris albis. *Fl. svec.* 1094; 1254. *versicolor.*
arico-polyporus versicoloribus lineis varius, poris albis tenuissimis. *Hall. helv.* 26.
bitat ad truncos Arborum antiquarum.

LETUS acaulis subpulvinatus scaber: setis erectis ramosissimis, poris angulatis patulis. *Favus.*
bitat in China.
ngus *planus, fuscus, vix pulvinatus: pagina superiore radique hispida quasi Lichene rhangiferino, parvo,*
e setis

e setis compressis, ramosis, fuscis. Pagina instar favi apum Poris *magnis, angulatis, sursus basin inæqualibus.*

sanguineus. 6. BOLETUS acaulis submembranaceus ruber, tenuissimis.
Habitat Surinami. *Rolander.*
Fungus latitudine ovi, figura europæorum, vinatus, mollior, supra læte ruber zonis obsoletis; tus saturate croceus s. ruber poris impalpabilibus lo armato conspicuis.

suaveolens. 7. BOLETUS acaulis. superne lævis, salicinus *lapp.* 522. *Fl. svec.* 1095; 1255.
Habitat in Salice.

** *Stipitati.*

perennis. 8. BOLETUS stipitatus perennis, pileo utrinque sculo. *Fl. lapp.* 519. *Fl. svec.* 1086; 1245. *Dalib. paris.* 383.
Fungus lignosus fasciatus. *Vaill. paris. t.* 12. *f.*
Habitat in sylvis super terram, subjectis caudicibus rum putridis.

viscidus. 9. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinato viscido, teretibus convexis immersis distinctis, stipite
Boletus caulescens, pileo luteo, poris teretibus stinctis lividis, stipite lacero. *Fl. svec.* 1089;
Habitat in Sylvis.

luteus. 10. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinato subviscido poris rotundatis convexis flavissimis, stipite
Boletus caulescens, pileo livido subviscido, poris convexis, stipite albido. *Fl. svec.* 1088;
Dalib. paris. 381.
Suillus annulatus terreus, inferne flavescens *helv.* 29.
Fungus porosus autumnalis viscidus. *Buxb. cent.* 7. *t.* 14.
Habitat in Sylvis.

bovinus. 11. BOLETUS stipitatus, pileo glabro pulvinato nato, poris compositis acutis: porulis brevioribus.
Boletus caulescens, pileo testaceo, poris com

angulatis griseis. *Fl. svec.* 1087; 1246. * *Dalib. pa-rif.* 382.
oletus julii mensis. *Dill. giss.* 188.
illus fulvus inferne ex flavo virescens. *Hall. helv.* 29.
abitat in Pratis.

OLETUS stipitatus, pileo viscido pulvinato, poris teretibus subangulatisque truncatis: angulo granulato. *Fl. svec.* 2. *n.* 1249. granulatus.
bitat in Sylvis.
eus *convexus, viscidus, carnosus, lividus, margine cuto cinctus.* Pori *flavi, difformes, inæquales, te-etes & subangulati, truncati: margine laterali, ad ngulos, quasi farinæparticula solitaria aucti.* Stipes *lævis pileo brevior.*

OLETUS stipitatus, pileo flavo subtomentoso, oris subangulatis difformibus fulvis planis, stipi-e flavo. *Fl. svec.* 1091; 1251. * subtomentosus.
bitat in sylvis.

OLETUS stipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuosis niveis. *Fl. svec.* 1090; 1250. * subsquamosus.
bitat in Sylvis.

HYDNUM.

DNUM stipitatum, pileo convexo imbricato. *Fl. app.* 523. *Fl. svec.* 1097; 1257. *It. w. goth.* 215. *Roy. ugdb.* 519. imbricatum.
naceus esculentus albus crassus. *Mich. gen.* 132. *t.* 2. *f.* 2.
ngus pæne candidus, prona parte erinaceus. *Bauh. ist.* 3 *p.* 828.
bitat in Sylvis acerosis.

DNUM stipitatum, pileo convexo lævi flexuo-o. *Fl. svec.* 1098; 1258. *Dalib. paris.* 383. repandum.
dnum pediculatum, pileo inæqualiter laciniato scabro flavo. *Guett. stamp.* 1. *p.* 383.
naceus esculentus pallide luteus. *Mich. gen.* 132. *t.* 2. *f.* 3.
bitat in Sylvarum desertis.

DNUM stipitatum, pileo plano infundibuliformi. *Fl. svec.* 1099; 1259. * tomentosum
bitat in Sylvis acerosis.

aurifcalpium. 4. HYDNUM ftipitatum, pileo dimidiato. *Fl. lapp.* *Fl. fvec.* 1100; 1260. *Roy. lugdb.* 519.
Erinaceus parvus hirfutus ex fufco fulvus, pileo orbiculari, pediculo tenuiore. *Mich. gen.* 132. *f.* 8.
Fungus erinaceus parvus in conis abietis nafcens. *cent.* 1. *t.* 57. *f.* 1.
Fungus erinaceus parvus, pediculo longiore ... pium referens buxei coloris. *Buxb. hall.* 129. *t.*
Habitat in Sylvis acerofis fupra terram, fubjacen... aut ftrobilo; an varietas fola H. imbricati?

parafiticum. 5. HYDNUM acaule arcuato-rugofum, tomentofum. *Habitat in* Europæ *arboribus.*

PHALLUS.

efculentus. 1. PHALLUS pileo ovato cellulofo nudo rugofo. *fvec.* 1102; 1262. *Dalib. parif.* 383. *Oed. dan.*
Phallus petiolo nudo, pileo fubtus laxo. *Hort.* 479.
Phallus petiolo nudo, pileo fubtus undique ... *Hort. cliff.* 879. *Roy. lugdb.* 517.
Boletus efculentus rugofus albicans, quafi fuligi... fertus. *Tournef. inft.* 561. *t.* 329. *f. A.*
Boletus efculentus rugofus 1, 2, 3. *Mich. gen.* 85. *f.* 1. 2.
Fungi efculenti fpecies tres. *Cluf. hift.* 2. *p.* 164.
Habitat in Sylvis antiquis.

impudicus. 2. PHALLUS volvatus ftipitatus, pileo cellulofo.
Phallus volvatus pileo apice claufo. *Act. ftockh.* *p.* 20. *t.* 2. *f.* 1. *Fl. fvec.* 1101; 1261.
Phallus volva exceptus, pilei apice pervio. *Hort.* 478. *Roy. lugdb.* 517. *Guett. ftamp.* 1. *p.* 17.
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, cellulato ac fumma parte umbilico pervio. *Mich. gen.* 201. *t.* 83.
Phallus hollandicus f. batavicus. *Dalech. hift.* 1...
Fungus fœtidus penis imaginem referens. *Bauh.* 374.
Habitat in Sylvis.

CLATHRUS.

* *Acaules.*

cancellatus. 1. CLATHRUS acaulis fubrotundus. *Hort. cliff.* Roy. lugdb. 518.

Clathrus tuber. *Mich. gen.* 214. *t.* 93.
Boletus cancellatus purpureus. *Tournef. inst.* 561 *t.* 329. *f.* 6.
Fungus coralloides cancellatus. *Clus. app. alt.*
Fungus rotundus cancellatus. *Bauh. pin.* 375.
Habitat in Europa *australiori.*

* * *Stipitati.*

CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo volvato. denudatus.
Clathrus pediculatus purpureus, capite oblongo. *Guett. stamp.* 1. *p.* 16.
Clathroides purpureum pediculo donatum. *Mich. gen.* 214. *t.* 94. *f.* 1.
Habitat in Europa *australiore.*

CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo axi longitudinali adnato. *Fl. svec.* 2. *n.* 1263. nudus.
Clathroidastrum. *Mich. gen.* 214. *t.* 94.
Habitat in Italiæ *lignis putridis.*

CLATHRUS stipitatus, capitulo globoso, glande ovali. *Fl. svec.* 2. *n.* 1264. recutitus.
Habitat in Sveciæ *truncis arborum.*

HELVELLA.

* *Stipitata.*

HELVELLA pileo deflexo adnato lobato difformi. Mitra.
Fl. svec. 1103; 1265.
Fungoides fungiforme crispum laciniatum & varie complicatum. *Mich. gen.* 204. *t.* 86. *f.* 7.
Fungus autumnalis velut apex staminis. *Mentz. pug. t.* 6.
Habitat in Truncis putridis.

* * *Acaulis.*

HELVELLA acaulis. Pineti.
Agaricus acaulis utrinque planiusculus. *Fl. lapp.* 517.
Fl. svec. 1084.
Habitat in Pinu, Abiete.

PEZIZA.

PEZIZA campanulata lentifera. lentifera.
Peziza calyce campanulato. *Hort. cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 518.

Peziza caliciformis lentifera lævis. *Dill. giff.* 15
Svec. 1109; 1271.
Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti feri
Mich. gen. 222. *t.* 102. *f.* 1.
Fungoides infundibuli forma, femine fœtum.
parif. 56. *t.* 11. *f.* 6. 7.
Fungus campaniformis niger parvus, multa femi
fe continens. *Pluk. phyt.* 184. *f.* 9.
Fungus pyxoides feminifer. *Læf. pruff.* 98. *t.* 1
Fungus fpermelias. *Bocc. muf.* 1. *t.* 301. *f.* 1.
Fungus caliciformis feminiferus. *Mentz. pug. t.*
β. Peziza calyce campanulato, interne ftriato. externe
molo. *Guett. ftamp.* 1. *p.* 15. *Dalib. parif.* 38
Habitat in Agris, Lignis, Sepimentis.

punctata. 2. PEZIZA turbinata truncata, difco punctato. *Fl.*
1111; 1275.
Elvela petiolo breviffimo, pileo turbinato, difco
ctato. *Hort. cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 518.
Fungus minimus infundibuliformis, fuperne nigris
ctis notatus. *Raj. fuppl.* 21.
Mufcus minimus lignofus, difco punctato. *Bocc.*
2. *p.* 25. *t.* 107.
Habitat in Stercore *equino, nec alibi; anne va*
Boleti?
Difcus niveus, punctis atris eminentibus.

cornucopioides. 3. PEZIZA infundibuliformis, difco patente finuato
ctato.
Elvela infundibuliformis, ore expanfo laciniato pun
to. *Guett. ftamp.* 1. *p.* 11. *Dalib. parif.* 384.
Fungoides nigricans majus cornucopiæ forma. *V*
parif. t. 13. *f.* 2. 3.
Habitat in Gallia.
Caulefcens hæc eft cum fequenti.

Acetabulum 4. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis ra
Fungoides fufcum acetabuliforme: externe rami
tum. *Vaill. parif.* 57. *t.* 13. *f.* 1.
Fungoides fufcum majus. *Buxb. act.* 4. *p.* 283. *t*
f. 1. 2.
Fungoides maximum pyxidatum. *Vaill. parif.* 5
13. *f.* 1.
Fungoides maximum vafis fuforii forma. *Mich.*
206. t. 86. f. 1

Hab

Habitat in Europa *australi.*
Varietas an hæc Agarici Chantarelli?

PEZIZA cyathiformis: margine obtuso erecto. *Fl. svec.* 1110; 1274. cyathoides
Peziza lutea parva: marginibus lævibus. *Raj. angl.* 3. *p.* 479. *t.* 24. *f.* 4.
Habitat in Terra.

PEZIZA globoso-campanulata: margine crenato. *Fl. svec.* 2. *n.* 273. cupularis.
Peziza calyce campanulato globoso: ore crenato. *Guett. stamp.* 16 *Dalib. parif.* 388.
Fungoides glandis cupulam referens, margine dentato. *Vaill. parif.* 57. *t.* 11. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Gallia.

PEZIZA plana: margine convexo piloso. *Fl. svec.* 2. *n.* 1272. scutellata.
Peziza lutea parva, marginibus pilosis. *Raj. anglic.* 3. *p.* 18. *t.* 24. *f.* 3.
Elvela sessilis scutellata. *Guett. stamp.* 1. *p.* 10.
Fungoides, qui Fungus minimus scutellatus, coloris aurantii. *Vaill. parif. t.* 13. *f.* 13. 14.
Habitat in Parietibus *putridis.*

PEZIZA turbinata cochleata. cochleata.
Elvela sessilis multis anfractibus cochleata. *Guett. stamp.* 1. *p.* 10. *Dalib. parif.* 384.
Fungoides auriculam judæ referens, intus rufescens, extus candicans & quasi farinosum. *Vaill. parif.* 57. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in umbrosis.

C L A V A R I A.

* *Indivisæ.*

CLAVARIA clavæformis simplicissima. *Fl. svec.* 1104; 1266. *Dalib. parif.* 385. pistillaris.
Clavaria clavata integerrima obtusa erecta. *Hort. cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 517
Clavaria alba pistilli forma. *Vaill. parif.* 39. *t.* 8. *f.* 5.
Clavaria major lutea. *Mich. gen.* 208 *t.* 87. *f.* 1.
Fungus clavatus albidus pistillaris. *Bocc. musc.* 1. *t.* 307.
Habitat in Sylvis *umbrosis.*

militaris. 2. CLAVARIA clavata integerrima, capite sc
Guett. ſtamp. 1. *p.* 8. *Dalib. pariſ.* 385.
Clavaria militaris crocea. *Vaill. pariſ.* 39. *t.*
Habitat in ſylvis auſtralibus.

Ophioglosſoides. 3. CLAVARIA clavata integerrima compreſſa
Guett. ſtamp. 1. *p.* 8. *Dalib. pariſ.* 386.
Clavaria ophioglosſoides nigra. *Vaill. pariſ.* 3
f. 3.
Habitat in ſylvis auſtralibus. ♄

* * *Ramoſæ.*

digitata. 4. CLAVARIA ramoſa lignea nigra. *Guett. ſta*
p. 10. *Dalib. pariſ.* 387.
Agaricus digitatus niger. *Tournef. inſt.* 562.
Habitat in ſylvis auſtralibus.

Hypoxylon 5. CLAVARIA ramoſo-cornuta compreſſa. *Fl.*
1105; 1267.
Fungus ramoſus niger compreſſus parvus: api
albidis. *Raj. angl.* 3. *p.* 15.
β. Agaricus ramoſus cornu rangiferi referens. *Mid*
ret. tab.
Hypoxylon digitatum. *Bruck. monogr.*
Fungus cornu dorcadis facie. *E. N. C. dec.* 1.
p. 195.
Habitat in Cellis, navibus, aliisque nunquam ſol
ſtratis.

Coralloides. 6. CLAVARIA ramis confertis ramoſiſſimis ina
bus. *Fl. ſvec.* 1106; 1268. *Dalib. pariſ.* 38
Clavaria ramoſiſſima. *Roy. lugdb.* 518.
Corallo-fungus flavus. *Vaill. pariſ* 41. *t.* 8. *f.*
Coralloides flava albida. *Tournef. inſt.* 564. *t.* 33
Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. *t.* 11. *f. A. B*
Habitat in Sylvis *opacis.*

faſtigiata. 7. CLAVARIA ramis confertis ramoſiſſimis faſ
obtuſis luteis. *Fl. ſvec.* 1107; 1269.
Fungoides fungiforme luteum fœtidum & mi
moſum. *Raj. angl.* 3. *p.* 479. *t.* 24. *f.* 5.
Habitat in Sylvis.

muſcoides. 8. CLAVARIA ramis ramoſis acuminatis inæqu
luteis. Fl. ſvec. 1108; 1270.

Fungus parvus ramoſus luteus. *Raj. angl.* 3. *p.* 16. *t.* 24. *f.* 7.
Habitat inter Muſcos.

LYCOPERDON.

* *Solida, ſubterranea absque radice.*

Tuber. LYCOPERDON globoſum ſolidum muricatum, radice deſtitutum.
Lycoperdon ſolidum. *Fl. lapp.* 526. *Fl. ſvec.* 1116; 1281. *Mat. med.* 500. *Roy. lugdb.* 519. *Dalib. pariſ.* 391.
Tuber brumale, pulpa obſcura odorata. *Mich. gen.* 221. *t.* 164.
Tuber. *Matth. Dioſc.* 544. *Mich. gen.* 221. *t.* 102.
Habitat ſub Terra.

Cervinum. LYCOPERDON globoſum ſolidiuſculum lacerum centro farinifero, radice inſtructum.
Lycoperdaſtrum tuberoſum arrhizon fulvum, cortice duriore craſſo & granulato, medulla ex albo purpuraſcente, ſemine nigro craſſiore. *Mich. gen.* 220. *t.* 99. *f.* 4.
Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.
Tuberum genus quibusdam Cervi Boletus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 851.
Habitat in Bohemia, Sileſia, Vermelandia.

* * *Pulverulenta, radicata ſupra terram.*

Boviſta. LYCOPERDON ſubrotundum: lacerato-dehiſcens. *Fl. lapp.* 525. *Fl. ſvec.* 1115; 1[illegible]. *Dalib. pariſ.* 388. *Roy. lugdb.* 518.
Lycoperdon vulgare. *Tournef. inſt.* 563.
Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus germanis Boſiſt. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 848.
Habitat in Campis ſterilibus.

aurantium. LYCOPERDON ſphæroidale baſi rugoſum ſtipitatum: laciniis obtuſe emarginatis dehiſcens. *Dalib. pariſ.* 390. *n.* 9.
Lycoperdon aurantii coloris, ad baſin rugoſum. *Vaill. pariſ.* 123. *t.* 16. *f.* 9. 10.
Habitat in Gallia.

ſtellatum. LYCOPERDON volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Hort. cliff.* 479. *Fl. ſvec.* 1113; 1277. *Dalib. pariſ.* 390. *Roy. lugdb.* 519.

Lycoperdon stellatum, calyce inverso. *Buxb. cen p. 45. t. 49. f. 3.*
Geaster major, umbilico fimbriato. *Mich. gen. t. 100. f. 1. 2. 3.*
Fungus pulverulentus, Crepitus lupi dictus, corona & inferne stellatus. *Raj. angl. 3. p. 27. t. 1. f. 1.*
Fungus stellatus. *Bocc. mus. 1. t. 305. f. 4.*
Habitat in Collibus.

Carpobolus. 6. LYCOPERDON volva multifida, fructu globo ex feminibus combinatis. †
Carpobolus. *Mich. gen. 221. t. 101.*
Habitat in Italia, Svecia.
Fungus albidus, magnitudine capitis aciculæ, dehiscens in limbum patentem, 5-7fidum; e disco exsilit vesicula ovalis, altitudine disci totius, & explodit contentum, tamquam vermis casei saltu. Forskåhl.

radiatum. 7. LYCOPERDON disco hemisphærico, radio colorato.
Habitat in Sveciæ lignis Abietinis putridis ad prædium nostrum Safja, ubi lectus 1760. a Filio.
Magnitudo dimidii fructus Coriandri. Discus *gibbosus, fuscus, elastice dehiscens expellensque cum ambulante polline lanam bombycinam, tumescentem, fuscam rariorem, adhærentem.* Limbus *campaniformis, fulveus, sectus fere ad basin in partes 12, æquales disco paulo longiores, basi integra ovali cingente discum.*

pedunculatum. 8. LYCOPERDON stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico integerrimo. *Hort. cliff.* 4. *Fl. svec.* 1112; 1276. *Roy. lugdb.* 519. *Hall. helv.* *Dalib. paris.* 390.
Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum. *Tournef. inst. 563. t. 331. f. E. F.*
Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo innitens. *Raj. angl. 3. p. 27.*
Habitat in Campestribus.

*** *Parasitica, in farinam fatiscentia.*

epidendrum. 9. LYCOPERDON cortice farinaque purpurea. *svec.* 1114; 1279.
Lycoperdon epidendron, miniatum pulverem fundens. *Buxb. hall.* 203. *Hall. helv.* 11.

Lyco

Lycoperdon ſangvineum ſphæricum. 1. *Buxb. cent.* 5. *p.* 15. *t* 29. *f.* 2.
Habitat in Lignis, parietibus *antiquis.*

LYCOPERDON aggregatum paraſiticum: ore multifido lacero: pulvere fulvo. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1278. — epiphyllum.
Habitat in dorſo foliorum Tuſſilaginis.

MUCOR.

* *Perennes.*

MUCOR perennis, ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Fl. ſvec.* 1121; 1286. *It. ſcan.* 20 — ſphærocephalus.
Sphærocephalos niger, villo ochroleuco. *Hall. helv.* 3. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Parietibus, Lapidibus, Lignis.

MUCOR perennis, ſtipite ſubulato nigro, capitulo lenticulari cinereo. *Fl. ſvec.* 1122; 1287.* — Lichenoides
Coralloides fungiforme arborum nigrum vix cruſtoſum. *Dill. muſc.* 78. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat in corticibus Pini.

MUCOR ſeta nigra, villo fuſco. — Embolus.
Embolus ſeta nigra villo fuſco. *Fl. ſvec.* 1136; 1288.
Embolus nigerrimus villo albo adſperſus. *Hall. helv.* 8. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in lignis putridis.

MUCOR perennis pallidus, pileo fulvo. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1289. — fulvus.
Habitat Upſaliæ. *D. Solander.*

MUCOR perennis viridis, foliis furfuraceis, ſtipite filiformi, capitulo globoſo. *Fl. ſvec.* 2. *n.* 1290. — furfuraceus.
Habitat in Terra nuda paſſim in Svecia. *Dan. Solander.*

* * *Fugaces.*

MUCOR ſtipitatus, capſula globoſa. — Mucedo.
Mucor filamentis granulatis fugacibus putreſcentibus innatis. *Fl. lapp.* 534. *Fl. ſvec.* 1119; 1284. *Roy. lugdb.* 520.
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griſeo. *Mich. gen.* 215. *t.* 95. *f.* 1.

Mucedo capitulo diaphano, deinde viridi & pol nigro. *Malp. vegetat. t. 25. f. 108. p. 2.*
Habitat in variis putridis: pane, plantis, &c.

leprosus. 7. MUCOR setaceus, seminibus radicalibus.
Aspergillus cespitosus densissimus, initio niveus, inde aureus, seminibus ovatis. *Mich. gen.* 21, 91. *f.* 5.
Habitat in cavernulis *autumno.*

glaucus. 8. MUCOR stipitatus, capitulo subrotundo aggreg
Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus tundis. *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 1.
Habitat in Citris, Melonibus, Pomis *aliisque* ptis.

crustaceus. 9. MUCOR stipitatus, spicis digitatis.
Mucor crustaceus albus, capitulis setisque aq *Fl. svec.* 1118; 1283.
Byssus filamentosa fugax alba, putrescentibus in *Fl. lapp.* 533. *Guett. stamp.* 1. *p.* 3. *Roy. lugdb.*
Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis. *M gen.* 212. *t.* 91. *f.* 3.
Habitat in Cibis *corruptis.*

cespitosus. 10. MUCOR stipite ramoso, spicis ternatis.
Aspergillus albus tenuissimus, graminis dactyl facie, seminibus rotundis. *Mich. gen.* 213. *t.* 9
β. Aspergillus terrestris capitosus & ramosus al *Mich. gen.* 21. *t.* 93. *f.* 4.
Habitat in Putrescentibus.

Erysiphe. 11. MUCOR albus, capitulis fuscis sessilibus. *Fl.* 1124; 1292.
Habitat in foliis Humuli, Aceris, Lamii, Ga psidis, Lithospermi.

septicus. 12. MUCOR unctuosus flavus. *Fl. svec.* 1117; 128
Mucilago flava ramosissima mollis. *Hall. helv.* 5.
Spongia fugax mollis flava amoena. *Marck. act.* r *p.* 472.
Habitat in Vaporariis *defervescentibus visibili incr to; maturus semina explodens.*

PALMÆ.

'LABELLIFOLIÆ.

CHAMÆROPS.

ıMÆROPS frondibus palmatis plicatis, ſtipiti- s ſpinoſis. *Hort. cliff.* 482. *Roy. lugdb.* 4. — humilis.
a minor. *Bauh. pin.* 506.
ıa humilis f. Chamæriphes. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 368.
ıæriphes. *Dod. pempt.* 820.
ıæriphes tricarpos ſpinoſa, folio flabelliformi. *nit. anth.* 147. *t.* 8.
tat in Europa *auſtrali*, *præſertim Hiſpania.*

BORASSUS.

ıASSUS frondibus palmatis plicatis cucullatis, ɔitibus ſerratis. — flabellifer.
ſſus frondibus palmatis. *Fl. zeyl.* 395.
ıa coccifera, folio plicatili flabelliformi; mas, nina. *Raj. hiſt.* 1366.

ana. *Rheed. mal.* 1. 13. *t.* 10.	Carimpana. *Rheed. mal.* 1. *p.* 11. *t.* 9.
	Lontarus domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 45. *t.* 10.

tat in India.

CORYPHA.

ıYPHA frondibus pinnato-palmatis plicatis filo erjectis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 394. *Roy. lugdb.* 4. — umbraculifera.
a montana, folio plicatili flabelliformi maximo nel tantum frugifera. *Raj. hiſt.* 1363.
la-pana. *Rheed. mal.* 3. *p.* 1. *t.* 1. - - 12.
ıus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 42. *t.* 8.
tat. in India.
r. Palma thebaica. *Pocock. orient.* 1. *p.* 281. *t.* 73. — thebaica.
Frondes pinnato-palmatæ plicatæ, filo interjecto, ɔitibus ciliato-ſpinoſis, Caudice dichotomo.

PENNATIFOLIÆ.

CYCAS.

circinalis. 1. CYCAS frondibus pinnatis circinalibus: foliolis l ribus planis.

Cycas frondibus pinnatis, foliolis lineari-lanceol stipitibus spinosis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 393. *lugdb.* 5.

Palma indica, caudice in annulos protuberante di &c. *Raj. hist.* 1360.

Arbor Zagoe amboinensis. *Seb. thes.* 1. *p.* 39. *t.* 25.

Tessio. *Kæmpf. jap.* 897.

Olus calappoides. *Rumph. amb.* 1. *p.* 86. *t.* 22. 23

Todda pana s. Mouta panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 13 -- 21.

Habitat in India.

Foliatio circinalis more Filicum peragitur.

COCOS.

nucifera. 1. COCOS frondibus pinnatis: foliolis ensiformibu plicatis. *Jacq. hist. t.* 168.

Coccus frondibus pinnatis: foliolis ensiformibus gine villosis. *Hort. cliff.* 483. *Fl. zeyl.* 391. *lugdb.* 4.

Palma indica coccifera angulosa. *Bauh. pin.* 502.

Palma indica nucifera. *Bauh. hist.* 1. *p.* 375.

Calappa. *Rumpf.* 1. *p.* 1. *t.* 1. 2.

Tenga. *Rheed. mal.* 1. *p.* 1. *t.* 1. 2, 3. 4.

Habitat in Indiæ *paludosis, umbrosis.*

Foliola omnia (excepto utrinque infimo) retro-p sunt, contra ac in sequente.

Monoica, hexandra, trigyna.

PHOENIX.

dactylifera. 1. PHOENIX frondibus pinnatis: foliolis ensifo complicatis.

Phœnix frondibus pinnatis: foliolis alternis ensi bus basi complicatis, stipitibus compressis dor tundatis. *Hort. cliff.* 482. *Hort. upsf.* 306. *Fl.* 390. *Roy. lugdb.* 5.

Palma major. *Bauh. pin.* 506.

Palma dactylifera major vulgaris. *Sloan. jam.*

Palma. *Bauh. hist.* 1. *p.* 351. *Dod. pempt.* 819. *Raj. hist.* 1352.

Palma hortensis mas. *Kæmpf. amæn.* 688. *t.* 1. 2. *f.* 1. 2.	Palma hortensis femina. *Kæmpf. exot.* 668 686 *t.* 1. 2. *f.* 2. 16. 11.

Habitat in India.

ARECA.

ARECA frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppositis præmorsis. *Fl. zeyl.* 392. — Cathecu.

Areca s. Fausel, avellana indica versicolor. *Raj. hist.* 1363.

Palma arecifera nucleo versicolore moschatæ simili. *Pluk. alm.* 275. *t.* 309. *f.* 4.

Palma cujus fructus sessilis Fausel dicitur. *Bauh. pin.* 510

Pinanga. *Rumph. amb.* 1. *p.* 26. *t.* 4.

Caunga. *Rheed. mal.* 1. *p.* 9. *t.* 5. 6. 7. 8.

Habitat in India.

ELATE.

ELATE frondibus pinnatis: foliolis oppositis. — sylvestris.

Palma dactylifera minor humilis sylvestris, fructu minore. *Herm. prodr.* 361. *Fl. zeyl.* 397.

Palma sylvestris malabarica, folio acuto, fructu pruni facie. *Raj. hist.* 1364.

Katu indel. *Rheed. mal.* 3. *p.* 15. *t.* 22. 23. 24. 25.

Habitat in India.

ZAMIA.

ZAMIA. — pumila.

Palma fructu clavato polypyreno. *Mill. dict.* 12.

Palma prunifera humilis non spinosa insulæ hispaniolæ, fructu jujubino simili: ossiculo triangulo. *Comm. hort.* 1 *p.* 111 *t.* 58.

Palma americana foliis polygonati brevibus leviter serratis & nonnihil spinosis, trunco crasso. *Pluk. alm.* 103. *f* 2. & 309 *f.* 5.

Palmifolia femina. *Trew. ehret.* 5. *t.* 26.

Habitat in America *meridionali.*

Radix more fructus Cupressi divisus in flosculos.

BI-

BIPENNATIFOLIÆ.

CARYOTA.

urens. 1. **CARYOTA** frondibus bipinnatis: foliolis cunei-
mibus oblique præmorsis. *Fl. zeyl.* 396.
Palma indica. folio bicomposito, fructu racem-
Rai. hist. 1365.
Palma dactylifera, fructu acerrimo. *Plum. spec.* 3.
Seguaster major. *Rumph. amb.* 1. *p.* 64. *t.* 14.
Schunda-panna *Rheed. mal.* 1. *p.* 15. *t.* 11.
Habitat in India.
Palmarum *omnium historia fructificationis adhuc im-
fecta est, nec sufficit industria Rheedi; cui tam-
bemus in his quidquid adhuc certi innotuerit. Ut-
exotici Botanici nobis traderent distinctas hara-
cies, & genera, etjam ex structura frondium, (
serius & rarius apud nos floreant.*

APPENDIX.

BROSSÆA.

coccinea.

BROSSÆA.
Brossæa frutescens, flore coccineo, fructu nigro. *Plum. gen.* 5. *ic.* 64. *f.* 2.
Habitat in America *calidiore.*
Rami alterni. Folia *alterna, ovata, serrata, petiolata.* Flores *aliquot, ramos terminantes, alterni.* ♄

BUCEPHALON.

racemosum.

BUCEPHALON.
Bucephalon fructu racemoso rubro. *Plum. gen.* 52. *ic.* 67.
Habitat in America. ♄
Folia ovata, acuminata, integerrima, alterna: petiolis brevissimis. Spicæ *laterales, solitariæ.*

MATTHIOLA.

scabra.

MATTHIOLA.
Matthiola folio aspero subrotundo, fructu nigricante. *Plum. gen.* 16. *ic.* 173. *f.* 1.
Bategal arbor indiana. *Zanon. hist.* 167. *t.* 75?
Habitat in America. ♄
Folia sparsa ovata. Bracteæ pinnatæ.

TREVIA.

nudiflora.

TREVIA.
Arbor racemosa malabarica, fructu triquetro. *Comm. mal.* 30.
Pamschi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 76. *t.* 42.
Habitat in Malabariæ *arenosis.* ♄
Ad classem Monœciæ pertinet.

uragoga.

MYGINDA. *Jacq. hist. t.* 16. (*Tetrandra Tetragyna.*)
Habitat in America *calidiore.* ♄
Frutex Foliis *oppositis, sessilibus, serratis.* Corymbis *axillaribus, biternatis.*

Nyctelea. **271. ELLISIA.** (*Pentandra, Monog*
Polemonium Nyctelea. *Sp. pl.* 2. *p.* 231.
Proprii generis planta est.

Eupatorioides. **289. KUHNIA.** (*Pentand. Monogyn*
Eupatoria conyzoides odorata, folio crenato ... subincano. *Pluk. alm.* 140. *t.* 87. *f.* 2?
Habitat in Pensylvania, *unde vivam attulit* ... Kuhn. ♃
Caules *sesquipedales, erecti, læves, rigiduli.* F... *alterna, petiolata, lato-lanceolata, nuda, subrug... subtus venosa, subdentata serraturis mediis majori...* Rami *alterni, e medio caule.* Corymbi *pani... minales & etiam sæpe ramorum lateralium.* Co... *albæ.* Stamina *albo-flavescentia.* Planta *refert ... patorium, sed Pistilla clavata, &* Antheræ *dis... cylindricæ, apice labio dehiscentes, absque exem... alio Composito flore.*

Schinoides. **227. SCHREBERA.** (*Pentandra, Digy*
Schinus *Myricoides* foliis simplicibus lanceolatis... tis. *Sp. pl.* 1. *p.* 388.
Habitat ad Cap. b. Spei. *Schreber.* ♄
Caulis *suffruticosus:* Ramis *determinate ramosis, ... tiusculis, tomentosis, nodosis cicatricibus a casu f... rum.* Folia *alterna, conferta, lanceolata, nitidi... serrata versus apicem serraturis* 3. *s.* 5: Petiolis... *vissimis, subtomentosis.* Pedunculi *conferti pluri... eodem puncto ad basin ramorum, filiformes, long... ramosi:* Pedicellis *similibus, alternis, unifloris.* ... res *albi.*

parasitica. **274. HILLIA.** *Jacq. hist. t.* 66. (*Hexandra, Monog*)
Habitat in America *meridionali, parasitica.* ♄

Draco. **534. PTEROCARPUS.** *Mat. med.* 522. (*Deca... Monog*)
Jacq. hist. 283. *t* 183. *f.* 92.
Draco arbor. *Læfl. it.* 266, 273 *n.* 147, 168.
Draco arbor indica siliquosa, populi folio. *Comm.* ... 1. *p.* 213. *t.* 109.
Lingoum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 70.
Habitat in Indiis. ♄
Anne Myrospermum *cum hoc Genere combinari p...*

55

HEISTERIA. *Jacq. hist. t.* 81. (*Decandra, Monogyna.*) coccinea.

Habitat in America meridionali. ♄

DECUMARIA.

...nus flore pleno. *Fabric. helmst.* 216.

...fia minor. *Tramp. origin.*

Habitat an in Africa? *Schreber.* ♄

...or Foliis *oppositis, petiolatis, obovatis, lævibus, acutiusculis, serratis.* Gemmæ *pubescentes.* Corymbi *brachiati, aphylli.* Flores *albidi, odoratissimi.* Fructus *ignotus in Europæorum hortis. an dioica?*

GOUANA foliis glabris. (*Polygama, Monoica.*) domingensis

...isteria foliis alternis lanceolatis serratis. *Sp. pl.* 1. p. 427.

...llinia foliis simplicibus lanceolatis serratis. *Hort. ups.* 97.

...amnus inermis, ramis cirrhiferis scandentibus, foliis glabris. *Jacq. amer.* 17.

...pulus sylvestris americana claviculis donata. *Pluk. alm.* 229. *t.* 201. *f.* 4. & *t.* 63. *f.* 3.

Habitat in Barbados, Jamaica. ♄

SPECIES.

JUSTICIA fruticosa, spinis axillaribus, pedunculis lateralibus simplicibus. spinosa.

...cia spinosa, foliis oblongo-ovatis emarginatis, caule fruticoso ramoso. *Mill. dict.* 6.

...icia monanthera spinosa. *Jacq. amer.* 11. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat in America. ♄

JUSTICIA fruticosa, floribus axillaribus sessilibus. *Jacq. amer.* 11. *t.* 2. *f.* 2. sessilis.

Habitat in America. ♄

3. JUSTICIA foliis lanceolato-ovalibus, floribus spicatis: bracteis oblongo-cuneatis. *Jacq. amer.* 11. *t.* 5. charthaginensis.

Habitat in America.

... VERONICA racemis subspicatis, foliis ovatis obtusis plicatis, caule prostrato piloso. pilosa.

Chamædrys spuria minor latifolia. *Bauh. pin.* 249.

Chamæ-

Chamædryos falſa ſpecies; Teucrium ſ. f. ſ. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 286.
Habitat in Auſtria. ♃
Caules *decumbentes, apice adſcendentes, piloſi,* ra*mi.* Folia *ovata, obtuſa, ſerrata, plicis* ... *neata, petiolata: ſupremis ſeſſilibus.* Spicæ *ſi nales, ſolitariæ;* Bracteis *ovatis: infimis* ba*ſi tis.* Calyces *ſeſſiles: laciniis 2 exterioribus* i*bus.* Corollæ *albido-cæruleſcentes.*

elongata. 6, 7. VALERIANA floribus triandris, foliis ra*bus* ovatis; caulinis cordatis ſeſſilibus inci haſtatis.
Valeriana floribus triandris, foliis dentatis ſub ſummis baſi haſtato-inciſis, panicula elonga *vind.* 205. *t.* 1. *
Nardo Celticæ ſimilis alia. *Amœn. acad.* 1. *p.* 1;
Habitat in alpibus Schneeberg *Auſtriæ inferioris. ſerus, Jacquin.*
Caulis *erectus, ſpithamæus, ſimpliciſſimus.* Fol*dicalia ovata, integerrima, rarius ſubdentata,* i *longius petiolata. Caulina ſeſſilia, oppoſita:* op*nibus 2 ſ. 3, majora, amplexicaulia, cordata funde dentata ſ. inciſa.* Racemus *terminalis,* i *longus:* Pedicellis *oppoſitis, dichotomis, brevi*
Bracteis *linearibus.*

maculata. 9, 10. IXIA foliis enſiformibus, floribus alternis i lis baſi obſcuris.
Synonyma *Oldenlandi* & *Mylleri* ſub *Ixia erec*ſita, huc referenda.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♃
Spica *rarior floribus ſeſſilibus.* Petala *ſublanceola va, baſi interiore nigricantia.* Stamina 3 *flava.* Statura *Ixiæ bulbiferæ.*

fuſcus. 13. SCHOENUS culmo tereti folioſo, ſpiculis ſciculatis, foliis filiformibus canaliculatis.
Cyperella paluſtris, capitulis florum umbellatis pactis fuſcis. *Mich. gen.* 53.
Cyperus minor anguſtifolius paluſtris, capit ſcis paleaceis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 239. *ſ.* 8. *t.* 11
Habitat in Sveciæ, Angliæ, Italiæ, *paluſtribus toſis.* ♃
Schoeno faſciculato *ſimillimus ſtatura magnitudi*

cie, loco, diversus tamen, differens spiculis glomeratis fuscis, nec est fastigiatis albis; praecocius floret.

PHALARIS spica cylindrica: flosculis mucronatis: neutris plurimis; infimis praemorsis. paradoxa.
Gramen phalaroides lusitanicum. *Raj. hist.* 1248.
Gramen phalaroides, spica brevi reclinata ex utriculo prodeunte. *Pluk. alm.* 177. *t.* 33. *f.* 5. *Moris. hist.* 3. *p.* 187. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 6.
Habitat in Oriente. *P. Forskåhl.* ⊙
Radix *fibrosa, minime bulbosa.* Culmi *pedales, plures, erecti, ante anthesin decumbentes.* Folia, *uti* Caulis, *laevia, minime pubescentia.* Spica *oblonga, cylindrica, divisibilis more congenerum in racemulos f. corymbos.* Flosculi *in quovis corymbo minimo sunt* Neutri *f. cassi plures &* Fertilis *unus terminalis.* Glumae *calycinae compressae: valvis navicularibus, membranaceo-carinatis, mucronatis. Inferior dimidia Spicae pars habet flosculos steriles quasi praemorsos, unde haec pars quasi ab insectis erosa apparet.*

ALOPECURUS culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. *Gouan. monsp.* 37. *Houds. angl.* 24. bulbosus.
Gramen myosuroides nodosum. *Raj. angl.* 3. *p.* 397. *t.* 20. *f.* 2.
Gramen typhinum phalaroides, pilosa spica, aquaticum bulbosum. *Barr. ic.* 699. *f.* 1. & 680. *f.* 1, 2.
Habitat in Galliae, Angliae *pratis.* ♃

AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus aequalibus: virgineis corolla brevioribus, fecundatis duplo longioribus. *Hudf. angl.* 28. † sylvatica.
Gramen miliaceum sylvestre, glumis oblongis. *Raj. angl.* 404.
Habitat in Angliae *sylvis humosis.*

AVENA subspicata, calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. *Hudf. angl.* 42. pubescens.
Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. *Gmel. sib.* 1. *p.* 129.
Gramen avenaceum hirsutum, panicula purpureo-argentea splendente. *Raj angl.* 3. *p.* 405. *t.* 21. *f.* 2.
Festuc dumetorum. *Bauh. pin.* 20. *prodr.* 19. ex *Vaill. paris.* 89.
Habitat in Sibiriae, Angliae, Galliae *pascuis sicciori-bus.* ♃

Nimis affinis *A. pratensi*, *sed folia non involuta.*
Varietas β ab *Avena pratensi*, huc referenda, si speciem distinctam velis.

...romoides. 11, 12. AVENA subspicata: spiculis binatis: ... pedunculata, aristis divaricatis, calycibus ... ris. *Gouan. monsp.* 52.
Gramen alpinum avenaceum glabrum angustifol... locustis aristatis in spicam dispositis. *Scheuch.* ... 228. *t.* 4. *f.* 21, 22. * *Hall. helv.* 226.
Habitat in Helvetia, Monspelii.

...lumosa. 3. ARISTIDA arista intermedia longiore lanata, ... mis villosis.
Gramen orientale tomentosum spicatum minus, a... pennatis. *Tournef. cor.* 39.
Habitat in America. *D. D. Schreber.*
Panicula *aristis lanatis refert Stipam pennatam, sed* ... *nicula magis composita, & omnes partes minora* ... *Culmus villosus.* Arista *seminum itidem lanata,* ... *versus basin nuda, ubi ipsa notatur setis s. aristis* ... *oppositis, brevibus, capillaribus, patulis.*

...opontica. 2. KNAUTIA foliis superioribus lanceolatis indi... corollis calyce æqualibus.
Scabiosa orientalis, foliis superioribus integris, ... re parvo purpureo, calyce longo gracili. *Til...* 153. *t.* 48.
Scabiosa orientalis villosa, flore suaverubente, ... ctu pulchro oblongo. *Tournef. cor.* 35.
Habitat in Oriente. *Forskåhl.* ♂
Synonymon *Tilli a Knautia orientali removeatur* ... *ad hanc maxime affinem deferatur.* Caulis ... *crassitie digiti, bipedalis, villosus, statura Chei...* *incani.* Folia *lanceolata, subpiloso-scabra, sem...* *suprema integerrima, spithamæa.* Calyces ... *cylindrici, foliolis* 8 *s.* 10 *lanceolatis, apice ...* *tis.* Corollæ *calyce non longiores, quadrifidæ,* ... *ginales majores: lacinia exteriore majore, pur...* *scentes; Corollulæ intermediæ sæpe* 4. *minores,* ... *inæquales:* Antheræ *purpureæ. Filamenta & ...* *alba.* Differt *a K. orientali Foliis indivisis, ...* *decem, nec quinis, iisque calyce non longioribus.* ... mina corona 15-dentata, ciliata.

*10. GALIUM foliis octonis lanceolatis lævibus, panicula capillari. — lævigatum

Mollugo pumila, alsines mollioris folio. *Moris. hist.* 3. *p.* 331?

Rubia lævis linifolia, floribus albis montis virginis. *Bocc. mus.* 83. *t.* 75.

Habitat in Italia. *Arduini.* ♃

Planta *pedalis, tota lævis.* Folia *octona f. novena, exacte lanceolata, lævia, minime rigida.* Paniculæ *pedicelli capillaris tenuitatis.* Flores *non vidi.* Fructus *leves.*

3. OLDENLANDIA pedunculis terminalibus paniculatis, foliis ovali-lanceolatis. — paniculata.

Habitat in India *orientali.*

Caulis *erectiusculus, lævis, dichotomus.* Folia *opposita, lanceolato-ovata, acuta, integerrima, lævia.* Panicula *terminalis, aphylla.* Fructus *leves.*

PLANTAGO foliis lato-lanceolatis trinerviis subdentatis subpilosis, scapo angulato, spica oblonga hirsuta. — lusitanica.

Plantago trinervia latifolia minor incana hispanica. *Barr. rar.* 118. *t.* 745.

Habitat in Hispania. *Cl. Alstræmer.* ♃

Folia *erecta, palmaria, latiora quam Pl. mediæ.* Scapi *foliis longiores, subhispidi, quinquesulcati.* Spica *Pl. Lagopi, sed oblonga* Bracteis *brevibus, hirsutis.* Corolla *alba stria flavescente.* Stamina *alba.* Stylus *elongatus, pubescens, albus.*

PULMONARIA foliis linearibus scabris, calycibus subulatis quinquepartitis. — suffruticosa

Lithospermum angustifolium umbellatum. *Bauh. pin.* 238, 517. *Pluk. phyt.* 42. *f.* 7. *Bocc. sic.* 77.

Habitat in Alpibus Italiæ. *Seguier, Arduini.* ♃. ♄

Caules radicales *lignosi perennantes cum foliis:* Florentes *caules palmares, simplicissimi, subpilosi.* Folia *linearia & fere filiformia, sparsa, hispida, longa.* Flores *fasciculati, terminales, calycibus quinquepartitis, subulatis, corolla dimidio brevioribus.*

4. PULMONARIA foliis cordatis caulinis pilosis supra lævibus. — hirta.

Pulmonaria mitis fragariæ odore. *Bocc. muf.* 2. p
t. 105.
Habitat in Hetruriæ *montibus.* ♃
Caules *pedales*, *fimplices*, *erecti*, *teretes*, *hirti.*]
alterna, *petiolata*, *cordata*, *integerrima*, *lurido-vi*
venofa, *fubtus*, *ut tota planta*, *hirta*, *fuperiora*
majora. Flores *fafciculati*, *terminales*, *pedun*
Calyces *breviffimi*, *quinquedentati*, *hirti.* Co
purpurafcentes, *infundibuliformes*, *erecta.* Sta
corolla paullo breviora, *conniventia.* Stylus *c*
longitudine. Stigma *capitatum*, *emarginatum*, *alb*
Floret *primo vere.*

elongata. 1, 2. ANDROSACE corollis calyce brevioribus, p
cellis longiffimis, foliis fubdentatis.
Habitat in Auftria. *Jacquin.*
Simillima Andr. maximæ, *fed* Calyces *non excr*
in majores abfoluto flore; verum Pedunculi p
evadunt elongati, *longitudine ipfius fcapi.*

biflorus. 11, 12. CONVOLVULUS foliis cordatis pubefc
bus, pedunculis geminis, corollis lobis trifidi
Habitat in China. ⊙
Caulis *volubilis*, *teres*, *pilofus*, *bafi ramofus*, *ma*
dine C. arvenfis. Folia *cordata*, *oblonga*, *ut*
pubefcentia. Petioli *teretes*, *pilofi*, *folio brev*
Pedunculi *gemini*, *hirti*, *bafi approximati fe*
unum, *petiolo breviores.* Calyx *pentaphyllus: fo*
duobus exterioribus cordato-oblongis; duobus in
lineari lanceolatis; quinto femicordato. Corollæ
campanulatæ, *quinquefidæ*, *plicatæ*, *parvæ; lo is*
trifidis: medio minore. Tubus *calyce brevior.*
mina *longitudine tubi*, *alba.* Piftillum *album*
gitudine ftaminum. Stigmata *duo*, *capitata*, *pur*

carnea. 9, 10. IPOMOEA foliis cordatis glabris, pedunculi
tifloris, corollis marginatis. *Jacq. amer.* 13.
Habitat in America. ♄

repanda. 9, 10. IPOMOEA foliis cordatis oblongis repandis
dunculis ramofis cymofis. *Jacq. amer.* 13. *t.* 2
Habitat in America.

.CAMPANULA caulibus unifloris, foliis obovatis glabris integerrimis subciliatis. cenisia.

Campanula plerumque multicaulis uniflora, foliis ovatis sessilibus integerrimis. *Allion. pedem.* 35. *t.* 5. *f.* 1.

Habitat in Cenisii alpinis, Ronche *dictis. Allion.* ♃

Radix *repens, alternatim emittens ramos terminatos foliis radicalibus.* Caules *simplicissimi, pollicares, filiformes.* Folia *Radicalia conferta. Caulina* 4 *s.* 5, *obovata, obtusa, lævia.* Pedunculus *terminalis, solitarius.* Flos *ratione plantæ magnus.* Calyx *hirtus.*

o. CAMPANULA foliis lanceolatis serratis lævibus, floribus racemosis secundis nutantibus, calycibus serratis. Alpini.

Campanula pyramidalis minor. *Alp. exot.* 340.

Habitat in Summano *aliisque* Italiæ *Alpibus. Arduini.* ♃

Folia *serraturis distantibus, valde acuminatis.* Pistillum *corolla longius.* Calycis *foliola serraturis sæpe duabus utrinque, acuminatis.*

15. **CAMPANULA** caule simplici, pedunculis unifloris axillaribus diphyllis. *Jacq. vind.* 210. * alpina.

Campanula alpina pumila lanuginosa. *Bauh. pin.* 94.

Trachelium pumilum alpinum. *Clus. hist.* 171.

Habitat in Alpibus Schneeberg. ♃

Caulis *simplicissimus.* Folia *lineari-oblonga, superne latescentia, obtusa, integra, hirsuta.* Pedunculi *axillares, longi, uniflori: foliolis duobus alternis.*

. AZALEA foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalibus. pontica.

Azalea arborea. *Sp. pl.* 1. *p.* 150.

Chamærhododendros pontica maxima, mespili folio, flore luteo. *Tournef. cor.* 42. *Act. parif.* 1704. *Buxb. cent.* 5. *p* 36. *t.* 69.

Habitat in Ponto, Trapezunte. ♄

Simillima Rhododendro pontico, *sed huic stamina* 5, *corollæ luteæ; nec stamina* 10 *&* *corollæ violaceæ. Folia minora sunt ovata, ciliata. D. D. Schreber.*

. VERBASCUM foliis semidecurrentibus, caule ramoso. Thapsi.

Verbascum angustifolium ramosum, flore aureo, folio crassiore. *Bauh. hist.* 3. *p.* 856.
Verbascum album mas, flore luteo. *Dalech. hist.* 13[illegible] e J. B.
Verbascum angustius. *Dod. pempt.* 143. a J. B.
Verbascum foliis viridibus crassioribus. *Moris. hist.* 2, *p.* 436 e J. B.
Habitat in Europa *rarius. Filius observavit.*
Hybrida *a matre* Verbasco Lychnitide, *patre* Verbasco Thapso, *orta Upsaliæ in horto* 1761. *in* [illegible] *cum parentibus pulvillo, sed sterilis, dudum visa* [illegible] & *ad J. Bauhinum missa, unde omnes alii* [illegible] *Convenit cum* Matre *Caule ramoso; Floribus; Filamentorum barba purpurascente, licet minus. Cum Patre convenit magnitudine; Foliorum figura decurrente, sed non totaliter, minusque alba: Calycibus, sed magis pedunculatis, licet minus quam matris. Verbasci Species distincta non est, sed potius varietas Verbasci lychnitidis.*

pensylvanica. 5, 6. PHYSALIS foliis ovatis subrepandis obtusis [illegible] diusculis, floribus geminis, caule herbaceo.
Physalis radice perenni, caule procumbente, foliis ovatis acute dentatis, petiolis longissimis. *Mill. dict.* [illegible]
Alkekengi virginianum perenne majus, flore luteo amplo, fructu minimo. *Rand. act. angl.* 399.
Habitat in Virginia ♃
Caules *multi, nunc procumbentes, nunc erecti, vix pedales, subflexuosi, teretiusculi s. obsolete angulati,* [illegible] *summitate ad flores ramosi, tomento obsoleto adspersi.* Folia *alterna (Bœrhaviæ), ovata, obtusa, serrato-repanda, supra nudiuscula, subtus obsolete tomentosa, ad flores gemina.* Petioli *foliis dimidio breviores.* Pedunculi *ad axillas ramorum, solitarii, petiolis paulo longiores.* Calyx *subcylindricus, subangulatus, basi retusus.* Corolla *lutea fundo obscuriore.* Stamina *lutea.* Bacca *globosa, parva, pisi magnitudine, rubra.*

peruviana. 6, 7. PHYSALIS pubescens, foliis cordatis integerrimis
Habitat Limæ. *Alstræmer.* ♃. ♄
Planta simillima Daturæ Metel. Caulis *altus, divaricatus, tenuissime pubescens, mollissimusque, uti* [illegible]
Folia *cordata.* Flores *solitarii, penduli, lutei* [illegible] *bilico*

bilico corollæ maculis quinque fuſcis utrinque conſpicuis, fauceque hirſuta.

RONDELETIA foliis ternis. *Jacq. hiſt. t.* 43. — trifoliata.
Rondeletia arboreſcens, tini facie. *Ehret. pict. t.* 15.
Habitat in America. ♄
Folia *terna, lanceolata, petiolata.* Pedunculi *folio breviores, nec ut in plumeriana longiores.*

RONDELETIA foliis petiolatis ſubovatis obtuſis. *Jacq. amer.* 16. *t.* 42. — odorata.
Habitat in America. ♄

. VARRONIA foliis ovatis acuminatis, ſpicis oblongis. *Jacq. amer.* 14. *t.* 32. — martinicenſis.
Habitat in Martinica. ♄

4. ECHITES pedunculis racemoſis, foliis ovatis emarginatis acuminatis. *Jacq. amer.* 13. *t.* 23. — agglutinata.
Habitat in America. ♄
Corollæ laciniis lanceolatis.

5. ECHITES ſpicis axillaribus brevibus, ſtaminibus eminentibus, foliis ſubovatis. *Jacq. amer.* 13. *t.* 29. — ſpicata.
Habitat in America. ♄

ECHITES racemis corymboſis, ſtaminibus eminentibus, foliis lanceolato-ovalibus. *Jacq. amer.* 13. *t.* 30. — corymboſa.
Habitat in America. ♄

8. RHAMNUS ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis hermaphroditis. *Jacq. vind.* 212. — ſaxatilis.
Lycium facie pruni ſylveſtris ſ. italicum. *Bauh. pin.* 478.
Spina infectoria pumila 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 111.
Habitat in montibus Badenſibus, Italicis. ♄

GENTIANA foliis quaternis. — quadrifolia.
Habitat in Europa *auſtrali. Cl. Alſtræmer.*
Planta. Matre *Gentiana perfoliata*, Patre *Lino quadrifolio.* Caulis *ſimplex, ſpithamæus, ſubtetragonus, articulatus.* Folia *verticillato-quaterna, linearia, verſus apicem paullo latiora, obtuſiuſcula, longitudine articulorum.* Pedunculi *terminales, quinque: quinto intermedio; ſingulis in medio bracteæ 2, oppoſitæ,*

parva, *&* *apice flores* 3 *pedicellati.* Flores di *G. perfoliatæ*, *sed angustiores.*

angustifolium. 1, 2. SIUM foliis pinnatis umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido. *Hall.* 103. †
Sium s. Apium palustre, foliis oblongis. *Bauh.* 154.
Sium verum mathioli. *Dalech. hist.* 1012.
Habitat in Europæ *australis aquosis*, *nec extra* adscendit. ♃
Folia *basi hastata sunt.* *Varietas β* Sii latifolii *re*denda *&* *huc amandanda.*

lævigatum. 13, 14. RHUS foliis ternatis, foliolis sessilibus lanceolatis lævibus.
Habitat ad Cap. b. Spei. *Arduini.* ♄
Simile Rhoi lucidi, *sed* Foliola *lanceolata*, *minus* *utrinque lævia.* Panicula *longa*, *tenuissima.*

alpinum. 7, 8. LINUM calycibus rotundatis, foliis linearibus fimis reflexis, caulibus declinatis. *Jacq. vind.* 31
Synonyma Lini tenuifolii var. *s huc referenda.*
Habitat in Austriæ *alpinis.* ♃
Simillimum Lino austriaco, *sed* Caules *declinati &* lia *inferiora imbricatim reflexa.*

uniflorus. 1, 2. LORANTHUS pedunculis racemosis: partial unifloris. *Jacq. amer.* 18. *t.* 69.
Habitat in America. ♄

europæus. 6. LORANTHUS racemis omnibus terminalibus plicibus, floribus dioicis. *Jacq. vind.* 230. *
Habitat in Austriæ *Quercubus*, *parasiticus.* ♄
Statura *Visci albi.* Calyx *obsolete sexdentatus.* P & Stamina *sex.* Germen *inferum.* Flores Bacca *monosperma*, *flavescens.*

hispidula. 24, 25. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis su bosis, foliis ternis ovato-lanceolatis, ramulis hi
Habitat ad Cap. b. Spei. *Scheber.*
Flores *parvi*, *ut semen Brassicæ.* Calyx *corolla* *dio brevior*, *etiam lævis.* Pedunculi *bracteis* *minutis.* Folia *Thymi ovata*, *acuminata*, Rami *hispiditate ferruginea s. testacea tecti.*

ZYGOPHYLLUM foliis pinnatis, caule arboreo. *Jacq. amer. 20. t. 83.* — arboreum.

Habitat in America. ♄

Folia *opposita, pinnata absque impari, sæpius septemiuga; pinnis alternis, lanceolatis, obtusis.* Pedunculi *ramosi.*

DIANTHUS floribus solitariis: squamis calycinis binis cordatis brevissimis, corollis emarginatis subintegerrimis. — pomeridianus.

Caryophyllus sylvestris & saxatilis, flore magno lacteo subtus ad spadiceum vergente. *Tournef. cor.* 23.

Habitat Constantinopoli. *Forskåhl; in* Palæstina. *Hasselquist.* ♃

Herba *simillima D. Caryophyllo.* Radix *vix se multiplicans.* Caulis *ramis tribus quatuorve simplicibus, longis, unifloris.* Calycis *squamæ tantum duæ, breves, acutæ non acuminatæ.* Corolla *lutea, subtus virescenti-albida.* Petala *lateribus revoluta, hinc convexa nec dilatata, sed distantia, calycis tubo breviora, obtusissima, parum emarginata, linea exarata.* Stamina *longitudine calycis, alba.* Pistilla *demum excrescunt in longitudinem corollæ.* Flos *aperitur hora diei duodecima cum dimidia, clauditur noctis hora decima.*

10. SILENE floribus racemosis, calycibus decemsulcatis viscidis, floribus aliis staminibus exsertis, aliis inclusis. — paradoxa.

Habitat in Italia. ♃

Statura *Silenes nutantis, sed quadruplo major.* Folia *lineari-lanceolata, canaliculata.* Caules *subincani: alii florentes sesquipedales; alii steriles brevesque pro futuro anno.* Flores *racemosi:* Pedunculis *lateralibus trifloris, viscidis.* Calyces *subcylindrici, decemsulcati angulis viscidis.* Corollæ *purpurascentes, aliis albidæ, noctu explicatæ & odoræ:* Petala *semibifida, subcrenata: corona acuta, subserrata.* Pistilla & *stamina cum antheris in aliis plantis primum prodeunt iisque divaricatis. In aliis plantis Pistilla mox prodeunt, stamina vero inter tubum floris effœta hærent.* Rami *inter flores valde viscosi.*

15. SEDUM erectum, floribus corymbosis fastigiatis. — atratum.

Synonyma Sedi rubentis *quædam huc forte spectant.*

 Habi-

Habitat in Italiæ *alpibus. Allioni.* ⊙
Diversissima planta a Sedo rubente. Caulis *erectus pollicaris, ramis ad radicem duobus oppositis,* ... *dine caulis.* Folia *oblonga, basi soluta.* Ped... *alterni, uniflori, in corymbum fastigiatum* ... Calyces *atro-purpurascentes.* Petala *alba,* ... *longitudine calycis.* Stamina *decem.* Germina ... *purpurascentia.*

linearis. 7, 8. CAPPARIS floribus subracemosis, foliis linearibus. *Jacq. amer.* 24. *t.* 102.
Habitat in America. ♄

pulcherrima. 7, 8. CAPPARIS floribus racemosis, foliis oblongis ... tusis, fructibus baccatis. *Jacq. amer.* 24. *t.* 106.
Habitat in America. ♄
Baccæ subrotundæ sunt.

frondosa. 8, 9. CAPPARIS pedunculis umbellatis, foliis ... confertis. *Jacq. amer.* 24. *t.* 104.
Habitat in America. ♄
Folia sunt lato-lanceolata.

palæstina. 8, 9. STACHYS floribus subspicatis, foliis lanceolatis tomentosis venosis integerrimis, calycibus muticis.
Stachys alba, angusto salviæ folio. *Barr. ic.* 279.
Sideritis incano oleæ folio, flosculis ex incarnato ... dicantibus montis libani. *Volk. norib.* 353. ... *suppl.* 306.
Sideritis molli cinereo oleæ folio caulem ambiente, flore violaceo, ex monte carmelo. *Bocc. mus.* 2. *p.* 145. *t.* 109, 112.
Habitat in Palæstina. *Arduini.* ♄
Caules *teretes, tomentosi, albi.* Folia *sessilia, lanceolata, integerrima, venosa, tomentosa, mollia, parum* ... *cuta.* Spicæ *e verticillis sexfloris:* Bracteis ... *tomentosis, venosis.* Calyces *acuti, mutici.*

crispum. MARRUBIUM foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calycibus decemdentatis muticis.
Marrubium dictamni spurii foliis & facie. *Herm. par.* 200. *t.* 200.
Pseudo-dictamnum nigrum, rotundo crispo folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 152. *t.* 129. & *in titulo.*
Habitat in Italia, Hispania. *Arduini.* ♃

Coro-

larum galea rotundata, emarginata. Satis simile M.
'icano. Figura Bocconis in ipso titulo delineata est
regia.

MALVA caulibus prostratis, foliis cordatis biculatis crenatis tomentosis, & pedunculis foli-:iis unifloris. **Scherardiana.**
va humifusa minima. *Till. pis.* 108. *t.* 35. *f.* 2.
tat in Bithynia. *Arduini.* ♃
es *bipedales, filiformes, prostrati: ramis brevissi-s.* Folia *cordata, orbiculata, rugosa, obtuse cre-ta, parva, utrinque tomentosa: petiolis longitudine 'iorum.* Pedunculi *axillares, uniflori, solitarii, pe-lis demum longiores.* Flores *parvi, calyce exte-ore minutissimo.* Fructus *cum calyce ratione plan-magnus: arillis decem, rotundis, inflatis, pube-ntibus.*

OS foliis lanceolatis integerrimis enerviis. **acaulis.**
ios acaulis. *Jacq. amer.* 31. *t.* 153.
ta innominata. *Plum. amer. t.* 57.
tat in Americæ *arboribus.*

'RIPLEX caule herbaceo divaricato, foliis lan-olatis obtusis integris, calycibus femineis pedun-latis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 295. * *Hudſ. angl.* 378. **pedunculata.**
plex maritima, femine lato. *Raj. angl.* 3. *p.* 153.
plex maritima Halimus dicta humilis erecta, fol-:ulis in latitudinem expansis & utrinque recurvis, ngo pediculo insidentibus. *Pluk. alm.* 61. *t.* 36. *f.* 1.
iplex maritima nostras, ocymi minoris folio. *Raj. gl.* 3. *p.* 153.
itat in Angliæ, Daniæ *maritimis.* ☉

'IA *angustifolia.*
Albara s. Pacivira. *Pis. bras.* 213. *fig. bona.*
Petala *interiora tria emarginata, uti in C. latifolia: horum petalorum alterum laterale ita flectitur, ut intermedium evadat.*

:HAVIA *erecta.*
Bœrhavia floribus paniculatis, seminibus pentagonis truncatis. *Gouan. monsp.* 2.

Folia

Folia *ovata subtus incana.* Corollæ *purpurascent*
——— *scandens.*
Boerhavia floribus umbellatis, seminibus fusifor truncatis apice tuberculatis. *Gouan. monsp.* 1.
Folia *subcordata, glabra.* Corollæ *viridescentes.*

SALVIA *disermas.*
Salvia caule fruticoso, foliis ovatis sinuatis crenat gosis hirtis. *Arduin. spec.* 9. *t.* 1.
——— *hispanica.*
Salvia foliis cordato-ovatis serratis rugosis, bracteis verticillis florum senis, calycibus tridentatis. *Ar spec.* 10. *t.* 2.

VERONICA *fruticulosa. Jacq. vind.* 200. *

VALERIANA *tripteris. Jacq. vind.* 201. *
——— *montana. Jacq. vind.* 202. *.
——— *celtica. Jacq. vind.* 203. *
——— *saxatilis. Jacq. vind.* 204. *
——— *Locusta.* η *mutica.*
Valeriana caule dichotomo, foliis imis dentatis, mis linearibus multifidis. *Sauv. monsp.* 131.
Valeriana semine umbilicato rotundo nudo. *M monsp.* 273.
Phu minimum. *Lob. ic.* 716.
Planta vix tripollicaris.

SCHOENUS *mucronatus.*
Juncus maritimus, panicula subrotunda glumosa. *B ic.* 203. *f.* 1.

CYPERUS *fuscus. Jacq. vind.* 206. *

NARDUS *aristatus.*
Nardus incurvus, spica incurvata æquali, calycina ma exteriore aristato-acuminata longissima, flor distantibus alternis. *Gouan. monsp.* 33.

PHALARIS *oryzoides. Jacq. vind.* 206. * Petalis nullis.

MILIUM *lendigerum.*
Agrostis *ventricosa* calycibus inferne ventricosis, val exteriore acuminata longitudine aristæ. *Gouan.* 39. 547.

AGROSTIS *alba.*
Agrostis *palustris* panicula coarctata mutica, calyc æqualibus hispidiusculis coloratis, culmo repe *Hudf. angl.* 27.

AIRA - - *flexuosa.* hujus sola varietas. *A. montana. Hudf. angl.*

CYN

ɪSURUS *durus.* habitat etiam Halæ *Leyſer.* ⊙
Culmi *ex eadem radice pauci, vix palmares.* Folia *lævia.* Spica *ſecunda: Spiculis ſecundis duorum ordinum, abſque involucro.* Spiculæ *rigidæ, triſloræ, lineares, obtuſæ, læves.* Floſculi *compreſſi, mutici.*

ɪUS *diſtachyos.*
Feſtuca *ciliata* valvulis interioribus glumæ corollinæ ciliatis, panicula ſtricta ſecunda ſimplici. *Gouan. monſp.* 48, 547.
Gramen feſtuceum myurum elatius, ſpica heteromalla gracili. *Barr. ic.* 99. *f.* 2. *Scheuch. gram.* 293.
Gr. cultum communiter ſpicis tribus loco duarum eſt.

ɪDO *Donax.* Calycibus plerumque quinquefloris eſt. *D. Turre.*

ɪCUM *maritimum.*
Poa ſpicata: ſpiculis alternis ſeſſilibus ſubſexfloris. *Hudſ. angl.* 35.
Gramen pumilum, loliaceo ſimile. *Raj. angl.* 3. *p.* 395.
Gramen exile duriuſculum maritimum, foliolis circumvolutis veluti junceis brevibus. *Pluk. phyt.* 32. *f.* 7.

ɪCUS *fullonum β. ſativus* Paleis recurvatis a ſpontaneo differt.

ɪOSA *ochroleuca* vix ſpecie differt a *S. columbaria;* collocanda itaque proxime.
— *papposa.* ⊙
Caulis *pedalis, brachiatus, ſubdichotomus.* Folia *linearia, pinnatifida.* Pedunculi *axillares, longi.* Flores *parvi.* Pappus *ſeminum plumoſus cum adjacente Ariſta longiore.*

EA *viſcoſa.*
Staphyllodendron foliis lauri anguſtis. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 247. *f.* 2.

;COUM *erectum in uno, quem vidi, flore erant ſtamina tetradynama; obſervandum an ſic ſemper?*

ɪGLOSSUM *cheirifolium.*
Cynogloſſum foliis ſpatulatis incanis tomentoſis ſemiamplexicaulibus. *Gouan. monſp.* 37. *
— *linifolium.*
Cynogloſſum foliis lineari-lanceolatis ciliatis, pedun-

dunculis axillaribus multifloris subnudis. Go[uan] monsp. 82.

ECHIUM *Italicum.*

Echium *anglicum* caule simplici erecto, foliis lan[ceo]lato-linearibus hispidis, floribus spicatis lateral[ibus] staminibus corolla longioribus. *Hudf. angl.* 70.

——— *italicum* β. varietas, pro distincta ab Hudsono. Echium italicum corollis subæqualibus vix calycem [ex]cedentibus margine villosis. *Hudf. angl.* 70.

NOLANA *prostrata.*

Atropa foliis geminatis, calycibus polycarpis, [ca]uli humifuso. *Gouan. monsp.* 82.

DIAPENSIA *helvetica.* *Jacq. vind.* 303. *

PRIMULA *integrifolia.* *Jacq. vind.* 209. *

Corollæ *laciniæ semibifidæ: Tubo simplici absque a[nnulo] coarctato.*

——— *minima.*

Primula foliis cuneiformibus nitidis, scapis unifl[oris] *Jacq. vind.* 208.

Involucrum *diphyllum, calyce brevius.* Flos *unicus:* C[o]rolla *infundibuliformis, intus hirsuta absque fundo co[ar]ctato.*

CAMPANULA *pyramidalis* caulibus junceis simplicibus, fo[liis] lævibus serratis cordatis, caulinis lanceolatis, [...] bellis sessilibus lateralibus *præstaret dici.*

——— *thyrsoides.* *Jacq. vind.* 211. *

THESIUM *alpinum.* floribus tetrandris. *Jacq. vind.* 213. *

SALSOLA *altissima.* Flores prægnasci ex basi ipsius folii, ut Thesio, observavit *Filius.*

GENTIANA *nivalis.* *Jacq. vind.* 215. *

ERYNGIUM *maritimum* involucris ovatis capituli longitud[ine] *Gouan.*

Campestre involucris subulatis, capitulo longiori[bus] *Gouan.*

Amethystin. involucris lanceolatis, capitulo long[iori]bus. *Gouan.*

BUPLEURUM *falcatum.*

Caulis *totus paniculatus, purpurascens.* Umbellæ *sat[uratæ] te luteæ: umbellulis sæpius septem.*

DAU

ꞆUS *muricatus.* β. *maritimus.*
Caucalis umbella bifida, umbellulis dispermis, involucris semine brevioribus linearibus. *Gouan. monsp.* 135.

ꞆMANTA *cretensis.* *Jacq. vind.* 218. *

ꞆCLEUM *austriacum.* *Jacq. vind.* 216. *

ꞆTIA *orientalis*, foliis omnibus pinnatifidis, corollis calyce longioribus *dicenda.*

ꞆNLANDIA *corymbosa.* ☉
Caules *subprostrati*, *adscendentes*, *tetragoni*, *læves: Ramis oppositis.* Folia *opposita*, *angusto-lanceolata*, *lævia*, *linea longitudinali exarata*, *longitudine internodiorum.* Stipulæ *oppositæ*, *obtusissimæ*, *adnatæ*, & *connectentes folia*, *apice aristis tribus*, *ut in Spermacoce*, *cui & Houstoniæ proxima.* Pedunculi *alterni*, *solitarii*, *laterales*, *filiformes*, *nudi*, *intra singulam stipulam terram spectantem singuli*, *longitudine folii*, *terminati* umbellula *subquadriflora absque involucro.* Flores *albi.*

ꞆA *humilis.*
Piercea foliis cordatis pubescentibus. *Mill. dict.* 2.

ꞆCARPUS *erecta.*
Munghala arbor curassavica, foliis salignis. *Comm. hort.* 1. *p.* 115. *t.* 60?

ꞆENIA *florida.*
Jasminum ramo unifloro pleno, petalis coriaceis. *Ehret. seleit. t.* 15. *egregia.*

ꞆTES *suberecta.*
Corollarum Tubus hirsutus est.

ꞆERICUM *revolutum.*
Phalangium æthiopicum ramosum, floribus albis, petalis reflexis. *Comm. hort.* 1. *p.* 67. *t.* 34?

ꞆERA *gummifera.*
Terebinthus americana polyphylla. *Comm. hort.* 1. *p.* 149. *t.* 77?

ꞆSIA *amara.*
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94? *an potius hujus*, *quam Melicoccæ synonyma.*
Arboris Folia *alterna*, *pinnata: foliolis quinis*, *lato-lanceolatis*, *integerrimis*, *lævibus.* Petiolo communi *marginato*, *articulato.* Racemi *terminales.*

LIGU-

LIGUSTICUM *austriacum. Jacq. vind.* 221. *
——— *peregrinum.*
Petroselinum hortense latifolium. *Bauh. pin.* 153.
Apium hortense magnum, petroselini sapore ida anglicum quibusdam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 99.
Sapor & odor omnino Petroselini, *sed crassiora rigidi que omnia.*

PHELLANDRIUM *Mutellina. Jacq. vind.* 223. *

SESELI - - *pumilum.*
Pimpinella umbellis numerosissimis simplicissimis co positisque. *Jacq. vind.* 227. *
Pimpinellæ glaucæ nimis affine, sed decies minus.
——— *Hippomarathrum. Jacq. vind.* 224. *

PHARNACIUM *cordifolium.*
Spergula e. c. b. f. foliis portulacæ minoribus stella *Pet. mus.* 478.

AMARYLLIS *Belladonna.*
Monographia System of vegetable generation. *L* 1758. *Jofl. t.* 1. - 5.

ALLIUM - *triquetrum.*
Folia *Sparganii, triquetra s. ensiformia, valde cari* Scapus *erectus, triqueter, foliis brevior.* Spatha l *ceolata, bivalvis.* Umbella *longitudine Spathæ.* Co la *Petalis 6, lanceolatis, acuminatis, erectis, albis, rina obsolete viridi.* Stamina & Pistilla *petalis di dio breviora.* Antheræ *flavæ.* Stigma *acutum.*

ANTHERICUM *calyculatum.*
Anthericum *Pseudo-Asphodelus* foliis ensiformibus nearibus, racemis oblongis, filamentis glabris. *J vind.* 233. *

JUNCUS - *bulbosus.*
Juncus *compressus* foliis linearibus canaliculato-c cavis, capsulis obtusis, culmo compresso. *J vind.* 235.

BERBERIS - *cretica.*
Folia *obovata, obtusa, mucronata, integerrima, plura eadem gemma.* Furcæ *tridentes.* Racemi *fere* ut *lati.* Semina *tria oblonga.*

POLYGONUM *amphibium.*
Stamina plantæ aquaticæ flore breviora, siccæ longio Jacq.

VAC-

:CINIUM *uliginosum. Jacq. vind.* 239. *

SIA-*Senna.*

Petioli absque glandula. Siliquæ recurvatæ.

—— *ligustrina.*

Foliola *margine subpilosa sunt, quæ dormiens planta noc[illegible] patentissima extendit, ut pagina superior apicem peti[illegible] respiciat.*

NARIA *multicaulis.*

Affinis A. ciliatæ. Folia *non nervosa observavit Jacq.*

—— *media* floret hora 12.

—— *rubra* floret hora 9. *maritima* glabra, foliis peduncu[illegible]que pubescentibus viscidis est.

PERVIV. *globuliferum.* Flores *hexandri, hexagyni, [illegible] Jacquin.*

PILUS *Chamæ Mespilus. Digynus visus Jacquin.*

HRUM *virgatum.*

Lythrum *austriacum* foliis oppositis lineari-[illegible] latis subsessilibus nitidis, floribus dodecandr[illegible] *vind.* 243. *

Lysimachia rubra non siliquosa. *Bauh. pin.* 246.

Lysimachia purpurea 2. f. minor. *Clus. hist.* 2. *p.* 51.

Folia *etiam in hac opposita sunt. Flores terni.*

:NTILLA *aurea. Jacq. vind.* 245. *

—— *caulescens. Jacq. vind.* 246.

DIUM *Cardamines.*

Lepidium foliis inferioribus alternato-pinnatis: pinnulis semicordatis carnosis glaucis; superioribus sessilibus dentatis apice ovatis. *Arduin. spec.* 19. *t.* 8.

IA *multiflora. N. L. Burmannus.* ⊙

Simillima Z. pauciflora, *sed* Caulis *hirtus, nec lævis.* Folia *subpetiolata, nec sessilia.* Flores *pedunculati pedunculo lævi calyce longiore, nec sessiles.* Corollæ *radius supra ruber stylis flavis, nec totus flavus.*

OSPERMUM *polygaloides.* Folia *sessilia, erectissima, lanceolata, mucronata, integerrima, carinata, glabra.* Caulis *inter folia sæpe villis bombycinis adspersus.* Pedunculi & Calyces *muricati spinis molliusculis.*

:ANTHUS *albus.*

Blitum maritimum minus, calyculis aculeatis. *Till pis.* 25.

D. STILLINGFLEET *miscellaneous tracts*. *Lond.* 17 8vo sequentia *Gramina* pulchre delineavit.

pag. 381	Tab. 1	ANTHOXANTHUM - -	*odoratum.*
381	2	ALOPECURUS - - -	*pratensis.*
382	3	AGROSTIS - -	*capillaris.*
383	4	AIRA - - -	*flexuosa.*
383	5	AIRA - - -	*caryophyllea.*
383	6	POA - - -	*pratensis.*
383	7	POA - - -	*annua.*
384	8	FESTUCA - -	*ovina.*
386	9	FESTUCA - -	*rubra.*
386	10	FESTUCA - -	*fluitans.*
390	11	CYNOSURUS - -	*cristatus.*

JACQUINI Historia Plantarum Americanarum.

Tabula	6.	UTRICULARIA - -	alpina
	9.	HIPPOCRATEA - -	volubilis
	10.	TAMARINDUS -	*indica*
	11.	CALLISIA - -	repens
	14.	FAGARA - -	tragodes
	15.	CISSUS - -	Sicyoides
	33.	VARRONIA - -	bullata
	34.	CERBERA - -	Thevetia
	37.	CHRYSOPHYLLUM -	Cainito
	38.	- -	glabrum
	39.	JACQUINIA - -	armillaris
	41.	ACHRAS - -	Sapota
	44.	PORTLANDIA - -	grandiflora
	46.	PSYCHOTRIA - -	herbacea
	47.	COFFEA - -	occidentalis
	50.	HAMELLIA - -	patens
	51.	f. 3. SAUVAGESIA -	erecta
	52.	f. 1. CONOCARPUS -	erecta
	53.	- - -	racemosa
	85.	SAMYDA - -	parviflora
	87.	ERYTHROXYLUM -	aculeatum
	91.	GINORA - -	americana
	92.	EUPHORBIA - -	Tithymaloides
	109.	LECYTHIS - -	Ollaria
	110.	CRANIOLARIA -	annua
	111.	CRESCENTIA -	Cujete
	115.	CAPRARIA - -	biflora
	122.	DOLICHOS - -	pruriens

DEX GENERUM.

A.

000003

Ceta-

INDEX GENERUM.

Mol-

Stra-

INDEX SYNONYMORUM

A.

Am-

Coral-

F.

H.

Lobus

NOMINA TRIVIALIA

B.

J.

K.

L.

Napus

T.

U.

V.

ERRATA.

in nonnullis exemplaribus occurrentia.

'. *anguſtana lege* auguſtana.
1. *lin. ead.* anguſtiora *lege* auſteriora.
,. *lin.* 14. moliniformis *lege* moniliformis.
). *n.* 20. *deleatur*: Geranium Africanum, Coriandri. Riv. pent. 106.
;. *lin.* 31. antiqua *lege* Jacquin.
:. pelegina *lege* pelegrina.
:. *n.* 31. Spica *lege* ſpicatis.
). *lin.* 17. fructiferis *adde* reflexis.
. *lin.* 21. glomeratis *lege* glomerulis.
4. poſt *lin. ult. adde: Habitat in* Angliæ *fucis.*
;. *n.* 1. & 3. pulvitanus *lege* pulvinatus.